



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4867/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4867/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4867/A/1

4867/A.

A XIX. a



7006
3
P A V L I

ÆGINETÆ OPVS DE RE ME-

dica nunc primum integrum, Latinitas

te donatum per IOANNEM

GVINTERIVM

Andernacum, do-

ctorem me-

dicum.


ADIECTIS IN EVNDEM DO

ctissimis & quàm utilissimis anno-

tationibus ab eodem Ander-

naco elucubratiss,

CVM INDICE COPIOSISSIMO.

Ex lib. Pompei  Pompeii
Philippi.

Venetijs apud Andream Arriabenum.

M D XXXXII.

CANDIDO LECTORI S.

IAm pridem Paulum Aeginetam à me cōuersum, optime le-
ctor ædidiſſem, niſi meliorum exemplarium ſpes aliqua me
detinuiſſet. Cupiebam. n. optimum authorem non mutilū, ut in
impreſſo codice habetur, ſed quatenus liceret integrū, fideliter
ac pure expreſſum, ſtudioſis hominibus impartire. Quippe ui-
debam parū adeo utilitatis ad ſtudioſos peruenturū, ſi Aldino
exemplari duntaxat uſus, in quo per multa deſiderantur, ſcri-
ptorem interpretandum ſuſcepiſſem. Imo plurimum dignitati
ipſius deceſſurum ſciebam, tandemq; interpretis temeritate op-
timum authorem iri neglectum. Itaq; primum laboraui ſedulo,
ut codicem meum ex alijs exemplaribus manuſcriptis, ſine qui-
bus neminē puto q̄libet ingenioſum aliquid proſecturum emē-
darem: deinde ſententiam Pauli, ſi qua erat obſcurior, cū ſcri-
ptoribus unde tranſcripſerat, conferrem, ac ſtatim in Ioannis
Laſcaris uiri incomparabilis antiquū exemplar inciſi, ſed nō
ita per oīa fidele, ad hæc ſæpius Ruellij medici clariſſimi, admi-
randę uetuſtatis codicem inſpexi, ſed ne is quidē omni ex pte
reſpondit, præſertim in Chirurgia, licet alijs quos uiderim fue-
rit emendatior. Porro non contentus fui ijs ſolum exēplaribus,
uerum longis itineribus antiquiſſimū Oribasij uolumen, literis
longobardicis ſcriptū, egregium uetuſtatis monumentum con-
ſului, quod ſanē quo minus elegantię & ornatus, eo plus fidei
& authoritatis habuit, Vnde non paucos correxi locos, quos
Paulus ad uerbum ex illo trāſcripſit. Omitto quot ex Galeno,
Hippocrate, Alexandro inſtaurari, qui in omnibus exempla-
ribus erant deprauati. Sed ecce, dū tanta ſollicitudine & dilige-
tia, pulcherrimo authori conor ſubuenire, rumor hic ſpargitur
eundē Baſileę latinitate donatū excuſi. Quod ſanē non potui
nō demirari, quum typographi illic anno, anteq̄ interpret ille

cogitasset eum uertere, me propemodum absoluisse, p meas & amicorum literas cognouissent. Nō tamen ideo mœrori me dedam, quasi oleum & operam perdiderim, quum, opus non integrum, ut in quo tum alia, tum sextus liber, ut optimus ita difficillimus desideraretur. Id tamen male me habuit, quod statim ubi huc fama de Pauli impressione uenisset meum coactus sum prælo committere, nondum dedolatum imo ne runcinas quidem, expertum, ut iam tertius liber esset impressus fere, anteq̃ ex Germania alter adueheretur. Illud uerissimum, si domi libros istos diutius paulo & in manibus habere atq; reguſtare interim ex interuallo licuiſſet, longe elimatiores prodituros fuiſſe. Quum uero p typographum id non licuerit, festinata operis descriptione factum est, ut aliquoties dictio una pro altera posita sit, quæ optime in præcedentibus habebatur. Sed oīa libris iam impressis ad fidem restituimus, ut secundæ reeognitiōis loco esse possint. Præterea in singulos libros annotatiunculas fecimus, quibus locutiōes uulgo incognitæ exponūtur, aut quando exēplaria uariant, nusq̃ interpretationem alteram reprehendimus. Nā id censui & parum candidum & prope infinitū. Nostra duntaxat uoluimus esse emendata, Hippocratis exemplum imitati, qui ingenue aliquando à futuris se deceptum fuiſſe fatetur, more scilicet magnorum uiro- rum, & fidutiam, magnarū rerum habentium. Nā læuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multaq; nihilominus habituro cōuenit ēt simplex ueri erroris cōfessio p̄cipueq; in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur, ne qui decipiātur eadē ratione, qua quis ante deceptus est. Vale Lector candidissimi.

AD CLARIS

SIMVM IOANNEM BELLAIVM

Præsulem Parisiensem, & Francisci Christianissimi

Francorum regis consiliarium, in sanctiore

consilio: Ioannis Guinterii Anderna-

ci in Paulum Aeginetam è

Græco in Latinum trās-

latum, præfatio.



Voniam nuper lucubrationes nostras
Præsul Clarissime, tanta excepisti hilari-
tate, et benevolentia ut in me adiuuando
ornandoque nihil feceris reliqui, immen-
sa animo meo cura subiit, quomodo me
gratum beneficiis tuis approbem, res-
ponamque gratiam. Non enim tan-
tum in me ingenii, non eam sentio dis-
cendi facultatem, qua, ut par est, nomi-
nis tui memoria, celebritasq; frequentetur. uerum et diis lacte
rustici, ut Plinianis uerbis utar, multæq; gentes supplicant, et
mola tantum salsa litant, qui non habent thura. Offero igitur
tibi integrum Pauli Aeginetæ de re medica opus, in Latinam
orationem à me superioribus annis conuersum, non tam refe-
rendæ gratiæ studio (uix enim condignum tuis meritis existi-
mo, ut quibus summa studiorum meorum debeatur omnis)
quàm ut auspicato in uulgus procedat, ac ancipitem iudicio-
rum aleam secure experiatur, tanti celebritate nominis com-
mendatum. Noui enim hosce meos labores, nisi magno ali-
quo patrocinio defendantur, à morsibus uiligatorum tutos
non fore: isto præsertim tempore, quo homines honestum
quidem illud Hesiodi certamen inter sese negligunt, uerū ubi
studiosior aliquis ingenii sui fœturas, magno sudore multisq;
uigiliis in communem partas usum emittit, statim nullo iudic-
cio calumniantur, eleuant, traducunt. Tuam itaq; autoritatē,

EPISTOLA.

Pontifex ornatissime appello: eius uiri authoritatem qui ob admirabilem animi probitatem, singularem doctrinā, ad multos honores amplissimos euectus est, cuius tantam prudentiā Franciscus Christianissimus Galliarum Rex, tum in Sanctiore suo consilio, tum apud exteros principes sentit, ut Homerus cum illud uerē dicat,

Αἶχεν ἔδωτε πάτερ καὶ ἀθλῶ κίη καὶ ἄ' πολλόν,
Τοῖς τοι δέ κ' μοι συμφραδέμενον εἶεν Ἀχαιῶν.

Eoq; nuper Parisiensibus nullum alium antistitem inter tot præclaros alioqui uiros sua sponte delegerit: quem in hoc à Deo terris concessum arbitror, ut esset qui hoc seculo Mœcenatis illius Romani imaginem nobis referret: Proinde à parū candidis iudicibus ad te prouoco, sic difficultatibus aliquādo tanti operis uictus, utilitatem iuuandi prætulerim gratiæ placēdi. Cum enim uiderem medicos hætenus medendi rationem à barbaris indoctisq; scriptoribus petere, omni cura authorē Græcia aliquem interpretandum mihi censui, ex quo rectius practicen (sic enim uocant) suam cōdicerent. Occurrit autem in primis Paulus Ægineta excellens medicinæ scriptor, annis iam mille desideratus, qui compendio, ordine, artificio, perspicuitate, & doctrina, omnes facile superauerit. Adde quòd multa feliciter tractet quæ Galenus, Oribasius, Alexander, Aetius, Rufus, & reliqui huius disciplinæ procures omiserunt. Vnde non dubitem asserere, hunc unum Paulum, si Galeni theoricæ adiicias, ad medicinam perfectè discēdam sufficere. Toto igitur animo & cogitatione incubui, ut hūc authorem in studio forum gratiam quasi latinitate donarem: in quo sanè laboris mihi plurimū fuit subeūdum, tū exemplariorū uisio: quibus tria obtigerint diuersa, tum quod in chirurgica uel instrumentorū nomine difficillima, nulli ferè latini authores habeantur, quos tuto queas æmulari. Quippe is semper mihi in uertēdis Græcorum monumētis fuit animus, ut præter fidem, qua nihil in interprete est optabilius, pure omnia, latine & munde, quatenus liceret, exprimerem, quanquam hodie multos agrestes hircososq; philosophos, si diis placet, uideam, quos impolita

E P I S T O L A.

magis & rudia delectat exasciataq; magis q̄ dedolata: ex ho-
rum numero nonnulli grauiiores disciplinas exponere aggres-
si, uocabulis sordidis & ex intima plebei sermonis fæce acces-
ptis, foedant contaminantq;. Vnde fit ut qui paulo humanius
educati institutiq; sunt, non reformident illas adeo, sed fugiāt
oderint & despuant, cum maxime referret, egregias mentes
præclaraq; ingenia sermonis uenustate & gratia ad seueriores
illas ut ita dicā, matronas allicere. Quæ an ego præstiterim,
quod in tam grandi opere uix potest fieri, aliorum esto iudicium:
certe hoc audacter assero, qui nunq̄ inter politioris mu-
sa æmulos certationibus disceptationibusq; elimati, nunq̄ p
Celsi, Largi, Plinii, Varronis, Columellæ aliorumq; literas
sunt peregrinati, eos parum adeo fructus hinc relaturos. Tu
interea hasce meas uigilias, Pontifex Optime ne contemne,
ad quas absoluendas & author et auxiliarius extitisti. Perge
fauere doctis, perge literas excitare, perge ueterem recipere
medicinam, quæ hætenus ægrota erat et propè desperata.
Habes in hoc pulcherrimo negotio Iacobum Colinum uirgē
ex animo omnium doctorum maximum, instar albæ lineæ,
amatorem: habes fratres tuos clarissimos, ut omnium gene-
re uirtutum, sic literis supra ueri fidem excultos, qui te ueluti
Hercules Atlantem strenue adiuuabunt. Vale præsul clarissi-
me. Lutetiæ, Calendis Octobribus, Anno ab orbe redempto
millesimo quingentesimo trigesimo secundo.

INDEX TOTIVS OPERIS, CVIVS PRI

mus numerus folium, secundus paginae uersum significat:

a, primam paginam, b, uero secundam denotat.

A Baptismi. fol. 259 b 29	a 17 & 31	
Abdominis uulnerati	Acetum	326. a 21
signa. 237 b 9	Aceti fæx	326. a 21
Abdominis interioris mem-	Acetum scilites	341. b 27
branæ uulnera qua ratione	Acetum scilites quibus utile	
manu curentur. 237 b 1	342. a 2	
Abdominis suendi ratio.	Achores unde fiant & quō cu-	
238 a 13.	rentur. 66. a 26. ib. b 1.	
Abies. 292. b 17	Achras	237. b 20
Abrasorum curatio. 169. a 19	Acidorum uis	278. a 2
Abrotanum. 279. a 13	Acinus herba	281. a 21
Abcessus quid. 172. a 19	Acini mali punici	319. a 21
Abcessuum differētia. ib. 29	Aconitum	281. a 25
Abcessuum notæ. ib. 31	Aconiti notæ	211. b 29
Abcessuum curatio manu ad-	Aconiti remedia	ib. b. 14
hibita. 228. b 14	Acopa	371. b 25. 582. b 1
Abcessus corporis exteriores	Acopa calefacientia quibus	
quomodo curentur. 117. a 2	consent, quibusque conue-	
Abcessus rumpentia. ib. b 11	niant	282. b 8
Abcessus uulvæ curatio per	Acopa emollientia quid præ-	
manum adhibita. 169. b 24	stent	ib. 11
Absinthium. 286. b 25	Acoporum spissitudo quæ ef-	
Acacalis. 180. b 26	se debeat	ib. 17
Acacia	Acopon Azanitæ	383. b 2
Acalyphe	Acopon Basilii	ib. 7
Acanthus	Acopon dysodes à foedo odo-	
Acantha leuce	re dictum	383. b 26
Acanthium	Acopon præcilon, à uarietate	
Acanthobolon	sic dictum	383. a 24
Aceratos, hoc est ceræ, expers	Acopon cui nomen est pyxis	
emplastrum Galeni, glutin-	384. a 14	
at, cōcoquit. ulcera ad sup-	Acopon ex abiete Galeni.	
purationē perducit. 371. a 1	ib. 22 & 33	
Acetabulum. 304. a 11. 345	Acopon ex atramento libra	
	a iiii	

INDEX

nio, cutis ruborem peculia-	ægyptia artaba	395.b 17
riter inducens, idque potissi	ægyptium lutum	289.a 31
num in iis quibus altera ps	ægyptia stomatica	397.a 12
capitis dolet.	385.a 14 ægiros	280.a 16
Acopon ex nigra populo, dia	æma	ib. 33
ægyros dicitur.	ib. æquinotium autumnale	
Acoron	281.a 32 33.a 24	
Acrides	ib. b 1 æquinotiu uernum	ib. 6
Acrium uis	278.b 3 æra. i. lolium	280.b 24
Acrochordon	169.b 24 æris flos	328.b 11
Acroterialmos	254.a 2 ærugo	297.a 6
Acte	281.b 5 æruginis coctio	376.a 11
Aculeos educentia medicamē	æstate quæ uictus ratio utilis	
ta	290.a 26 fit	15.a 11
Adarce	281.b 5 æs combustum	328.b 7
Adeps animalium	28.a 34 æthale	280.a 27. 307.a 28
Adeps anserinus	323.a 1 æthiopis	280.a 29
Adeps bubulus	ib. 4 aetonychon	280.a 6. 308.a 26
Adeps caprillus	322.b 15 ædoxon	280.a 22
Adeps galli	323.a 2 æris cremati coctio	375.b 10
Adeps gallinæ	ib. Agallochum	279.a 20
Adeps leoninus	ib. 3 Agapeti compositio ad poda	
Adeps uillus	322.b 33 gram	348.b 2
Adeps uiperinus	ib. 7 Agaricum	279.a 27
Adeps ursinus.	ib. 5 Agarici nigri remedia	
Adeps vulpinus	ib. 7 215.a 30	
Adeps mariu calidior & sic	Ageraton	279.a 33
cior quam foeminae	ib. 9 Ageratus	307.b 34
Adeps uetustate calidior red-	Agglutinamenta	358.b 17
ditur.	ib. 10 & 359.b 7	
Adiantum	277.b 32 Agglutinamēta oculor & dea	
Aduſtio infantium	3.b 20 . fluxionibus infestae	364.b 25
Aer optimus qualis	13.a 35 Agnus	279.a 26
Aer uitiosus	ib. b 2 Agnus sanguis	280.b 14
ægilops	280.a 12 Agriſcorodon	321.b 29
ægilops morbus	87.b 4 Agrostis, gramen	279.b 8
224.b 3	Aizoō maius, & minus	280.a 2
ægilopis curatio	ib. 9 Alabaſtites	308.a 6
& 224.a 33	Alæ aduſtio quō adminiſtran	
ægirinum	387.a 25 da.	

INDEX

Alana gleba	289.b 2	alsine	282.a 27
Alauda	393.b 29	altercum	326.b 35
Alua dia rhodon	362.b 23	alterci signa	210.b 19
albugines oculorum curatia		alterci remedia	ib. 20
90.a 24		althæa	281.b 17
alcæa	281.b 28	alumen	323.b 4
alcibiadios Anchusa	279.b 21	aluminis coctio	376.a 22
alcyonium	281.b 32	alumen astragalites	323.b 7
alcionium Miletium	ib. 34	alumen rotundum	ib. 6
Alexandri Cyphoides		alumen scissile	ib.
346.a 10		alumen placites	ib. 8
alexandri purgatio ex rhodo		alumen plinthites	ib.
melite confecta	333.b 27	alui citæ curatio	60.b 11
alga	328.a 20	alui cruentæ curatio	ib. 31
alica	23.b 18	alui deiectiones quid præfa-	
alimentorum facultates		giant	61.a 6
23.a 20		alius optima	43.b 25
alimon	281.b 23	alius pessima	44.a 9
aliptræ	128.a 35	aluum fanis subducentia	
allium	25.a 25	11.a 30	
allium sylvestre	321.b 30	alypon	282.a 32.332.b 9
alme	382.a 6	alysson	ib. 35
aloe	ib. 13	amantium notæ	79.a 23
aloes coctio	377.a 34	amantium curatio	79.a 33
alce stomacho conducit		aniores	79.b 20
330.b 23		amaracus	282.b 11
alopes	282.b 5	amaracinum	388.b 14
alopecia unde dicta	62.b 18	amaranthus	282.b 13
alopeciæ remedia	63.a 3	amarorum uis	278.b 8
alos achne	282.a 13	amaurosis	92.b 20
alos authos	ib. 19	ambrosia	282.b 18.288.a 5
alphi unde generentur		ambylopia	92.b 20
166.a 33		ambrosia ad febreis arcendas	
alphi duplices albi & nigri		apta	382.a 31
ibid. 34		ambustorum igni curatio	
alporum curatio	ib. 34	168.a 35	
alphos nigros tollentia	ib.	ami	282.b 23
alphos albos exterentia		amianthis lapis	ib. 16
167.a 5		amazonū pastillus	250.a 33
als, id est, sal	281.b 11	amithaōis emplastrū	469.a 15

INDEX.

Ammanitæ fungi	25.b 7	Anchusæ quatuor	279.b 13
Ammos	282.b 32	Anchusa sine nomine	
Ammonii hygidion collyriū	279.b 24		
361.a 22		Ancyle	193.b 31
Ammoniacum suffimen		Anacylosis	ib. 34
283.a 1		Ancylicon	226.b 2
Ammoniacū thymiana	ib.	ancyloglosson	ib. 3
Ammoniacicoctio	377.a 11	ancylotomon	227.a 4
Ammoniaci gutta	ib.	andrachne	283.b 25
Amomum	283.b 14	andronius pastillus	351.a 19
Ampeloprason. 25.a. 30.		androsæmon	283.b 33
283.a 10		anemone	283.b 6
Ampelosagria	ib. 16	anethum	284.a 11
Ampelos hemeros	ib. 21	anethum uiride	ib. 16
Ampelos leuce	ib. 25	anethum ustum	ib. 14
Ampelos melæna	283.a 32	anethinum	386.a 36
Amphisbenæ morsus notæ		anethine malagma	282.a 23
& remedia	204.a 34	aneurysma	230.a 35
Amphora Italica	395.b 12	aneurysmatū discretio	ib. b 8
Amurca	283.a 6	aneurysmatis curatio.	
Amygdala	27.a 22	230.b 18	
Amygdala amara.	ib. 28	aneurysmata incurabilia	
& 283.b 1		ibid. 16	
Amygdala dulcia.	283.b 4	anginæ signa	93.b 31
Amygdalinum	387.a 25	anginæ curatio	94.a 2
Amygdalinum quod & meto		angiologia	217.b 2
pion dicitur	ib. 31	anguis senectus	289.b 29
Amylum	25.b 27	anicetos ab in superabili ui ap	
Amylon	283.b 6	pellatum emplastrum, gluti	
Anabrochismus	221.a 23	nat, discutit, squamas sepa	
Anacolemata	359.b 7	rat, & ad articulos recenti cū	
Anagallis	283.b 1	catrice contractos, ualet	
Anagyris	ib. 22	371.a 31	
Anaphorici	104.b 10	an ex crescentias curantia	
Anarrhinon	284.a 27	138.a 2	
Anasarca hydrops	128.b 31	an fistularum curatio manu	
Anas	28.b 9	administrata	251.b 14
Anatis sanguis	280.b 21	an inflammationem curan	
Anchilops quid	87.b 5	tia	137.a 35
Anchilopis curatio.	ib. 8	an in non perforati curatio.	

INDEX

253.a 16	antylum	382.a 6
ani procidentiam curantia	aparine	284.a 12
138.b 15	apechema	258.b 2
ani ulceꝝ remedia	136.b 12 aphace	286.b 8
animalium partes	28.a 15 aphrodes papauer	310.b 14
animalia pedestria	ib.35 aphroditarium	354.a 29
animalia uolatilia	26 b 1 aphronitrum	286.b 11
animæ defectum curantia	aphrofelenes lapis	308.a 21
61.b 14	aphtæ quō curentur	3.a 1
anifum	283.b 6 apiastrum	310.a 21
anodynion medicamentum,	apios	284.b 3
ad abraſa flagris cæſa, & ar-	apium morſus notæ	201.a 27
ticulorum contuſiones	apium morſus remedia	ib.32
169.a 30	apium	24.b 11
anodinon hygrocollyrium	apium montanum	34.a 26
85.b 31	apium paluſtre	292.b 34
anonis	284.a 31 apium ſylueſtre	322.a 25
anorexia	113.b 2 apochyma	284.b 15
anorexiam curantia	ib.22 apochymatis coctio	376.b 27
anſer	27 b 11 apocynon	184.b 8
anſerinus adeps.	323.a 1 apollinaris herba	326.b 35
anſerum oua	27.b 23 apollophanis malagma	
anſeris ſanguis	280.b 21 391.b 28	
anthemis	329.a 2 apomel	358.b 1
anthera ad ſciſſuras calcaneo	apophlegmatiſmi	12.b 22
rum & planipediū	158.b 17 apophlegmatiſmus ad cæ-	
antheron	254.b 18 phalæam	70.a 30
anthyllis	284.a 15 apoplexia quid	79.b 8
antiades	226.b 28 apoplexiæ cauſa	ib.21
antidotum quid	339.a 16 apoplexiæ ſigna	ib.32
antidotorum triplex differen-	apoplexiæ curatio	80.a 7
tia	ib.14 apoſcepharniſmos	258.a 30
antidotum dia hæmation,	apofyrmatū curatio.	169.a 13
hoc eſt ex ſanguinibus.	apothraufis	258.a 18
341.b 4	appetitus caninus quō curan-	
antidotu Mithridatis dia ſcin-	duſ.	58.b 30
cu	ib.a 23 aqua	226 b 25
antidotū Philonis	342.b 1 aqua quæ optima	13.b 17
antiochi hiera	336.a 30 aqua uitioſa	ib.22
antirrhinon	284.a 26 aquæ malæ quō corrigantur	

INDEX.

14.27	arbutus	302.b.19
aquæ aluminosæ quibus uti-	arceuthos	285.a.1
les	14.b.21	archigenis hîera
aquæ bituminosæ quibus uti-	archigenis medicamentum	336.b.35
les	14.b.25	ad superarî morsus
aqua marina	296.a.6	204.a.9
aqua nitrosa	326.b.30	archigenis medicamentum
aquæ nitrosæ & falsæ, quibus	ad erosionem mamillæ cū	
utiles	malignitate	111.b.27
aquæ sulfurosæ quibus utiles	archigenis medicamentū ad	
14.b.23	carcinode & cacoethe ulce-	
aqua pluuiialis	ra.	178.a.14
aqua in quo ferrum restinctū	arcion	285.a.5
est	arcion	ib.9.288.a.15
aquarum sponte prouenien-	areæ unde fiant.	62.b.8
tium uires	arearum curatio.	ib.21
aquæ frigidæ uniuersim epo-	arena	282.b.31
reæ remedium	argemon oculi ulcus	89.a.18
aquam eduentia	argemone	284.b.24
aquam eduentia quibus con-	argenti recrementū	293.a.7
ueniant	argenti spuma	307.b.5
aqua inter cutem unde oria-	argēti spumæ coctio	375.a.32
tur	argenti spumæ remedia	
aquæ inter cutem curatio	215.a.13	
128.b.36	argentum uiuum	326.b.14
aqua inter cutem laborantiū	argenti uiui notæ & remedia	
uictus	215.a.22	
aqua inter cutem qua ratione	arida medicamenta	353.a.26
educatur	aridoꝝ medicamentoꝝ uarie	
aquæ rosatæ quam hidroro-	differentiæ	ib.29
fatum dicunt compositio	arida carnē generantia	ib.35
358.a.15	arida reprimentia	ib.b.7
aquosorum uis	arida urētia & exedētia	ib.35
aquosum amicum curantia	arida sanguinem reprimen-	
134.a.23	tia	ib.b.17
arabicus lapis	aridorū quæ ulceribus faciūt	
arachne	species	ib.a.31
araneus	aridoꝝ quæ cuti admoventur	
araneæ ictus remedia	genera	ib.b.20
201.b.27	arida quæ capiti admoventur	
	tur	ib.27

INDEX.

aridum cephalicum, capiti	raucitatem, & ægre reiciem
conueniens	ib. 32. 36 tes. ib. 7
aridum ad crustam in canis	arteriæ Per quas pulsus fit
rabidi morfu excitandam	37. a 34
200. a 31	arterias diuidendi ratio.
aridum diacrocū	360. a 29 217. a 18
aridum collyrium Galeni, qđ	arteriotomia ib. 19
oculostuetur	ib. 11 arteriacon 102. a 30
arietum testiculī	28. a 23 arthricis quid 152. a 23
ariobarzanos	368. a 8 articularii morbi ib.
arifanum	284. b. 26 articularii morbi unde pro-
aristolochia	ib. 28 creentur ib. 1
aristolochia clematidis	ib. articularios morbos præce-
aristolocha longa	ib. 34 dentia 152. b 4
aristolochia rotunda	ib. 35 articularium morboꝝ curatio
aristophanium emplastrum	153. a 1. 153. b 35
369. a 21	articulariis morbis laboratiū
armana	312. a 21 uictus 153. b 24. 156. a 35
armenia fracturis accommo-	articuloꝝ cōtractio seu liga-
data	371. a 18 tio qūo curetur
armenia mala	27 a 2 193. b 31
armeniacus lapis	385 a 14 articuli relaxati qūo curen-
308. a 21	tur 194. a 25
armeniacum	285. a 13 articuloꝝ ulcera qūo curen-
arnabo	ib. 18 tur 190. a 6
arnoglossum	ib. 24 articuloꝝ cōtusoꝝ curatio
aron	ib. 34 179. a 16
arquatus	131. b. 24 articulorum luxatorum cura
arquati multæ differentia.	tio ib. 17
ibidem. 27	artos 285. b 11
arquati cāæ & notæ	132. a 12 arundines extrahentia medi-
arquati curatio	132. a 22 camenta 190. a 16
arsenicum	285. b 2 asarum 285. b 12
artaba ægyptia	395. b 25 asbole ib. 18
artemisia	285. b 7 ascalabotes ib. 24
arteriace ad abscissum uocis	ascarides lumbrici 156. b 33
sonum & eius claritatem fa	ascarides lūbrici unde nascā-
ciens	104. b 20 tur 197. b 1
arteriace, hypoglossis appel-	ascarides lumbrici quomodo
lata ad abscissionem uocis,	curentur. ib. 3

INDEX.

ascyrrhon	285.b 34	349.b 9	athena, ad ulcera sordida, im
& 283.b 35	ib. 36		pacta neruorum uulnera
ascyrrhoides	128.b 21	269.b 21	
ascites hydrops	285.b 24		atheromatis curatio 181.b 11
asclepias	315.b 2	230.a 9	
asclepion panaces			athera 280.a 8
asclepios smcgma aridum			atra bilis duobus modis gene
355.a 11			ratur 161.a 8
aselli quid	274.a 35		atractylis 286.a 36
asæ petræ flos	307.b 36		atracton 256.a 10
aspalathus	285.b 35		atramentum indicū 309.b 19
asparagus	286.a 4		atramentum scriptorium
asparagus myacanthinus			ibidem. 28
286.a 5			atramentum sutoriū 328.a 34
asparagus petræus	ib.		atramentum sutorium coctio
asparagi	24.b 29		375.b 29
asparagi a spinosis stirpibus			atriplex 286.b 3
ibidem 39			atrophia oculi 91.b 13
asphaltus	286.a 29		atrophiam oculi curantia.
asphodelus	ib. 32		ibidem 20
aspidis exuium	289.b 31		artagena 27.b 5
aspidum tria genera	205.b 15		attenuantia alimenta 23.a 17
aspis chersæa	ib. 14		auditorii meatus non perfo
aspis chelidonia	ib. 15		rati curatio 224.b 16
aspis. ptyas omnium pessima			auditus grauis quō corrige
205.b 15			tur 8.b 17
aspidis morsus notæ	ib. 22		auditum grauem curantia
asplenon	286.a 9		95.b 23
astaphis	ib. 13		auellane nuces 299.b 8
astaphis domestica	ib. 15		auena 25.b 34
astaphis syluestris	ib. 16		aures humentes curantia
aster atticus	ib. 18		3.b 14
aster magni	362.a 27		aures animalium 28.a 26
aster pastillus	349.a 35		aurium curta quomodo sar
asthmatici	105.a 20		ciantur 225.b 34
astragalus	286.a 24		auribus incidentia quomodo
astringentium uis	278.a 35		extrahantur 225.a 1
aractos compositio ad poda			aurium foramina compressa
gram	348.b 10		quomodo curentur 96.a 10
athanasia dolorem leniens			

INDEX.

aurium dolores quō curen-	camentum	88.b.8
tur	93.b.7	Basilisci morsus remedia
auribus conuenientia medica	ibidem 14	
menta	94.b.3	Basilicum tetrapharmacum
aurium uermes curantia	365.b.16	
95.a.15	Basilii acopon.	383.b.6
aurium sonitus curantia	Basii hygra ad hypopios	
95.b.1	90.a.11	
aurium sordeculæ	319.a.35	Batina mora
auricula muris	282.a.27	356.b.14
& 311.b.28	Batrachos	287.b.8
auripigmenti notæ	214.b.32	Batrachion
auripigmenti remedia	ib.1	
auripigmentum	285.b.2	Batrachus quid
auripigmenticoctio	376.a.1	100.b.9
autumno quæ uictus ratio cō		Batus
ueniat	15.a.15	287.a.27
axillarum foedum odorē tol-		Bdellium
lentia	112.a.19	ib.b.13
azanitæ acopon	383.b.2	Bdellii coctio
		337.b.8
		Edellium & Scythicum
		287.b.14
		Bdellium Arabicum
		ib.
		Bechium
		287.b.18
		Bechicum
		ib.
		Bechicon, ad tussim
		104.b.33
		& 343.b.20
B Acce prunorum sylue		
strium	302.b.2	Belulcos
Baccharis	287.a.7	236.b.14
Baion	380.b.7	Befasa
Balaninon	387.b.10	357.a.15
Balanus myrepica	286.b.34	Beta
Balaustium	287.a.12	324.b.36
Balenæ	30.a.8	Betonica
Ballote	287.a.22	287.b.17
Balneum calidum	14.b.4	Bilem purgantia quibus con-
Balsamum	287.a.17	ueniant
Barbara, emplastrum quod	332.a.31	330.b.14
cruentis protinus uulneris		Bilem uacuantia
bus iniicitur, & fracturarum		331.a.9
callos firmat	370.a.14	Bilis atra duobus modis gene-
Barbaricum dia euphorbiu,		ratur
ad coxendicum dolores &		161.a.17
alia pleraq.	384.a.5	Bilem atrameducentia
Barbæ alopecijis efficax medi		332.a.31
		Bilem atram purgantia qui-
		bus conueniant
		ib.33
		Bilem flauam purgantia
		330.b.15
		Bilis uomitum curantia
		59.b.27
		286.a.30
		Bitumen

INDEX

Bithynius pastillus	351.b.20	Bubonum curatio	175.a.9
Bituminis coctio	376.l.34	Bubulus adeps	323.a.4
Blatta quæ in pistrinis inueni		Bubula caro	28.a.10
tur	321.a.1	Bubulus sanguis	ib.36
Blepharoxiston	88.a.8	Bubulus talus ustus	315.b.30
Blitum	287.b.33	Buccina	29.b.16
Boleti	25.b.6	& 301.a.5	
Bolus	289.b.21	Bucellatus purgans	314.b.30
Botanicon emplastrum		Buglossum	288.a.9
366.a.17		Bulbus	287.b.36
Botton ulcer oculi		Bulbus agrestis	112.a.31
89.a.16		Bulbus esculentus	288.a.1
Botrys	288.a.4	Bulbus qui uomitum cit	
Bouis femur	314.b.34	ibidem 2	
Bouillum lac	28.b.21	Bulimos	58.b.13
Brassica canina	284.b.9	Bulimon curantia	ib.15
Brachialis luxatio quõ cure		Bunium	288.a.15
tur	273.a.34	Buphtalmon	ib.27
Brachii fracti curatio		Buprestis	ib.18
265.a.12		Buprestis notæ	209.b.1
Bractea plumbi	311.a.25	Buprestis remedia	ib.15
Brassica	304.a.31	Butyrum	288.a.21
Brassica ægyptia	ib.b.1		
Brassica esculenta	ib.a.32	Cacalia	298.a.19
Brassica marina	ib.b.5	Cachexia	129.a.21
Brassica syluestris	ib.3	Cachexiæ curatio	
Brathy	288.a.4	ibidem.29	
Britanica	ib.36	Cactus arbor	322.a.13
Bromion acopon	383.a.22	Cadmia	298.a.12
Bromus	288.b.32	Cadmia botriitis	ib.13
Bronchos quid	102.b.29	Cadmia concrēmata	ib.15
& 231.a.7		Cadmia plācitis	ib.14
Bronchocele	ib.4	Cadmia cœctio	376.a.25
Bryon thalassion	288.b.8	Cæcitudinis nocturnæ cura	
Bryonia	283.a.27	ib.34	91.b.33
& 288.b.17		Cæforum flagris curatio	
Bubonocèle	133.b.16		
Bubonocèles curatio p uistio	168.b.35	Calamintha	298.a.27
nem	246.a.16	Calamus	ib.35
Bubonium	288.a.15	Calamus odoratus	ib.b.1
		Calamus	

INDEX

- Calamus phragmites** ib.4
Calamagrostis ib.a 22
Calidum in primo gradu 278.a 21
Calidum in secundo gradu. ibidem 30
Calidum in tertio gradu ibidem 31
Calidum in quarto abscessu ibidem 35
**Calcaneorum scissuras curan-
tia** 158.b 16
**Calcanei attritus ex longo de-
cubitu, curantia** ib. 15
Calx uiua 325.b 5
Calx restructa ib.
Calcis potæ signa 214.a 32
Calcis potæ remedia ib.20
**Calcis os luxatum quō cure-
tur** 177.a 26
Calculorum in renibus notæ 121.b 7.13
Calculorum materia 121.b 29
Calculorum causæ ib.31
**Calculorum in renibus cura-
tio** ib.33
Calculi ne creentur 122.a 32
Calculorum curatio 305.a 17
Calculorum in uesica notæ ibidem 22
**Calculi puerorum usque ad
annum decimumquartum
facile curantur** ib.26
**Calculi in senibus difficile cu-
rantur** ib.28
**Calculi maiores facilius curā-
tur, minores difficiliter** ibidem 30
Calculorum remedia 346.b 15.23.347.a 4.10
Calliblephara sinegmata 88.a 21
Callus quid 250.a 34
Callos tollentia 159.a 21
**Callus qui membrum distor-
tum firmavit quō curetur** 186.a 22
**Calli immodici fracturis ob-
ducti quomodo curentur** 169.b 4
**Callus si fracturæ non obdu-
catur quid faciendum** 269.b 30
Caluariæ fractæ cura 259.a 16
Caluitium unde fiat 62.b 16
Caluitii curatio ib.21.63.b 9
Campæ 298.b 9
Camarosis 258.a 29
Cancri 299.a 19
Cancer fluuiatilis ib.25
Cancroꝝ fluuiatilium cinis ibidem 20
Cancroꝝ marinorum cinis ibidem 23
Cancer quid 235.b 3
Cancer latens ib.6
**Cancri curatio per manū ad-
hibita.** ib.19
**Cancer in qualibet corporis
parte oriri solet, sed præci-
pue in mulierum mammis** 177.b 4
Cancri curatio ib.16
Cancroꝝ uulvæ notæ 144.a 6
Cancroꝝ uulvæ lenientia ibidem 22

INDEX

Cancanus	298.a 3	Capitis morborum signa ubi
Cancanum	ib. 6	apparuerint quid faciendum
Canis rabidi signa	199.b 8	ibidem 5
Canes rabiunt plerumque in		Capitis morborum signis ne
æstu uehementiore	ib. 6	gleetis qui morbi sequantur
Canis qui momordit rabiosus	ibidem. 15	
fit annon, qua ratioe cogno-		Capitis doloris in febribus
scas	200.a 8	curatio 55.b 3
Canis rabiosi morsuum reme-		Capitis fractura 258.a 12
dia	ib. 22	Capitis fracturarum curatio
Canis non rabiosi morsus re-	259.a 6	
media	ib. 14	Capitis uasa latentia quō diui-
Caninus appetitus quō curan-		dantur 217.b 1
dus	58.b 23	Capitis uasa latentia adureno
Cannabis	298.b 20	di modus ib. 25
Canopus	334.b 7	Capitis dolor unde oriatur
Canopon	298.b 25	67.a 17
Cantharides	298.b 13	Capitis dolor ex solis æstu cō-
Cantharidis notæ	209.a 1	tractus quibus notis digno-
Cantharidis remedia	ib. 19	scatur ib. 32
Caper syluaticus	282.b 19	Capitis dolor ex æstu solis cō-
Caprillus adeps	322.b 35	tractus quō curetur ib. 36
Caprilla caro	28.a 7	Capitis dolorem ex frigida
Caprillum lac	28.b 20	intemperie notantia ib. b 21
Caprillus sanguis	28.b 11	Capitis dolorē ex frigida in,
Capito piscis	29.b 4	temperie curantia ib. 26
Capnion	298.b 26	Capitis dolorem ex bilioso
Capnistos pastillus	105.a 10	humore quō curemus
Capnos	298.b 27	68.a 5
Capparitis	ib. 34	Caput confortii lege i ndole-
Capita	309.b 11	scens quomodo curetur
Capita menarum salfarum	ibidem. 19	
ibidem 12		Capitis dolor ex uino quō cu-
Caput lacertæ	ib. 18	retur 68.a 3
Caput milui	ib. 16	Capitis dolor ex ictu quō cu-
Caput muris	ib.	retur ib. 16
Caput smaridis	ib. 14	Caput adurendi modus
Capitis formatio	18.a 24	216.a 13
Capitis morbos quæ signa		Caput per os purgātia 12.b 1
præcedant	32.a 1	Caput per nares purgantia

INDEX

ibidem 23
 Caprifici ficus 323.b.19.27
 Carbunculus 171.a.26
 Carbunculoꝝ curatio 176.b.10
 Carbunculus oculi 911.a.10
 Carbunculi oculorum curatio
 ib. 13
 Carcinoma oculi
 Cardamum 151.a.31
 Cardamine 321.a.23
 Cardamomum 299.a.11
 Cardamum sylvestre 181.a.2
 Cardiogmos 74.a.35
 Carduus 321.b.17
 Carice 26.b.12
 Caries lignorum 319.b.19
 Caris 299.a.16
 Caros ib.27
 Cari radix 25.a.17
 Caros unde fiat 72.b.4
 Carosa lethargo differt ib.5
 Carnes optimæ q̃ 28.a.12
 Carnis ptusæ curatio 179.a.35
 Caro cucumeris esculenti
 320.b.19
 Caro bubula 28.a.10
 Caro caprilla ib.7
 Caro ceruina ib.1
 Caro hircina ib.9
 Caro leporina ib.11
 Caro ouilla ib.11
 Caro suilla ib.1
 Caro thynni falsi 324.a.6
 Caro ulceribus supercrescēs
 qua ratione exedatur 184.b.1
 Carpesiæ liquoris signa
 111.b.10
 Carpesiæ liquoris remedia
 ibidem 13
 Carpesium 399.a.32
 Carya ib.35
 Caryinum 387.b.13
 Caryophyllon 299.b.11
 Casamum 399.b.30
 Caseus 326.a.28
 Caseus laudatior q̃lis ib.34
 Caseus oxygalactinus 182.b.16
 Castanum 151.a.31
 Castaneæ 27.a.35
 Castorium 299.b.26
 Catagmatica emplastra
 363.a.13
 Catagmatice, q̃ est fracturis
 idoneum emplastrum, Ori
 basii. 374.b.35
 Catagmatice ad fracturas cū
 uulnere, citraq; id factas He-
 racleti 375.a.6
 Catalepsis 73.b.23
 Cataplasmata 353.a.29
 Cataphora 31.b.8
 Catophoræ curatio 65.a.23
 Cataplasma quod oras uulne
 ris latus in rabidi canis mor
 tu seruat. 100.b.3
 Cataplasma ad sacrū ignem,
 herpetas, abscessus parotidas
 & ambusta 174.b.23
 Catapotia ex xylomacere, dy
 sentericis utilia 348.a.8
 Catapotia q̃ cōstant lapide ar
 menico, arthriticis potissi
 mū exhibenda 334.b.33
 Catapotia ad destillationem
 in fauces tussim
 104.a.10

INDEX

Catapotia ad ueterem tussum	Cephalææ curatio	69.a 19
ibidem 25		69.b 15
Catapotia Dosithei ad iecur	Cephalicum aridum	
inscripta		346.b 1 353.b 32
Catarrhus quid.	Cephalalgia unde oriatur	
Catarrhi curatio	ibidem 19	
Catheter	Ceræ	301.a 1
Catheterismus	Ceræ coctio	376.a 11
Catoche	Ceræ cum oleo in medicamē	
Catochos	tis quis modus esse debeat	
Catochi causa	ib.7 377.b 23	
Catochi notæ	73.a 27 Ceramium italicum	
Catochi curatio	ib.27 395.a 8	
Catochi siue catochomeni un Ceras		300.a 29
de dicti sint	73.b 21 Cerasia acida	ib.4
Caucalis	300.a 1 Cerasia auringentia	26.b 23
Causos febria	49.a 8 Cerasia dulcia	ib.2
Cecis	ib.21 Ceratia	ib.9
Cedrea	300.a 13 Ceratum Thaidis faciem ru	
Cedrus	ib.10 befaciens	99.a 5
Cedrus arbor	ib.11 Ceraftis morsus signa	
Cedrus frutex	ib. 205.b 22	
Cedrinus liquor	ib.13 Ceraftis morsus remedia	
Cenchros	ib.5 206.a 1	
Cenchri morsus notæ	Ceratoidis membrana	
205.a 34	88.a 3 1. & 221.b 24	
Cenchri morsus remedia	Ceratonia arbor	300.b 9
ib.4	Ceratum ad erysipelata & am	
Centaurium	300.a 19 busta	167.a 21
Centaurium maius	ib.4 Cercosis quid	247.a 35
Centaurium minus	ib.14 Cercosis curatio	ib.b 2
& 281.b 14	Cerebrum animalium	
Centunculus	290.b 14 28.a 19 & 292.a 1	
Cepa	21.a 25 Cerebrum cameli	ib.6
Cepæa	300.b 32 Cerebrum galli	ib.8
Cephalæam curans apophle	Cerebrum leporis	ib.1
gmatisimus	80.a 33 Cerebrum mustelæ	ib.3
Cephalæam curans epithema	Cerebrum ouillum	ib.10
79.b 9	Cerebri temperati notæ	
Cephalæa	68.b 35 18.b 6	

INDEX

Cerebri calidioris notæ	Chalazium qua uia curetur
ibidem 14	ibidem 32
Cerebri frigidioris notæ	Chalbane 328.a 27
ibidem 24	Chalacanthos ib.34
Cerebri ficcioris notæ	Chalcitis ib.30
ibidem 29	Chalcitidis coctio 375.b 22
Cerebri humidioris notæ	Chalcos 328.b 5
ibidem 32	Chalcu anthos ib. 1
Cerebri inflammati notæ	Chamæ pisces 29.b 15
82.a 3	Chamæ acte 281.b 6
Cerebri inflammati curatio	Chamæcissus 328.b 20
ibidem 8	Chamædaphne 291.a 17
Cerebri uulnerati notæ	Chamædrops 329.a 12
257.a 5	Chamædrys 328.b 16
Cerebri membranæ conuuls	329.a 13
nerata signa ib.3	Chamæleæa 329.a 21
Cerebri membranæ inflam	Chamæleon 328.b 28
mata curatio 261.a 4	Chamæleontis albi radix
Cerebri membrana nigra	ib.33
scens quomodo curetur.	Chamæleontis nigri radix
ibidem.23	ibidem 29
Cerion 182.a 16	Chamæleontis notæ 200.a 7
Cerion quid 251.a 24	Chamæleontis remedia
Cerii curatio ib.25	ibidem 12
Cerion capitis unde nascatur	Chamæleuce 328.b 5
& qua ratioe curetur 67.a 26	Chamæmelon 329.a 1
Ceruina caro 28.a 11	Chamæmelinon 386.a 31
Ceruicis morbi 83.a 14	Chamæpitys 329.a 5
Ceruicis tumorum curatio	Chamæraphanos 333.a 4
231.a 6	Chamæsyce 329.a 15
Cerusa 330.a 10	Characias 321.a 36
Ceruse coctio 301.a 5	Chelidonium 329.a 24
Ceruse signa 214.b 13	Chelidonium minus ib.29
Ceruse remedia ib.19	Chelidon ib.33
Ceryces 301.a 5	Chemosis quid 86.b 11
Cestron 287.b 23	Chemosis quomodo curetur
Cetacea 30.a 8	ibidem 16
Chalazium quid sit 222.a 28	Cheradicum medicamentum
Chalazion 88.a 9	ad strumas 181.a 17
Chalazii curatio.	ib. Cheradicum exedens

INDEX

ibidem. 16	90. a. 25
Chezanance	337. a. 17
Chiacum collyrium	359. b. 22
Chimethla	158. a. 12
Chironium panaces	314. b. 2
Chironia ulcera	187. a. 7
Chirurgicae duae sunt partes	216. a. 8
Choenix	395. b. 26
Chocras	229. b. 7
Chole	219. b. 1
Cholera	115. a. 24
Cholerae signa	ib. 26
Cholerae curatio	ib. 29
Chondrus	25. b. 13. 329. b. 23
Chondri coctio	26. b. 9
Chondrilla	329. b. 20
Chorion	249. b. 26
Chrysanthos	293. b. 19
Chryse cruentis uulneribus accommodata	374. b. 30
Chrysis	329. b. 34
Chrysocola	ib. 25
Chrysocome	ib. 33
Chyma parua	395. a. 32
Ciborum corruptione laborantes quo curandi	9. b. 16
Ciborum repletionis curatio	ibidem. a. 20
Cibi fastidium	113. b. 1
Cibi fastidium curantia	ib. 22
Cibi fastidium in febribus quo curandum	58. a. 5
Ciborum uires	23. b. 23
Cicadae	324. b. 31
Cicatrix quo ulceri induenda	183. a. 3
Cicatrices nigras tollentia	187. b. 14
Cicatrices oculorum	90. a. 25
Cicatrices oculorum tingentia	ib. b. 5
Cicatricem induenda, medicamenta	135. a. 22
Cicer	26. a. 17. 193. b. 17
Cicer arietinum	ib. 22
Cicer crios	ib.
Cicer oriobiaeum	ib. 24
Cicer sylvestre	ib.
Cichorium	361. b. 15
Cici	ib. a. 12
Cicinum	387. a. 16
Cicuta	305. b. 2
Cicutae signa	211. a. 11
Cicutae remedia	ib. 16
Cimex	303. b. 10
Cinara	24. b. 8
Cinerula	322. b. 17
Cinereum quod spodaicon dicitur, ad inflammationes, defluxus & chemosin	360. b. 14
Cinis	325. a. 7
Cinis acerbae arbores	ib. 12
Cinnabaris	301. a. 17
Cinnamomum	ib. 19
Cinnamomis	ib. 23
Circaea	ib. 26
Circuncisorum curatio	240. a. 17
Chrisocole	244. a. 23
Cissampelus	293. a. 30
Cissaros	301. b. 1
Cissanthemos	305. a. 31
Cisseris	301. a. 30
Cisfinum, ad nervorum uulnera punctus, & maxime diuturna	367. b. 3
Cissos	301. 7
Cisthos	305. a. 31

INDEX

Cistos	301.a 35	Coagulati lactis remedia	
Citrium malum	27.a 29	ibidem. 10	
Citrium	301.b 16	Cochlea	304.a 16
Citrium	381.a 9	Cochleæ	29.b 16
Citra grauidarum uitium		Cochleæ crematæ	304.a 17
1.a 25		Cochleæ non crematæ	ib. 21
Claucula	262.b 30	coccus baphicos	302.a 22
Clauculæ luxatæ curatio.		coccus gnidius	ib. 22
271.a 12		coccymelea	ib. 32
Claucula soli homini a natura data est	ib. 16	coctio medicaminum quæ	
Clauculæ fractæ curatio		emplastra ingrediuntur	
263.a 6		365.a 1	
Claudiacum dia smyrnon		coctio æris cremati	
361.a 1		375.b 10	
Clauus quid	159.a 28	coctio æruginis	376.a 11
255.a 4		coctio aloes	377.a 35
Clauos curantia	ib. 21	coctio aluminis	376.a 22
Clauorum curatio	255.a 7	coctio ammoniaci	377.a 11
Clauus oculi	89.b 17	coctio apochymatis	376.b 25
Clematis	301.b 30	coctio argenti spumæ	
Cleonis collyrium	362.b 8	375.a 32	
Cleopatæ mors	295.b 19	coctio atramenti sutorii	
Clidion Aphrodisiasticon		375.b 29	
350.a 5		coctio auripigmenti	376.a 8
Clidion Oribasii ad dysentericos & coeliacos	ib. 12	coctio bdellii	377.b 5
Clinopodion	302.b 6	coctio bituminis	376.b 34
Collyrium dia hydrias, repel-		coctio cadmiæ	376.a 25
lens	360.b 1	coctio ceræ	ib. b 11
Clysteres quibus utiles, & quales esse debeant	13.a 30	coctio cerusæ	ib. a 7
Cnecum siue cnicū	302.a 9	coctio chalcitidis	375.b 22
Cneoron	333.a 22	coctio conchilioꝝ	376.a 33
Cnicum syluestre	386.b 1	coctio diphrygis	375.b 15
Coagulum	286.b 1	coctio floris æris	375.b 26
Coagulum equi	ib. b 6	coctio galbani	377.a 25
Coagulum leporis	ib. 2	coctio herbarum	ib. b 19
Coagulum phocæ	ib. 7	coctio lachrymæ papaueris	
Coagulati lactis signa	214.a 18	ib. a 35	
		coctio lachrymæ turis	ib. b 1
		coctio lapidum	376.a 32
		coctio mannae thuris	
		b iiii	

INDEX

377.b 11		Colon quid	119.a 1
Coctio minii	376.a 25	Colicus dolor uariis ex causis	
Coctio myrsos	375.b 33	accidit	ib. 32
Coctio myrrhæ	377.b 17	Colici doloris notæ	ib. 8
Coctio nitri	376.a 29	Colici doloris curatio	
Coctio olei	ib. b 1		119.a 1
Coctio opopanax	377.a 21	Colicorum notæ	121.b 8
Coctio picis	376.b 22	Colla, id est, glutinum	
Coctio pinguium	376.b 2		302.b 7
Coctio plumbaginis	375.b 5	Colletica emplastra	
Coctio plumbi usti	376.a 5		363.a 13
Coctio pompholigis	ib. 26	Collyria	158.b 16
Coctio propolis	377.a 6	Collyriorum aridorum gene	
Coctio pumicis	376.a 33	ra	ib. 18
Coctio radicum	377.b 19	collyriorum liquidorum ma	
Coctio resinæ	376.b 18	terna	ib. 19
Coctio sagapeni	377.a 29	collyrium aridum ad siccam	
Coctio salis	376.a 29	lippiudinem, quæ xeroph	
Coctio sandarachæ	376.a 2	thalmia dicitur, sycosin. tepe	
Coctio seminum	377.b 19	donas, carnis excrementas	
Coctio fori	375.b 15		364.a 33
Coctio squamæ	ib. 17	collyria italica quid	
Coctio sulphuris	376.a 29		86.a 30
Coctio terræ cuiuslibet		collyrium cleonis	362.b 8
ibidem 32		collyrium chiacum	359.b 22
Coctio thapsiæ	377.b 3	collyrium Galeni aridum	
Coctio unguentorum			364.a 11
376.b 7		collyrium Ilambonis	
Cœlia	302.a 14		360.b 10
Cœliacus affectus	116.a 3	collyrium diamañira	
cœloma ulcus oculi	89.a 17		90.a 3
Coitu immodico læsi quō cu		collyrium liquidum ex cauca	
randi.	10.b 14	lide	364.b 5
Coitus commoda	6.b 27	collyrium liquidum ad sycos	
Coitum adiuvantia	10.a 20	sin, encanthidas, & excre	
Coire nequeunt quō iuuen		scientiam carnis	ib. 10
tur	10.a 1	collyrium ex cornu, dia cera	
Calchicon	212.a 3	tos dicitur, Galeni	
Colis glans nudata qua ratio			362.a 8
ne regatur	239.a 1	collyrium malabathrinum,	

INDEX

quod & Isotheon dicitur	363.b 17	comitialis morbi causæ	75.a 16
collyrium ex aloë, dia aloes dictum	362.b 29	comitialis morbus cui ætati accidat.	ib.30
collyrium ex decoctis, dia zematōn dicitur	360.a 30	comitialis morbi notæ	ibidem 32
collyrium ex cypobalsamo	363.b 3	comitialis morbi curatio	ibidem 19
collyrium ex succo fœnugræ ci	362.b 3	commi	302.b 25
collyrium ex succo fœniculi.	363.a 28	compositio dia citriu, quod est ex malo medico, stomacho utilis.	334.a 10
collyrium quod protinus dolorem sedet, monohemerōn dictum, ad incipientem uertustamque lippitudinem	359.b 14	compositio dia coronopodiu stomacho utilis	335.a 5
collyrium uino exceptum dia œnu dicitur.	363.b 25	compositio dia hermodactylu ad podagram	334.b 18
collyrium ex duobus lapidibus ad aspritudinem	364.a 5	conchulæ indicæ	314.a 2
collyrium e thure, dia libanu nuncupatur	362.a 14	conchyliæ	302.a 12
collyrium ex oleæ turionum succo tenerum, dia thalias uocatur	360.b 24	conchyliorum coctio	376.a 33
color non arguit simplicium temperamentum	278.a 28	concoctionis signa nunquam sinistre apparent	35.b 32
color malus qua ratione emendetur	8.a 21	conditum calculos confringens	347.a 4
colobomata	225.b 36	condyloma quid	247.b 9
colocyntha	301.b 7	condyloma ani	252.a 35
colocynthis	ib. 1	condylomatidis ani curatio	233.a 4
colpos	188.a 1	condyloma muliebrium locorum quomodo curetur	247.b 12
columbinus pullus	27.b 6	confusiones oculorum quæ curentur	85.a 25
columella	100.b 25	congius	395.b 22
colymbades oliuæ	27.a 25	conia	202.b 26
κωμᾶ	71.a 10	conium	303.b 29
comaros	301.b 19	conos	ib. 32
		constantini Sapo	355.b 17
		contensio	83.a 14

INDEX

Contusorum articuloꝝ cura	cornu taurinum	ib.36	
tio	175.17 cornus	304.a.26	
Contusorum unguium cura	coronopus	303.b.33	
tio	160.a.24.254.b.19	corporis habitum calefacien	
Conuulsiones unde oriantu	tia	8.a.10	
82.b.12	corpis tēperati notæ	17.a.31	
Conuulsionū curatio	ib.21	corporis intēpati notæ ib.5	
Conuulsorum curatio	corporis calidi notæ	17.b.7	
179.b.32	corporis frigidioris notæ	ib.12	
Coniza	302.b.35	corporis siccioris notæ ib.18	
Copos	382.b.4	corporis humidioris notæ	
Copros	303.b.5	ibidem.29	
Copton ad duritiem stoma	corpis rugosi curatio	7.b.34	
chi & iocinoris	381.b.33	corpis liuores arcentia	8.a.4
Cor animalium	28.a.33	corporis qđ rabe consumitur	
Coracon ex oximelite ad na	curatio	54.b.26	
turalium uitia, & nomas ac	corporis color malus quō e		
commodatum	369.a.30	inendetur	8.a.21
Corallium	303.b.4	corporis suauem odorem fa	
Cordis affectus	110.b.17	cientia	8.a.5
Cordis palpitatio quomodo	corpora odora, tenuia sunt et		
curetur	111.a.16	calida	278.a.25
Cordis temperaturæ notæ	corpus extenuantia	116.b.4	
20.a.3	corpus tenue implentia	ib.	
Cordis uulnerati notæ	corpora inodora substantiis		
257.a.11	crassa sunt	278.a.22	
Coremata	314.b.22	coridallus	303.b.18
Coria ueterum calceamento	coridros	ib.	
rum	291.a.26	coriza quid	102.a.24
corianum seu corium	costæ fractæ notæ	264.a.11	
303.b.18	costur	304.a.1	
coriantrum	ib.	cotus Naxiæ detrimentum	
corlandri notæ	210.b.31	308.a.15	
corlandri remedia	210.b.36	cotis oleariæ detrimentum	
coris animal	303.b.10	ibidem	16
coris herba	ib.18	cotonea mala	27.a.8
cornu	306.a.29	& 310.b.24	
cornu caprillum	ib.30	cotiledon	304.a.11
cornu cerui	ib.31	coxa luxata	274.b.29
cornu hircinum	ib.30	coxe interiorē partē	

INDEX

lapsæ signa	275.a8	crocinum in quo & alterius	
coxæ in exteriora prolapsæ		crocomagmatis cōfectura	
signa	ib.12	explicatur	388.b32
coxæ in priorē partem pro-		crocodilion	304.b32
motæ signa	ib.16	crocodilus terrestris	321.b3
coxæ in posteriora prolapse		crocodilimorsus remedia	
signa	ib.21		206.b18
coxæ luxatæ curatio	ib.25	crocodeshoc est crocetus pa-	
coxarum fracturæ signa		stillus	349.b13
204.a14		crocodes pessus	390.b23
coxarum fracturæ curatio		crocomagmatis præparatio	
ib.17			350.b35
coxarum morbi quō curentur.	150.b2	crocinum	305.a4
coxendices adurendi modus	106.b2	cruentum sputum unde fiat	
250.a12		cruenti sputi curatio	107.a20
coxendix morbus quō curetur.	150.b2	cruris reponēdi rō	268.b15
crambe	304.a31	cubiti gibber	272.b22
crania.i.cornus	ib.26	cubiti gibber luxatus quō curetur	ib.34
cratægonos	ib.b7	cubiti fracti curatio	266.b21
cremasteres	242.a17	cucumer	26.a35
creta sutoria	309.b25	cucumis	320.b17
crethmon	304.b19	cucumis siluestris	ib.24
crimnou	ib.19	cucurbita	26.b30
crimnon poltarion	ib.22	cucurbita syluestris	302.b15
crimnon poltos	ib.	cucurbitulæ usus	233.b3
crinon	ib.24	cucurbitula levis quid efficiat	
crinaton suffimen	389.b28	ibidem 4	
crines	326.a3	cucurbitula cum scarificatione	ib.9
criogenes pastillus	352.b4	ne quid præster	
crithe	304.b13	cucurbitulâ ad mouendi mor-	
crithe tuberculum	88.b13	bus ibi per totū cap.	
crithe curatio	ib.15	culices persequentia fugien-	
criticon, medicamentum ad		tiq;	198.a25
stigmata	167.a32	cuminum	305.a3
critonis sinegma peponatu		cunila	302.b35
355.a33		cupressus	305.b6
crocus	305.a1	cura quid sit	79.a21
crocinū dia rhodō	362.b2	curei malagina	381.a13

INDEX

curta in auribus quō	farciano	ciphois	273.b 17
tur	225.b 34	ciparissias	325.b 2
curta in labris qua	ratione	ciprinum	388.a 25.b 3
farciantur	ib.	cipros	305.b 19
cutis astricta	6.b 3	cirenaicus liquor	314.a 28
cutis astrictæ curatio	ib. 12	citinus mali punici flos	
cyamos	305.a 11	319.a 14	
cyanos	ib. 18	citulus.	305.b 26
cyathiscus	221.a 3		
cyathus	395.a 32	Ades	290.b 17
cyclaminus	305.a 22	Damasonium	ib. 35
cycliscus	259.a 25	Damascena pruna	
cydonatum contusum frag.	27.a 25. &	290.b 33	
mentis saluis	344.b 22	Daphne arbor	291.a 7
cygnarium	359.b 28	Daphne herba	ib. 13
cygnus rubens	ib. 33	Daphnoides	ib. 16. 301.b 31
cygnus albus	360.a 2	Darti quid	242.a 27
cyminum	305.a 34	Daucus	391.a 2
cynicus spasmus	81.b 14	Daucus sylvestris	ib. 4
cynocrambe	284.b 9	Dauci radix	25.a 17
cynosbatos	305.b 1	Decameron	380.a 27
cynomoron	284.b 10	Decretoria signa in morbo	
cynosorchis	314.b 1	tū initio praua sunt	35.a 34
cyparissus	305.b 6	Deiectiones quid præfagiant	
cynanche	101.b 31	43.b 32	
cyperus	305.a 12	Deiectiones optimæ	ib. 23
cyphi	389.b 9	Deiectiones pessimæ	
cyphis materia	ib. 10	ib. 44.a 9	
cyphis usus	ib. 11	Delirium	70.b 10
cyphi magnum, quod uocant	Delphini		30.a 8
solare, ex rebus triginta sex	Dentes quo tempore orian-		
confectum	ib. 29	tur.	3.a 9
cyphi quod rebustuigintiocto	Dentes qua ratione ab iniu-		
constat, lunare appellatum	ria afferantur		8.b 6
390.a 16	Dentes qua ratione eximan-		
cyphi lunare	ib. 17	tur	226.a 20
cyphi solare	389.b 35	Dens excreescens quomodo	
ciphoïdes ad iecorosos & pe	curetur		ib. 31
ctoris uitia	346.a 1	Dens confractus quomodo	
ciphoïdes Alexandri	ib. 10	curetur	ib.

INDEX.

Dentes attritos curantia	346.a 18	Dia batinon moron	
100.a 20		Dia besafa, ex ruta syluestri	
Dentium candorem faciētia	356.b 14	Dia cadmias emplastrum ci-	
ibidem. 13		atricem inducens	
Dentium stuporem tollentia	357.a 15	368.b 8	
ibidem 19		Dia carion, quod est ex nuci-	
Dentium dolorem sedantia		bus simplex	356.b 18
99.a 12.b 13.		Dia carion compositum	
Dentium inflammationem		ibidem 22	
curantia	99.a 26	Dia cariophyllu	379.a 28
Denteis mobileis stabilientia		Dia castoriu pastillus ad ulce-	
99.b 8		ra, nomas & defluxiones	
Dentifricium	100.a 4	351.b 26	
Derma	291.a 18	Dia caualidos collirium	
Destillatio quid	102.b 26	464.b 6	
Destillationis curatio		Dia cedrias emplastrum	
103.a 22		372.b 12. 17	
Destillationis notæ	ib. 10	Dia ceratos collirium	
Deuterion	249.b 26	362.a 9	
Dia ægirosacopon		Dia ceratos elap hui colliriū	
384.b 2		ibidem.	
Dia æron, emplastrum		Dia chartiu pastillus	351.a 31
371.b 11		Dia chartu, hoc est, charta me-	
Dia alicacabu pastill	352.a 25	dicamentum, ad nomas o-	
Dia aloes medicamentum		ris potissimum & naturaliu	
354.a 5		ulcera	354.b 23
Dia aloes collirium	362.b 30	Dia chilon emplastrum	
Dia althæas emplastrum		365.b 35	
367.a 29		Dia cinnabareos emplastrū,	
Dia anacardion Theodores		quod Pamphlethes dicitur	
fus	345.b 19	373.b 18	
Dia anemones emplastrum		Dia citriu	334.a 10
313.a 1		Dia citriu, hoc est, ex malo	
Dia anchuses emplastrum		medico tarde concoquenti-	
368.b 23		bus efficax.	345.a 17
Dia apyranu	366.b 28	Dia codion, id est, ex papaue-	
Dia asphodelu emplastrum		ris capitibus & sapa.	
366.a 2			
Dia bacanu medicamentum			
hepati accommodatum			

INDEX.

- 342.b 32
 dia codion, compositum 343.a 6
 dia coralliu 348.a 12
 dia coralliu pastillus 349.b 25
 dia coronopodiu 335.a 5
 dia crocu aridum 364.a 29
 dia dictamni emplastrum
 glutinans, ad canum mor-
 fus, & omnigena ulcera 369.b 30
 dia dion pipereon 342.b 16
 dia draconitiu emplastrum 368.a 15
 dia elates acopon 384.a 22
 & 33
 dia electru pastillus 349.b 30
 dia erigerontos emplastrum 367.b 24
 dia euphorbiu acopon 384.5
 dia gigarton, malagma 382.a 13
 dia gleucous 357.a 7
 dia gyreos emplastrum 366.a 12
 dia hæmaton antidotum 341.b 4
 dia halon emplastrum 373.b 5
 dia helcismatos emplastrum 367.a 22
 dia hermodactilu 334.b 18
 dia iteon emplastru 370.a 21
 dia leptocaron emplastrum 174.a 2
 dia libanu 354.a 25
 dia libanu collirium 362.a 14
 dia lithospermu, ex lithosper
 mo medicamentu 347.a 32
 dia lotarion pastillus, i. ex lo-
 ro syluestri, ad sedis natura-
 lium uitia 352.a 27
 dia licu hepato, hoc est, ex
 iecore lupino medicamen-
 tum 345.b 9
 dia mamira collirium 90.a 34
 dia meliloton malagma 378.b 3
 dia melitos emplastrum 365.b 27
 dia metallicon, emplastrum 371.a 13
 dia moron simplex 356.b 3
 dia moron, compositum
 ibidem 7.
 dia nitru ad abscessus, scirros
 & tumores 373.a 33
 dia nitru emplastrum, ad car-
 bunculos 372.b 32
 dia ochras emplastrum 372.b 3
 dia oenantes malagma 382.a 1
 dia oenu, hoc est, ex uino, col-
 lirium 373.b 25. 33.
 dia omphacos 379.a 21
 dia opobalsamu collirium 363.b 3
 dia orobon 343.a 32
 dia ostreon 354.a 21
 dia oximelitos emplastrum 369.a 30
 dia oximirsines, qd est e mir-
 ro syluestri medicamentum 354.b 32
 dia phellō pastillus 351.b 12
 dia phisalidō pastill 350.b 17
 dia prasiu, hoc est, ex marru-

INDEX.

- bio cōpositum 343.a.23
 dia prasiu simplex ib.16
 dia pternesēplastrū, hoc ē ex
 pna, tophos soluit 373.b.11
 dia rhodon, hoc est, ex rosis,
 quæ septuagintaduas uncias
 pendunt 362.b.13
 dia rhodon album ib.23
 dia rhodon crocinum ib.35
 dia rhodon nili 363.a.5
 dia rhodon pastillus 349.b.20
 dia sampsichu malagma
 381.a.24
 dia scincu 341.a.24
 dia scorodon emplastrum
 366.b.20
 dia smirnon ad rhiadas & æ
 gilopas. 361.a.7
 dia smirnon, Claudiacum ib.1
 dia spermaton malagma
 381.b.10
 dia spermaton pastillus
 349.b.9
 dia sphecles, hoc est, ex fæce
 uini combusta, manethonis
 354.a.9
 dia stactes emplastrū 373.a.25
 dia struthiu emplastrum
 366.b.4
 dia stiracos, bechicon hoc est
 tusli efficax 343.b.20
 dia thecolithu, i. ex lapide Iu
 daico medicamentū 347.b.8
 dia tessaron medicamentum
 151.b.18
 dia tertigon, i. ex cicadis, me
 dicamentū nephriticum
 347.a.17
 dia thalias colliriū 360.b.24
 & 32
 dia thapsias medicamentum
 ad omnes inueteratos affec
 tus 63.a.33
 dia thapsias pastillus 353.a.9
 dia tragematon, i. ex bellariis
 medicamentum nephriticū
 uesicæ & renum exulcera
 tion idoneum 347.b.26
 dia trion pipereon, ex tripli
 ci pipere. 3344.b.33
 dia trion pipereon Oribasii
 345.a.2.14
 dia turpænes ceratum ad po
 dagram, dolorē leniens mi
 rabiliter 374.a.9
 dia zematon collirium
 360.a.30
 diabetes quid 124.b.27
 diabetes origo ib.31
 diabetes curatio ib.34
 diabrosis 106.b.19
 diamotosis 260.a.14
 diapedesis 179.a.3
 diaphanes 22.b.8
 dichromon emplastrum, à
 duplici colore sic appella
 tum 372.b.25
 dictamnion 291.a.31
 dies decretorii 35.a.9
 dies speculatorii ib.b.3
 digiti adnati sunt duplices
 234.a.35
 digiti adnati præcisio quo
 modo fieri debeat
 ib.b.9
 digitorum luxatio quō cure
 tur 273.a.34
 digitorum pedis luxatio quō
 curetur. 277.a.31
 digitorum rimas curantia

INDEX.

155.b 6
 Digitorum ossa fracta quō cu
 rentur 267.a 4
 Digitus sextus 254.a 36
 Dionisia, ad abscessus mirabi
 lis, item ad mammas & in
 guina, epispastice quæ per
 latentes meatus discutit 171.b 21
 Dionisias 283.a 35.
 291.a 34.
 Dioclis epistola ad ualetu
 dinem tuendam 31.b 20
 Dioptrismos 143.b 22
 Dioporon 308.a 25
 Diospolites 345.a 13
 Diphriges 391.a 35
 Diphrigis coctio 375.b 15
 Diplacn 124.b 30
 Diplacos 391.b 3
 Dipladis morsus notæ 104.b 29
 Dipladis morsus remedia 205.a 12
 205.b 34
 Diplas unde dictus 220.b 11
 Distichia 218.b 28
 Distichiasis
 Dodecatheon medicamentū 343.b 1
 Dolichon 26.a 25
 Dolores unde oriuntur 54.a 2
 Dolor pulsabilis ib. 6
 Dolor pertundens ib. 7
 Dolor tensius ib. 14
 Doloris causæ & curationes ibidem 14
 Doloris capitis in febribus
 curatio 55.b 3
 Dolores oculorum unde fi
 ant 84.b 30
 Dolores oculorum quomo
 do curentur ib. 36
 Doracia 27.a 1
 Dorias 294.b 24
 Doriciou 291.b 8
 dosithei catapotia ad iecur in
 scripta 346.b 1
 dothien 175.b 18
 dothiene emplastrum 366.a 33
 drachma 395.a 22
 dracuntium 291.b 19
 dracunculus ib.
 dracunculi 197.a 32
 dracunculorū curatio ib. b. 4
 draconis marini ictus reme
 dia 206.a 25
 dropax duplicem recipit
 præparationem, materiam
 acopis & emplastris confi
 nem 382.b 20
 dropax Gallus Ori basii 384.b 16
 dropax simplex ib. 27
 druppæ oliuæ 27.a 14
 driopteris 291.b 2
 dris ib. 23
 driinus, pessimus serpens
 304.b 1
 driini morsuum signa ib. 11
 driini morsuum remedia
 ibidem 16
 dulcis radica 290.a 26
 dulcium uis 278.b 12
 dulcium & utilium potionū
 differentiæ 357.a 27
 duplici pipere constans me
 dicamentum 342.b 16
 disenteria 117.b 34
 disenteria

INDEX

Dysenteriae curatio	ib. b 14	Elephantiasis	ib. 14
Dysodes acopon	383. b 27	Elephantiasis unde fiat	
Dysodes malagma	38 1. b 18	ibidem	18
E Benus	29 1. b 31	Elephantiasis recens quō cu-	
Ebiscus	28 1. b 18	retur.	ib. 26
Ebrietatis curatio		Elephantia quo fere tempo-	
9. b 7		re nascatur	ib. 34
Ebulus	28 1. b 6	Elephantiae inueteratae cura-	
Ecchymomatis species		tio	ib. b 15
179. b 9		Elephanticorum uictus ratio	
Ecchymoma	ib. a 27	162. a 17	
Eccope	255. a 33	Elephanticis facientia medi-	
Echidna	294. b 7	camenta	162. b 11
Echinus herba	ib. 13	Elephanticī procul ab urbi-	
Echinus	ib. 15	bus habitare debent.	
Echion	ib. 23	163. a 33	
Eclegma ex marrubio, sim-		Elephantia morbus est conta-	
plex, tabidis maxime accō-		giosus	ib.
modatum	343. a 16	Elevatio pulsus	37. a 26
Ecpiesma	258. a 28	Elymus	293. a 32
Ecpiesmos oculi	93. a 9	Embryoelcia	150. a 36
Ectropii curatio manu admi-		Emmoton ad sordida plantae	
nistrata	220. b 30	ulcera, facit et genitali exul-	
Ectropion	87. a 33	ceratio	158. a 14
Ectropii curatio	87. a 34	Empetron	293. a 36
educatio pueri	2. b 5	Emphysema quid	86. b 24
Elæa	292. a 12	Emphysematum curatio	
Elæon	ib. 24	87. b 2	
Elæomeli	ib. b 4	Emplastrorum materia	
Elaphoboscus	ib. 23	365. a 6	
Elate	ib. 17	Emplastrorum differentiae	
Elaterium	ib. 10	ibidem. 11	
Elaterii remedia	215. a 30	Emplastra catagmatica	
Elatine	ib. 20	ibidem 13	
Electrum	295. b 9	Emplastra cicatricem ducen-	
Elelisphacus	292. b 16	tia	365. a 21
Eleoselinon	ib. 33	Emplastra colletica	ib. 13
Elephantus	193. a 2	Emplastra quæ concoquunt	
Elephantia	161. a 5	ibidem 36	
		Emplastra digerentia	ib. 25

INDEX

- emplastrum emollientia
 ibidem 29
 emplastrum enema ib. b 6
 emplastrum extrahentia
 ibidem a 34
 emplastrum quæ leniunt
 ibidem b 4
 emplastrum pus mouentia
 ibidem. 22
 emplastrum siccantia ib. 33
 emplastrum quando & quibus
 adhibenda ib. a 10
 emplastrum Amithaonis ad
 articulos recenti cicatrice
 contractos conuulsosq; est
 etiam ad extrahendum effi-
 cax 369. a 15
 emplastrum Aristophanium
 emolliens ib. 21
 emplastrum botanicum ab
 herbis dictum 366. a 16
 emplastrum Dothiene ib. 34
 emplastrum entaticon
 374. a 26
 emplastrum Italicum, ad pur-
 gandum sordida inducen-
 dumq; carnem ib. 16
 emplastrum Macherionis ui-
 ride, ad coxendicum crucia-
 tus, articulos infarctos & ab-
 scessus 373. a 5
 emplastrum Mnafæi discu-
 tiens 368. a 3
 emplastrum Nerōis, ad ictus
 omnemq; particularum car-
 nosarum dolorem 370. b 24
 emplastrum Nicolai, ad recē-
 tia uulnera & sinus glutinā-
 dos aptum ib. a 31
 emplastrum parigrum, hoc
 est, liquidā Orībasii 368. b 1
 emplastrum pirine, ad duri-
 tias & scirrhus 367. a 3
 emplastrum ad Chironia ul-
 cera 187. a 24
 emplastrum qd nutriēdæ ul-
 ceræ carni est 374. b 11
 emplastrum ex achate, discu-
 tiēs emolliensq; 309. b 7
 emplastrum ex aliis, dia sco-
 ridon dictum, ad rumpen-
 dum 366. b 20
 emplastrum ex althæa, podas-
 gricis aliisq; duritiis accom-
 modatum ib. 35
 emplastrum ex anchusa am-
 bustis efficax 369. b 23
 emplastrum ex anemone
 313. a 1
 emplastrum dia apyranu ad
 discutiendum 366. b 28
 emplastrum ex auellanis, dia
 leptocarion dicitur, ad arti-
 culorū tophos probatum
 374. a 1
 emplastrum ex cedria emol-
 liens 372. b 17
 emplastrū ex cedria, glutinat
 digerit abstergitq; ib. 12
 emplastrum ex cerusa uel o-
 uis 368. a 31
 emplastrum ex cinere aspidū
 discutit strumas & podagras
 372. a 1
 emplastrum ex cinere lixiuo
 stillatio, coxendicū dolori-
 bus, articulariis, & tumori-
 bus œdema referentibus, uti
 le 373. a 25
 emplastrum ex cinnabari ad

INDEX

- tophos**, aliosq; omnigenos 368.b 33
tumores induratos 373.b 18
emplastrum ex dracunculo 368.a 15
emplastrum e fermento, abscessus rumpens 366.a 23
emplastrum ex hastula regia, dia asphodelu dicitur 366.a 23
emplastrum ex lapidis asii flore, Philagrii, ad scirrhus 374.a 26
emplastrum ex lapidis asii flore, Galeni ib.b 1
emplastrum ex liquore syca- mino 371.b 17
emplastrum ex lolio, dia æro dicitur ib. 11
emplastrum ex melle, dia melitos dictum 365.b 26
emplastrum ex metallicis 371.a 13
emplastrum e nitro ad abscessus, scirrhus, & tumores 373.a 23
emplastrum ex perna 373.b 11
emplastrum ex pumice ad cicatricem ducendā 372.b 21
emplastrum ex ochra, inflammationem arcet, tum spon- te, tum in iudicio tortis idoneum ib. 3
emplastrum ex oxelæo 369.b 4
emplastrum ex plumbagine ad calidos affectus ib.a 25
emplastrum ex polline farina- ceo dia gyreos appellatum 366.a 11
emplastrum ex pompholyge pompholygeron dictum 368.b 33
emplastrum e radice lana- ria, dia struthiu dicitur, stru- mas discutiens 366.b 3
emplastrum ex sale, dia ha- lon dicitur 373.b 3
emplastrum ex salis flore, articulariis in declinatio- ne accommodatum 374.b 5
emplastrum ex salicibus, dia iteon dictum glutinans, cru- enta excreantibus & puru- lentis efficax, thoraci impo- situm 370.a 21
emplastrum ex senecione, quod dia erigerontos dici- tur 367.b 24
emplastrum a succo dia chy- lon dictum 363.b 33
emplastrum ex succo lini se- minis ib. 19
emplastrum ex urina muli, podagricis utile 374.a 20
emprothotonos 83.a 29
empyema unde fiat 108.b 16
encanthis quid 88.b 34
encanthidis curatio ib. 36
encanthides palpebrarum qua ratione tollantur 222.b 5
encephalos 292.b 36
enæma emplastra 365.a 12
engisoma 258.b 2
enneapharmacus pessus 391.a 13
entaticum quasi dicas inten- sorium 374.b 21

INDEX

Enterocoele	133.b 18	Epulis quid	99.b 33.
& 244.b 22		226.a 9	
Enterocoeles notæ	ib. 34	Epulidis curatio	99.b 35
Enterocoeles causæ	ib. 28	& 226.a 11	
εὐδαιμονία	77.a 27	Equus fluviatilis	297.a 25
Ephelidem curantia		Equinum coagulum	
98.b 2		318.b 6	
Ephemeron	294.b 3	Erasistrati panchrestos hy-	
Ephemeris notæ	212.a 24	gra	364.b 16
Ephemeris remedia	ib. 35	Erebinthus	293.b 18
Ephialtes unde dicatur		Erice	ib. 35
78.b 6		Erigerum	295.a 33
Ephialtes unde nascatur		Erinaceus	294.b 15
ibidem.		Erinaceus marinus	ib. 21
Ephialtem quæ notent		Erinacei terrestres fel	ib. 16
ibidem.		Erinacei terrestres pellis	
Ephialtes quomodo curan-		ibidem.	19
dus	ib. 17	Erinos	294.a 2
Epicuma ulcus oculi		Errhina quid	69.a 26
59.a 10		Errhinon medicamentum	
Epimedium	293.b 7	ibidem.	1
epimelis	ib. 11	Eruca	294.a 21
Epinyctides quid	167.b 29	Eruca sylvestris	ib. 30
Epinyctidum curatio	ib. 34	erucæ olerum	298.b 9
Epipactis	193.b 15	erucæ picearum	316.b 18
Epiphoræ curatio	86.a 1	erucæ picearum notæ	
Epiplocele	245.a 18	109.b 23	
Epiploenterocoele	ib. 19	erucæ picearum remedia	
Epispastica medicamenta		ibidem.	29
171.b 14		eruptiones pituitæ	167.b 6
Epistola Diocli ad ualitudi-		erum	314.a 32
nem tuendam	31.b 20	eryngium	296.a 1
Epithemata	378.a 1	erysimon	294.a 21
Epithema ad cephalæam		erysipelas	170.a 25
69.a 29		& 174.a 4	
Epithymum	293.b 4	erysipelatis cerebri notæ	
Epomphalum medicamen-		82.a 16	
tum quod umbilico illini-		erysipelatis cerebri curatio	
tur ad alium subducendam		ibidem.	19
337.a 31.b 3		erysipelata ani quò curentur	

INDEX

- 137.b 20
 erysipelacea inflammatio 174.a 5
 erysipelas inflammatus ib. 10
 erysipelatis curatio ib. 15
 erythrium. 38 ob 27
 erythrodanum 294.a 15
 erythroides tunica 242.a 30
 esdra multiplicis usus, uehe-
 menter enim deficcatur 343.b 35
 ethmoides meatus 96.b 25
 eunuchismus 246.b 22
 eunuchos faciendi ratio du-
 plex ib. 25
 eunuchi quomodo fiant
 ibidem 32
 euodes a grato odore dicti
 380.b 1
 eupatorium 394.a 32
 euphorbium ib. 36
 euzomon ib. 26
 exanthemata unde fiant
 167.b 8
 exanthemata capitis 65.b 34
 exanthematum curatio ib. 35
 & 167.b 11
 exanthemata puero oborta
 quomodo curentur 2.b 17
 exarthrema 270.a 18
 excrescentias ani curantia
 138.a 2
 exercitatio 4.a 30
 exercitationis commoda
 ibidem 32
 exercitationis genera
 ibidem.b 18
 exercitatio celeris ib. 28
 exercitatio composita ib. 33
 exercitatio uiolenta ib. 23
 exomphalon 236.b 23
 expressionis oculorum cau-
 sa 93.a 10
 expressionis oculorum cura-
 tio ib. 11
 extractio eorum quæ in au-
 reis inciderunt 225.a 1
 Faba 26.a 14. 305.a 11
 Faba Aegyptia 26.a 15
 Faciei aspretudinem
 tollentia 98.a 21
 Faciei pilos tollentia ib. b 35
 Faciei uitia 98.a 20
 Faciem a rugis asserentia
 ibidem 23
 Faciei nigritias tollentia ib. 29
 Fæcula 355.a 14
 Fæx aceti 326.a 21
 Fex uini ib. 11
 Fex uini cremata ib. 16
 Famem grandem curantia
 58.b 13
 Fastidium cibi 113.b 1
 Fastidium cibi curantia
 ibidem.a 16
 Fastidium cibi in febris
 quomodo curandum
 58.a 3
 Fatigationis ex itinere reme-
 dia 15.b 24
 Fatuitas unde fiat 77.a 13
 Fauus quid 182.a 16
 Fauorum curatio ib. 18
 Fauis capitis unde nascantur
 & quomodo curentur 66.a 26
 Fauæ in pastillus 331.a 25
 Febrium ardentium signa
 50.a 32
 Febrium ardentium curatio

INDEX

ib. b 14	Febres continentes	49. a 5	Febbris semitertianæ curatio	51. a 3
Febrium continētium origo	ibidem 28	Febbris tertianæ agnitio	46. b 3	
Febrium continentium notæ	ibidem 31	Febbris tertianæ curatio	ibid. em. b 2	
Febrium continentium cura	ib. 39	Febristertianæ notæ curatio	47. a 27	
Febbris diaria quæ ratione di-	43. a 3	Febrium quæ ex affectu uisce-		
gnoscat		rum erysipelas referente oriū		
Febri diariæ qui opportuni		tur notæ	49. a 34	
ibidem 7		earundem curatio	50. a 6	
Febbris diariæ curatio		Febrium ex crudoꝝ humorū		
ibidem. 15		redundantia ortarum notæ		
Febri diaria laborantium ui-		52. b 15		
ctus	ib. b 12	earundem curatio	ib. 26	
Febrium hecticarum notæ		Fel	329. b 1	
50. a 26		Fel accipitrum	ib. 17	
Febrium hecticarum dux spe-		Fel aquilarum	ib.	
cies	ib. 31	Fel bouinum	ib. 9	
Febrium hecticarum curatio		Fel caprillum	ib. 8	
ibidem. b 23		Fel capræ syluestris	ib. 13	
Febrium putridarum notæ		Fel erinacei terrestres		
45. b 25		294. b 16		
Febrium putridarum curatio		Fel gallorum	329. b 16	
46. a 5		Fel hiænæ	ib. 10	
Febbris quartanæ cognitio		Fel ouillum	ib. 7	
47. b 12		Fel perdicum	ib. 16	
Febbris quartana quo fere an-		Fel piscis callionimi	ib. 10	
ni tempore incipiat		Fel icorpionis	ib.	
ibidem 10		Fel suillum	ib. 5	
Febbris quartanæ curatio		Fel taurinum	ib. 9	
ibidem 25		Fel testudinis marinæ	ib. 13	
Febbris quotidiana quibus no-		Fel ursi	ib. 9	
tis agnoscat	48. a 17	Fel oīum animantis humoꝝ		
Febbris quotidianæ curatio		calidissimum est	ib. 2	
ibidem. 30		Fel flauū pallido calidius	ib. 3	
Febbris semitertiana	51. a 1	Fel uiride flauo calidius	ib. 4	
Febbris semitertiana duobus		Fel uolucrum oīum acius	8c	
modis generatur	ib. 10	siccando uehementius est,	9	

INDEX

quadrupedum	ib. 14	289.a 10	Fistularum ani manifestarū
Felis morsuum reme dia			notæ
202.a 32			ib. 31
Femur bouis	314.b 34		Fistulæ insanabiles
Femorīs fracturæ qua ratio			ib. b 8
ne curentur	267.a 23		Fistulæ ægre consanescentes
Femorum intertrigines curā			ibidem. 11
tia	3.b 10		Fistularum ani curatio, quæ
Fermentum	285.b 14		manu peragitur
Ferrum	320.b 10		ibid. 13
Ferri sterces	322.a 7		Flatus uentriculi unde fiant
Ferula	312.b 13		114 b 30
Ferulæ medulla	ib. 14		Flatus uentriculi quomodo
Ficus morbos	66.b 22		curentur
Ficorum curatio	ib. 25		ibidem. 33
Ficus	27.b 7		Floris æris coctio
Ficus arbor	ib. 22		375.b 26
Ficus Aegiptia	ib. 29		Flos siluestris punicæ
Ficus aridæ	ib. 14		287.a 13
Ficus caprifici	ib. 19		Fluor muliebris
Ficus humilis	329.a 5		141.a 11
Ficus pingues	323.b 14		Fluor muliebris multiplex
Ficus syluestris	ib. 27		ibidem 16
Ficus uirides	ib. 1		Fluoris muliebris notæ
Filix	318.a 18		ibidem 20
Filum in futuris uulnerum	7		Fluoris muliebris curatio
quale esse debeat	238.a 29		ibidem 26
Filicula	291.b 20, 317.b 2		Fœnogræcū
Fimus ciconiarum	303.a 30		26.a 21, 325.a 21
Fimus crocodili fluuiatilis			foetum x utero excidendi ra
ibidem. b 2			tio
Fimus crocodili terrestris			248.b 8
ibidem. a 36			formica quid
Fimus murium	ib. 31		169.b 17
Fistula quid	189.a 8		formicarum curatio
Fistularum differentia			ib. 26
250 b 3			fractura quid
Fistularum ani latentium no			258.a 23
tæ	251.a 29		fracturarum multæ differen
Fistularum curatio			tia
			ibidem 26
			fractura alphetidon
			ib. 8
			fractura calamidon
			ib.
			fractura caryedon
			ib. 17
			fractura cauledon
			ib. 10
			fractura eis onicha
			ib. 10
			fractura raphanidon
			ib. 6
			fractura schidacidon
			ib. 13
			fractura sicyedon
			ib. 10
			fractura capitis
			ib. 23
			fracturarum capitis diffe

INDEX

[illegible]

INDEX

Galerita	303.b 29	Geranis	263.b 25
Galiancones	272.b 16	Geranium	289.a 2
Galiidolon	289.a 8	Ges entera	289.b 34
Galion	ib. 3	gigarta	290.a 2
Galiopsis	ib. 7	gingidium	24.b 20
Galla	300.b 21	gingiuas reprimentia	
Galla combusta	ib. 30	100.a 14	
Galla immatura	ib. 22	gingiuas exesas curantia	
Galla quæ flauo colore est		ibidem 28	
ibidem 27		gingiuarum pruritus curatio	
Galla omphacitis	ib. 22	3.a 3 & 34	
Gallina	27.b 26	gladiolus	313.a 21
Gallinæ adeps	323.a 2	glandula	175.a 33
Gallinæ ius	295.a 24	glandulæ animalium	
gallarum cua	27.b 23	28.a 23	
galli adeps	323.a 24	glandes	27.b 33
Galli ueteris ius	295.a 23	glans unguentaria	
Gallus dropax Oribasii		386.b 35	
384.b 16		glans colis nudata quō tegatur	
Galopsis	289.a 7	tur	239.a 19
Gammari	29.b 17	glans præputio adhærens	
Ganglium quid	170.a 1	quomodo curetur	
231.a 20		240.a 7	
Ganglii notæ	281.b 24	glans penis clausa quō apeririatur	
Ganglii curatio	231.b 28	12.b 18	
Gangræna	172.b 16	glandes unde fingantur	
Gangrænarum curatio		13.b 9	
ibidem 24		glandibus quando utendum.	
Gangrænarum per manus curatio		ibidem. 7	
235.a 27		glaucium	290.a 11
Garum	289.a 12	glaucomata	92.a 12
Gastrophagia	257.b 1	glaucomata curantia	ib. 28
Ge	289.a 25	glaux	290.a 15
Genista	322.a 35	gleba Alana	289.b 25
Genitale exulceratum curantia		glechon	290.a 18
159.a 3		gleucinum, embole prima	
Genu articulus luxatus quō reponatur		399.b 20	
276.b 35		Embole secunda	ib. 29
Gentiana	289.a 17	embole tertia	ib. 36
Geodes lapis	308.a 12	glæos	290.a 12

INDEX

glossocatochon	226.b35	gyris	ib.17
glutinium	302.b7		
gluten piscium	347.b33		
glycidide	290.a30		
glycea ulcra quibus curentur	97.a9		
glyciriza	290.a26		
glycisis	76.b22		
gnaphalium	290.b3		
gnaphalon	ib.8		
gonchora tela	255.b9		
gone, pessus ad concipiendū	391.a25		
gongylis	290.b10		
gramen	279.b8		
granum gnidium	302.a22		
granum tinctorium	ibidem36		
grauedo quid	102.b22		
grauedinis curatio	103.a21		
grauedinis notæ	102.b25		
grauedinem pueri curantia	2.b31		
gravidis superuenientia quō			
curentur	ib.8		
grossi ficus	313.b8		
grues	27.b14		
gummi	302.b23		
gummi ex pruno	302.a35		
gummi cerasi arboris	300.b15		
gustatu certissime simpliciū			
temperamenta noscuntur.	278.a31		
guttur quō incidendum	228.a17		
gutturi quō spinæ eximantur	227.b33		
gypsum	290.b20		
Gypsum ustum	ib.23		
		Abitus quomodo inca	
		lescat	8.a10
		Hæmatites	
		307.b12	
		Hæmorrhoi ictus	204.b22
		Hæmorrhoi ictus remedia	
		205.a1	
		Hæmorrhoides cæcæ	
		138.a23	
		Hæmorrhoidum curatio	
		ib.21.252.b16	
		Hæmorrhoides in mulierib	
		bus quomodo curentur	
		247.b12	
		Halatia, quasi dicas ex sale	
		confecta purgatio	
		334.b12	
		Halimon	24.a3
		Halmades oliuæ	113.a29
		Harmala	357.a19
		Harmation collyrium	
		363.b13	
		Hastula regia	286.a32
		Hebetudo oculorum	
		92.b20	
		Hebetudinis oculorum cura	
		tio	ib.22
		Hecatombe ad cicatrices cras	
		fas	361.b35
		Hecticæ febres	50.a24
		Hedera	301.b7
		Hederæ lachryma	ib.14
		Hedera terrestris	328.b20
		Hedricum ad ani dolores	
		137.b22	
		Hedricū optimū ad ani infla	
		matiões & excrescētiasib.	28
		Hedichroi qđ theriacē ingre	

INDEX

ditur pfectio	339.a 26	Herba mercurialis	308.a 35
Hedyosmus	295.a 28	Herba pulicaris	330.a 12
Hedysarum	ib. 34	Herba sabina	288.a 32
helcysma	293.a 7	Herbarum coctio	377.b 19
Helenium	292.b 28	Herculeum panaces	315.a 34
Helichryson	293.a 18	Hermaphroditorum quatuor differentiæ	247.a 11
Heliocæes medicamentum a durens	354.b 14	Hermaphroditorum curatio	ibidem 22
Helioscopius tithymalus	325.b 3	Hermodactylus	294.a 7
Heliotropium maius	ib. 3	herpes	173.a 28. 170.a 23
Heliotropium minus	ib. 6	Herpes exedens	173.a 32
Helitis squama	366.b 19	Herpes miliaris	ib. 34
Helleborus	293.a 13	Herpetum curatio	ib. 36
Helleborum quibus dandum	338.a 11	Herpillum	294.a 12
Helxine	293.a 24	Hexapharmacum medicame tum	158.b 2
Hemerocalles	295.b 14	Hiberias	306.b 12
Hemicrania	68.b 35	Hidros	296.b 21
Hemicraniæ curatio	69.a 1. ib. b 35	Hieras conficiendi modus	336.b 36
Hemiectum	395.b 29	Hiera Antiochi	ib. a 3
Hemina	ib. a 19	Hiera Archigenis	ib. b 35
Hemina in aridis	ib. b 23	Hiera Galeni	ib. 21
Hemionitis	295.b 17	Hiera iusti	ib. 10
Hemiplexia	79.b 13	Hiera Rufi	ib. 27
Hepar	295.b 10	Hieracites lapis	308.a 18
Hepialis febris	48.b 4	Hippocampus	297.a 11
Hepialis unde dicatur	ib. 29	Hippolapathum	ib. 15
Hepiali curatio	48.b 30	Hippomarathon	ib. 19
Hepsema	294.b 28	Hippophaes	297.a 35
Heraclei catagmaticæ	374.b 35	Hipophies	ib. 35
Heraclia	295.a 27	Hippopotamus	ib. 24
Heraction	308.a 25	Hippopotami pellis	291.a 21
Heraction papauer	ib. b 14	hippofelinon	24.b 11
Heracius lapis	ib. a 3	& 297.a 27	
Herba Apollinaris	326.b 36	hippuris	ib. 30
Herba hirundinaria	329.a 24	hircina caro	28.a 8
Herba lactaria	325.a 25	hircorum testiculi	ib. 28
		hirudinum notæ	210.a 26

INDEX

hirudinum remedia		hydroceles curantia	
ibidem. 31		134.a.22	
hirundo	329.a.33	hydroceles adustio	243.b.14
hirundinaria herba	ib.24	hidromel ex malorum coto-	
helocleros	212.a.9	neorum succo	338.a.1
holoschoenos	324.a.32	hydrocephalon	216.b.9
hominis morsus remedia		hydropeperi	326.b.20
206.a.30		hidropiper	ib.22
hominum in lupos conuer-		hidrophobia	199.b.16
sionis notæ	79.a.4	hidrophobiæ signa	ib.17
hominum in lupos conuer-		hidrorosati compositio	
sionis curatio	ib.9	358.a.15	
hordeum	304.b.16	hidrops unde oriatur	
humani sanguinis herba		128.b.7	
283.b.34		hidropis curatio	ib.36
humeri luxatio	271.a.24	hidropicorum uictus	130.a.15
humeri luxati curatio		hidrops quomodo manu cu-	
ibidem. b.18		retur	236.a.18
humeris summus quid		hidros	205.a.19
ibidem.22		hyeme quæ uictus ratio sit uti	
humeri summi luxatio quò		lis	15.a.3
curetur	ib.20	higra, hoc est, liquidum colly-	
humidum in primo gradu		rium, ex caucalide	
278.b.24		364.b.5	
humidum in secundo ordine		higra ad hypopios	90.a.11
ibidem. 31		higrocollyria quid	85.b.27
humidum in tertio gradu		higrocollyrium, quod dolo-	
ibidem. 32		rem leuet anodinon dictum	
hyacinthus	326.b.1	ibidem. 30	
hyalos	ib.8	higidion Ammœnii collyriū	
hydatis quid sit	221.b.9	361.a.22	
hydatis qua ratione curetur		hiosciamus	326.b.35
ibidem. 21		hipecoon	327.a.13
hydnon	326.a.11	hipericum	303.b.14
hydor	ib.25	327.a.5	
hydor thalassion	296.a.5	hiperon	272.a.6
hidrargiros	326.b.14	hipochimata	92.a.16
hidrocele	242.a.36	hipochimata quò curentur	
hidroceles notæ	ib.20	ibidem. 19	
hidroceles curatio	ib.14	hipocistis	327.a.19

INDEX.

hipoglosson	ib. 16	Iecur caprillum	ib. 22
hipoglossis arteriace	104. b 7	Iecur hircinum	ib. 25
hipoglottides medicamenta		Iecur lacertæ	ib. 26
103. a 26		Iecur lupinum	ib. 27
hipophæston	327. a 15	Iecur mergi	ib. 31
hypopii, oculi suppurantes		Iecur rabidi canis	ib. 21
223. a 16. 90. a 13		Iecur suillum	28. a 35
hipopiorum curatio		Ignis sacer	174. a 5
223. a 19		Ignis sacri curatio	ib. 15
hypofarcidios hydrops		Ilambonis collyrium	
128. b 30		360. b 10	
hipofpatismus	218. a 30	Ileos morbus qualis	
hyposphagma	86. b 23	121. a 5	
hiposphagmatis curatio		Ileos unde nascatur	ib. 8
ibidem 32		Ilei morbi curatio	ib. 14
hipotheton pastillus		Ilex	317. b 35
353. a 18		Illitio sedis ad flatu excutien	
hyssopum	327. a 33	dos	337. a 17
		Ilium ossa fracta qui digno	
		scas	264. b 14
I Aspis colore subuiridi		Ilium ossa fracta qui curentur	
307. b 24		ibidem. 17	
I Aspis colore uiridi		Impetigines unde contraham	
ibidem 26		tur.	164. a 33
Iberis herba	151. a 30	Impetiginum curatio	ib. 36
Icesios ad strumas, abscessus,		Impetigini facientia medica	
lienem, articulos & coxas		menta	ib. b 14
dicum dolores	370. b 15	Impetiginum ferarum cura	
Icthiocolle	297. b 33	tio	ib. b 23
Icteros	131. b 23	Impetigini feræ utilia medio	
Icteri multæ differentię		camenta	ib. b 27
ibidem 17		Impuberes imberbesq; reddē	
Icteri causæ & notæ	ib. 28	tia	133. a 16
Icteri curatio	131. a 22	Incubo unde dicatur	
Idæa radix	296. a 23	78. b 6	
Iecur	296. b 20	Incubonis causæ	ib. 10
Iecur adurendi ratio		Incubonis notæ	ib. 11
256. b 12		Incubonis curatio	ib. 17
Iecur animalium	28. a 34	Indice, ad ulcera quæ serpen	
Iecur apri	295. b 29	do depascunt, & sanguinis	
Iecur asuinum	ib. 28		

INDEX.

sputum	371.b.30	Intestini tenuioris morbus	121.a.2
Indicia decretoria in morbo		Intestinorum leuitas	116.a.2
rum initio praua sunt		Intestini procidentia quō ma	
35.b.29		nu curetur	237.b.32
Indicum atramentum		Intestinorum ramex	244.b.17
308.a.18		Intybum	320.a.12
Infantium uictus ratio		Intybus syluestris	301.b.25
3.b.33		Inula campana	292.a.28
Inflammatio quid	170.a.15	Inunctiones quæ proprie di	
Inflammationis curatio		cantur	385.b.19
ibidem	36	Inunctionum, aliæ simplices,	
Inflammationis uariæ diffe		aliæ compositæ	ib.a.30
rentiæ	ib.18	Inunctionum simplicium ma	
Inflammationis oculorum		teria	ib.32
curatio	85.a.30	Iocinoris affectus uarii	
Inflatio unde nascatur		109.a.21	
178.b.16		Iocinoris affectuum signa	
Inflationis curatio	ib.26	ibidem	27
Inguinalis herba	286.a.19	Iocinoris affectuum curatio	
Inguinis ramex	133.a.16	128.b.21	
Inguinum ramicis curatio		Iocinoris inflammationes	
244.a.32		quomodo eurentur	
Infania	77.b.8	128.a.1	
Infantiæ curatio	78.a.24	Iocinoris temperiei notæ	
Insolatu adusti quomodo cu		20.b.1	
rentur	11.a.20	Iocinorosi qui	125.b.33
Intemperies sicca	22.a.23	Ion	297.a.2
Intemperiei siccæ curatio		Ios	ib.6
ibidem	28	Iris	297.b.5
Intemperies calida quō cor		Iris syluatica	294.b.4
rigatur	22.a.3.28.a.7	Irium	388.b.24
Intemperies frigida quō emē		Ifatis	297.b.10
detur	21.b.5	Ifatis domestica	ib.11
Intertrigines ex calceamētis		Ifatis syluestris	ib.15
curantia	119.a.13	Ifcæ	236.a.4
Intertrigines femorum curā		Ischias	306.b.25
tia	3.b.10	Isis cruētis accōmodata, ad	
Intestina animalium	28.b.3	glutinandū carnē inducen	
Intestini plenioris morbus		dū & purgandū	369.b.11
118.b.33			

INDEX.

Isopyz	297.b 20	Lac bubulum	ib. 23
Isotheon collyriū	363.b 17	Lac caprillum	ib. 32
Italicum emplastrum		Lac muliebre	ib.
374.b 16		Lac nutricis quale esse debe-	
Itea	297.b 27	at	1.b 36
Itria	103.a 27	Lac nutricis uitiatū quō corā	
Iudaicus lapis	307.b 28	rigatur	2.a 11
Iudaicum morbi futurum		Lac quod statim a partu red-	
quomodo prænoscas		ditur	28.b 22
36.b 5		Lac scissile	29.a 18
Iudicium morborum instans		Lac uaccinum	288.b 35
quomodo agnoscatur		Lactis coagulati notæ	
ibidem 21		214.a 18	
Indicium morbi optimum		Lactis coagulati remedia	
peractum, quō agnoscas		ibidem. 20	
36.a 5		Lac coquendi modus	29.a 3
Iuglans	27.a 18	Lac coctū	28.b 14. 288.b 27
Iuguli fracti curatio	263.a 7	Lac potanti quid obseruan-	
Iuliani oxymel	333.a 36	dum	ib. 26
Iuncus angulosus	305.b 13	Lacerta	320.a 5
Iuncus quadratus	ib.	Lacerta chalcidica	320.a 35
Iunci odorati flos	320.a 22	Lacertæ caput	301.b 17
Iuncus palustris	ib. 29	320.a 6	
Iuniperus	285.a 2	Lachrymæ papaueris coctio	
Iusti hiera	336.b 10	377.a 35	
Ixiæ notæ	212.a 12	Lachryma thuris	307.a 14
Ixiæ remedia	ib. 17	Lachrymæ thuris coctio	
Ixios	296.b 35	377.b 11	
		Lactaria herba	325.a 25
L Aboriosam uitam agen		Lactuca	296.b 4
tium uictus ratio	15 a 31	Lactuca syluestris	ib. 8
Labra disrupta quō cu-		Ladanon	306.a 8
rentur	100.b 4	Ladon	ib. 9
Labiorum curta qua uia farci		Lagopus	ib. 6
antur	225.b 30	Lagophthalmum	220.a 28
Labrum ueneris	291.b 4	Lamina plumbea	312.a 22
Labrusca	283.a 17	Lanæ concremata	
Labruscæ uitis flos	313.a 33	3.b 32	
Lac	288.b 21	Lanearum uestium fragmen-	
Lac asininum	ib. 33	ta	318.b 11

INDEX.

Lanæ pinguedo	313.b 6	Lasitudo inflammatoria	ib. 27
Lanæ sordidæ	293.b 17	6.a 11	
Lanæ, quæ sordibus carent		Lasitudinis inflammatoriæ remedia	ib. 27
ibidem. 31			
Lapathum	306.a 24	Lasitudo tensoria	ib. 7
Lapides	307.b 11	Lasitudinis tensoriæ remedia	ib. 21
Lapis ageratus	ib. 34	dia	ib. 21
Lapis alabastrites	308.a 6	Lasitudo ulcerosa	ib. 6
Lapis aphrofelenes	ib. 21	Lasitudinis ulcerosæ remedia	ib. 18
Lapis Arabicus	ib. 25	dia	ib. 18
Lapis Armeniacus	ib. 21	Lasitudines spontaneæ quò	
Lapidis Asii flos	307.b 35	curentur	6.b 22
Lapides in Argæo nati		Lateralis dolor	109.b 14
308.a 10		Lateralis doloris notæ	
Lapis gagates	ib. 2	ibidem. 16	
Lapis galactites	307.b 18	Lateralis doloris curatio	
Lapis geodes	308.a 12	110.a 6	
Lapis hæmatites	307.b 12	Lathiris	306.a 17
Lapis heraclius	308.b 3	Lauacra quibus utilia	
Lapis hieracites	ib. 18	14.a 36	
Lapis iaspis	307.b 24	Lauacra naturalia	ib. b. 12
Lapis indicus	308.a 18	Laureola	291.a 16
Lapis iudaicus	307.b 28	Laurus Alexandria	ib. 12
Lapis magnes	308.a 3	Laurus arbor	ib. 7
Lapis melitites	307.b 18	Laurinum	387.a 15
Lapis morochthus	ib.	Leæna, siccata digeritque	
Lapis opithes	308.a 11	372.a 12	
Lapis ostracites	ib. 13	Leæna alia, corpus recolligit	
Lapis phrygius	307.b 32	humoresque euacuat	
Lapis pyrites	ib. 29	ibidem 7	
Lapis sapphirus	308.a 20	Lectionis commoda	5.b 5
Lapis schistos	307.b 17	Legumina	26.a 9
Lapis specularis	322.b 5	Lemnestis	384.a 11
Lapidum coctio	376.a 32	Lemnia rubrica	289.a 33
Lapilli qui in spongiis inueniuntur	308.a 8	Lemnia sphragis	ib. 34
Lappago	297.a 35	Lemniscon	229.a 23
Lapsana	306.a 21	Lemonium	306.a 32
Larix resina	319.a 3	Lentes	327.b 2
Laserpitium	1321.a 1	Lenticula	26.a 10

INDEX

Lenticula palustris	327.a 9	128.a 31	
Lenticulas curantia	98.b 3	Leucus pastillus	352.a 22
Lentiscus	324.a 17	Leuiraiæ	30.a 2
Lentiscinum	387.b 21	Leuitas intestinorum	
Leontopetalon	306.b 8	116.a 2	
Leoninus adeps	323.a 3	Libanium	362.a 2
Lepidion	151.a 31	Libanius pessus	391.a 5
306.b 11		Libanotis	307.a 7
Lepidoide ossa	216.a 36	Libanotis coronaria	
Lepis	306.b 15	ibidem	11
Leporina caro	25.a 10	Libanotus	ib. 14
Leporis coagulum	318.b 2	Libellæ	30.a 8
Leporinus sanguis	28.a 8	Libra	395.a 22
Leporis marini notæ		Lichenes equorum	
209.b 33		306.b 5	
Leporis marini remedia		Lichen herba	ib. 35
210.a 5		Lichenion medicamentum	
Lepra quid	163.b 5	163.a 3	
Lepra unde nascatur		Lienis effectus	130.a 3
ibidem 8		Lienis intemperies quò euré	
Lepræ curatio	ib. 15	tur.	ib. 23
Lepræ facientia medicamentu		Lienosi	ib. 1
ra	ib. 22	Lienem adurendi modus	
Leptocarya	299.b 9	235.a 24	
Lethargus unde contrahatur		Lienteria duplex	116.a 6
72.a 27		Lienteriæ curatio	ib. b 19
Lethargicorum notæ		lignorum caries	319.b 19
ibidem 29		lignis	307.a 25
Lethargi curatio	ib. 14	ligusticum	ib. b 2
Leuca seu leuce quid		ligysticum	ib.
166.b 23		lilium	304.b 24
Leucæ sanabilis aut insanabi		liliaceum	386.b 7
lis notæ	ib. 27	lilinum suffimen	389.b 27
Leucæ curatio	ib. 35	linei panniculi	318.b 14
Leucacanthum	306.b 24	lingua animalium	8.a 22
Leucas	ib. 28	lingua bubula	226.b 1
Leuce	307.a 4	linguæ ligatio duobus mo	
Leucographis	307.b 20	dis accidit	ib.
Leucoion	306.b 31	linguæ ligatio qua ratioe cū	
Leucophlegmatias hydrops		retur	ib. 12

d

INDEX

Linguae morbus	100.b 8	tiæ	194.b 3
Linguae scabritiem humectan		Lumbrici unde fiunt	ib. 7
tia	39.b 2	Lumbrici ascarides	196.b 23
Lini semen	308.a 28	Lumbrici ascarides unde na-	
Linospermon	ib.	scantur	ib. 35
Linozostis	308.a 34	Lumbrici ascarides quomodo	
Lippitudo unde fiat	85.a 19	curentur	197.a 3
Lippitudinis curatio		Lumbrici lati	196.a 31
ibidem 21		Lumbricorum latorum notæ	
Lippitudini utile medicamē-		ibidem.b 5	
tum	340.b 2	Lumbricorum latorum cura-	
Liquidi hyssopi medicamenti		tio	ibidem. 8
præparatio	375.a 16	Lumbrici teretes siue rotun-	
Liquor Cyrenæicus		di quibus notis dignoscantur	194.b 19
314.a 19			
Liquor Medicus	ib.	Lumbrici teretes qua ratione	
Liquor Syriacus	ib.	occidantur & e corpore e-	
Lithargyros	215.a 7	ducantur	195.a 25
Lithargyri notæ	ib.	Lumbricorum communiter	
Lithargyri remedia		omnium curatio	197.a 17
ibidem 13		Lumbrici terræ	289.b 35
Lithi	307.b 11	Lunare cyphi	390.a 17
Lithospermon	308.a 24	Lupinum	26.a 20. 296.a 23
Litrum	308.b 5	Lupinum esculentum	
Liures corporis arcentia		ibidem 24	
8.b 1		Lupinum sylvestre	ib. 28
Lixiuum	302.b 26	Lupus piscis	29.b 7
Lixiuum protostacton		Luscioli	93.a 35
ibidem 31		Luxatio quid	270.a 11
Locustæ	281.b 1	Luxationes duæ species	
Loligines	29.a 19	ibidem. 17	
Lolium	280.b 23	Luxatorum articulorum cura-	
Lonchitis	308.b 13	ratio	179.a 16
Lordosis	273.b 33	Luxata cum ulcere quomo-	
Lotus arbor	309.a 10	do curentur	177.b 6
Lotus herba	ib. 3	Luxatio cum fractura quomo-	
Lotus Aegyptia	ib. 8	do curetur	178.a 1
Lotus sylvestris	ib. 7	Lycanthropiæ signa	79.a 1
Lotus domestica	ib. 4	Lycanthropiæ curatio	ib. 10
Lumbricorum tres differen-		Lycæonis notæ	ib. 35

INDEX

Licaonis curatio	ib. 9	phthisis dicitur conducen	
Lichnis	308.b 35	ria	ibidem 36
Lici medicamentum ad uipe		malagmata uiscerum perfric	
rarum morsus	204.a 5	ticni utilia	ibidem 12
Licium	308.b 22	malagmata Apollopianis ad	
Licium Indicum	ibidem 30	iecoros	381.b 28
Licoctinum	281.a 29	malagma curei	ibid. a 13
Licopsis	308.b 18	malagma disodes a foedo o	
Licopsis anchusa	279.b 19	dore dictum, ad pleuritic	
Ligos	279.b 18	ibidem. b. 18	
Linceus ad claritatem oculo		malagma Nili ad lienem, om	
rum	263.a 9	nemq; duritiem	
Lipiræ febres	49.a 1	ibidem. a 4	
Lisimachum	308.b 31	malagma ad cephalalgiam	
Lisiponium acopon	383.b 17	68.b 17	
		malagma ex baccis lauri	
		381.b 4	
		malagma ex œnanthe	
		382.a 1	
		malagma ex sampucho	
		381.a 24	
		malagma ex seminibus	
		ibidem 10	
		malagma ex sertula campa	
		na, dia meliloton dicitur	
		378.b 3	
		malagma ex stercore capril	
		lo Oribasii ad iecur indura	
		tum, lienosos, & hidropicos	
		381.a 20	
		malagma ex fimo caprillo,	
		spongion, hidropicis efficax	
		381.a 31	
		malagma ex uinaceis, dia gi	
		garton dicitur	382.a 13
		mala	320.b 17
		mala acerba	ibidem. 24
		mala acida	ibidem. 22, 27, 25
		mala aquosa	ibidem 20
		mala austera	ibidem 6
		d ii	

M Acedonicum; 72.a 26
Macer 309.a 17
Macherionis empla
strum uiride 373.a 5
madarosis quid 88.a 24
madarosis curatio ibid. b. 19
magnes 308.a 3
magni aster 362.a 17
malagmatum genera 378.a 2
malagmata alui profluuii la
borantibus utilia ibidem 25
malagmata ardori uiscerum
congruentia ibidem 29
malagmata febribus ardenti
bus conuenientia ibidem 30
malagmata iecori iniicienda
ibidem 21
malagmata lieni applicanda
ibidem 11
malagmata pectori condu
centia ibidem 34
malagmata stomacho iniicie
da ibidem 18
malagmata in tabe quæ

INDEX

Mala cotonea	ib.8	Mammæ in maribus, fœminæ	
Mala dulcia	ib.3	rum mcre inturgescences	
Mala mandragoræ		quomodo manu curentur	
309.a 33		135.b 1	
Mala præcocia	310.b 35	Mandragoras	309.a 33
Mala Punica	27.a 9	Mandragora	ib.
Mala struthia	310.b 24	Mandragoræ signa	211.b 16
Malum Medicum	301.b 16	Mandragoræ remedia	
Malum Punicum	319.a 15	ibidem 19	
Malum Punicum dulce		Manethonis dia sphecles	
ibidem 13		354.a 9	
Malum Punicum acidum		Mania	77.b 9
ibidem 19		Manus summæ ossa fracta	
Malum Punicum austerum		quomodo curentur	267.a 4
ibidem 19		Manna thuris	309.b 4
Malicorium	ib.22	Mannæ thuris cectio	
Malum terræ	284.b 3	369.b 11	
Malus Armeniaca	310.b 33	Marathron	309.b 7
Malus Persica	ib.28	Marasmos	50.b 5
Malabathrinum collyrium		Marcellius thronus	
363.b 17		351.b 2	
Malabathrum	309.a 22	Marcellium ad perniones	
Malache	ib.25	158.a 28	
Malacia	29.a 29	Marcium	379.a 16
Mali corporis habitus cura		Eiusdem dia omphacos em	
tio	128.a 20	bole prima	ib.8
Malleoli luxati curatio		Eiusdem caryophylli embo	
277.a 6		le secunda	ib.12
Malua	24.a 29	Eiusdem embole tertia	
309.a 25		ibidem 16	
Malua hortensis	ib.26	Marrubium	317.a 22
Malua sylvestris	ib.	Marrubium nigrū	387.a 22
Mamiras	ib.29	Massalioti medicamentum	
Mamillarum affectus uarii		355.a 5	
111.a 29		massiche	309.b 11
Mamillarum inflammatio		Massiche Aegyptia	ib.16
unde & quomodo curetur		Massiche Chia	ib.12
ibidem 35		Massichinum	387.b 24
Mamillas conseruantia		Masuaphii confectio	
212.a 8		390.a 32	

INDEX

- Mafuchæ confectio** ib. **tes, xyraphium** 66.b 30.
Maxilla inferior fracta quomodo curetur 262.a 19 **Medicamenta ad fœdum odoris**
Maza 25.b 32 **rem axillarum & sudationes** 112.a 19.
Mecon 310.a 34 **Medicamentum palpebris ad duren-
 dis congruum** 220.a 11
Medicamenta inuicem alterantia 353.a 30 **Medicamenta spinas, arundines,
 spicula, aculeos, furculos que educunt** 190.a 14.
Medicamenta quæ emplastra ingrediuntur quomodo conquantur 375.a 30 **Medicamentum ex aloë**
 354.a 4
Medicamenta arida 353.a 26 **Medicamentum tuslim ueterem concoquens**
 104.b 34
Medicamenta purgantia composita 333.a 19 **Medicamentum ex capitibus
 papaueris & melle** 342.b 16
Medicamenta simplicia quæ flauæ bili purgandæ sint 330.b 14 **Medicamentum ex corallio
 quod dia coralliu dicitur podagricis idoneum**
 348.a 13
Medicamenta purgantia stomacho aduersantur, excepta aloë ib. 26 **Medicamentum ex cyrenai-
 co liquore ad febrem quartanam** 335.a 14.
Medicamentum moderatum 278.a 16 **Medicamentum ex duplici pipere**
 342.b 16
Medicamentum Galeni e scilla, comitialibus potissimum efficax 342.a 24 **Medicamentum ex eruis**
 343.a 37
Medicamentum e murino colore psaron dictum 354.a 9 **Medicamentum ex lupino i-
 core præstantissimum** 345.b 9
Medicamentum xanthon, hoc est, flauum ib. 5 **Medicamentum ex malorum
 cotoneorum carnibus** 344.a 28
Medicamentum ad abrafa, intertrigines, inueterata ulcera senilem teneramque cutem 169.b 8
Medicamentum ad aspretudinem gutturis, tuslim & spiritum cruentum 104.a 34 **Medicamentum ex marrubii
 semine** 347.b 1
Medicamentum ad capitis & mentis eruptiones, exanthemata, uocant ficum referen- **Medicamentum ex moris ba-
 tinis quæ rubi fructus sunt** 356.b 14
Medicamentum e musto, dim d iii

INDEX

gleucous dicunt	357.a 6	395.b 2	
Medicamentum ex ostreis		Mel uino ponderosius est	
dia ostreon dicitur	354.a 21	ibidem.a 35	
Medicamentum ex rebus sep		Mellis quod in Heraclia Pon	
tem constans	348.b 27	ti nascitur notæ & remedia	
Medicamentum ex sanguine	214.a 34		
hircino	347.a 10	Mellis rosacei quod rhodo	
Medicamentum ex succo ma		meli uocatur confectura	
li Funic	356.b 29	358.a 20	
Medicamentum ex succis ma		Melan	309.b 19
lorum ad appetentiam abo		Melæne Serapionis	
litam & ægram concoctio	371.a 24		
nem probatum	344.b 1	Melamphillon	281.a 5
Medicamentum ex siluestris		Melancolia quid	77.a 10
malux semine	347.b 16	Melancholiæ causa	ib. 12
Medicamentum ex thapsia		Melancholiæ signa	ib. 20
ad omnes inueteratos affec		Melancholiæ curatio	
tus	63.a 33	ibidem.b 12	
Medicamentum ex thure, dia		Melancholia hypochondria	
libanu	354.a 25	ca	ib. 16
Medicus liquor	314.a 19	Melanchloron cruentis aptu	
Medion	310.a 29	367.b 12	
Medimnus Atticus	395.b 23	Melanchloros pastillus, a nia	
Medulla animalium	28.a 32	gro uiridiq; colore sic dictus	
Medulla ceruina	311.b 16	352.b 12	
Medulla hircina	ib.	Melanteria	309.b 24
Medulla uitulina	ib.	Melanthion	ib. 32
Medulla taurina	ib.	Melaplasticti præparatio	
Medulla quæ in artubus con		344.b 11	
tinetur	ib. 18	Melea malus Persica	310.b 28
Medulla quæ de spina elici		Meli	310.a 4
tur	ib. 19	Melia	ib. 13
Medulla ferulæ	312.b 13	Meliceridis proprietates	
Mel	310.a 4	239.a 21	
Mel coctum	ib. 9.30.b 15	Meliceridis curatio	
Mel non coctum	30.b 16	180.b 2.14	
Mel sachar	310.a 9	Melilotos	310.a 17
Mel amarum, quod in Sardi		Meline	310.b 28
nia fit	ib. 8	Melinum	387.a 3
Mel oleo grauius est		Melissophillon	310.a 21

INDEX

Meliteria Oribasii	354.a 16	Mensuræ	394.b 18
Melissinus	2.b 34	Mensurarum notæ	ib. 25
melittites	307.b 18	Mensuræ aridorum	51.a 35
Melittomata	139.a 13	Mensuræ liquidorum	395.a 26
Melopepon	26.a 29	Menta	295.a 28
Memæcilo	210.a 24	Meon	312.a 1
302.b 19		Mernia	27.b 7
Memoriæ iactura quomodo		Mesopotamenon	385.a 25
accidat	74.a 12	Mespila	27.a 10
Memoriæ iactura quomodo		Meta yncritica	201.a 1
reparetur	ib. b 2	Metasyncriticon medicamen	
Membrana ceratoides		tum	145.a 14
221.b 34		Metopion	387.a 32
Membranæ cerebri inflam-		Milax	311.a 4
mata curatio	261.a 3	Milax aspera	ib. 6
Membrana cerebri nigrescēs		Milax læuis	ib.
quo curetur	261.a 21	Milium	25.a 35
Membranæ cerebri uulnera		Millefolium	312.a 3
tæ signa	257.a 3	Milphosis quid	88.a 23
Membranæ interioris abdo-		Milphosis curatio	ib.
minis uulnera quomodo		Milui caput	300.b 16
manu curentur	237.b 7	Mina Attica	395.a 21
Membris distortis callus ob-		Mina Aegyptia	ib.
ductus quomodo curetur		Mina Romana	ib.
269.b 15		Minii coctio	376.a 25
Mendesiū malagma	379.a 6	Misy	311.a 8
Mendes	ibidem. 8	Misios coctio	375.b 33
Meningophilax	82.b 11	Mithridatis antidotum dia	
Menseis ducentia	13.a 17	scincu	341.a 23
Mensium purgatio qua ætate		Mithridatis antidotum qui-	
accidat	139.a 1	bus utile sit	ib. b 1
mensium purgationem quæ		Mithridatis mors	207.b 22
adiuuēt	ib. 10	Muasei emplastrum	
mensium purgatio immode-		368.a 3	
rata unde oriatur	140.a 24	Mochlia	275.b 20
mensium purgationis immo		Mochliscos	269.a 2
dicæ purgatio	ib. 32	Modius Aegyptius	395.b 25
mēsiū suppressio unī	139.a 18	modius Italicus	ib. 26
mensium suppressionis cura			
tio	ibidem 29		

d liii

INDEX

molaris	307.b3	morbis comitialis cui fere	
mola quid	145.a25	ætati accidat	ib.30
molæ signa	ib.29	morbis comitialis notæ	
molæ curatio	ib.b2	ibidem	32
moly	312.a21	morbis comitialis curatio	
molybdos	311.a17	ibidem	9
molibdæna	ib.14	morbis regius	131.b22
monohemeron collirium		morbis regii multæ differen-	
359.b14		tia	ib.27
mora	27.b18	morbis regii causæ & notæ	
mora batina	356.b14	ibidem	28
moræa	311.a29	morbis regii curatio	
morbis omnes habent sua si-	132.a22		
gna	31.b5	morochthus	307.b2
morbis lethalem notantia		morsuum uirulentorum re-	
34.a8		media communia	
morbis non lethalis signa	198.b15		
ibidem	28	moris	311.a29
morbis quatuor notis digno-		mulieris ex foetu suo moritu-	
scuntur	ib.b5	ræ notæ	248.a16
morbis an iudicium subitu-		mulieri grauidæ superueniē-	
rus soluendusue sit quō præ-		tia	1.a1
scias	ib.30	mulieri grauidæ superueniē-	
morbis iudicium futurum		tia quomodo curentur	
quomodo prænoscat		ibidem	8
36.a5		muliebris fluor	141.a13
morbis iudicium instans		muliebris fluor multiplex	
quomodo agnoscas		ibidem	14
ibidem	20	muliebris fluoris notæ	
morbis iudicium optimum		ibidem	20
peractum quō agnoscat		muliebris fluoris curatio	
37.a13		ibidem	26
morbis principium quod		muliebrium locorum clausu-	
34.a2		ra quomodo curetur	
morbis publice grassantes		147.b12	
1.a35		nullus piscis	29.b7
morbis publice grassantes un-	325.b3		
de oriantur	24.b3	nulla	30.b19
morbis comitialis causæ		nulla quomodo paranda	
7.a16		ibidem	21

INDEX

multipedæ	313.b 30	myrrha Bœotica	ib. 23
murænæ marinæ morsus au-		myrrhæ coctio	377.b 17
xilia	206.a 21	myrrhinæ	312.a 12
muria	300.b 16	myrrhis	ib. 7
muria salforum pisciū	30.a 10	myrsinatum	368.a 27
muria oliuarum colymbadū		myrsine	312.a 12
27.a 15		myrsinites, tithimalli genus	
muris caput	300.b 16	325.a 36	
muris aranei morsuum notæ		myrsinoides	301.b 31
203.a 2		myrtitis præparatio	358.a 32
muris aranei morsuum reme-		mirtula	312.a 15
dia	ib. 10	mirtus	ib. 14
muris auricula	311.a 25	mysclion	59.b 13
musæ pastillus	350.a 31	mistrum magnum	395.a 30
mustela	288.b 34	mistrum paruum	ib. 32
mustelæ cerebrum	291.b 8	mituli	311.b 5
mustelæ uenter	392.a 20	myxa	ib. 28 59.b 12
mustum	113.b 5		
myaces	311.b 5	N	
myagros	ib. 2	Acaphthon	312.a 29
myaron	ib. 10	Naocanthion	ib.
myceres	ib. 20	Napus	25.a 7
mydriasis	91.a 21	Napi	312.a 32
mydriasis causa & curatio		Narce	ib. b 28
ibidem b. 4		Narcissus	ib. 25
myelos	311.b 14	Narcotica medicamenta	
myiata tela	255.b 19	153.b 9	
myocephalon	89.a 17	Nardostachis	312.a 34
myopiasis	93.a 34	Nardus gallica	ib. b 6
myopia	ib. 35	Nardus montana	ib. 10
myosote	311.b 25	Nardi spica	ib. a 35
myracopa quæ sint		Nardinum collirium	
385.b 21		361.b 20	
myrica	311.b 32	Nardus cizicine	380.a 8
myriophyllon	312.a 3	Embole prima	ib.
myrmecia quid	255.a 10	Altera embole	ib. 16
myrmeciarum curatio		Tertia embole	ib. 21
ibidem 14		Narium contusarum curatio	
myrmecion	169.b 22	261.b 3	
myrrha	312.a 7. 322.a 17	Narium fracturæ curatio	
		ibidem	

INDEX

Narium ima pars non frangi tur, sed contunditur	ib. 18	nili malagma	381.a.4
Narium foedus odor quomo- do menderetur	97.a.32	nitrum	308.b.6
Narium vitia quomodo cure- tur	96.b.21	Nitrum chalaistreum	
Narium ulcera quibus curen- tur	97.b.4	ibidem 10	
Narphía	308.b.2	Nitri coctio	376.b.29
Narthex	312.b.14	Notæ ponderum & mensura rum	394.b.25
Nasturcium	299.a.5	Nubeculæ oculorum	
Natricis morsus signa		90.a.23	
201.a.21		Nubeculas oculorum curan- tia	ibidem 25
Natricis morsus remedia		nucis arboris coliculi	
ibidem 24		299.a.36	
natura alium dolores sedant a		nux arida	27.a.19
137.a.29		nux uiri is	ibidem 20
Nauigantium uictus	16.a.17	nuces	299.a.35
Nauseam curantia	59.b.23	nuces auellanae	ib. b.8
Naxiæ cotis detrimentum		nuces iuglandes	ib. 1
308.a.15		nuces Ponticæ	ib. 9
Neapolitæ smegma ad mil- phosin & longos palpebra- rum affectus	88.a.13	nutrix qualis esse debeat	
Nephriticorum accidentia		1.b.12	
121.b.17		nutrici quæ uitanda	ib. 29
Nepita	298.a.27	nutricis lac quale esse debeat	
Nerion	312.b.14	ibidem 36	
344.a.12		nutricis lac uitiatum quomo- do corrigatur	2.a.11
Nerionis emplastrum, ad ictus omnemq; particularum car- nosarum dolorem	370.b.24	nyctalops quid	91.b.29
Neruorum conuulseratorum curatio	191.b.16	nyctalopis curatio	ib. 32
Neuras	312.b.30	nymphæa	313.a.1
Nicolai dactilorum genus		& 296.a.31	
367.a.5		nymphæa radice alba	
Nicolai emplastrum	70.a.31	ibidem 1	
nigella	309.b.32	nymphæa radice nigra	
nili dia rhodon	363.a.5	ibidem 5	
		nymphe quid	247.a.28
		nymphæ excisio	
		ibidem 33	
		nymphodoti pastillus	
		353.a.2	

INDEX

- O** Beliaxa 219.a 18
 obolus 395.a 24
 obscuritas oculorum 92.b 16
 obscuritatis oculorum cura 92.b 17
 tio 92.b 17
 ocimum 330.b 5
 ocimum aquaticum 392.a 3
 ocimoides 330.b 10
 ocularia remedia quo tempo-
 re paranda 359.a 13
 ocularium medicamentorum
 uaria est materies 358.b 18
 oculorum caliginis curatio 8.b 33
 oculi carcinoma 91.b 1
 oculi carbunculus ib. 10
 oculi carbunculum curantia
 ibidem 13
 oculorum cicatrices 90.a 20
 oculorum cicatrices curan-
 tia ib. 8
 oculorum albugines curantia
 ib. a 30
 oculorum nubeculae ib. 25
 oculorum nubeculas curantia
 ibidem 25
 oculorum unguis qui ptery-
 gion dicitur 90.b 14
 oculorum unguis curantia
 ibidem 19
 oculorum confusio quomodo cu-
 retur 93.a 25
 oculorum defluxionis impe-
 tus quo curetur 86.b 1
 oculi dolorum causae 84.b 30
 oculorum expressionis causa
 93.a 8
 Oculorum expressio quomo-
 do curetur ib. 13
 Oculorum hebetudo
 92.b 17
 Oculorum hebetudinis cura
 tio ib. 22
 Oculorum obscuritas ib. 20
 Oculorum obscuritatem cu-
 rantia ib. 22
 Oculi perturbatio 84.a 32
 Oculi perturbationis curatio
 85.a 22
 Oculi precidentia quo cure-
 tur 89.b 18
 Oculi purulenti quo curetur
 ibidem 35
 Oculorum purulentorum cu-
 ratio manu administrata
 223.a 16
 Oculorum suffusio ib. b 2
 Oculorum suffusio unde fiat
 ibidem 5
 Oculorum suffusionis notae
 ibidem 13
 Oculorum suffusorum cura
 tio ib. 34
 Oculorum suffusiones curan-
 tia 92.a 12
 Oculorum ulcera 89.a 13
 Oculi ulcerum curatio
 ibidem 24
 Oculi unguis 89.b 34
 Oculorum unguis quomodo
 manu curetur 222.b 18
 Oculi cute non contacti cura
 tio qualis 220.a 33
 Odora corpora tenuia sunt &
 calida 278.a 25
 Odoratu non potest iudicari
 de simplicium temperamen

INDEX

Narium ima pars non frangi tur, sed contunditur	ib. 18	nili malagma	381.a.4
Narium foedus odor quomo- do mendentur	97.a.32	nitrum	308.b.6
Narium vitia quomodo cure- tur	96.b.21	Nitrum chalaistreum	
Narium ulcera quibus curen- tur	97.b.4	ibidem 10	
Narphía	308.b.2	Nitri coctio	376.b.29
Narthex	312.b.14	Notæ ponderum & mensura- rum	394.b.25
Nasturcium	299.a.5	Nubeculæ oculorum	
Natricis morsus signa		90.a.23	
201.a.21		Nubeculas oculorum curan- tia	ibidem 25
Natricis morsus remedia		nucis arboris coliculi	
ibidem 24		299.a.36	
natura alium dolores sedant a		nux arida	27.a.19
137.a.29		nux uiri is	ibidem 20
Nauigantium uictus	16.a.17	nuces	299.a.35
Nauseam curantia	59.b.23	nuces auellanae	ib. b.8
Naxiæ cotis detrimentum		nuces iuglandes	ib. 1
308.a.15		nuces Ponticæ	ib. 9
Neapolitæ smegma ad mil- phosin & longos palpebra- rum affectus	88.a.13	nutrix qualis esse debeat	
Nephriticorum accidentia		1.b.12	
121.b.17		nutrici quæ uitanda	ib. 29
Nepita	298.a.27	nutricis lac quale esse debeat	
Nerion	312.b.14	ibidem 36	
344.a.12		nutricis lac uitiatum quomo- do corrigatur	2.a.11
Nerionis emplastrum, ad ictus omnemq; particularum car- nosarum dolorem	370.b.24	nyctalops quid	91.b.29
Neruorum conuulnatorum curatio	191.b.16	nyctalopis curatio	ib. 32
Neuras	312.b.30	nymphæa	313.a.1
Nicolai dactilorum genus		& 296.a.31	
367.a.1		nymphæa radice alba	
Nicolai emplastrum	70.a.31	ibidem 1	
nigella	309.b.32	nymphæa radice nigra	
nili dia rhodon	363.a.5	ibidem 5	
		nymphe quid	247.a.28
		nymphæ excisio	
		ibidem 33	
		nymphodoti pastillus	
		353.a.2	

INDEX

- O** Beliaxa 219.a 18 Oculorum expressio quomo-
 obolus 395.a 24 do curetur ib. 13
 obscuritas oculorum Oculorum hebetudo
 92.b 16 92.b 17
 obscuritatis oculorum cura Oculorum hebetudinis cura
 tio ib. 22 tio ib. 22
 ocimum 330.b 5 Oculorum obscuritas ib. 20
 ocimum aquaticum 392.a 3 Oculorum obscuritatem cu-
 ocimoides 330.b 10 rantia ib. 22
 ocularia remedia quo tempo- Oculi perturbatio 84.a 32
 re paranda 359.a 13 Oculi perturbationis curatio
 ocularium medicamentorum 85.a 22
 uaria est materies Oculi precidentia quō cure-
 358.b 18 tur 89.b 18
 oculorum caliginis curatio Oculi purulenti quō curetur
 8.b 33 ibidem 35
 oculi carcinoma 91.b 1 Oculorum purulentorum cu-
 oculi carbunculus ib. 10 ratio manu administrata
 oculi carbunculum curantia 223.a 16
 ibidem 13 Oculorum suffusio ib. b 2
 oculorum cicatrices Oculorum suffusio unde fiat
 90.a 20 ibidem 5
 oculorum cicatrices curan- Oculorum suffusionis notæ
 tia ib. 8 ibidem 13
 oculorum albugines curantia Oculorum suffusorum cura-
 ib. a 30 tio ib. 34
 oculorum nubeculæ ib. 25 Oculorum suffusiones curan-
 oculorum nubeculas curantia tia 92.a 12
 ibidem 25 Oculorum ulcera 89.a 13
 oculorum unguis qui ptery- Oculi ulcerum curatio
 gion dicitur 90.b 14 ibidem 24
 oculorum unguis curantia Oculi unguis 89.b 34
 ibidem 19 Oculorum unguis quomodo
 oculorū cōfusio quomodo cu- manu curetur 222.b 18
 retur 93.a 25 Oculi cute non contacti cura-
 oculorum defluxiōis impe- tio qualis 220.a 33
 tus quō curetur 86.b 1 Odora corpora tenuia sunt &
 oculi dolorū causæ 84.b 30 calida 278.a 25
 oculorū expressionis causa Odoratu non potest iudicari
 93.a 8 de simplicium temperamen

INDEX

10	ib. 20	Oleum ex immaturis oliuis	
Odorem corporis bonum	ibidem. 26		
reddentia	8. a 5	Oleum ex lilio	304. b 26
Oe	313. a 23	Oleum ex nucibus	
ordema unde fiat	178. a 20	299. b 1	
ordematis curatio	ib. 33	Oleum picinum	316. a 6
ornantharia	389. a 8	Oleum raphaninum	
ornanthariorum usus	392. b 1		
ibidem 15		Oleum ricinum	ib. a 36
ornanthe	313. a 33	Oleum sabinum	ib. 34
ornanthini confectio		Oleum sesaminum	ib. b 1
389. a 8		Oleum uetus	ib. 29
oros	313. b 3	Oleum in quo cocta fit cuni-	
osypus	ib. 6	la	303. a 1
osypi medicamenti præpara-		Oleum in quo torpedo mari-	
tio	375. a 16	na decocta sit	312. a 21
Olea	292. a 12	Oleum elotum	292. a 28
Olea Aethiopica	ib. 17	Olei cum cera in medicamen-	
Olea syluatica	ib. 23	tis quis modus esse debeat	
Olex coliculorum succi con-	377. b 23		
fectio	360. b 24	Oleosorum uis	278. a 12
Oleago	329. a 21	Olfactus uitia quō emendens-	
Oleariæ cutis detrimentum		tur	96. b 23
308. a 16		Cligophoron uinum	22. b 22
Oleomel	292. b 4	& 81. b 29	
Olera	24. a 24	Oliuæ colymbades	27. a 15
Olera cruda peiores succos		Oliuæ druppæ	ib. 14
procreant quam cocta		Oliuæ halmades	ib.
25. a 30		Oliuæ purgantes	
Olera syluestria	24. b 24	334. a 22	
Oleum	292. a 25	Cl osteum	313. b 12
Olei coctio	376. b 14	Olympos collyrium	
Olei mira uis	208. a 20	361. a 30	
Oleum crassius melle & dul-		Olympiacum collyrium	
cius	292. b 5	ibidem	
Oleum ex agresti olea		ωμὴ λυσις.	102. b 19
iqidem. a 34		Omenti procidentia quō ma-	
Oleum cedrinum	300. a 13	nu curetur	238. b 28
Oleum ex oliuis druppis		Omotribes	292. a 27
292. a 25		Omphacium	313. b 14

INDEX.

Omphacocarpus	284.a 36	278.b 12	
Omphacomelitis præparatio		Oreoselinum	314.a 26
358.a 28		Oribasii Catagmaticæ	
Onagra	313.b 18	374.b 35	
Oni	ib. 30	Oribasii clidion	350.a 12
Onobrychis	ib. 26	Oribasii emplastrum parygru	
Onochelos anchusa	279.b 21	368.b 1	
Onoclea anchusa	ib. 1	Oribasii medicamentum ad	
Onoma	313.b 22	uiperarum morsus	203.b 35
Ononis	284.a 31	Oribasii Melitera	354.a 16
Onothera	313.b 19	Origanum	314.a 25
Onothiuris	ib.	Oris affectus	99.a 11
Onyches	314.a 2	Oris firmitatem facientia	
Oon, id est, ouum	330.a 25	100.a 14	
Ophiasis unde appellata		Oris uentriculi inflammatio	
61.b 19		nes quomodo curentur	
Opioscorodon	321.a 31	122.b 1	
Ophites lapis	308.a 11	orminon	314.a 36
Ophthalmia unde fiat		orminoti siluestre	ib. b 4
85.a 16		orobanche	314.a 30
Ophthalmiæ curatio		orobæum cicer	393.b 24
ibidem. 21		orobos	314.a 32
Opisthocranion	216.a 35	orthopnoxa unde nascatur	
Opisthotonos	88.a 22	105.a 22	
Opisthotonicis accommoda		orthopnoxa curatio	
potio	84.b 16	ibidem. 26	
Opion	310.b 10	orthopnoxi	ib. 22
Opium	314.a 18	oriza	333.b 6
Opium papaueris liquor		oscheon	242.a 33
221.a 30		osciboides	268.a 8
Opopanax coctio		os scaphoides	ib. 9
377.a 21		ossa	314.b 24
Orchis herba	312.b 14	ossa cremata	ib. 25
Orchis Serapias	ib. 15	ossa humana	ib. 26
Orchis maicr	ib. 12	ossa lepidoides	216.a 35
Orchis minor	ib. 13	ossium elephantis ramenta	
Orci tunica	286.a 26	293.a 4	
Ordeum	25.b 28	ossis sacri fracturæ curatio	
Ordines temperamentis pri-		265.a 5	
marum qualitarum quatuor		ossa	314.b 24

INDEX

to	ib. 20	Oleum ex immaturis oliuis	
Odorem corporis bonum	ibidem. 26		
reddentia	8. a 5	Oleum ex lilio	304. b 26
Oe	313. a 23	Oleum ex nucibus	
ordema unde fiat	178. a 20		299. b 1
ordematis curatio	ib. 33	Oleum picinum	316. a 6
œnantharia	389. a 8	Oleum raphaninum	
œnanthariorum usus			392. b 1
ibidem 15		Oleum ricininum	ib. a 36
œnanthe	313. a 33	Oleum sabinum	ib. 34
œnanthini confectio		Oleum sesaminum	ib. b 1
	389. a 8	Oleum uetus	ib. 29
œnos	313. b 3	Oleum in quo cocta fit cuni-	
œsypus	ib. 6	la	303. a 1
œsypi medicamenti præpara-		Oleum in quo torpedo maris	
tio	375. a 16	na decocta sit	312. a 21
Olea	292. a 12	Oleum elotum	292. a 28
Olea Aethiopica	ib. 17	Olei cum cera in medicamen-	
Olea syluatica	ib. 23	tis quis modus esse debeat	
Olexæ coliculorum succi con-			377. b 23
fectio	360. b 24	Oleosorum uis	278. a 12
Oleago	329. a 21	Olfactus uitia quō emendens-	
Oleariæ cutis detrimentum		tur	96. b 23
	308. a 16	Cligophoron uinum	22. b 22
Oleomel	292. b 4		82. b 29
Olera	24. a 24	Oliuæ colymbades	27. a 15
Olera cruda peiores succos		Oliuæ druppæ	ib. 14
procreant quam cocta		Oliuæ halmades	ib.
	25. a 30	Oliuæ purgantes	
Olera syluestria	24. b 24		334. a 22
Oleum	292. a 25	Cl osteum	313. b 12
Olei coctio	376. b 14	Olympos collyrium	
Olei mira uis	208. a 20		361. a 30
Oleum crassius melle & dul-		Olympiacum collyrium	
cius	292. b 5	ibidem	
Oleum ex agresti olea		ω μ η λ υ σ ι ς .	102. b 19
iquidem. a 34		Omenti procidentia quō ma-	
Oleum cedrinum	300. a 13	nu curetur	238. b 28
Oleum ex oliuis druppis		Omotribes	292. a 27
	292. a 25	Omphacium	313. b 14

INDEX.

Omphacocarpos	284.a 36	278.b 22	
Omphacomelitis præparatio		Oreoselinum	314.a 26
358.a 28		Oribasii Caragmaticæ	
Onagra	313.b 18	374.b 35	
Oni	ib. 30	Oribasii clidion	350.a 12
Onobrychis	ib. 26	Oribasii emplastrum parygru	
Onochelos anchusa	279.b 21	368.b 1	
Onoclaea anchusa	ib. 1	Oribasii medicamentum ad	
Onoma	313.b 22	uiperarum morsus	203.b 35
Ononis	284.a 31	Oribasii Melitera	354.a 16
Onothera	313.b 19	Origanum	314.a 25
Onothuris	ib.	Oris affectus	99.a 11
Onyches	314.a 2	Oris suauitatem facientia	
Oon, id est, ouum	330.a 25	100.a 14	
Ophiafis unde appellata		Oris uentriculi inflammatio	
62.b 19		nes quomodo curentur	
Opioscorodon	321.a 31	122.b 1	
Ophites lapis	308.a 11	orminon	314.a 36
Ophthalmia unde fiat		orminou siluestre	ib. b 4
85.a 16		orobanche	314.a 30
Ophthalmiæ curatio		orobiaum cicer	393.b 24
ibidem. 21		orobos	314.a 32
Opisthocranion	216.a 35	orthopnoxa unde nascatur	
Opisthotonos	88.a 22	105.a 22	
Opisthotonicis accommoda		orthopnoxa curatio	
porio	84.b 16	ibidem 26	
Opion	310.b 10	orthopnoxi	ib. 22
Opium	314.a 18	oriza	333.b 6
Opium papaueris liquor		oscheon	242.a 33
221.a 30		os ciboides	268.a 8
Opopanax coctio		os scaphoides	ib. 9
377.a 21		ossa	314.b 24
Orchis herba	312.b 14	ossa cremata	ib. 25
Orchis Serapias	ib. 15	ossa humana	ib. 26
Orchis maicr	ib. 12	ossa lepidoides	216.a 35
Orchis minor	ib. 13	ossium elephantis ramenta	
Orci tunica	286.a 26	293.a 4	
Ordeum	25.b 28	ossis sacri fracturæ curatio	
Ordines temperamentis pri-	265.a 5		
marum qualitarum quatuor		ossa	314.b 26

INDEX

ostraca	ib. 36	oxymel Iuliani	333.a 36
ostracites lapis	308.a 13	oxymel scillinum	341.a 6
ostracoderma	29.b 12	oxymel scillites	ib. b 27
ostrea	ib 14	oxymel simplex	ib. 23
ostreorum testa	315.a 6	oxymel splenicum, hoc est	
osyris	ib. 20	lieni dicatum	346.b 6
othonna	313.a 28	oxyschoenos	324.a 31
8 ^a	313.a 26	oxos	314.a 11
ouilla caro	28.a 7	ozena quid	97.a 8
ouina pellis	291.a 20	ozenas curantia	ib. 24
oua anserum	27.b 24		
oua gallinarum	ib. 23	P Aederotes	281.a 6
ouum gallinae melius reliquis		Pæonia	290.a 32
330.b 2		Pæonia compositio	
oua phasianorum	27.b 23	348.a 30	
oua struthiocamelorum	ib.	Paguri	29.b 18
oua pincta	27.b 30	Paliuron	315.a 27
oua recentia ueteribus melio-		Palina	328.a 4
ra	27.b 25	Palmulæ	27.a 11
330.b 2		Palmularum phœnice dictû	
oua sorbilia	330.b 1	368.b 16	
oua tremula	ib. 26	Palpebrarum commissarum	
oui candidum & tenue		curatio manu adhibita	
332.a 26		222.a 15	
oui luteum	ib. 30	Palpebrarum ustio ex urente	
ouum tostum	ib. 32	medicamento facta	
ouum acetum incoctum		219.a 35	
ibidem		Palpebrarum ustio a ueteri-	
ouum crudum	ib. 36	bus damnata	220.a 1
8 ^a paxos	256.a 25	Palpebræ inferioris sutura	
8 ^a paxos	121.b 13	220.b 5	
ouon	315.a 11	Palpebræ inferioris ustio per	
oseia	91.a 32	medicamenta	ib. 12
oxera multiplicis usus		Palpebræ superioris sutura	
370.b 31		quomodo administretur	
oxyacanthos	314.a 14	218.b 25	
oxygalactinus caseus		Palpebrarum encanthis	
183.b 16		quomodo auferantur	
oxymel calculosis efficax		222.b 5	
346.a 15		Palpebrarum pili oculum	

INDEX

Irritantes quomodo curen-	Papauer cornutum
tur	88.b 19 310.b 11
Palpebrarum pili oculum	Papaueris cornuti notæ & cre
irritantes quâ ratione euel-	media
lantur	213.a 15
Palpebrarum pili oculum ir-	Papauer Heraclion
ritantes quomodo per ustio	310.b 14
nem curentur	221.b 2 310.a 35
Palpebrarum uerrucæ quo-	Papauer rhoas
modo tollantur	222.b 5 310.b 2
Palpitatio cordis quô curet	Papauer spumeum
	314.a 19
	Papaueris liquoris notæ
Palumbis stercus	303.a 25 111.a 30
Palumbus	27.b 9 Papaueris liquoris remedia
Palumbi uenter	302.a 18 ibidem 35
Paplethes emplastrû	364.b 16 Pappi quid
Panaces	315.a 33 Papporum remedia
Panaces Asclepion	ib.b 2 ibidem.
Panaces Chironium	Papyrus
ibidem 3	315.b 6
Panaces Herculeum	Paralysis
ibidem	79.b 13
Panchrestos Erasistrati	Paraplexia
364.b 16	ib. 28
Pancration	Pararthrema
215.a 24	270.b 21
Panicum	Parastatæ
293.a 33	241.a 17
Panis	Parasynanche
285.b 11	101.b 28
Panis triticeus	paracynanche
25.b 20	ib. 32
Panis filigineus	Pardalianches
ib. 24	281.a 26
Panise similia	Paresis curatio
ib. 315.b 10	80.b 5
Panis syncomistos	Parietaria
ib. 25	293.a 25
Panis cibarius	Paronychia
ib. 26	159.b 11
Panis ordeaceus	Parosidum curatio
ibidem 32	ibidem 30
Pantolmius ad Chironia ma-	Parthenium
lignaque ulcera & deflu-	283.a 26
xiones	Particularum inefficacium
352.b 23	curatio
papauer	136.a 31
310.a 34	Partium attenuatarum cura-
Papauer aphrodes	tio
310.b 14	17.a 17
	Partium extremarum uitii
	curatio
	254.a 1

INDEX.

Partus difficilis unde fiat 149.b 3	Partillus Faustini 351.a 25
Partus difficilis quomodo ad iunetur ib. 27	Partillus quia ano subiicitur hipotheon dictus & intesti- norum tormina & uni dolo- res 353.a 18
Partum ex utero excutiendi ratio 240.a 29	Partillus Leucus 352.a 17
Parulis quid 226.a 12	Partillus Musæ 350.b 31
Parulidas curantia ib.	Partillus Neræ 351.a 5
Pasionis pastillus 351.a 15	Partillus Nymphodoti 353.a 2
Passer 27.b 7. 326.a 23	Partillus passionis 351.a 15
Passum 294.b 29	Partillus Philippi ad intesti- norum tormina 350.b 23
Pastillorum tres species 348.b 35	Partillus Trigonus 349.b 5
Pastillorum qui potantur ua- riæ species ib. 36	Partillus purgans 334.a 34
Pastillorum qui in aluum in- duntur variæ species 349.a 10	Partillus dia coralliu 349.b 25
Pastillos in aluum inferendi modus ib. 18	Partillus a subere, dia phellō dictus 351.b 12
Pastilli qui ab inferioribus partibus iniiciuntur, quibus utiles ib. 22	Partillus dia rhodon 349.b 29
Pastilli qui delinuntur quibus conueniant ib. 25	Partillus a seminibus, dia sper- maton dictus ib. 7
Pastillus Amazonum 350.a 33	Partillus ex amigdalīs ama- ris 350.b 3
Pastillus Andronius 351.a 19	Partillus ex castorio, colicis efficax 351.b 32
Pastillus quem galenus A- phrodisiasticon clidion in- scribit ib. 4	Partillus ex cornu ceruino disentericis & sanguinem excreantibus salutaris 350.a 16
Pastillus aster dictus 349.a 35	Partillus ex charta, dia char- tiu appellatus 351.a 31
Pastillus, Capnistos a fumo di- ctus, ad tussim continuam 105.a 9	Partillus ex duplici ueratro, Eidem uero ex acatia dupli- ci 352.a 31
Pastillus Criogenes 352.b 4	Partillus ex electro 349.b 30
Pastillus erocodes 349.b 13	Partillus ex erica lieni dica- tus 350.a 29
	Pastillus

INDEX

Pastillus ex lapide Phrygio,	curatio	88.a 23
naturalium uitiis accommo-	Pedum rimas curantia	
datus	352.a 10	158.b 6
Pastillus ex oenelæo, sedis &	Pedis ossa fracta quō curen-	
naturalium uitiis utilis ib.5	tur	268.a 5
Pastillus ex spina Aegyptia	Pedis digitorum ossa fracta	
349.a 34	quō curentur	ibidem
Pastillus ex thapsia, hemicra-	Peganera ad pleuriticos	
nico dolori efficax	353.a 9	370.a 20
Pastillus ex uescariis, diaphy	Peganum	316.a 29
salidon uocant	350.b 16	Pelation ad ulcera
Pastilli scillini confectio	Pelation ex scoria argenti,	360.a 7
339.b 1	dia helcysinatos dicitur, ad	
Pastilli theriaci	ib.8	similia abrasis
Pastinaca	322.b 19	367.a 21
Pastinacæ radix	25.a 17	Pelecinos
Pastinaca marina	326.a 6	295.a 35
Pastinacæ marinæ morsus re-	Pellis	291.a 19
media	206.a 21	Pellis hippopotami
Pastinaca syluestris	322.b 24	ib.21
Pastinacæ pisces	29.b 36	Pellis ouina
Patella	267.b 6	ibidem 20
Patellæ fractæ curatio	ib.12	Pellis uiperæ
Pati sordes, palæstrarum		ibidem 23
319.a 34	Peperi	315.b 25
Paula emplastrum strumis &	Peplion	ib.21
bubonibus efficax	372.b 28	Peplon herba
Pauo	27.b 11	ib.18
Pectinis ossa fracta qui noscā	Pepou	26.a 31
tur, curenturq;	204.b 23	Perdix
Pectoris impressionis notæ	Perdicium	27.b 5
203.b 17	Perfrictionis curatio	293.a 26
Pectoria impressionis curatio	11.a 10	Pericranion
ibidem 34	Pericranion	216.a 18
Pectoris ruti notæ	ib.28	Peryclimenon
Pectoris rupturæ curatio	ib.33	315.b 35
ibidem 33	Periphimosi	239.b 5
Pediculos capitis tollentia	Peripneumonia quid	106.b 33
67.a 5	Peripneumoniæ curatio	ib.11
Pedicularum in palpebris	Periscythismus	218.a 30
	Peristereon	316.a 5
	Peritonæos	236.a 31
	Pernicnes	158.a 10
	Pernionum curatio	ib.27

INDEX

Perfra	316.a 8	cans & unluæ uitis singula
Perfica	ib. & 25.b 34	riter accommodus ib. 5
Perficum malum	310.b 28	Pessus Titianus 391.a 17
Perturbatio oculi quid		Pestilentia signa superueniē
85.a 15		tia 52.a 3
Perturbationis oculi curatio		Pestilentia præcautiones
ibidem 25		52.a 12
Perunctio sedis uentrem mo		Pestilentiam arcentia ib. 39
uens chezanance	337.a 26	Petalites 316.a 11
Pes cornicis	303.a 33	Petroselinon ibidem 14
Pessus quid	139.b 35	Peuce ib. 26
Pessi	390.b 5	Peucedanum ib. 18
Pessorum tres differentia		Phaci 327.b 2
ibidem 7		Phœnigmos 86.a 23
Pessorum emollientium usus		Phæon ad oculos sanguine
ibidem 8		suffusos, & magnos affectus
Pessorum emollientium ma		60.a 13
teria	ibidem 11	Phagedænam per manus cu
Pessorum aperientium usus		ratio 235.a 27
ibidem 14		Phalangiorum ictibus conue
Pessorum aperientium mate		niēs medicamentū 201.b 19
ria	ibidem 16	Phalangioꝝ morsus notæ
Pessorum astringentium usus		ibidem 2
ibidem 18		Phalangiorum morsus reme
Pessorum astringentium ma		dia ibidem 13
teria	ibidem 21	phalangites 327.b 17
Pessi crassitudo qualis esse de		Phalagosis 218.b 31.220.b 10
beat	ibidem 22	Phalaris 176.b 20
Pessus Aegyptia	291.a 21	Pharici notæ 219.a 19
Pessus chrysos ab aureo colo		Pharici remedia ib. 21
re dictus emolliens 390.b 35		Phaseolum 26.a 22
Pessus crocodes, ad inflāma		Phasganion 313.a 13
tionē, auersiones, duritias &		Phasianus 27.b 6
inflationes	ib. 28	Phasianorum oua ib. 24
Pessulus emolliens 145.a 5		Phasiolum 297.b 20
Pessus enneapharmacus		Phellos 327.b 21
391.a 13		Phigethli curatio 175.b 15
Pessus Gone ad concipiendū		Philagrianum malagma
ibidem 25		378.b 29
Pessus libanius, menseis euo		Philanthropos 284.a 36

INDEX

philetæron	330.b 11	phthifis curatio	ib. 11
phileterion	317.a 7	phthifis oculi quid	91.b 13
philippi pastillus	350.b 23	phthifis oculi causa	ib. 17
philocoryche, dolorem leni-		phthifis oculi curatio	ib. 22
ens, ad sedē utilis	369.a 3	phthice	178.a 29
philonis antidotum	342.b 1	phu	328.a 16
philoxeni medicamētū puru		phusca ad conterendum cal-	
lensis & lōga defluxione in		culos	346.b 23
festatis idoneū	343.b 26	phycos	328.a 20
philyras	377.b 25	philites	ibidem 23
phimus	147.b 8	phima quid	172.b 21
phimi duplex cā	239.b 2	phimatum curatio	176.b 20
phimi causæ	ib. 4	piceæ cortex	316.b 22
phimi curatio	ib. 10	piceæ erucæ	ib. 17
phimi in muliebris duabus ex		picra, hoc est, amara cōposi-	
causis sunt	247.b 20	tio, Galeni	345.a 27
phimi in mulieribus cura-		picra ex oxymelite ad stoma-	
tio	ibidem. 24	chicos, utæ & aquam inter	
phimi in mulieribus incom-		cutem	ibidem 34
moda	247.b 25	picris	301.b 27
phlegmone quid	170.a 17	picrocoli	45.a 14
phlegmonæ curatio	ib. 36	pili combusti	326.a 4
phlogosis	176.a 1	pilos faciei tollentia	98. b 35
phlomitris	313.b 25	pili qua ratione adustis rena-	
Phlomos	327.b 30	scantur	169.a 10
phlyctena quō curetur	90.a 8	pili palpebræ oculū irritan-	
phlystæna curatio	168.a 10	tes quō curentur	88.b 19
phœnicine emplastræ	368.b 13	pili palpebræ oculū irritan-	
phœnix arbor	328.a 4	tes quō euellantur	221.a 25
phœnix herba	327.b 36	pilos nutrientia	62.b 12
phormion	328.a 12	oilos cōseruantia	ib. 21
phragmites calamus	398.b 4	pilos augentia	ib. 30
phrenes	71.a 1	pilos denigrātia ib. & 64.b 18	
phrenitis quid	70.b 10	pilos exte nuantia	ib. 3
phrenitidos causa	ib. 14	pilos defluētes curātia	ib. a 3
phrenitidos notæ	ib. 22	pilos erispantia	ib. 22
phrenitidos curatio	71.a 13	pilos tincturis inficientia	ib.
phrygius lapis	307.b 32	pilos canos arcentia	ib. b 5
phrynion	317.b 19	pilos canos denigrātia	ib.
phthifis notæ	109.a 4	pilos dealbantia	65.b 1

INDEX

Pilorum glutinans medica-	pityides	316.b 14	
menium	88.b 29	pityocampæ	ib. 18
Pinguedo animalium	28.a 33	pityriasis	65.b 12
Pinguium coctio	376.b 1	pityriaseos curatio	ib 19
Pinon	375.a 27	pitiufa	316.b 27
Pinus	303.b 32	pix	316.a 34
Pini nuclus	26.b 32	pix arida	ib.35
pineæ refina	319.a 5	pix liquida	ib.36
piper	315.b 25	piceis flos	316.b 17
piper	315.b 25	piceis coctio	376.b 22
piper album	ib 28	placitis cadmia	298.a 12
piper aquaticum	326.b 29	plantago	285.a 25
piper longum	315.b 27	platanus	316.b 30
piper nigrum	ib. 19	plethoricus	194.b 17
pira grandia	27.a 8	pleuritis quid	109.b 14
pirum agreffe	286.b 20	pleuritidis notæ	ibidem 16
pirus domestica	284.b 3	pleuritidis curatio	110.a 6
pifces faxatiles oim optimi		plumbago	311.a 14
ibidem 35		plumbaginif coctio	375.b 5
pifces deterrimi	29.b 3	plumbea lamina	311.a 22
pifces cartilaginei	ib.34	plumbum	ibidem 17
pifces cetacei	30.a 7	plumbū cōcrematum	ib. 16
pifces cruftati	29.b 17	plumbi ufti coctio	376.a 5
pifces molles	ibidem 26	plumbi recrementū	322.a 11
pifces testacei	ib. 11	plumbi epotæ notæ & reme-	
pifcium glutem	98.b 35	dia	215.a 19
pifcium ius	295.a 16	pluuialis aqua	326.b 31
pifcium recentium ius	ib. 17	pneumon	317.a 2
piffa	316.a 34	pnicta oua	28.b 19
piffelæen	316.b 6	pnigalion	78.b 10
piftacia	77.a 24	podagra quid	152.a 18
pifum	26.a 16	podagra unde nafcatur	ib.
pituitæ in fuperiore uentricu		podagram qua ratione effu-	
lo redūdantis notæ	11.a 27	gias	157.a 6
pituitæ in fuperiore uentricu		podagræ remedia	348.a 14
lo redūdantis curatio	26.a 16	350.b 24	
pituitam uacuantia	332.b 16	pœcilon acopon	383.a 29
pituitam purgantia quibus		polemonium	417.a 7
conueniant	ibidem 23	polenta	25.b 30.304.b 16
pituitæ eruptiones	167.b 6	polium	317.a 12

INDEX

polleni farinaceus	290.b 17	moda	84.a 16
polycnemum	317.a 35	potiones suspensioſis aptæ	
polycopa	150.a 15	105.b 17	
polygalon	317.a 18	præciſio	258.a 14
poligonaton	306.b 25	præcocia	27.a 1
317.a 18		præputium glandi adhærens	
polygonon	317.a 28	qua ratione curetur	240.a 6
poligonoides	301.b 32	praſion	317.b 22
poliide ſphragis	351.a 9	praſoides	293.b 1
polipus morbus	97.a 5	praſon	317.b 27
225.a 28		preſter unde dictus	204.b 33
polipipiſces	29.b 28	preſteris morſus notæ	ib. 29
polipodion	317.b 2	preſteris morſus remedia	
poma	27.b 27	305.a 4	
pompholigeron emplaſtrū		priapiſcon linamentum	
368.b 33		97.b 32	
pompholix	317.b 5	priapiſmus	136.a 1
pompholigis coctio	376.a 26	priapiſmi curatio	ib. 6
pondera	394.b 13	prinos	317.b 35
ponderum notæ	ib. 25	procli compoſitio podagræ	
ponticæ nuceſ	299.b 9	& coxendicum doloribus ac	
populus alba	307.a 4	commodata	348.b 19
populus nigra	280.a 16	proſciſcentium uictus ratio	
porcelli iuueniſ ſanguis		15.b 22	
28.b 10		propoliſ	318.a 1
poros quid	152.a 35	propoliſ coctio	377.a 6
poros unde naſcatur	157.a 19	propomata	357.b 4
pori quō curentur	ib. 27	proptoliſ oculi quomodo cu	
porphiræ	317.b 9	retur	89.b 17
perrigo capitiſ	65.b 12	proſechii ſtacticum collyriū	
porriginiſ curatio	ib. 17	361.a 15	
porrum	317.b 27	proſphifiſ	242.a 28
porrum ſylueſtre	283.a 12	proteuſ, colliriū	363.a 18
portulaca	283.b 26	protoſtactos	366.b 14
potamogeton	317.b 15	prunum	302.b 4
poterion	312.b 30	pruna Damascena	ib. 5
& 317.b 18		prunus	302.a 32
potionum dulcium & utiliū		prunorum ſilueſtrium baccæ	
differentiæ	357.a 27	ibidem. b. 2	
potio opithotonicis accom-		pruritus uñ noſcatur	165.a 11

INDEX

pruritus curatio	ib. 13	ibidem 20	
pruritus gingivæ curantia		pterygium unguium 254.b.4	
3.a 9 & 33		Pterygium unguium unde fi-	
psaron medicamentū	354.a 9	at	ib. 25
pseudobunium	330.a 3	pterygii unguium curatio	
pseudocinuamomū	301.a 24	ibidem 35	
pseudodictamnū	291.a 32	ptilosis quid	88.b 13
& 330.a 8		ptiloseos curatio	ib. 5
psilotrum	355.b 24	ptisana	304.b 17
psilotron uitia genus	283.a 28	ptisanam coquendi modus	
psimnithion	330.a 10	26.a 22	
psitacium	368.a 20	pudendum masculi cerui	
psora quid	163.b 7	280.a 3	
psora unde nascatur	ib. 8	Pudenda intumescencia quō	
psoræ curatio	ib. 15	curentur	137.a 18
psoram abigentia medicamē	ib. 34	Pudendoꝝ remedia	136.b 12
ta		Pueri educatio	2.b 3
psoricon	330.a 16	Pueris ab anno. 6. aut. 7. quid	
psorophthalmia quid	107.a 2	faciendum	4.b 1
psorophthalmiæ curatio		pulegium	290.a 18
ibidem 16		Pulicaris herba	330.a 12
psychrotrophō	287.b 23	Pullus columbinus	27.b 6
psydracia	65.b 30	Pulmo animalium	28.b 1
psidracioꝝ curatio	ib. 36	317.a 2	
psillium	330.a 12	Pulmo agnus	ib. 3
psyllii notæ	211.a 6	Pulmo suillus	ib. 1
psyllii remedia	ib. 9	Pulmo vulpinus	ib. 4
ptarmice	318.a 5	pulmo marinus	ib. 5
ptelea	ib. 10	pulmonis temperaturæ notæ	
ptelis	296.a 31	25.b 32	
pteris	318.a 18	pulmonis uulnerati notæ	
pterygion	222.b 12	257.a 15	
pterygii curatio	ib. 16	puls ad purgandum	335.a 20
pterygion digitoꝝ	159.a 30	putricula	304.b 23
pterygion unde fiat	ib. 38	Pulsus quid	37.a 26
pterygion curantia	ib. 35	Pulsus usus duplex	ib. 7
pterygia digitoꝝ putrida qui-		Pulsuū cæ & pſagia	41.a 11
bus curentur	160.a 6	Pulsus homini niuo nunquā	
pterygium oculoꝝ	ib. 15	deficit	42.a 12
pterygium oculoꝝ curantia		Pulsus eleuatio	37.a 28

INDEX

pulsus submissio ib. 31 & 38. b 4
 pulsus boni rythmi 38. b 13 pulsus mollis 38. a 13
 pulsus nullius rythmi ib. pulsus myurizontes 39. a 13
 pulsus æqualis ib. 34 pulsus myurus ib. & 28
 pulsus altus 37. b 26 pulsus myurus deficiens ib. 16
 pulsus amplius 41. a 1 pulsus myurus recurrēs ib. 21
 pulsus arcus 27. b 30 pulsus naturalis 38. a 8
 pulsus brevis ib. pulsus neneucotes 39. b 31
 pulsus caprizans 39. a 36 pulsus ordinatus 40. a 4
 pulsus citatus 27. b 13 pulsus pararythmus 37. b 10
 pulsus coincidens 29. a 8 pulsus parvus 37. b 34
 pulsus conuulsorii 49. a 4 pulsus perineneucotes
 pulsus creber 38. b 4 39. b 36 & 24
 pulsus deficiens 39. a 4 pulsus plenus 38. a 17
 pulsus dirotus 39. b 5 pulsus rarus 38. b 4
 pulsus durus 38. a 12 pulsus ferratus 40. a 34
 pulsus ecrhythmus 38. b 22 pulsus tardus 37. b 16
 pulsus eurythmus ib. 26 pulsus turbulenti 40. a 4
 pulsus epineneucotes 39. a 28 pulsus uacuis 38. a 19
 pulsus fluctuans 40. a 2 pulsus uehemens 37. b 35
 pulsus fluctuosus 40. a 12 pulsus uermiculans 40. a 2
 pulsus formicans ib. 16 pumex 301. a 30
 pulsus frequens 38. a 32 pumex crematus ib. 34
 pulsus gracilis 41. b 35 pumex lotus ib. 35
 pulsus hecticus 41. a 21 pumicis coctio 376. a 34
 pulsus heterorythmus 38. a 23 punica mala 27. a 9. 319. a 15
 pulsus humilis 37. b 30 purgationū effectus 330. b 32
 pulsus inæqualis 38. b 35 purgationes quibus utiles
 pulsus inclinans 39. a 31 331. a 1
 pulsus inordinatus 40. a 7 purgationis tempus ib. 8
 pulsus inordinati differentiae purgatio ieiuno debet dari
 40. b 18 335. b 7
 pulsus languidus 37. b 30 purgatio quid requirat ib. 5
 pulsus latus ib. 27 purgatiōe non euacuāte quid
 pulsus longus ib. 28 faciendū ib. 21
 pulsus magnus ib. 34 purgatione supra modū eua
 pulsus mediocris 38. a 1 cuante quid fieri debeat
 & 16 336. a 5
 pulsus meiurus 39. a 12 purgatio ex mala cotoneis
 pulsus moderatus 38. a 9. 13 334. a 5

c iiii

INDEX

- purulentis adustio quō adhi- Ramex aquosus 242.a 35
 benda 234.b 17 Ramicis aquosi notæ ib. b 14
 Purulentus excreatio unde Ramicis aquosi curatio ib. 29
 fiat 108.b 16 8c. 134 a 23
 Purulentæ excreationis notæ Ramicis aquosi adustio
 ibidem 25 243.b 14
 Purulentæ excreationis cura Ramicem aquosum curantia
 tio 110.a 6 134.a 23
 Pustularum curatio 168.a 10 Ramex carnosus 243.b 18
 Pustulæ puero obortæ quō cu Ramicis carnosæ curatio ib. 34
 rentur 2.b 16 Ramex inguinis 133.b 16
 Picnocomon 318.a 21 Ramicis inguinum curatio
 Pyrethrum ib. 25 246.a 9
 Pyrgitæ 27.a 8 Ramicis inguinum curatio
 Pyrine emplastrum 367.a 3 per unctionem ib. 16
 Pyrites 307.b 28 Ramex intestinorū 133.b 17
 pyritis 312.a 1 Ramicis intestinorum causæ
 Pyros 318.a 31 ibidem. 28
 Pytia ib. 36 Ramicis intestinorum notæ
 pyulcon 137.b 7 ibidem 34
 pyxis acopon 384.a 15 Ramicis intestini curatio
 245.a 24
Q Vercus 291.b 23 Ramex omenti ib. 16
 Quinquefolium Ramex omenti intestiniq;
 315.b 14 ibidem. 19
 Ramex tophaceus 244.a 12
 Acolis 246.b 10 Ramicis tophacei curatio
R Racosis curatio ib. ibidem 15
 Radices cibi rationem Ramex uaricosus ib. 23
 habentes 25.a 5 Ramicis uaricosi curatio
 Radicum coctio 377.b 19 ibidem. 27
 Radicula 25.a 23. 318.b 23 Ramex uentosus ib. 11
 Radii fracti curatio 266.b 21 Ramicis uentosi curatio
 Raix 30.a 2 244.b 22
 Ramenta dentium elephanti Rana 287.b 28
 293.a 4 Rana cremata ib. 10
 Ramenta ex ungue elephan- Ranæ palustris notæ 110.a 13
 ti ibidem. 3 Ranæ palustris remedia ib. 18
 Ramicum curatio 133.a 16 Ranæ rubetæ notæ ib. 15
 Ramicum genera ib. 1 Ranæ rubetæ remedia ib. 18

INDEX

Ranunculus herba	287.b 1	Repletionis mala	9.a 15
Ranunculi quatuor genera		Repletionis ciborum curatio	
ibidem.3		ibidem.7	
Rapa	25.a 6.390.b 10	Resinæ	318.b 36
Raphaninum	387.a 12	Resina ex abiete	319.a 7
Ratiocinationis iactura		Resina e picea	ib.
74.a 12		Resina pinea	ib.5
Ratiocinationis iactura quō		Resina e teda	319.a 4
reparetur	ib.b 2	Resina terebinthina	ib.1
Raucitas	102.b 29	Resinæ coctio	376.b 18
Raucitatis curatio	103.a 22	Resolutionis curatio	8.b 5
Recrementum	322.a 6	Resolutionis quæ cum laxita	
Recrementum plumbi	ib.11	te aut distensione est, curatio	
Reduuiæ quid	159.b 11	81.a 23	
Reduuiæ curatio	ib.10	Resolutionis quæ unamquāq;	
Refractio	258.a 8	particulam obsedit, curatio	
Regius morbus	131.a 23	ibidem.b 6	
Regii morbi maltæ differen		Resolutionis ob colicum doe	
tia	ib.27	lorem contractæ curatio	
Regii morbi causæ & notæ	82.a 29		
ibidem.18		Rha	318.b 28
Regii morbi curatio	132.a 22	Rhacos	318.b 11
Reñes animalium	28.a 25	Rhacodes sinus quomodo cu	
Renum morbi	121.b 3	rentur	188.b 19
Renum abscessus notæ		Rhagadum curatio	253.a 6
123.a 14		Rhagadas curantia	136.a 27
Renum abscessus curatio		Rhagadas digitorum & pe	
ibidem.21		dum curantia	257.a 29
Renum calculi notæ		Rhagoides tunícula oculi	
121.b 9.22		89.b 10	
Renū duritiæ notæ	124.b 18	Rhamnus	318.b 19
Renum duritiem curantia		Rhaphanus	ib.23
ibidem 24		Rheon	318.b 29
Renum inflammationis no		Rhetinæ	ib.36
tæ	122.b 14	Rhigos	49.a 14
Renum inflammationis cura		Rhinarium	361.b 20
tio	ib.25	Rhoda	319.a 8
Reñes sanguinis profluui		Rhodia ad supprimendum	
la borantes quō curentur		sanguinem, ulcera depascen	
124.a 27		tia, & excrementas	354.a 32

INDEX

Rhodia radix	319.a 12	ruta	316.a 29
Rhododaphne	312.b 34	ruta fatiua	ib. 31
Rhodomelitis confectio		ruta syluestris	312.a 22
358.a 20		rutæ syluestris remedia	
Rhodostacti confectio	ib. b 9		
Rhoea	319.a 15	rhythmus quid	38.b 6
Rhoe	ib.		
Rhoeas papauer	310.b 1	Sacer ignis	174.a 2
Rhoetis cōpositio	318.b 13	Sacri ignis curatio	ib. 15
Rhogme	258.a 27	Sacri ossis fracti curatio	
Rhu	328.a 1		
Rhus	319.a 25	Sachur mel	310.a 9
Rhus coriaria	ib. 26	Sagapenum	319.b 24
Rhyas quid	88.b 36	Sagapeni coctio	377.a 29
Rhyadis curatio	89.a 4	Sal	281.b 11
Rhypcs	319.a 29	Sal crematus	ib. 16
Rhythmus quid	38.b 6	Salis coctio	376.a 29
Ricinum	301.a 13	Sales theriaci	340.b 12
Ricininum	387.a 15	Salis flos	282.a 20
Rigores febriles	48.b 5	Salis spuma	ib. 24
Rigoris febrilis curatio	56.a 19	Salamandra	319.b 6
Rimarum ani curatio	253.a 8	Salamandræ notæ	209.b 12
Rimas naturalium curantia		Salamandræ curatio	ib. 15
136.b 27		Saliua hominis ieiuni	320.b 1
Rimas sedis curantia	ib.	salix	297.b 27
Rosæ	319.a 8	Salsamentum thynni	344.b 4
rosacei confectio	286.a 23	Salsorum uis	278.b 9
rosatum suffimen	389.b 22	Saluia	292.b 26
rostra animalium	28.a 20	Sambucus	281.b 5
rubia pasiuua	294.a 16	samia rubrica	289.b 6
rubetæ ranæ signa	210.a 15	samosuchum	319.b 10
rubetæ ranæ remedia	ib. 21	Sandaracha	ib. 13
rubrica synopsis	289.b 4	Sandarachæ coctio	376.a 1
rubus	287.a 27	Sandarachæ signa	214.b 32
rubus caninus	305.b 2	Sandarachæ remedia	ib. 34
rufi hiera	316.b 27	Sandyx	319.b 16
rumex	306.a 24	Sanguinaria	317.a 28
rumex acuta	ib. 25	Sanguis quilibet	28.b 6
rumex grandis	297.a 15		
ruptionis curatio	256.b 26	Sanguis bubulus	28.b 9

IN D E X

Sanguis caprillus	280.b 10	sio quō administrāda	ib. 19
Sanguis syluestrium caprae		Sanguis quo tempore mitten-	
ibidem.b 17		dus	ib. 30
Sanguis chamæleontis	ib. 8	Sanguis qua ætate dimitten-	
Sanguis columbae	ib. a 3	dos	232.a 2
Sanguis terrestris crocodili		Sanguis redundans detrahen-	
ibidem 18		dus est	ib. 28
Sanguis equorum admissario		Sanguinis copia duobus mo-	
rum	ib. 19	dis capitur	231.b 8
Sanguis gallinarum cohorta-		Sanguinis copiosi notæ	ib. 16
lium	ib. 12	Sanguinis subter cutem coeū-	
Sanguis hœdinus	ib. 14	tis curatio	179.b 1
Sanguis hircorum	ib. 17	Sanguinis e naribus proflu-	
Sanguis leporinus	28.b 8	uium in febribus quō cure-	
Sanguis noctuæ	280.b 4	tur	297.b 25
Sanguis palumbi	ib. a 36	Sanguinis x ore profluuiū	
Sanguis purcelli iuuenis		sedantia	101.b 14
28.b 10		Sanguinis renum profluuiū	
Sanguis ranarum	280.b 8	curatio	124.a 28
Sanguis ricinorum	ib.	Sanguinis profusionis ex ue-	
Sanguis suillus	ib. 134	na arteriaue & naribus, cura-	
Sanguis taurorum	ib. b 17	tio	190.a 23
Sanguinis taurini signa		Sanguinis destillatio in febrē	
213.b 34		bus quō curanda	61.a 20
Sanguinis taurini remedia		Sanguinem uementium cu-	
214.a 5		ratio	108.27
Sanguis turturis	280.a 36	Sanguinis fluorem in mulie-	
Sanguis uespertilionum		ribus sistentia	140.b 8
ibidem.b 5		Sapa	294.b 18
Sanguis urforum	ib. 16	Sapo	319.b 23
Sanguis testudinis marinæ		Sape Constantini	
quō paretur	206.b 4	351.b 17	
Sanguinis per cucurbitulas		Sapphyrus	308.a 10
detractio	233.a 34	Saprotes	319.b 19
Sanguinis per uenas detractio		Sar cocolla	ib. 25
feri debet præcipue p mor-		Sarcoma	97.a 7
bi initia	231.b 19	Sarcomata quibus curentur	
Sanguinis per uenā dimissio		ibidem 10	
ibidem. 1		Sardoe herba	
Sanguinis per uenas dimis-		280.b 4	

INDEX

Sardonix herbæ signa	126.b 16
213.a 1	Scirrhus exactus 180.a 4
Sardonix herbæ remedia	Scirrhus non exactus ib. 5
ibidem 6	Scirrhî curatio ib. 19
Sardonius risus	ib. 5 Schistos lapis 307.b 17
Satyriacum antidotum	Schoenu anthos ib. 22
347.b 36	Scleroma uteri 144.b 21
Satyriasis quid	135.b 8 Sclerophthalmia 87.a 19
Satyriaseos curatio	ib. 16 Sclerophthalmiæ curatio
Satyrium	319.b 31 ibidem 20
Saura	320.a 5 Scoliosis 273.b 18
Saxifraga	319.b 29 Scolopendra marina
Saxifrages	ib. 321.b 12
Scabies quid	163.b 5.12 Scolopendræ siue terrestris
Scabies unde nascatur	ib. 9 siue marinæ morsus notæ
Scabiei curatio	ib. 15 202.b 11
Scabiem sanantia medicamēta	Scolopēdræ terrestris aut ma-
Scammonia	ib. 34 rinæ morsus remedia ib. 21
321.a 27	Scolopendrium 321.b 15
Scammonia inter omnia pur-	Scolopomachærium 224.b 15
gantia stomacho est aduer-	Scolymon 321.b 17
sissima	331.b 8 Scordion 321.b 22
Scandix	321.a 35 Scoria 322.a 6
Scapularum compressio qui	Scorodon 321.b 29
noscatur	263.b 14 Scorodoprason ib. 33
Scapularum compressio quō	Scorpius terrestris 322.a 3
curetur	ib. 17 Scorpionum ictus signa
Scapulæ fractæ quō noscant,	202.a 3
& curentur	ib. 19 Scorpionum ictus remedia
Scapularum rupturam qui di-	ibidem 11
gnoscas	ib. 11 Scorpionum periculorum
Scapularum ruptura quō cu-	ictibus congruum medica-
retur	ib. 17 mentum 212.b 2
Scilla siue scylla	321.b 9 Scorpium marinus 322.a 4
Scillini pastilli confectio	Scorpionis marini ictus auxi-
339.b 1	lia 206.b 1
Scillinum oxymel	342.a 6 Scorpuiros 295.b 3
Scillites acetum	341.b 27 Scrotum 242.a 33
Scincos	321.b 3 Scroti inflammationis notæ
Schinos	324.a 17 134.b 7

INDEX

Scroti inflammationis curatio	Sesamoides	310.a.29
ibidem 16	Sesamum	ibidem 31
Scroti pruritus curantia	Sesaminum	387.a.8
135.a.18	Seseli	290.b.14.310.a.20
Scrupium	Sextarius	395.a.28
Scitales morsus notæ & reme	Sextarius aridi mensura	
dia	204.a.34. 395.b.27	
Secundæ	Sextarius Italicus	ibid.21
Secundas educendi modus	Sialon	310.b.1
ibidem 26	Siccitatis curatio	22.a.23
Sedis erysipelata quō curen	Siccum in primo ordine	
tur	137.a.15. 378.b.26	
Selache	Siccum in secundo gradu	
Selinon	320.a.6. ibidem.30	
Semivis profluuium	Siccum in tertio gradu	
Seminis profluuii causa	ibidem 34	
ibidem 25	Siccum in quarto gradu nī	
Seminis profluuii curatio	hil est quod non urat	ib.34
ibidem 27	Sicyonium simplex	388.a.3
Semen genitale redundans	Sicyonium compositum	
quō minuatur	10.b.24. ibidem 7.& 19	
Seminaria uasa	Sicyos	310.b.17
Semimedimus	Sicioos agrios	ib.23
Semiseptarius	Sideratio	172.b.24
Senecio herba	Siderationis curatio	ib.26
Senectus anguis	Sideritis	310.b.7
Senum uictus ratio	Sideritis Achillea	ib.8
Sepiæ	Sideritis Heraclia	ib.
Sepiæ testa	Sideros	ibidem 10
Seps	Sidion	319.a.23
Septi transuersi uulnerati no	Siliqua pondus	395.a.24
ta	Siliquæ	27.a.27
Serapias	Silphe	321.a.1
Serapionis Melæne	Silphium	321.a.5
Seriphium	Silutus	320.b.33
Seris	Silibon	ib.29
Seris syluestris	Sinapi	24.b.17.312.a.32
Serpillum	Sinapisimus quō fiat	384.b.31
Sertula campana	Sinapisimus quibus utilis sit	
Serum lactis	388.b.24. 382.a.30	

INDEX

Sinapifmus quibus uitandus	Smilacis remedia	ib. 18
fit	283.a 17	Smilion, ad abscessos
Sinciput qua ratione inciden-	368.b 11	
dum	218.a 29	Smiris lapis
Singultus unde oriatur	Smirna	308.a 7
60.a 18	Smirnum	312.a 16
Singultus curatio	ib. 24	Solanum hortense
Sinon	321.a 10	Solanum halicacabon
Sinus quid	87.b 34	Solanum hipnoticum
Sinum curatio	188.a 1	Solani furiosi remedia
Sinum differentia	250.a 36	Solare cipi
Sinus rhacodes quo curentur	Solema	389.a 35
138.b 18	Solstitiū æstiuū	268.a 21
Sion	24.b 11	Solstitiū hiemale
Siræon	323.b 17	Soltitio hiemali quid faciunt
Sirialis	3.b 19	dum
Sirialis notæ	ib. 23	Somnus quid
Sirialis curatio	ib. 24	Somni comoda
Siricum	319.b 16	Somni tempus optimum
Sifarum	321.a 17	ibidem 35
Sifer	ib.	Somnus per diem nō bonus
Silymbrium	321.a 22	ibidem 36
Sitis unde fiat	59.b 12	Somnus nocturnus optimus
Sitim in febribus placantia	31.a 7	
ibidem 28	Somni terminus quis	ib. 11
Smaridis caput	300.b 14	Sonchos
Smectica medicamenta		126.b 28, 322.a 29
358.b 34	Sopores quomodo curentur	
Smegmata	353.a 27, 30	31.b 8
Smegma aridum quod Ascle-		Soporis noxii curatio
pios dicitur	355.a 10	55.a 28
Smegma peponatum	ib. 27	Sorba
Smegma quod capitis deflu-		26.a 10
xiones exiccet	ib. b 9	Sorbus
Smegma ad cicatrices nigras		313.a 25
187.b 30		Sordeculæ aurium
Smegmata ealliblephara		319.a 35
188.a 26		Sordes balneoꝝ
Smilax	322.a 16	290.a 22
Smilacis notæ	212.b 16	Sordes palæstræ
		319.a 34
		Sordes ex statuis æreis detra-
		etæ
		319.a 30
		Sordes ex uasis in quibus mul-
		tum olei inhærescit, detra-
		etæ
		ib.
		Sori
		311.a 8, 324.a 36

INDEX

Sori coctio	375.b 15	spongia	322.b 11
Sotera, antidotum	343.b 9	spongiacremata	ib. 14
Sparganium	322.a 33	spongos	ibidem 11
Spartos	ib. 35	spuma argenti	307.b 5
Spasmus cinicus	81.b 14	spumæ argenti notæ	
Spathe	379.b 22	215.a 7	
Specularium	322.b 5	spumæ argenti remedia	
Specularis lapis	ib.	ibidem 14	
sphacelos	172.b 12	sputi præfagia	44.b 26
sphæron, ad ardores		sputum cruentum unde fiat	
	372.a 30	106.b 4	
sphagitides uenæ	233.a 14	sputi cruëti curatio	ib.
spheclarium	322.b 8	squama	306.b 15
sphecle	326.a 16	squamæ coctio	385.b 17
sphincter	252.a 1	squama erit	306.b 17
sphlanchnon	288.b 14	spuama ferri	ib. 10
sphongion malagma		squama helitis	ib. 19
	381.a 31	squama stomomatis	
sphragis poliide	351.a 9	ibidem 21	
spica nardi	312.a 34	squatinæ	302.a 2
spica uardi Indica	ib. b 4	squillæ	ib. 18
spica syriaca	ib.	stacticum profechii colliriū	
spicula educentia medicamē	361.a 15		
ta	190.a 14	staltica colliria quid	86.b 31
spina alba	281.a 11	staphis	286.a 14
spina Aegyptia	ib. 16	staphileparton	101.b 26
spina Arabica	ib.	staphilinon	291.a 4
spinæ qua ratione gutturi exi		staphilinus	322.b 19
mantur	227.b 34	staphiloma	89.b 15
spinas educentia medicamen		staphilomatis curatio	
ta	190.a 1	223.a 4	
spinæ dorsi confractæ cura		steata	322.b 30
tio	204.b 36	steatomatis proprietates	
spirandi difficultas	105.a 17	230.a 19	
spodiaton collirium		steatomatis curatio	ib.
	360.b 14	stegnosis	6.b 4
spodium	322.b 17	stellio transmarinus	285.b 24
spondili	29.b 16	stellionis transmarini mors	
spondilion, siue sphondilion		sus remedium	202.b 30
	314.a 31	stephane	223.a 3

INDEX

Stercus crocodili fluuiatilis	Stragulorum curatio
ibidem.2	102.b 8
Stercus crocodili terrestris	Stratiotes aquaticus 323.a 25
ibidem a 36	Stratiotes terrestris ib.
Stercus ferri 322.a 7	Strobilus 26.b 32.345.b 34
Stercus infantium 303.a 1	Strumarum curatio 18.b 15
Stercus luporum ib. 14	Strumarum curatio quæ ma-
Stercus murium ib. 31	nu adhibetur 229.b 20
Stercus palumbis ib. 24	Strumæ incurabiles ib. 15
Stercus sturnorum ib. 34	Struthia mala 310.b 24
Sterilitatem emendantia	Struthiocamelus 27.b 11
147.b 19	Struthiocamelorum oua
Sternutamentum citantia	ibidem: 24
97.a 13	Stultitia unde fiat 74.a 17
Sternutamentum sedantia	Stripteria 323.b 4
ibidem 19	Styrax ibidem 9
Sternutamenta in febribus	Suber 327.b 21
quomodo curentur 57.b 21	Submissio pulsus 37.a 31
Stigmata quomodo curentur	Sudor in febribus quid adhi-
167.a 12	bendum 56.b 16
Stillicidium urinæ curantia	Suff. minumus 389.b 11
125.a 18	Suffimen crinaton ib. 20
Stimmi 323.a 12	Suffimen lilinum ibidem
Stœbe ibidem 13	Suffimen rosatum ibidem 22
Stœchas ibidem 21	Suffusio oculorum 223.b 3
Stomacho iniicienda malag-	Suffusiones oculorum quo cu-
mata 378.a 18	rentur 92.a 20
Stomachi affectus & curatio	Sugiliata quomodo curentur
112.a 30	98.b 11
Stomacho in febribus quæ cu	Suillus adeps 322.b 33
ra adhibenda 56.a 1	Suilla caro 28.a 1
Stomachum adurendi mo-	Suillum iecur ib. 25
dus 235.b 32	Suillus talus 314.b 26
Stomachici 113.a 34	Sulfur 246.a 16
Stomatica medicamenta	Sulfuris coctio 376.a 29
356.a 4	Superciliorum defluuium cu-
Stomaticorum medicamen-	rantia 88.b 19
torum ulus uarius ib. 6	Sura 257.b 30
Strabismus 93.a 1	Suræ fractæ curatio ib. 36
Strabismi curatio ib. 3	Susinum 386.b 7
	Susinum

INDEX

- Sufinum compositum ib. 14
 Suspirium unde oriatur 214. a 3
 105. a 22
 Suspirii curatio ib. 26
 Suspiriosi qui ib. 29
 Syca 323. b. 13
 Sycamina 26. b. 18
 Syce 323. b. 22
 Sycomora 27. a. 23
 Sycomorus 323. b. 29
 Sycolis 87. b. 37
 Symphiton magnū 324. a. 7
 Symphiton petraū 322. b. 35
 Synanche 101. b. 18
 Syncopes notæ 110. b. 27
 Syncopes emendatio 111. a. 2
 Syncope in febre ex crudo hu-
 more redundante orta pref-
 sis, quid adhibendū 53. a. 32
 Syncope ob prætenues humo-
 res oppressorū curatio ib. b. 8
 Syncopes aliæ cæ 53. b. 23
 Synopsis rubrica 289. b. 24
 Syriaca 27. a. 26
 Syriacus liquor 314. a. 19
 Syringotomon 327. b. 24
 Syrmaismus 31. a. 15
 Systole 37. a. 32
 Tabis notæ 109. a. 5
 Tabis curatio ib. 27
 Tabis corpus confu-
 mentis curatio 4. b. 15
 Talus suillus 314. b. 26
 Talus bubulus uſtus ib. 30
 Tali articulus luxatus quō cu-
 retur 277. a. 13
 Tamarix 311. b. 31
 Tarichon 324. b. 4
 tauri sanguinis uotæ 213. b. 34
 tauri sanguinis remedia
 214. a. 3
 taurorum testiculi 28. a. 28
 taurocolla 324. b. 13
 taxus 322. b. 14
 tecolithos 307. b. 29
 tedæ 290. b. 27. 316. a. 27
 tela aranei 284. b. 21
 telorū differentia 255. b. 1
 tela dupliciter extrahuntur
 255. b. 32
 telorum extrahendorum mo-
 dus 256. b. 4
 telephia ulcera 187. a. 5. 8
 telephion 325. a. 15
 telis ib. 20
 tellinæ 324. b. 21
 temperamenti optimi notæ
 17. a. 31
 temperamenta quæ per gu-
 ſtus qualitates deprehen-
 duntur 258. b. 15
 temperamentoꝝ ordines &
 interualla ib. 31
 tempus purificationi idoneum
 331. a. 18
 tenesmus 116. b. 30
 tenesmi curatio 118. a. 6
 tensio 83. a. 24
 tephra 325. a. 7
 terebinthus 324. b. 25
 terebinthina resina 318. b. 36
 terebinthus uſtum 176. a. 13
 terebinthorum curatio ib.
 terminthos 324. b. 25
 terra 279. a. 25
 terra ampelitis ib. b. 14
 terra Armenia ib. 20
 terra Chia ib. 9
 terra Cimolia ib. 11

INDEX

Terrestris crocodilus	321.b3	Thalasseros collyrium	396.a 10
Tertiana exacta	46.b 25	Thalietrum	ib. 13
Tertiana extensa	ib. 30	Thapsia	377.b 3
Tertiana notha	47.a 26	Thapsiae coctio	215.a 30
Tertiana spuria	ib. 23	Thapsiae remedia	296.a 16
Testa ostreorū	315.a 6	Theion	ib. 20
Testa sepiarū	320.a 24	Theoplypteris	ibidem 27
Testae fornacum	315.a 1	Theodoretus dia anacardion	361.b 15
Testiculorū natura	242.a 14	Theodoretus sine anacardiis	339.b 7
Testiculorū temperaturae nota	345.b 16	Theodotion minus	Theriace praeparatio
ta	29.a 1	Theriace quibus utilis	ibidem 10
Testiculi inflammationis nota	ibidem 27	Theriace aduersus uirulenta	Theriace aduersus uirulenta
ta	134.b 8	& lethalia uenena, uiperarū	& lethalia uenena, uiperarū
Testiculi inflammationis cura	ib. 16	morsus & scorpionis ictus	morsus & scorpionis ictus
ratio	ib. 16	199.a 22	199.a 22
Testiculos incensos curantia	135.a 13	Theriaci pastilli	334.b 7
Testiculorū carnē excrescentem curantia	ib. 16	Theriaci sales	340.b 12
Testiculi animalium	28.a 28	Thermos	296.a 23
Testiculi arietum	ib. 28	Thlasis	258.a 30
Testiculi gallinaceorū sagina	ib. 26	Thlasis duplex est	ib. b 17
torū	ib. 28	Thlaspi	296.a 35
Testiculi hircorū	ib. 28	Thlasis aurium curatio	96.a 10
Testiculi tauroorū	ib. 28	Thoracis morbos quae signa	32.a 19
Testudinis marinæ fel	329.b 13	præcedant	32.a 19
Testudinis marinæ sanguis	206.b 4	Thoracis morborum signa	ib. 25
quo paretur	83.a 15	ubi apparuerit quid faciendum	ib. 25
Tetanus quid	ibidem 16	Thoracis morborum signis	contemptis qui morbi oriuntur
Tetanus unde nascatur	ib. 35	tur	ib. 32
ibidem	ib. b 13	Thoracia uulnerati notae	349.b 5
Tetanoorū notae	361.b 16	Thridax	296.b 4
Tetanoorū curatio	324.b 31		
Tetrapharmacum basilicum	325.a 4. 329.a 14		
Tettiges	324.b 36		
Teucrion	99.a 5		
Teutlon			
Thaidis ceratum			

INDEX

Thymi muliebrum locorum	tragosidotes	ib. 29	
quo curentur	247. b 12	tragus frumentaceus	ib. 31
Thymion	212. b 15	transuersi septi uulnerati in	
Thymos pudendorum curan	dicia	257. a 20	
tia	138. a 4	tremoris causæ	84. a 25
Thynni prægrandes	30. a 11	tremorum curatio	ib. 30
Thynni falsi caro	324. b 6	tria in morbis obseruanda	
Tibiæ fractæ curatio	267. b 27	33. b 22	
Tilia	327. b 25	triæna	235. b 30
Tinctorium granū	302. a 17	triblium	395. a 29
Tiphodes febres	49. a 1	tribolos	25. b 13
Titanus	325. b 4	tribulus	ib.
Tithymalus	ib. a 25	tribulus aquaticus	ib. 25
Titianus, pessus emolliens		tribulus terrestris	ib. 24
391. a 17		triches	326. a 3
Tomentum	290. b 7	trichiasis curatio	88. b 10
Tonfillæ	226. b 22	trichismus	257. b 9
Tonfillarum curatio		tricocca	310. a 26
ibidem 28		trifolium	319. b 31
Tonfillarum inflammationē		trigle	325. b 33
curantia	100. b 23	trigonus pastillus	349. b 5
Tonfillarum quomodo curē		triorchis	314. b 15
tur	ib. 35	triphillon	309. a 4. 219. b 32
Tophus	152. a 35	tripolium	326. a 1
Tophi unde nascantur		tritium	24. a 19. 318. a 31
157. a 17		trixago	321. b 22
Tophos curantia	ib. 29	trixago palustris	321. b 22
tormina	117. a 31	tryalis	327. b 31
torminum curatio	ib. b 14	trogodytes	326. a 23
torpedo marina	312. b 17	trigon	ib. 6
torpedines	29. b 35	tryx	ib. 10
Toxicum unde dictum		tuber	25. a 3
213. a 29		tuber terræ	326. b 11
toxici notæ	ib. 31	tuberculum ani curatio	
toxici remedia	ib. 35	233. a 6	
trachoma quid	87. b 31	tumorum ceruicis curatio	
trachomatis curatio	ib. 34	231. a 3	
tragacantha	325. b 10	turdus	27. b 6
tragium	ib. 12	turtur	ib. 9
tragoriganum	ib. 20	tussis unde fiat	102. b 14

INDEX

- V**ari quid 98.b.17
 varos faciei tollentia ibidem 35
 Varix 253.a.27
 Varicum excisio quō fiat 253.b.1
 Vasa seminaria 242.a.21
 Venæ sphagitides 233.a.13
 Venæ sectio 232.b.7
 Veneris comoda 9.b.27
 Veneri quæ natura idonea sit 10.a.9
 Venerem incitantia ib.3
 Veneri tempus idoneum ibidem 29
 Venerem exercere nequeunt
 res quomodo iuventur ibidem.b.1
 Venere immodica læsi quō
 curentur ib.13
 Venena 207.a.7
 Venenorum præcautiones
 ibidem 22
 Venenorum præcautiones diffi-
 ciles sunt ib.25
 Venenorum simplicium enu-
 meratio 28.b.22
 Venenorum quomodocunq;
 assumptorum remedia cōia
 207.a.32
 Ventris morbos signa præce-
 dentia 32.a.39
 Ventris morborum signa ubi
 apparuerint quid faciendū
 ibidem 3
 Ventris morborum signis contē-
 ptis, qui morbi accidunt
 ibidem 8
 Ventriculi temperaturæ nota
 19.a.25
 Ventriculi ficcioris notæ ib.
 Ventriculi humidioris notæ
 ibidem 31
 Ventriculi calidioris notæ
 ibidem 33
 Ventriculi frigidioris notæ
 19.b.1
 Ventriculi flatus unde fiunt
 114.b.30
 Ventriculi flatus quō curen-
 tur ib.33
 Vētris iulnera quō manu cū-
 rentur 238.b.24
 Ventriculus animalium
 28.b.3
 Venter 302.a.14
 Venter mergi ib.15
 Ventris gallinæ membrana
 interior ib.16
 Venter mustelæ ib.20
 Venter palumbi ib.18
 Veratrum 293.a.13
 Veratri albi remedia 215.a.29
 Veratrum nigrum 293.a.16
 Veratri exhibendi modus
 335.a.19.29
 Veratrum quibus dandū ib.13
 Verbenaca 316.a.5
 Vere quæ uictus ratio conue-
 niat 15.a.8
 Vergiliæ exortus 33.a.14
 Vergiliæ occasus ib.31
 Vermes terreni 289.b.35
 Vermes auriū curantia
 294.a.28
 Vermes in ulceribus quō ar-
 ceantur 183.b.10
 Verruca quid 169.b.19
 Verruca & curatio 169.b.25

INDEX

Vini vires	30.a.15	Viride unguentum si quomodo	
Vinum	313.b.4	fiat	385.b.32
Vinum album	30.a.24	virulentorum prae cautiones	
Vinum austere	ib.21	198.a.6	
Vinum crassum	ib.19	virulentorum morsum remedia	
Vinum dulce	ib.20	cōia	ib.b.8
Vinum rubens	ib.19	viscum	296.b.35
Vinum uermiculum	ib.24	Vitex	279.a.36
Vinum oligophoron	71.b.29	Vitis alba	383.a.26
Vinum purgans in hidropicis		Vitis nigra	ib.34
334.b.5		Vitis sativa	183.a.22
Vinum uetustum	313.b.4	Vitis sylvestris	ib.17
Vinum uetustum nouo magis		Vitrum	326.b.8
calefacit & desiccet	30.a.24	Vituli marini	30.a.8
Vinum immoderate sumentis		Ulcera Chironia	187.a.4
quid faciendum	ib.b.3	Ulcera Telephia	ib.5
Vini meracioris copiose epot		Ulcera caui curatio	183.b.4
ti remedium	215.b.15	Ulcera simplicis curatio	
Vinum in quo ferrum restin		182.a.26	
etum sit	320.b.14	Ulcera dolore & inflamma	
Vini faex	326.a.11	tione obfessa quomodo curentur	
Viola	297.a.4	136.a.6	
Viola alba	306.b.31	Ulcera inflammata quomodo sanantur	ib.
Violaceum	386.b.31	tur	
Vipera	203.a.31	Ulcera dirupta	189.b.27
Viperæ morsus signa		Ulcera diruporum cura	
203.a.34		tio	ib.35
Viperæ morsus remedia		Ulcera malefica dolosaque	
ibidem.b.14		187.a.4	
Viperæ maris morsus non tam		Ulcera maleficorum curatio	
malus quam foeminae	ib.12	ibidem 9	
Viperinos adeps	323.a.7	Ulcera putrida quomodo sanentur	
Viperæ pellis	291.a.23	185.a.2	
Viride emplastrum ad humi		Ulcera serpentia quomodo curentur	ib.5
da uitia & carnis excrescen		tur	
tias	373.a.15	Ulcera sordida quomodo purgentur	184.a.10
Viride emplastrum Macherio		tur	
nis	ib.5	Ulcera qua ratione maturentur	183.a.21
Viride emplastrum simplex		tur	
ibidem 16		Ulcera anti remedia	251.b.13

INDEX

Vlcera tonsillarum quō curē	materia	ib. 32	
tur	100.b 35	Vnguenta composita omnia,	
Vlceri quō cicatrix inducēda	calcfaciunt	386.a 3	
fit	136.a 3	Vnguenta cōposita uariis mo	
Vlceꝝ uermes quō arceantur	dis calefaciunt	ib. 10. 13. 14	
184.a 29	Vnguentum uiri de qua ratio		
Vlmus	318.a 10	ne fiat	385.b 33
Vlophoni indicia	212.a 12	Vnguentum Zosimi ad tremu	
Vmbilicus multis modis pro	lcs celebratum	384.b 6	
minet	236.b 20	Vnguentoꝝ coctio	376.b 7
Vmbilici prominentiæ signa	Vocis exercitatio	5.b 15	
ib. 30	Volæ manus ossa fracta quō		
Vmbilici prominentis cura	curentur	267.a 4	
tio	237.a 7	Vomitum etiam fanis utilis est	
Vmbilici procidentiam curā	337.b 14		
tia	133.a 5	Vomitum citantia medica	
Vnedon	293.b 12	mēta quibus profint, quibus	
Vngues pisces	29.b 16	non	ib. 25
Vngues oculoꝝ qui pterygiō	Vomitum commoda	11.b 8	
dicitur	89.b 3	Vomitum facilem reddentia	
Vnguis oculoꝝ curantia	ibidem 12		
ibidem 19	Vomitionem bilis curantia		
Vnguis oculoꝝ quō curetur	60.a 7		
manu	222.b 9	Vomitum nauigantium	
Vnguim uitia	159.b 8	16.a 19	
Vnguim pterygium		Vomitum sanguinis quō curē	
254.a 22		tur	108.a 27
Vnguim contusoꝝ curatio		Vranium	362.a 35
ibidem.b 14		Vrinaꝝ præfagia	44.a 15
Vngues contusos curantia		Vrinarum multæ differentiæ	
160.a 24		ibidem 17	
Vngues cruentos curantia		Vrina	315.a 12
ibidem 26		Vrina humana	ib.
Vngues scabros separantia		Vrinam humanam in peste	
medicamenta	ib. 31	bibere salutare est	ib. 15
Vnguenta quæ propriē dican		Vrina caprarum	ib. 21
tur	385.b 17	Vrina cameloz	ib.
Vnguentorum alia simplicia		Vrina maialium	ib. 13
alia composita	ib. a 30	Vrina mulorum	ib. 20
Vnguentorum simplicium		Vrina pueri impubis	ib. 19

INDEX

Vrinam sanis mouentia 11.b.36	Vteri procidentia uariis ex causis fit 147.a.1
Vrinæ difficultatem curantia 123.b.22	Vteri procidentia curatio ibidem 15
Vrinæ stillicidium curantia 125.a.18	Vteri scirrhus unde 144.b.16
Vrinam non reddentium, quia ipsius iter obstructum est, curatio 24.b.29	Vteri scirrhum curantia ibidem 28
Vrinæ incontinentia unde 125.b.10	Vteri strangulatio 146.a.8
Vrinæ incontinentia quō cu retur 21	Vteri strangulationis signa ibidem 13
Vrsinus adeps 323.a.5	Vteri strangulatio quibus fe re accidat & quo anni tem pore ib.32
Vrtica 24.b.19	Vtilium ac dulcium potionū differentiæ 337.a.27
Vteri affectus 38.b.34	Vuæ 26.b.7.14
Vteri abscessus signa 142.b.16	Vuæ passæ ib.16
Vteri abscessus curatio ib.32	Vua 227.a.18
Vteri cancrorum notæ 144.a.6	Vuæ curatio ibidem 24
Vteri canculos lenientia ibidem 21	Vuæ inflammationem tollen tia 101.a.23
Vteri declinantes curatio 142.a.4	Vulpes 283.b.5
Vteri exulceratio unde tur 143.a.16	Vulpinus adeps 323.a.6
Vteri exulcerati curatio ibidem 31	Vulneraria emplastra 365.a.12
Vteri inflatio unde fiat 145.b.5	Vulua animalium 28.b.3
Vteri inflationis notæ ibidem 23	Vulua uniuersim ablata mu lierem superuixisse 147.b.3
Vteri inflationis curatio ibidem 26	Vulux abscessus signa 142.b.15
Vteri inflammatio multis de causis accidit 100.a.15	Vulux abscessus curatio ib.31
Vteri inflammationis notæ 141.b.20	Vulux abscessus curatio ma nu adhibita 248.a.11
Vteri inflammationis curatio 142.a.1	Vulux cancroꝝ notæ 144.a.6
	Vulux condylomata quō cu rentur 149.a.18
	Vulux declinantis curatio 141.b.16
	Vulux hæmorrhoides quō curentur ibidem 27
	Vulux exulceratio unde acci dat 143.a.16

INDEX

vulux rimæ & scissuræ unde fiant	149.a 1	ibidem 26	Xerophthalmiæ curatio
vulux rimæ & scissuræ quò curentur	ib. 10	Xiphion	313.a 22
vulux scirrhus unde	144.b 15	Xiris	ib. 17
vulux scirrhum curantia ibidem. 29		Xyrocolla	324.b 15
vulux strangulatus 164.a 10		Xiraphium medicamentum	66.b 32
vulux strangulatæ signa ibidem 13		Xiris	313.a 17
vulux strangulatus quibus fere accidat, & quo anni tē pore	ib. 32	Xister	361.b 26
vulux strangulatæ curatio	ib.		
Z			
Anthion	313.a 14	Ea	294.b 35
Xanthion medicamen tum	354.a 4	zingiber	295.a 2
Xeria medicamenta	353.a 27	zomos	295.a 16
Xerion, quod est aridum, psi lotrum ad podagram		zopissa	285.b 15
355.b 23		zopyros, medicamentum	
Xerophthalmia	87.a 24	zofimi unguentum	384.b 6
		zigia	380.b 15
		zime	295.a 11
		zithus	ib. 7
		FINIS IN	
		D I C T I S.	

ANNOTA

TIONES IN PRIMVM LIBRVM.

IN PRAEFATIONE.

Agisq; Oribasium.) Hæc sententiam ex iis quæ paulo ante capitum enumerationem habentur, ita reddidi. Ad uerbum autem iōnat. Quum plures egregios authores perlegissem magisq; Oribasium, qui & ipse uniuersum librum in quo totam sanitatis tuendæ rationem comprehendimus, ex aliorū scriptis excerptis. quàm uero comprehendimus male congruat, quilibet potest uidere: & si in hunc modum omnia habeant exemplaria. Quare si hæc placet sententia, διήλθομεν in διήλθῃ, hoc est comprehendit mutandum est. atque sic reliqua conuenient.

Folio. 1. a linea 4

Nausea.) Græce est περισσάειν, quod significat κινεῖν. & ταραΐσειν, hoc est commouere, & turbare.

Linea. 16

Præcordia.) Græci ὑπὸ καρδίᾳ proprie appellant præcordia, teste Celso. Plinius tamen phrenas quoque Græce uocari scribit. Barbari uertunt ὑπὸ καρδίᾳ, illa quæ κενεώδης & λαγώδης dicuntur. Paulus hic pericardion superiorem præcordiorum partem, qua os uentriculi est, (nam ueteres hoc etiam cardiacum, hoc est, cor uocabant) intelligit. Linea enim decimaquarta hypochondria iubet lana contegi. Gale nus certe pericardion, cordis inuolucrum, siue membranā qua cor inuoluitur, appellat.

Linea. 18

Per se.) Græce κοινῇ, hoc est communiter. Solent huiusmodi seorsim applicari frequenter, eoq; communiter dicitur: rarius cum palmulis & uino ueteri.

Folio. 2. a linea 8.

Cibus solidior.) Græce solum στίον est, quod signat cibum. Verum relatione lactis & mellis qui & ipsi cibi sunt, alii nēpe caro, panis, similiaq; solidiores recte dicuntur.

ANNOTATIONES.

Folio. 3 a linea. 6

Cleo diiscocto.) Græce est α' π' φθς quod posset exponi, crudo, non cocto, quemadmodum α' π' ι' α cruditas. quo modo in tertio libro semel interpretatus sum. Verum penitus re considerans, inueni α' π' φθον idem esse quod π' α' λ' α' κ' ι' s κ' ο' ι' s μ' ε' γ' α' λ' ο' s ε' φ' θ' ο' ν, ut Latinis discoctum, probe coctum. Suidas eodem modo exponit. Præterea non uideo, quo pacto cera in oleo non cocto possit liquefieri, quod Paulus præcipit.

Folio. 5. a linea. 3

Rubescat.) Græce est, δ' τ' ο' τ' χ' ρ' ο' ι' α' s & α' μ' θ' ε' s, quod notat, si color floridus appareat. Floridus autē hoc loco nihil aliud sibi uult, quā uiuidus, id est, ruber. Nam ut pallor mortis, ita rubor uitæ index est.

Linea. 14

Apothepapia uti.) Exercitationis omnis peractæ pars ultima est apothepapia, ceu dicās recreatoria. Nam corpus expurgat, & lassitudinem arcet.

Folio. 8. a Linea. 23

Corpus decoloratum.) Recte Paulus α' χ' ρ' ο' ι' α' μ, quod est coloris penuriam pro pallore. Sic etiam Latini dicunt, colorem amisit, pro eo quod est, ex palluit. Celsus libro secundo, capite secundo: Vbi colorem decoremq; amisit, pro pallidior euasit. Quemadmodum ecōtrario coloratus dicitur pro eo qui bono colore præditus est, eiusdem authoris testimonio.

Linea. 29

Smegmatis.) Impressis codex habet ρ' υ' μ' μ' α' σ' i, manu scriptus σ' μ' μ' α' σ' i: utrumque absterforia medicamenta significat, eoq; malui smegmatis uocabulo uti, qd esset cōius & expurgandæ cuti accommodatum.

b. Linea 20

vincit.) Locutio hæc Celso familiaris est, pro conducit, expedit, bonum est, ut libro quarto, ubi de tussi agit: Post eam uincit tum ambulare.

Folio. 10. b Linea 6

Aut uiticis.) Omnia exemplaria habent α' ι' γ' s: Item uetus Orribasii codex Longobardicis literis scriptus, agni quoq; habet. Quum liquido constet id medicamenti contra Venereum ualere. Copus legit anisi, qua ratione non uideo.

ANNOTATIONES

Folio. 13. a linea 8

Melanthio quod facile paratur.) Sic quidem ad uerbum traduxi, Oribasius autem habet: Idem etiam errhinon est, & facile inuenitur. Melanthio autem sæpe usi sumus, ut facile paratur, ad succum betæ referat.

Folio. 14. b linea 9

Priato.) Videtur hic aliquid desiderari. Nam quum superius nominum relatione usus esset, priato nihil retulit. Adde igitur & magistratui, si uidetur.

Folio. 15. a linea. 19

Fugaces fructus.) Græce oporas est, quod signat omnia poma per æstatem & autumnum prouenientia. Vocantur autem fructus fugaces quod cito marcescant, nec diu possint afferuari. cogantq; se uenundari. Hac etiam ratione Galenus *ὁ πρὸς τὴν κατὰ πρῶτον* uocari recte scribit. Plinius libro decimo quinto, capite duodecimo id uocabuli usurpat, sic scribens: Pomum innocuū expetitur ægris, pretiumq; singulis iam triceni numi fuere nullius maiore: quod miremur, quia nō aliud fugacius: longissima nanque decerpto bidui mora est cogitq; se uenundari. Verum opora paulo latius patet quā horæi, fructus, hoc est, ut Plinius exponit, tempestiui aut fugaces fructus. Lege igitur si mauis: Poma æstatim assumere noxium est.

Linea 36

Facilitate præditus meatuum.) *Εὐδία πρὸς 50* dicitur, cui latentes meatus non occlusi sunt, sed recrementa corporis per eos repurgantur, quemadmodum per aluum sterces: uescam, urina. At si meatus eiusmodi conuiueant, cor statim incenditur, fuliginosis recrementis intus remanentibus, unde febris origo est. Huic sententiæ astipulatur Oribasius: Nam, inquit, qui ex laboribus non ægrotat frequenter, is latenteis poros habet apertos, per quos humana natura euaporat.

b. Linea. 10

Paululum dimoueri prius debent.) Omnia exēplaria Græca habet *καὶ βραχὺ κινεῖ ὅς πρὸ τερπν.* Forte legendū *κινεῖ ὅς* ut sit Paululum uacuare prius debent non dimoueri, ut habetur. Oribasius enim ex quo Paulus ad uerbū hæc transscripsit, de eadem re præcipiens, ita scribit: Qui igitur plethorici sunt, balneum ingredi fricariq; debent: quanquam &

ANNOTATIONES.

uacuare eos modicum sanguinis prius oporteat : de motu nullam interim mentionem faciens.

b. Linea. 25

Si inunctus sit.) Græce dictio est λιπαρός, hoc est pinguis, a λιπα deducta, qua oleum, adipem, unguemq; omne Græci signant. Inde etiam λιπαρά emplastra Celfo lenia dicuntur, libro quinto capite decimonono, quibus cera, aut resina, aut oleum, aut adeps, aut plura ex his, aut omnia miscentur.

b. Linea. 25

Et fortiter incedat.) Hoc est cū impetu & uehementia, qua corpus ualide concutitur. hoc Græcis est σ'αυτο'ρος.

Folio. 16. b. linea. 14

Medicamenta uero acriora hæc sunt.) Hoc est uehementiora & efficaciora, quæ locutio Celfo non infrequens est.

Folio. 18. a. linea. 35

Bene habita, ualens.) Ex Teretio sumptum est in Eunuchis. Nam si quæ paulo habitior est, Græce dicunt β'γαφ'ς: bene nutritus, ad uerbum.

Folio. 19. b. linea 26

Itaque calida pulmonum.) Quoniam a calida temperie pulmonum differere prius instituit author, addidi illud: Itaque calida pulmonum temperatura præditi: ad sententiam magis exprimendâ ne temere quis me putet assuisse.

Folio. 20. b. linea. 8

Præcordia & uenter pilis uacant.) Vbicunque inuenieris præcordia, Idem putato esse quod Græcis σ'ποχ'ον Δ'ρια. Sic Plinius, Celsus & Largus usurpat. Barbari ilia uertunt.

Folio. 21. a. linea. 22

Neque ad actionem expediti sunt.) Quoniam de uenere hic tantum uidetur agere, ratio est intelligere actionem ueneriam.

b. Linea 20

Horum calor exercitationibus.) Quia calorem exercitiis excitari & augeri dixit superius: uisum est ex Oribasio exercitationibus adicere, forsan a librariis omissum.

b. Linea. 7

Aequinoctialium horarum.) Hoc est communium.

Folio. 23. a. linea. 31

Si semel radices egerit.) Hoc loco intelligat: Si semel orta

25 ANNOTATIONES.

fuerit, semel consistat. Græce est συσή, quod alias non in e-
liganter uertimus, firmatum fuerit: sed hic propter sequen-
tem sententiam lenius accipiendum est.

b. Linea. 3 1

Sanguis atra bile uitiosus redditur.) Celsus sanguinem atra
bile uitiosum uocat. quē hoc loco Paulus μελαί χολικός: ade-
oque medici recentiores Latini melancholicum dicunt.

Folio. 24. b linea. 34

Asparagus autem siccus.) Asparagi uocabulo nihil aliud si-
gnat hoc loco quā primum necdum in folia explicitum
earum plantarum germen, & quæcunque in oleribus pri-
ma ex terra prodeunt & uidentur. non tantum spinosi fruti-
cis summum cacumen quod edendo est, quodq; priuati-
cum tota planta asparagus ubique uocatur. Plinius cymæ uo-
cabulo asparagum, de quo Paulus hic tradidit, interpreta-
tur, de brassica sic scribens libro decimonono capite octa-
uo: Cymas a prima sectione præstat proximo uere, hic est
quidam ipsorum caulium delicatior teneriorque cauli-
culus.

Folio. 25. b linea. 13

Chondrus egregie nutrit.) Sunt qui chondrum, ab alica dif-
ferre Pauli testimonio dicunt. sunt rursus qui idem utrūque
esse ex eodem authore asserant. Sed quum Paulus sæpe in
tertio libro ponat, chondri cremorem, & alicæ cremorem,
in eisdem fere locis. haud dubie diuersas fruges intelligit.
Possit tamē sorbitio e chōdro facta, alica dici latine, ut quæ
ex alica fruge conficitur.

Linea 23

Inter panes firmissimus est siligineus.) Panes recenset eo
fere ordine quo Celsus. uerum ille siligineum quem Græci
dicunt σιγινητήν, circumlocutione exponit ex tritico, in-
quiens. firmissima siligo. Similagineum, ex simila. Cui nihil
ademptum est, ὡς τὸ πυρρόν, quod triticum ipsum in eo totū
sit. Paulo idem συγκομίσος appellatur quasi omnia ex triti-
co continens. Cibarium ex Celso reddidi, quem Paulus πυ-
πάρην, hoc est sordidum, aliq; πυρίαν, id est furfuraceū ap-
pellant. Firmissimus, hoc est ualentissime alens, quod Græ-
ci τροφιμώτατος dicunt.

Folio. 26. a linea. 28

Fructus fugaces.) Cur ita horæos uocauerim superius expō

ANNOTATIONES

sui. Hoc autem notandum uenit, Plinium eos a tempestiuitate, tempestiuos uocasse contra Galeni sententiā, qui nō ideo quod mature proueniant, sed potius quod cito marcescant, appellari *ωραία* maluit. Latine ergo rectius fugaces dixeris. Pomum autem uoco, quicquid extrinsecus lignosum non est. Celsus uias, ficus, nuces, glandulas fructus surculorum esse scribit.

Folio. 27. a linea. 15

Muria conditæ.) Ad uerbum hoc sonat, quod Græci dicunt *halmadas oliuas*. *Νᾱα* *λμῆ* muria uocatur latinis. Alii quod sale condiantur sic nuncupari censent. Non desunt qui easdem colymbadas appellent, confusa ambarum differentia. Paulus certe ipsas distinguit, quum infinitæ fere oliuarum condituræ habeantur teste Palladio, & Columella. Dictæ autem sunt colymbades inde, quod oleo suo puræ hoc est sine accersita commendatione innatant, & quasi urinabundæ fluitant.

b. Linea 26

Tremula plus alimenti habent.) Hæc Græci *τρυμνία* nuncupant. Sunt autem modice cocta, ut Galenus ait. Hermolaus tenera & tremula eadem esse dicit. Sorbilia. & ipsa medio criter cocta sunt. Pnicta uocantur quæ in aqua suffocantur demergunturque, a uerbo *πνίω*. Quæ sartagine friguntur. Hæc *Τετραπύρα* Græce dicunt, deterrimi alimenti teste Galeno.

Folio. 28. a Linea 1

Quæ pedibus fidunt.) Pro inter animalium pedestrium carnes. loquendi ratio ex Celso petita, libro tertio. Ex his quæ uolūta fidunt.

Linea. 20

Quæ uolatu nituntur.) Hoc est uolatilium; Celsus sic loquitur.

Folio. 29. b Linea 29

Molles pisces.) Hoc est qui molli cute præditi sunt.

Linea 35

Cartilagineorum quæ selache.) Selache authore Plinio libro nono, capite uigesimoquarto Aristoteles primus uocauit eos pisces qui pro spina cartilaginem habent. Eosdem Plinius planos appellat.

ANNOTATIONES.

Folio. 30. a Linea 21

Austerum stomacho.) Græce est *συσφον*, quod sonat astringens. Galenus autem Methodi libro quarto austerum id uocat, quod *συσφον* quoque Græce dicitur, libroq; duodecimo austeram uinam uentrem roborare scribit, caputque inter omnia minime tentare, cæterum ad digestionem in corpus non festinare.

Linea. 23

Vermiculum.) Græce est *κίρρον*, medius inter album & uigrum color. non male rubens, & rubrum quis dicat.

Linea. 33

Desipiunt.) Græce *παρρησι*, melius hic quadrat mente alienantur.

Folio. 32. a lineam 8

Cum musto deferbuerint.) In uno exemplari Græce erat *γλυκυν*, hoc est mustum: in aliis *γλυκύν*, quod est passum, eaq; lectio magis placet.

Linea. 28

Styrmaismus.) Hanc dictionem Galenus in commentario in Hippocrate de articulis, his uerbis exponit. *Συρμέσμος δ' ἐκ τῶν οἰ παλαιοὶ τὰς μετρίαις κενώσεις, εἴτε διὰ τῆς δ'ρας, εἴτε καὶ δι' ἐμέτων γίνονται*, id est, Syrmesmos uocabant ueteres mediocres uacuationes, siue per aluum, siue etiam per uomitus fierent.

ARGVMENTVM LIBRI PRIMI.

PRIMVS totius operis hic liber est, in quo omnia sanitatis tuendæ præcepta tradidimus, quemadmodum iam in præfatione dictum est. diceturq; iterum per capita, ubi tantum hoc prælibauerimus, quod in primo & secundo uolumine plurima ex Oribasio mutuati sumus. Non enim peculiarẽ uoluimus constituere opinionem, sed ex omnibus utilitatem indipisci. In reliquis quinque libris paucissima tantum ex illius commentarijs huc transiuli.

CAPITA LIBRI PRIMI.

I.	Quæ grauidis superueniunt, & quæ uictus ratio eis conducatur.	1
II	De nutrice.	ibidem
III	De lacte nutricis	ibidem
IIII	Quomodo lac uitiatum corrigatur	2
V	Educatio pueri	ibidem
VI	De pustulis puero abortis, exanthemata dicuntur	ibidem
VII	De tussi & grauedine pueri	ibidem
VIII	De gingiuarum pruritu	3
IX	De dentium ortu	ibidem
X	De oris ulceribus quæ aphthæ dicuntur	ibidem
XI	Ad femorum intertrigines	ibidem
XII	Ad aures humentes	ibidem
XIII	De Siriasi	ibidem
XIIII	Ratio uictus infantium atque reliquarum deinceps ætatum, ad usque declinantes	ibidem
XV	De frictione præparatoria, quæ parasceuaftice dicitur	4
XVI	De exercitatione	ibidem
XVII	De exercitationum generibus	ibidem
XVIII	De generibus frictionum	5
	De uocis	

XIX	De uocis exercitatione	ibidem
XX	De lassitudinibus ob exercitationem	6
XXI	De cute astricta	ibidem
XXII	De spontaneis lassitudinibus	ibidem
XXIII	Victus senum ratio	7
XXIII	De rugoso corpore	ibidem
XXV	Quomodo corpus suauiter oleat	8
XXVI	Quomodo color malus mendetur	ibidem
XXVIII	Ad liuores	ibidem
XXIX	Quomodo dentes ab iniuria asserantur	ib.
XXX	Quomodo grauis auditus corrigatur	ib.
XXXI	Ad oculorum caligines	ibidem
XXXII	De repletione	9
XXXIII	De ebrietate	ibidem
XXXIII	Quibus cibi corrumpuntur	ibidem
XXXV	De uenere	ibidem
XXXVI	Ad eos qui uenerem exercere nequeunt	10
XXXVII	De iis qui immodice coierint	ibidem
XXXVIII	Si semen genitale redundet	ibidem
XXXIX	Si perfrictio nocuit	11
XL	Si insolatus adus sit	ibidem
XLI	De pituita in superiore uentriculo redun-	
	dante	ibidem
XLII	Quomodo facile quis uomat	12
XLIII	Quæ sanis aluum subducant, & quæ urinam	
	moueant	ibidem
XLIII	De clysteribus	12
XLV	De glandibus	ibidem
XLVI	De iis quæ per os caput purgant. Apophleg-	
	matismi uocantur, & quæ per nareis, un-	
	guenteisq;	ibidem
XLVII	Quæ menses ducunt	13
XLVIII	Quæ sudorem mouent	ibidem
XLIX	De aere	ibidem
L	De aquis	ibidem
LI	De lauacris	14
LII	De lauacris naturalibus	ibidem
LIII	Quæ uictus ratio quolibet anni tempore	
	sit utilis	ibidem
LIII	Victus laboriosam uitam agentium	15

LV	Proficiscentium uictus ratio	ibidem
LVI	Nauigantium uictus	16
LVII	Quomodo extenuetur corpus	ibidem
LVIII	Quomodo tenues impleantur	17
LIX	De partium attenuatarum curatione	ibidem
LX	Optimi temperamenti notæ	ibidem
LXI	Intemperatorum corporum notæ	ibidem
LXII	De capitis formatione	19
LXIII	Temperaturæ cerebri notæ	ibidem
LXIII	Ventriculi temperaturæ notæ	19
LXV	Pulmonis notæ	ibidem
LXVI	Cordis notæ	20
LXVII	Iocinoris temperaturæ notæ	ibidem
LXVIII	Testiculorum temperaturæ notæ	21
LXIX	Quæ prætermiffa sunt	ibidem
LXX	Quomodo calida intemperies corrigatur	ibidem
LXXI	Quomodo frigida intemperies emendetur	ibidem
LXXII	Quo sicca temperies in uentriculo ueluti exemplo, deinde & aliæ corrigantur	22
LXXIII	De alimentorum facultatibus	23
LXXIII	De oleribus	24
LXXV	De asparagis	ibidem
LXXVI	De radicibus quæ cibi rationem obtinent	25
LXXVII	De tuberibus & fungis	ibidem
LXXVIII	De frumentaceis	ibidem
LXXIX	De leguminibus	26
LXXX	De fugacibus fructibus	ibidem
LXXXI	De arborum fructibus	ibidem
LXXXII	De animalibus, & primo de uolatilibus	27
LXXXIII	De ouis	ibidem
LXXXIII	De terrestribus animalibus	ibidem
LXXXV	De partibus animalium	28
LXXXVI	De lacte & terrestrium sanguine	ibidem
LXXXVII	Da lactis potione	ibidem
LXXXVIII	De lacte scisili	29
LXXXIX	De caseo	ibidem
XC	De piscibus	ibidem
XCI	De testaceis	ibidem

XCII	De malaciis	ibidem
XCIII	De cartilagineis	ibidem
XCIII	De cetaceis	30
XCV	De uini uiribus	ibidem
XCVI	De melle & mulla	ibidem
XCVII	De somno	ibidem
XCVIII	De uigilia	31
XCIX	De sopore	ibidem
C	Dioclis epistola ad ualeitudinem tueudam conscripta	ibidem

ANNOCTATIONES IN LIB. II.

Folio. 33. b linea 10

M Orbis iam conflictantur.) loquutio Celso frequens,
ut libro secundo capite sexto: Hi uel capitis dolori
bus conflictantur, uel terram edunt.

linea. 26

Vna uice.) Græce est α' το' ως, quod uniuersim significat &
semel, non pluribus uicibus. Celsus uidetur hoc uerbi ex-
pressisse libro quarto capite duodecimo, quum ait: Ne quis
aut cibus aut humor uniuersos detur, sed paulatim. Ergo
per interualla temporis sat est cyathos binos ternosue su-
mere, & cibum pro portione. Hic uniuersim sumere nimis
pro α' το' ως ponitur.

linea. 31

Siquidem capitis.) Hæc dictio siquidem, ex superiore ora-
tione pendet, puta quale morbi principium dicamus. Nam
Paulus rationem reddens, cur non quodlibet superueniens
homini morbi, principium sit, inquit: Siquidem capitis &c.

Folio. 34. a linea 10

vigilia præcesserit.) Græcis est συμβεβηκο' πον, quasi dicas,
quæ simul contigerint, una inuaserint. Verum ex Celso, qui
hæc ad uerbum transtulit e Græcis, sumpsimus: quæ ita imi-
tamur, ut a fide non recedamus.

linea. 16

Pituita crassior.) Celsus ita uertit ex Hippocrate. Græca
dictio est λιμυι, quam Plinius etiam usurpat, libro uige-
simotertio, capite primo: Vel, inquiens, si lemæ in ocu-
lis erunt.

h ii

ANNOTATIONES

Linea. 20

In ueste floccos legere.) Græce est κροκιδί ζειν quod uotet proprie fimbrias diducere, ut Celsus exponit: floccos autem legere huic finitimum est, eoque addidimus ex Celfo. Sequitur καρφολάειν, hoc est, festucas & minima quædam carpere, quod incuria impressorum omisso est, tu adiiçito.

Linea. 27

Sudore digeratur. Tali dicendi formula Celsus utitur, quum quasi defectum animi ex sudore innuit, libro tertio capite decimonono: Quod stomacho languente immodico sudore digeritur.

Linea. 33

Cibi appetentia.) Græce est, ὡς ἐχειν πρὸς τὰ πρὸς τὸ φαγεῖν quod Celsus eleganter libro secundo capite secundo, ubi de bonis in ægrotantibus signis agit, cupiditatem cibi uerit, alias appetentiam. Barbari ad uerbum exponunt, bene se habere ad oblata.

b. Linea 10

Quarto die crisin experitur.) Crisis Græca dictio est, medicis admodum usitata, eoq; reliquimus: interim tamen iudicium, & iudicationem interpretati. Celsus dies crisis circumlocutione exponit, tertio libro de febribus: Dies, inquiens, in quibus de ægris iudicaretur, κρισίμια nominabant.

Linea. 13

Intra quartumdecimū diem soluetur.) Hoc est iudicabitur, ut rudiores intelligant.

Folio. 36. a linea. 15

Qui rigore uehementer febricitant.) Quia medicis alioqui doctis hæc dictio in usu est, non dubitavi ipsam ponere, pro ea quæ Græcis πῖσας dicitur, quanquam hanc Latine algorem cum tremore possis interpretari, uel rotius corporis concussionem. Rigores autem inflexibiles nervorum musculorumque duritias recte dixeris, ut Plinius & Celsus authores sunt. Non tamen ignoro in frigore aliquando rigorem dici. Verum id ex consequenti eius euentu dicitur.

Folio. 37. a linea 3

Conflictatus sit.) δυσφορίᾳς δὲ γενομένης Græce est, quod superius exposui excruciatum. Celsus alibi in simili re con-

ANNOTATIONES

fluctatur, usurpat. Si æger inquietus, conflictatur.

Linea. 28

Eleuatione.) Celsus eleganter διαστέλλειν & συστέλλειν, libro primo exponit: Quare inquietus uenæ nostræ modo submittunt se, modo attollunt: dixi autem uenas pro arteriis. Veteres enim uenas pro arteriis ponebant.

b. Linea. 7

Iis quæ per brachiale excurrunt omisissis.) Brachiale iuncturam uoco qua manus cum brachio iungitur. In qua parte, arteriæ omnium maxime apparent, ut sit sensus: Vbi eas quæ brachiale perreptant arterias prætergressus fueris, nullas in toto corpore tactu commodiores illis reperias quasi dicas: In brachiali, arteriæ ad tactum sunt accommodatissimæ.

Linea. 10

Tria sortitur interualla.) Barbari διασπασει uertunt dimensiones. Celsus libro tertio de febribus capite sexto: Si uenæ non æquis interuallis mouentur

Linea. 25

Distantia.) Hoc pro interuallo positum est. ex uocabuli græci significatu.

Folio. 38. a linea 34

Interualla cum ipso.) Interualla hic uoco ηρεμίας, hoc est quietem quæ percussibus arteriarum interuenit. Galenus etiam διασχυμα hoc est interuallum uocauit, sed tēporis quo arteriæ mouentur.

b. Linea. 25

Peculiaris quidem puerili.) Post uidetur omisissum id quod Galenus addit, & παιδὶ ὅν τ' πλησίον ἡλικίας σφυγμὸς λαβοίτο, παραρρυθμὸς καλεῖται, hoc est, si puer propinquæ ætatis pulsus acceperit, pararythmus uocatur.

Folio. 43. b linea 28

Alius optima.) Pro deiectione hic ponitur aluus. Celsus libro secundo capite quinto. Alius quoque uaria pestifera est. Item quæ liquida, eademque uel nigra uel pallida uel pinguis est. Idem pro parte accipit quæ excrementa continentur.

Linea. 30

In rusum elanguescit.) Pliniana locutio, pro leuiter rufesca est.

h iii

ANNOTATIONES.

Folio. 44. a linea. 5

Particularum tabem.) Græce est *σωτηρις*, quæ uox significat colliquationem consumptionemq; quâ particulis quotidie aliquid abscedit, nec alimentum recipiunt. Nos tabe interpretati sumus. quod hæc dictio apud Latinos latius patet, quam Græcorum *φθίσις*. Plinius uoce syntexi utitur tãquam latina, libro uicesimo secundo capite uicesimo quinto. Tali sorbitionis genere emendantur syntexes. hinc syntectici eodem authore dicuntur.

linea. 29

Speciem uini tenuis & albi.) Græci codices habebant *εἰς ἰκανὸν τὸ λεπὸν καὶ λευκόν*, hoc est, satis propinqua tenui & albæ, uerum legendum censeo, *εἰς οἶνον τὸ λεπὸν* &c. quem admodum Galenus & Oribasius, onde ad uerbum transcripsit.

linea. 33

A diluta.) Hoc est aquosa, ut Celsus sæpius utitur.

b. linea. 18

Subsidentia alba.) Græci uocant hypostaseis, Celsus residua, aut subsidentia, aut quod subsidet.

Folio. 46. b linea. 14

Consistit.) Pro in summo statit, in summo incremento est. Celsus libro tertio capite quinto: Quum uero febris incipit, incipiat, augeatur consistat, decedat. & paulopost. Satiùs est consistente iam incremento febris, aliquid offerre. Item libro quarto, capite septimo: Vbi in incremento constitit.

linea. 16

Nihiloque magis pectus quam extrema calent.) Hoc deesse uidebatur, ex Galeno instauratum.

linea. 34

Quod ad inferiora uergit.) Apertius ex Galeno & fusius exposui. Sic etiam Oribasius habet.

Folio. 47. a linea. 11

Circuncidendum est.) Celsiana loquutio, ut libro quarto capite uigesimo. Circuncidendum uinum est in totum annum.

linea. 18

Ordine conuerso otiosis.) Addidimus ad sententiam superiorem exprimendam, non incommode, ut speramus.

ANNOTATIONES

Folio. 49. b. linea. 23

Sustinere eos qui. Hoc est, nutrire. Græcum est *διεταφ*. ita Celsus loquitur.

Folio. 50. a. linea. 15

Humorem refrigerantis.) Hanc sententiam ita potius leges Refrigerans aliquid, humore eius expresso, pilæ cum portulaca iniicimus, deinde contusum exprimimus, cum usus exigit, modico polentæ mixto, totum in aquam frigidammersum refrigeramus.

b. linea. 8

Lemæ ipsis inhærescentes.) Plinius usurpat hoc uocabulū pro latino ut superius dictum est. Celsus crassiorem pituitā interpretatur.

linea. 20

Quum uero periclitatur.) Græce, *ἡ κίνδυνον ἡκῆ*, ad periculum uenit, pro eo quod latini dicunt, Metus est. periculū est. Celsus uerbo utitur, libro primo capite tertio sic scribēs. Nam siue plus est quam quod cōcoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet.

Folio. 51. b. linea. 5

Nimis laboriosa uitæ ratio.) Græce est *ταλαιπωρία*, quasi dicas miseriæ. Idem ualet ærumnosa uitæ ratio, quæ plena & laboribus & miseriis existat.

linea. 33

Pyræ incendio.) Græca dictio est pyra, latinis tamen usurpata. Proprie est lignorum strues.

Folio. 52. a. linea 32

Venter syntexin patitur.) Quid sit syntexis superius explicatum est. Sententia est: Venter tabida, & quæ ex ipsius corporis substantia decesserunt, humore undiquaque in ipsum confluente, mittit, partim uomitu, partim inferius. Ad uerbum Græce est: Venter syntexes emittit, alias fursum, alias infra. Cur autem sic reddiderim, Oribasius fuit in causa, qui apertius & fusiuseandem tractat sententiam.

Folio. 56. b. linea 29

Fenestris patentibus.) Hoc quidem in Græco non est, sed ex Celsoidem fere scribente huc transtuli, quod aer frigidior hinc peti soleat. Verba Celsi sunt libro. 3. cap. 19. quo minus corpus insudet, leui ueste debet esse contectus, loco non

h i i i i

ANNOTATIONES.

calido fenestris, patentibus, sic, ut perflatus quoque aliquis accedit.

Folio. 57. a linea 26

Hypoglottita uocant.) Scribonius Largus globulum uocat, qui sub lingua teneatur.

b. Linea. 9

Herbæ pituitariæ.) Pituitaria herba est quæ dicitur etiâ pedicularia, Græce staphis agria.

Folio. 58. b linea 10

In id uehementer efficax est.) Celso peculiaris est hic sermo, ut libro tertio capite decimooctauo: Mouere sternutamenta in id efficacibus. Eodem sensu usurpat, ad id efficax, ut lib. 4. c. 8. potionesq; ad id efficaces.

Linea. 14

Quum minus quàm par est.) Talis genus est, quæ ἀρεσφις Græcis dicitur. Plinius exponit, quum cibum corpus non sentit. Celsus eodem fere modo interpretatur, libro tertio capite uigesimo secundo, sic scribens: Tabis plures species sunt: Vna est, qua corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis uero in eorum locum subeuntibus, summa macies oritur, & nisi occurritur, tollit, ἀρεσφις hanc Græci uocant. Ea duabus fere de causis incidere cōsuevit: Aut enim nimio timore aliquis minus aut auditate nimia plusquam debet, assumit, ita uel quod deest, infirmata uel quod superat, corrumpitur. Hactenus Celsus.

Linea. 18

Acrimonia sane febrium.) Græce est ὀξύτης, quod significat acumen. Latine possis dicere. sæuitia febris lenita, aut acrimonia, aut uehementia remissa siue præterita, ut ad uerbum interpreter.

Folio. 59. a Linea. 25

Vniuersim superaccommodatus. Sonat Græce μετακρηνησµος. hoc est, cum strepitu, torrentis modo, ampliter in caput de turbatus ex oleo fonis.

Folio. 60. b Linea 31.

Pollen polentæ.) Apud Græcos est παπᾶλη ἀλφιτᾶ. Plinius tamen aliq; antiquiores scriptores, eas uoces ex Græcis uertentes nihil aliud quàm polentam dixerunt, quum tamen παπᾶλη propriam habeat significationem, quæ indicet, q; in farina tenuissimum est.

ANNOTATIONES.

Folio. 61. a Linea. 6

Ex calidis spiffamentis.) Aromata tusa, oleoq; admista ut tenuitatem eius spiffent, coactumq; confusa ipsarum farina increassent, spiffamenta Latinis dicuntur, Græcis stymmata. Plinius libro decimotertio capite primo: Ratio faciendi duplex, succus & corpus: ille olei generibus fere constat hoc odor: hæc stymmata uocant, illa hedy smata.

Folio. 62. a linea. 3

Aeris perspiratu.) Græce est, πρὸς ἀνέμους τρεῖς πῶς, quod est, ad uentum conuertens. Celsus autem superiore loquutione utitur in re simili. Qui enim uento exponitur, aeris perspiratum sentit.

Linea. 13

Qui subito animam perdunt.) Idem est quod animo deficiunt. Cæterum Celsus anima frequentius usurpat, q̄ animo alii uero indifferenter.

Linea. 16

Contra hanc pugnandum est.) Celsus hunc in modum loquitur.

Linea. 17

Symptomatics.) Hoc Celsus aliiq; cādidi Latinæ linguæ scriptores exponunt, per ea quæ superueniunt.

ARGVMENTVM LIBRI SECVNDI.

Hoc secundo totius operis libro, de febribus tractatur. Primum de iis quæ ad notas totamq; earum curationem conducunt, sermo habetur: deinde de singularum febris specierum generatione & curatione. postremo de ijs quæ febribus superueniunt.

CAPITA LIBRI SECVNDI.

- I De febribus ex Galeni aliorumq; plurium commentariis 33
- II Quot & quæ principalia in morbis potissimum febrilibus perquirenda ibidem
- III Vnde cognoscendum, morbus ne sit sanabilis an perniciosus. 34

III	De signis longæ ualitudinis	ibidem
IV	Quomodo præsciemus an morbus iudicium subiturus, soluendusue sit	ibidem
VI	De diebus decretoriis	35
VII	Decretoria iudicia in morborum principio esse praua	ibidem
VIII	Quemadmodum futurum iudicium præno- scendum sit	36
IX	Quomodo instans morborum iudiciū agno- scatur	ibidem
X	Quemadmodum optimum iudicium per a- ctum agnoscamus	37
XI	De pulsibus ex Galeuco commentariis	ib.
XII	De deiectionibus	43
XIII	De urinarum notis	44
XIII	De sputi notis	ibidem
XV	De febribus diariis dignoscendis, curan- disq;	45
XVI	De putridarum febrium agnitione	ibidem
XVII	Curatio febrium putridarum	46
XVIII	De tertianarum agnitione	ibidem
XIX	Curatio tertianæ	ibidem
XX	Curatio tertianæ nothæ	47
XXI	Quartanarum cognitio	ibidem
XXII	Curatio quartanarum	ibidem
XXIII	Quotidianæ agnitio	48
XXIII	Curatio quotidianæ	ibidem
XXV	De hepialo febris & rigore, quæ nullo calore possunt euinci	ibidem
XXVI	De febribus continentibus	49
XXVII	Agnitio febriū continentium, & curatio	ib.
XXVIII	Ardentium agnitio	ibidem
XXIX	Ardentium curatio	ibidem
XXX	Febrium quibus ex affectu erysipelas referen- te origo est, curatio & agnitio	ibidem
XXXI	Hecticarum febrium agnitio	50
XXXII	Hecticarum febrium curatio	ibidem
XXXIII	De semitertianis	51
XXXIII	De morbis publice grassantibus	ibidem
XXXV	De pestilentia, ex commentariis Ruffi	52

XXXVI	De iis qui redundantia crudoꝝ humoꝝ syncope periclitantur	ibidem
XXXVII	De iis qui ob prætenueis humores syncope opprimuntur	53
XXXVIII	De reliquis occasionibus quibus syncope succedunt	ibidem
XXXIX	De dolore	54
XL	Si corpus tabe consumatur	ibidem
XLI	De uigiliis in febribus	ibidem
XLII	Curatio soporis noxii, qui cataphora Græcis dicitur	55
XLIII	Curatio doloris capitis in febribus,	ib.
XLIII	Quomodo stomachi curam habere conueniat	56
XLV	De immodico frigore in febribus, & rigore	ibidem
XLVI	De sudoribus	ibidem
XLVII	De tussi in febribus	57
XLVIII	De sternutamento	ibidem
XLIX	De cibi fastidio	58
L	De grandi fame, quæ Græcis bulimos nuncupatur	ibidem
LI	De canino appetitu	ibidem
LII	De siti	59
LIII	De lingnæ scabritie	ibidem
LIIII	De nausea	ibidem
LV	De bilis uomitione	60
LVI	De singultibus	ibidem
LVII	De aluo in febribus astricta, & cita	ibidem
LVIII	De sanguinis distillatione & eiusdem ex naribus profluio	61
LIX	Si anima deficiat	ibidem
LX	Quomodo ulcus circa os sacrum proueniens curetur	62

ANNOTATIONES IN LIB. III.

Folio. 63. a linea 9.

A ut calami radix.) Aliquoties dictione calami usi sumus pro arundine. idq; citra adiectiuum aromatici, qui ab illo diuersus est.

Folio. 64. b. 8

Iunci floris.) Hoc est iunci rotundi floris, ut apud Celsum nonnunquam legitur. nisi mendum sit.

Folio. 70. a 11

Scordii drachmæ quatuor.) Impressum exemplar habet *scor* hoc est alliorum: scordium uirtute simili ad affectum hunc ualet, qua de causa ita reddidimus, quanquam superior lectio multis probetur.

Folio. 71. a 5

Venarum puluini turgescunt.) Hoc est ipsæ uenæ. Nam puluini nihil aliud sunt quam uenarum extuberantiæ, quemadmodum Celsus aliquando uenarum toros dixit.

Linea. 23

Medicamentum ex papauere. Simpliciter hoc diximus, pro ex papauerum capitibus, quod Latini scriptores sæpe factitare solent: Græce dicitur dia codion.

Linea. 33

Vel rhodomelite uel diluto hydromelite.) Affinitas dictionum malæ scripturæ occasionem præbuit, hunc igitur in modum uitiatam sectionem restitue, uel rhodomelo uel dulci hydromelo, dilutum positum erat pro aquoso, propter id quod sequitur. Nam uinosum hydromelum. Simili casu in septimo libro capite decimoquinto de prauata est lectio. ubi pro hydromel & rhodomel, legendum est hydromelum & rhodomelum.

Folio. 75. a 11

Bombylio ori instillantes.) Bombylium teste Galeno & Suida est poculum angustioris, cuiusmodi fictilia multa fieri solent.

Linea. 20

Fœmora & crura exulcerata.) Vrentibus scilicet qualis est urtica & sinapi. Celsus exasperare pro exulcerare ponit libro tertio capite uigesimo septimo. Prodest inquam etiam

ANNOTATIONES

torpentis membri summam cutem exasperasse, uel urticis
causam, uel imposito sinapi.

b. Linea. 35

Ac ore uentriculi submisso.) Græce ἡ σύστολις φυλάττειν,
ἀρετὴν ἔχει τὴν κοιλίαν, hoc est in systole conseruare & al-
uum irritare, puto autem aliquid desiderari, atque in hunc
modum legendum esse: Quibus uomere ex usu est, si statim
ad id cogendi sunt & inquiete seruandi: qui difficulter uo-
munt, iis alius duci debet.

Folio. 74. b 13

Iuncus aliq; similia.) Quotiescunque simpliciter iuncus
positum, rotundum intellige.

Folio. 75. a 33

Eorum quæ iuxta sunt obliuio.) Dictio Græca est προχωρ
quæ etiam familiares significat, atque sic duobus modis pos-
sit intelligi, sed prior sententia omnia complectitur.

Folio. 77. a 17

Quando ualentiora magisq; uaria.) Ita intellige, quando
contumax est humor tunc ualentiora tentare oportet re-
media.

Linea. 32

Ex cucumere.) Græce est δια σικyonias, quod est ex cucurbi-
ta syluestri, dicitur alias δια colocynthidos.

Folio. 78. b 6

Latinis incubo est.) Nonnulli incubonem Latine dici ne-
gant, Scribonius Largus eadem dictione utitur compositio-
ne centesima.

Folio. 79. a 16

Attonitum ipsi crus euaserat.) Attonitum hoc est apoplexia
occupatum.

Linea. 24

Omnes faciei subiectæ partes.) Hoc est, partes omnes quæ
a facie usque ad ima habentur.

Folio. 80. a 31

valetudini faciunt.) Hoc est profunt. Celsus sæpissime uale-
tudinem pro sanitate ponit, nullo etiam adjuncto.

Folio. 82. a 15

Commendatur autem lac.) Alterum exemplar scriptum
ἐπιτετι, quod est commendatur, uerum dum sententiam
penitus intropicio, melius habet impressum ἐπιτετι, ut sit

ANNOTATIONES

Cæterum uitari debet lac, caseus, &c.

linea. 20

Iunci rubi.) Græce quidem est $\chi\omicron\iota'$ $\nu\gamma$ quod est iunci rotundi, sed deprauate, pro $\chi\iota'$ $\nu\gamma$, quod est lentisci

b. linea. 28

Sorbitionibus ex chondro & alica.) Hoc ex loco manifestissimum est, Paulo diuersa esse chondrum & alicam, quod a libi monuimus

Folio 83 b. 24

Vbi refrixerint in memoria habeatur.) Peruersa est sententia, sic lege: necubi refrixerint. Sensus est, sudores lanis oleo madentibus abstergere, ne nobis imprudentibus refrigerant, in memoria habeatur.

Linea. 33

Instar erui.) Substantiue hic instar ponitur pro magnitudine loquutio Latinis medicis frequens.

Folio. 85. a. 23

Causa cæca.) Hoc est latente incognita.

Folio. 91. a. 17

Pollinem eius accommodare.) Pollinem accipimus in hoc opere, pro quocunque tenui puluere.

Folio. 94. b. 9

Amygdalarum quibus corticem detraxeris.) Græce est $\lambda\alpha\lambda\upsilon\kappa\alpha\varsigma\mu\epsilon\nu'$ $\omega\nu$, quod est amygdalarum exalbatarum; nos. quia cortice detracto albescunt amygdala, quibus corticem detraxeris, reddidimus.

Folio. 95. a. 17

Vel marrubii.) Impressum exemplar habet $\mu\alpha'$ $\sigma\gamma$ hoc est porri, atque ea lectio magis probatur, quod superius in eodem capite porrum ad aurium dolores Paulus commendauerit.

Folio. 97. b. 35

Aselli domestici combusti.) Corrupta est lectio dictionum Græcarum confinitate, Græce est σ' $\nu\iota\delta\alpha$ quam dictionem nusquam reperio, eoque; putavi legendum σ' $\nu\iota\delta\iota\omicron\nu$ pro multis. lege igitur σ' $\nu\omicron\upsilon\iota\delta\alpha$, ut sit, Vel ononidis combustæ cinerem inspirabis; uel ononidis expressæ succum instillato.

Folio. 95. a. 23

Fuci drachmæ tres.) Fucum uoco quod Græci phycos dicunt, Plinium hac in re sequutus.

ANNOTATIONES

linea.34

Thuris illyricæ.) Hoc est iridis illyricæ: distinguendum a thure est.

b.linea.5

Erui filiquæ.) Græce est λ'ευθα'ς quod per se lomentum significat & filiquam cuiuscunque frugis: hic autem erui farinam legere malim.

Folio.99.a 23

Quanto calidius.) Græce est quanto uetustius sed quia oleum uetustate redditur calidius eo modo transuli.

b.linea.14

Ficus pinguis uiridis.) Hæc in impresso exemplari male sigillatis adiuncta erant, nos ex manuscripto in suum locum restituiimus. Cæterum pro ficus pinguis, legendum est, nucis.

b.linea.16

Pondo triens.) Pondo hic nihil aliud significo, quam pondere, quemadmodum usurpat Largus quum autem solum ponitur, tunc libram signat. Porro triens de unciiis tantum dicitur apud medicos, hic autem male positum est in fine, lege igitur hunc in uerbum: Aluminis latercularii, salis ammoniaci, singulorum pondo triens, myrrhæ, costi, pyrethri singulorum denarii quatuor, piperis &c.

Folio.101.b 32

Spiritus recta ceruice uix trahitur.) Græce est ὀρθοπνοία τε καὶ πόνος μετὰ δύσπνοίᾳς, quod ad uerbum sonat, orthopnoea, labor cum spirandi difficultate, id totum breuissime complexi sumus, per spiritus recta ceruice, orthopnoeam intelligentes: uix trahitur laborem cum spirandi difficultate. Celsum hac in re imitati qui in capite de angina hæc eadem habet.

Folio.102.b 15

Et anguntur.) Græce est in codice manuscripto ἀπὸ ὠνται, quod est tristitia afficiuntur, anguntur: impressum habet ἀπὸ ὠνται, hoc est redeunt ad se, animum recipiunt.

Folio.103.a 17

Sumenalia quæ itria dicuntur.) Barbarus testatur itria dici sumenalia.

ANNOTATIONES

Folio. 104. b 23

Dum tabuerint.) Græce est α' π' τ' ε' π' ω' ι' s, hoc ad uerbum signat, usque ad tertias redactio; atque sic intelligi uolo, dum tabuerint usque ad tertias uidelicet decocta.

Folio. 106. b 14

In pinguedinem languescit.) Græce est υ' π' ο' λ' η' π' α' ρ' ο' ι' j' i' ν' ο' ν' π' α' j, hoc est, subpingues fiunt, quod nos expressimus per, in pinguedinem languescit, qui loquendi modus in hoc sensu Plinio alijsq; Latinis scriptoribus frequens est.

Linea. 14

Hydromelite.) Et hic hydromel pro hydromelo ponitur.

Folio. 107. a 4

Ad magnitudinem cicerum trium.) Græce uidetur habere ceratium, hoc est siliqua, ut sit sensus, ad magnitudinem siliquarum trium aut quatuor. Nos, quia hoc non uidebatur multum conuenire, diximus cicerum. tu utrum mauis elige.

Folio. 108. b 16

Purulenta excreatio quam Græci empyema nominant.) Empyema purulentam colluuiem uoco & excreationem, quæ a sanguinis expuitione facto ulcere neque ad cicatricem perductio fieri solet, probatissimos Latinæ linguæ scriptores imitatus.

Folio. 109. b 14

Pleuritis qui nobis lateralis dolor appellatur.) Lateralem dolorem uocaui, quem Græci pleuritā, authore Plinio; latez dolorem eum qui sine febris est. Celsus utrunque malū, dolorem lateris uocat.

Linea. 17

Dolor a summa.) Multi ita interpretantur hūc Pauli locum sed nos in subscriptum modum legimus: Dolor ad summā humerorum compagem & extremas costarum cartilagine pertinet.

Folio. 111. a 3

Puluerem ex uiæ pauimento.) In hunc modum Celsus ubi de sudore agit in cardiaco morbo, interpretatur id quod Græcis est καθαρισμός τῆς δαΐφρας, quasi dicas purgamenta pauimenti.

Ibidem.

Aliae refrigeria.) Græce est ψυχαιωσις, quod hoc loco refrigerationem

ANNOTATIONES

refrigerationem non delectationem animi significat, ut alias. Nam refrigeria sudantibus maxime ex usu sunt.

Folio. 115. b 25

Contra uentericulum ipsum.) Latinis uenterculus dicitur, qui Græcis stomachus; intelligo autem superiorem partem uentris, quæ sub cartilagine mucronata habetur. huic igitur applicari cucurbitula debet.

Linea. 35

Alimentum ægri sentiunt. Hoc est aluntur, loquutio Plinio & Celso frequens.

Folio. 117. b 35

Lacte caseato harundine demissa.) Legerem hic Græce καλαμαίν, sed impressum bene habet κακλήκων. sic igitur restitue lēctionē uitiatam. Lacte caseato lapillis marinis ignis in id demissis.

Folio. 118. b 6

Acerba uua, combusta.) Græce est ὀμφακίδος, quid hoc sit non comperi, conicio autem ex ipsius Pauli interpretatione glandis calycem esse, ut sensus sit, calycis quernei combusti, est autem hoc contanum &c.

Folio. 126. a 1

Recens caro lota esse uideatur. Sic reddit Celsus quod, Græce ἡμοικ πλυμακπ κρεῖωννισ φαιών.

linea. 16

Recrementa erunt sicciora.) videtur hic deesse in Græco exemplari, & pauciora, tu si uoles addito.

Folio. 128. b 2

Cottabismi & dropaces.) Quid cottabismus sit uide Heramoli Barbari Corollaria in Dioscoridem.

linea. 12

Nonnunquam sanguinis copia.) Græce quidem sic est, uex sequens sententia, ipsaq; rei ueritas πινδ' ματος pro αἵματος legendum esse dicitur, ut sensus sit. Nonnunquam spiritus copia &c.

Folio. 129. a 13

Agresti uua.) Sic uoco interim staphida agriam, aliquando pediculariam herbam.

Folio. 133 a 31

Calcis pondo denarii octo.) Græce est ἄσβεστος quod est, nō restinctæ, atque sic hic & in duabus sequentibus compositionibus accipiendum.

ANNOTATIONES

Folio. 134. a 13

Plumbi retosti quod helcysma dicitur .) Nonnulli sic interpretantur , sed proprie helcysma recrementum argenti est, lege ergo, scorix argenti quod helcysma &c.

Folio. 138. a 31

Aristolochiæ rotundæ.) Deprauatum hic exemplar Græcū est, habet enim μελαμπρίας σπογγύλης, quod est melanteriæ rotundæ, nullo sensu, quum creta sutoria rotunda nusquam legatur. Forte igitur legendum στυπνρίας hoc est aluminis, aut disiunctim melanterii & aluminis rotundi, ut substantium intelligatur in σπογγύλη, quemadmodum in χιςή.

Folio. 140. b 12

Ilicis italico fictili.) Græce est φελλός, Hoc est suberis, ut alias interpretati sumus . Nonnulli uero ilicem exponunt.

Folio. 142. b 10

Nigro Serapionis.) Intellige Melinum dictum, non nigrum.

Folio. 152. b 18

Lege consortii quod.) Hoc est per consensum. modus loquendi Celso peculiaris.

Linea. 21

Artus intricet humor.) Artus hic uoco, quod Græci αἰματόεσσι, membra nimirum motui dicata, alias articulos forma diminutiva dicimus. Idem facio in dictione καὶ λόν manus & crura, ea comprehendens. Barbari membra uertunt.

Folio. 156. b 6

Eiusdem aceti imbre.) Hoc est, aceto irrorato. Celsus sic loquitur.

Linea. 26

Sed crudi uini etiam assument.) Crudi dicuntur & homines & cibi: homines qui nondum concoctionem obierunt: cibi qui nondum concocti sunt.

Folio. 157. b 29

Podagram quæ iam constiterit.) Hoc est quæ iam confirmata fuerit. Nam id proprie συστασθαι significat. huic confine est, radices agere.

ANNOTATIONES

Folio. 159. a 35

Vel ovi luteum fabarum lomento cum aceto incoctum.)
Duplici modo hæc sententia intelligitur: Primum ut expo-
suimus, deinde in hunc modum, uel putamen fabaceum cū
aceto incoctum: Sed scriptum exemplar superiorem sentē-
tiam magis refert.

Linea. 32

Fit autem in pedis & manus præcipue pollicibus.) Impres-
sum exemplar hæc non habet, quanquam sensus requirat.
Nos igitur ex Marcello Dioscoridis interprete. Paulum ci-
tante hæc restituimus

ARGVMENTVM LIBRI TERII.

In hoc tertio totius operis libro de singularum corporis par-
tium affectibus disputatio est: quæ à summo capite incipiens, in
imos pedes desinit.

CAPITA TERTII LIBRI.

I	De pilorum affectibus, de areis, & calui- tio	62
II	Quomodo pili crispī fiant, & tincturis infi- ciantur, ex Cleopatraz libris quos de capil- lis crispis faciundis prodidit	64
III	De capitis affectibus cutem infestantibus, fur- furibus seu porriginē, quæ pityriasis dici- tur.	65
IIII	De capitis dolore quem Græci κεφαλαλγία uocant	67
V	De cephalæa & hemicrania	68
VI	De phrenitide	70
VII	De inflammatione cerebri	72
VIII	De erysipellate cerebri	ibidem
IX	De lethargo	ibidem
X	De catotocho aut uigili comate	73
XI	De memoriæ iactura & ratiocinationis item de sopore & fatuitate	74

i ii

XII	De uertiginibus	ibidem
XIII	De morbo comitiali	75
XIII	De melancholia	77
XV	De incubone qui ephialtes græce dicitur	78
XVI	De lycaone uel lycanthropia, id est, hominū in lupos conuersione	ibidem
XVII	De amantibus	79
XVIII	De apoplexia & hermiplexia, uel paraly si	ibidem
XIX	De conuulsionibus	82
XX	De cervicis morbis nempe tetano eiusq; dif- ferentiis	83
XXI	De tremoribus	84
XXII	Ocularia & primum de dolore ex Galeni cō mentariis	ibidem
XXIII	Auricularia, & primū de aurium dolore	93
XXIII	De narium & olfactus uitiiis	96
XXV	Ad faciei uitia, Quomodo facies a rugis affe- ratur	98
XXVI	De oris affectibus, & primum de dentium dolore	99
XXVII	De angina, eiusq; speciebus, ubi ē de strāgu- latis, uel alio modo suffocatis agitur	101
XXVIII	De grauedine, destillatione raucitate & tuf- si.	102
XXIX	De orthopnoea, suspīrio, & spirandi difficul- tate	105
XXX	De peripneumonia	ibidem
XXXI	De cruentis sputis	106
XXXII	De purulentis, & tabe q̄ phthisis dicitur	108
XXXIII	De laterali dolore, qui pleuritis dicitur	109
XXXIII	De cordis affectibus	110
XXXV	De mamillarū affectibus	111
XXXVI	Ad fœdū axillarū odorē sedationesq;	112
XXXVII	De stomachi, præcordiorū, & uentriculī affe- ctibus	ibidem
XXXVIII	De flatu uentriculī	114
XXXIX	De cholera	115
XL	De leuitate intestinorum quæ lienteria dicitur & coeliaco affectu	116

XLI	De tenesmo	ibidem
XLII	De torminibus, quæ dicitur dysenteria	117
XLIII	De morbo intestini plenioris quem Græci colicon appellant	118
XLIII	De tenuioris intestini morbo, qui ileos dicitur	121
XLV	De renum & uesicæ affectibus, & primum de calculo	ibidem
XLVI	De iocinoris affectibus	125
XLVII	De malo corporis habitu qui cachexia dicitur	128
XLVIII	De aqua inter cutem	ibidem
XLIX	De lienosis	130
L	De morbo regio quæ icteros græce dicitur	131
LI	De umbilico procidente	132
LII	Quomodo impuberes imberbesque; diu maneant, & particulæ naturales testesque; ita conseruentur, pilique; aboleantur	133
LIII	De ramicum generibus	ibidem
LIII	De inflammatione testiculi scrotique; , & aliis ipsorum affectibus	134
LV	De seminis profluuiis & ueneris infomitiis	135
LVI	De satyriasi	ibidem
LVII	De priapismo	136
LVIII	De particulis inefficacibus	ibidem
LIX	Pudendorum & ani remedia	ibidem
LX	De uteri affectibus, & primum de mensium purgatione	138
LXI	De mensium suppressione	139
LXII	De immoderata purgatione uteri, & sanguinis profluuiis	140
LXIII	De fluore muliebri	141
LXIII	De inflammatione uteri & declinatione	ib.
LXV	De uulvæ abcessu	142
LXVI	De uteri exulceratione	143
LXVII	De cancro	144
LXVIII	De scirrho & duritie	ibidem
LXIX	De mola	145
LXX	De inflammatione uulvæ	ibidem

LXXI	De uulvæ strangulatu	146
LXXII	De uulvæ procidentia	ibidem
LXXIII	De muliebrium locorū clausura, quam phi-	
	mon appellant	147
LXXIII	Ut sterilis mulier concipiat	ibidem
LXXV	De uulvæ scissuris, condylomatibus, & hamor-	
	rhoidibus	149
LXXVI	De partu difficili	ibidem
LXXVII	De coxarum morbis	150
LXXVIII	De podagra, & articulariis morbis	151
LXXIX	Ad permiones, qui tum pedum plantas, tum	
	calces infestant	158
LXXX	Ad clauos callosq;	159
LXXXI	Ad unguium uitia, & primū de reduciis	ib.

ANNOTATIONES IN LIB. IIII.

Folio. 161. a 23

Elephantiam nunquam curari.) Elephantia & elephā-
tias teste Plinio utroque modo dicitur, ut libro uige-
simo, capite decimo: Eadem in aceto cocta, cōtra ele-
phantiam proficit. Et libro uigesimo sexto cap. 1. diximus
elephantiasim ante Pompei Magni ætatem non accidisse
in Italia, & ipsam a facie sæpius incipientem: ubi hoc malū
elegantissime describit Plinius. dicta autem est elephantia-
sis ab elephantorum cutis similitudine. Hinc elephantici
uulgo leprosi. Græcis hoc uitii ελεφαντία, ελεφαντία & ελε-
φαντίασις, uocatur.

b. linea 6

Non fisso sed recens muleto lacte.) Inuenio apud probatos
authores, utpote Largum, Celsum Plinium, alumen fissum,
scissum & scissile: ita & lac, quum eadem dictio Græca sit,
χλιδόν.

b. linea 9

Acremento autem uomitus.) Græce est, ἀρρυμπαγία, quasi
dicas acrium esus. Verum intelligitur apud Græcos scripto-
res uomitio acrium ciborum esu concitata. Plinius lib. 20,
cap. 7. accrementum aceti dixit: Palladius acredinem cepo-
rum; cæteri acrimoniam.

AN NOTATIONES.

b. linea. 12

Malo uictis.) Hoc est deploratis, Græci uocant *πο'σω κενρατα μεν'ον*. Celsus libro quarto capite quarto. Quibus si non fuerit æger adiutus, scire licet malo uictum. Idem artem malo uictam dixit libro quinto, capite uigesimosexto sic scribēs. Ne si uicta ars malo fuerit, uel ignorasse uel fefellisse se uideatur. Item libro sexto capite decimo octauo. Si medicamenta uincuntur.

b. linea 16

Metasyncritica dicunt.) Hæc sunt proprie medicamenta quæ in morbi refectione adhibentur. Nunc Latini uocant noxios humores euocantia, nunc re corporatitia; prius autem hic magis congruit.

Folio. 162. a 1

Vini primæ notæ.) Hoc est excellentis & generosi.

linea. 10

Porro.) In uno exemplari erat *πρα'σιον* hoc est marrubium reliqua duo habebant *πρα'σον*, quod est porrum.

linea. 18

Manu molliter permulceri debent.) Græce est *ψυλαφαρι* quod est molliter contrectare manibus, ut Celsus libro tertio cap. 9. Ex aqua frigida cui oleum sit adiectum corpus eius pertractandum est. Idem permulceri utitur eiusdem libri capite uigesimotertio. Vbi inquit, mane experrectus est, corpus eius leuiter ex oleo uetere cum capite, (excepto uentre) permulceatur. Et libro quarto ca. ultimo: Leuiter unctis manibus corpus permulcere.

linea. 20

Nunc saltu.) Omnia exemplaria habebant, *τα' μεν' α'φαλα λο'μενος, τα' δε' πλε'ων. α'γκτη ρσοιτεκα'κορυ'κω χρω'μενος*, hoc est ad uerbum: Partim saltans, partim nauigans anctibus utens, & coryco. Nos autem uertimus. Nunc saltu nunc remigio, *πλε'ων* participium sit. Nam & remis agitandis corpus exercetur. Inclinabat autem animus *πλε'ων* legere: ut esset: Nunc saltu, nunc autem magis anctibus & coryco utens. Verum magni aliquot uiri nominis, priorē lectionē probant exemplaribus suffragantibus. Porro quum quotidie disquirerē, quid essent ancteres, nec reperirē quid huc faceret, Guglielmus Budæus unicū literarū decus, humaniter me submonnit pro ancteres hic legendum esse halteres, quod

i iiii

ANNOTATIONES.

ego statim arripui, ac ita deinde sententiam legere malui.
Nunc saltu, nunc autem magis halteribus uti & coryco. Qui enim apud ueteres saltu certabant, ii halteribus utebantur. Sunt autem halteres pilæ plumbæ massulæ ue quibus utraque manu se librabant ut certius assilirent. Martialis.

Quid pereunt stulto fortes haltere lacerti?

Exercet melius uinea fossa uiros.

linea. 33

Offa ex polentis.) Hoc est pulicula ex farina ordeacea. Græce est *μῶζα*, quod Hermolaus Barbarus & Theodorus Gaza offam exponunt.

b. linea. 5

Acria sine periculo.) Hæc sententia ita erat acria non sine periculo (exceptis condimentis) ingeruntur, id est acria adimenda sunt exceptis condimentis. atque ita, si placet, lege.

linea. 9

In dulciariorum genere.) Hoc est melitomatium, quasi dicas ex melle confectorum.

Folio. 163. a 6

Aesculapii medicamentum.) Latine reddidi quod Græcis dicitur Asclepion.

linea. 25

Aselli.) Hoc est multipedes, qui Græce *ὀνίσκοι* & *πολύπδες* appellantur, humectis in locis agentes. Alii malunt, sub hydriis, id est uasis aquariis.

linea. 37

Marinæ arenæ usus.) Hoc est in marina arena saburratio, si quid intelligo.

b. linea 10

Lepra altius circularibusq; erosionibus.) Vulgo lepram uocant, quæ doctis est elephantia siue elephantiasis, maxime inter se diuersa.

Folio. 164. a 4

Donec tabescât.) Celsi loquutio est. Græce sonat *ἕως φρὺπῶν*, in eodem fere sensu.

linea. 5

Oleo adiunge ceræ tractæ.) Cera tracta, candida est, auctore Photione, a quo & uerbum *τεκνῶν*, pro eo quod est perficere ac subigere ut alba fiat cera.

ANNOTATIONES

linea. 14

Lotariæ rubræ. Græce est *λωταρία ε' ρυθρα*, ut sit pluralis numeri. Herimolaus quoque citat ex Paulo, lotarium rubens quasi diminutivum lori. Nisi quis non de loto Aegyptia, sed de sylvestri potius accipiat. Est etiam pastillus apud Paulū, dia lotarion uocatus, ad naturalium sedisq; uitia.

b. linea 10

In uetustatem incidentibus.) Celsus sic loquitur, lib. 3. cap. 14. Si uero (inqueus) primis diebus discussus morbus non est, inciditq; in uetustatem &c.

linea. 21

Sulfuris uiui.) Scribonius largus uiui ponit, ubi Celsus igne non experti, Græce est *α' πυρον*.

linea. 35

Coctam liquatamq; illinito.) Græce est *τακτερωθει' σαρ*, hoc est *τακτε' σαρ* uel *μαλακωθει' σαρ*.

Folio. 165. a 27

Cineris lixiui stillatitii.) Idem est quod lixiuiæ. Verum quia *κονια* Græce multa significat, ut certior fieret res, cinis lixiuius stillatitius dictus est, non aliter quam si lixiuiam & lixiuum cinerem simpliciter diceremus.

b. linea 5

Parygro.) Hoc est liquido, uocatur ita etiam latinis.

Folio. 166. b 30

Vua cum ouorum aquato. Columella ita loquitur Scribonius Largus, compositione uigesimatertia: hoc quidem etiam in initiis ununtur cum oui aquato liquore per se. Idem uocat aquasissimum compositione uigesimafexta. Oportet iniquiens, eo ad sordida ulcera diluto cum oui albo, id est aquatissimo uti.

Folio. 167. a 12

Stigmata curabis.) Stigmata in uetere medicina dicta sunt, non puncta, sed maculis punctoꝝ quantitate & forma decolorata hominis cutis. Porro latinis etiam in usu est ea dictio. Largus compositione ducentesima & trigesima primas Qua stigmata tolluntur.

Ibidem.

Quod matulæ adhærescit.) Hoc est, quod ex urina in matula solet colescere. Ut enim urina acris exterendis maculis est potentia, ita nimirum & id quod ex urina reliquum matu-

ANNOTATIONES

læ adhærescit.

b. lineæ. 7

Græci exanthemata uocant.) Exanthemata pustulæ sunt exiguæ, quales ex urtica uel sudore fiunt, eodem plerunque quo & cutis colore. Et quoniam turgentium ad florem gemmarum in plantis modo tument, ideo exanthemata a Græcis dicta fuerunt, ἐξάνθημα enim illis signat florescere. Plinius hoc genus aliquando papulas, aliquando pituitæ eruptiones, sæpe etiam papularum eruptiones & exanthemata uocat.

Folio. 168. a 5

Splenio illitas imposito.) Hoc est ob longo emplastro, lenis modo facto. Plinius. Superimponi oportet splenium e melle decocto.

Lineæ. 30

Gliscentibus capitis ulceribus.) Hoc est manantibus Græci uocant ἀχνοῦρας.

Lineæ. 35

Ambusta igne medicamentis.) Plinius sic uocat, quæ πυρὸς καύται Græcis dicuntur.

Folio. 169. a 12

Fici pinguis.) Græci est καρπύης, quanquam Latina sit dictio quam Græci uocant ἰχάδα ficum siccata, nisi quid aliud in uicem huius sit legendum. Porro sicca ficus pingues potius sunt quam recentes. Celsus lib. quinto ponit ficus lincas piuguis siuas.

Lineæ. 30

Abrasa & superficiem instantia ulcera.) Recentiores interpretes ἀποσφραγιστά uertunt desquamata. Scribonius Largus abresa, ut in compositione 215. sic scribens. Facit ad tenera, mediocriter læsa, & abrasa, quæ ἀποσφραγιστά Græci dicunt.

lineæ. 35

Olei sesquihemina.) Impressum habet sesquicyathus, tu utrū libet accipe.

ibidem. 31

Heliotropii magni fructus.) Hic fructus pro semine positus est. Græci sæpe confundunt καρπὸν & σπέρμα.

b. Lineæ. 33

Nostri inflammationes, Græci phlegmonas uocant.) vbi.

ANNOTATIONES

que hic inflammationem interpretor, Græcorum φλεγμονή, quam hodie phlegmonem Latine efferunt: φλογοειδής, feruidam inflammationem. atque hoc in uniuersum dictum uelim.

Folio. 171. a 3

Lomenti drachmæ sex.) Fabarum farina est lomentum. Ponitur etiam aliquando, fabarum lomentum.

b. Linea 2

Aqua mulsa, posca, uino & mulso utendum est.) Mulsa Græcis dicitur melicratos; Mulsum est ænomeli.

Linea. 16

Tenera calami radix.) Hoc est arundinis.

Folio. 172. a 17

Ex humorum decubitu prouenerint.) Græce est ἀπὸ σκήμματος, dicitur & una dictione ἀπὸ σκημματος. Nominant sic dispositionem, quum qui prius unum membrum infestabāt humores, eo relicto ad alterum transeunt.

b. linea. 7

Emmoto medicamine.) Hoc est, linamentis carptis excepto. Nam μοῖρα ex significat. Scribonius Largus circumlocutione usus ita fere exponit, compositione ducentesima & trigesima septima. Cum opus est inquit, cochlearia tria rotæ cyatho permiscantur, inde linteola carpta continguntur, atque ita ulceri superponuntur.

Folio. 173. b 25

Stercoris plumbi triens.) Celsus recrementum plumbi uocat, σκαρία μολύβδου, Largus stercus plumbi, ut compositione octaua & quadragesima. Ad ulcera in naribus plumbi stercus, quod scoriam dicunt.

Linea. 28

Seui caprilli curati.) Græce est περιεπωμένον. Hoc Celsus simpliciter exponit, curatis ita scribens libro quinto cap. 19 περιεπωμένον & Græci appellant, quæ curata uocant, quum ex seuo puta, omnes membrulæ diligenter exemptæ sunt. Largus similiter adipem curatum dicit, compositione ducentesima & uigesima secunda. Qui præcedente compositione significantius & manifestius purgatum adipem suillum posuit. Hac eadem ratione, & cadmiæ curatam inuenies dici a Celso, ut libro sexto, capite sexto, in Collyrio Cleonis.

ANNOTATIONES

Folio. 174. a 4

Erysipelas qui sacer ignis latinis dicitur.) Plinius aliq; ueteres, erysipelas uocabant, sacros ignes, Celsus tamen ut diuersa genera describit.

b. linea. 30

Myrtei pondo, unguenti quincuncem.) Hic locus ita uideatur intelligendus, Olei myrtei pondo, unguenti myrtei quincuncem.

linea. 36

Ex cruda polenta.) Græce est ὠμὴ λυσίς, hoc est farina ordeï sine coctione soluta.

Folio. 175. a 11

Phyma.) Latini scriptores, ut Plinius, & Celsus eadem Græca dictione utuntur, quemadmodum & phygethlo.

linea. 20

Eubones qui prolapsu.) Græcum est προπίσσεσι. magis placet, collisu, quanquam & superiore modo non indocti exponunt.

linea. 31

Ulceris in quo id prouenerit.) Hoc est ulceris in quacunque corporis parte prouenerit, habenda est ratio.

b. linea. 29

Furunculus.) Est ulcus nascens passim in quacunque parte corporis. Græcis δ'οθήν uocatur. Non desunt tamen qui phygethlon furunculum exponant.

linea. 34

Triticum commansum & impositum.) Sic lege. Hic enim peculiaris in furunculo tritici usus est. Sic autem uenit intelligendum. Prius dentibus conteras, inde friatum ulceri inducas.

Folio. 176. b 4

Confestim circumscribuntur.) Græce est περιγράφοντες. Est autem circumscribere scalpello, idem quod circumsecare.

linea. 22

Ad sordium spissitudinem.) Manuscriptum exemplar habet μέχρι μελιτωδου συσσεως, quod est ad mellis crassitudinem.

linea. 30

Animene.) Græca dictio est, quemadmodum & emmoza, significans medicamentum solum. Poteris etiam latine

ANNOTATIONES

si mauis legere, ut sit, Cerata cephalica soluta, & in linteo-
lum illita.

Folio. 178. a 1

Ad carcinode.) Celsus eadem dictione utitur in iis ulceri-
bus quæ cancerum resipiant, libro quinto capite decimo-
octauo. Carcinode uero phymata commode his delin-
nuntur.

linea 26

Atque indolens tumor.) Indolens hoc est nequaquam do-
lens. Sic etiam intelligo capite trigesimo Magna ex parte
indolens.

b. linea. 8

Mollissimum ellychnion.) Ellychnion est quod ex papyro,
sparta, cannabæ, aut stupa, tortum, in lucernis uritur.

linea. 29

Visceribus oleum tenuius.) Sic uoco oleum quod Græci λε-
πιμαρπὲς dicunt, alii reddunt tenuium partium.

Folio. 179. a 29

Ibidem diuortiuu expertis.) Hoc est segregatis solu-
tisque.

Folio. 180. b 10

Ex petasone confectum.) Hoc est ex perna quod Græce δια-
pternes inscribitur.

Folio. 181. a 18

Olei ueteris pondo dua.) Vetusso more dictum dua pro
duo, quomodo Scribonius Largus sæpe loquitur, ut in
compositione quadragesima quinta Spumæ argenteæ pon-
do dua.

Folio. 183. a 34

Massiche Aegyptiaca & hyssopon.) Omnia exemplaria ha-
bent hyssopon deprauate nimirum, pro cæsypum, qui error
in Græcis exemplaribus frequens est.

linea. 35

Dictum aceron.) In septimo hoc medicamentum aceros
à Paulo dicitur, magis autem proprie aceros dicitur, quasi
ceræ expers.

Folio. 184. a 26

Viridia diluta.) Hoc est, cum alio soluta. Forsan remittentia
hoc est, lena reddita.

AN NOTATIONES

Linea. 27

Pastillusq; nigrouiridis.) Is est, qui melanchloros Græcis dicitur.

Folio. 185. a 24

Hæc & meliterion nomis proficient.) Est autem meliteriū diminutivum Meliteræ dicti medicamenti cuius Paulus capite quadragesimo meminit.

Folio. 186. b 26

Resinæ pitynæ.) Hoc est, resinæ e picea, teste Scribonio in compositione ducentesima prima.

Folio. 188. a 4

Nisi emissarium quoddam.) Græce sonat ὁ πρῶτος. Largus uocat ὁ πρῶτος, compo. ducentesima sexta.

Linea. 26

Rubra appellata.) Græce dicuntur κίρρα.

Folio. 189. a 15

Radix feruefacta. Magis placet circumrasa, ut habet exemplar manuscriptum.

Linea. 33

Finguntur collyria. Non solum medicamenta oculorum, sed aliarum quoque corporis partium collyria dicuntur. Celsus de ani fistulis libro septimo, capite quarto sic scribit: Si intus aliqua procedet, quo ferrum tuto peruenire nō poterit, collyrium demitrendum erit.

Folio. 193. b 15

Ceræ unguentariæ.) Hoc est odoratæ, qua unguentarii utuntur.

Linea. 34

Ancylas & ancyloses.) Celsus ita interpretatur, li. quinto capite decimo octavo: Recenti cicatrice contractos articulos, quas ἀγκύλας Græci nominant. Largus autem sic: Omnem tensionem & contractionem neruorum & ligationem, ἀγκύλην Græci uocant.

Folio. 194. a 29.

Ex alto in partem deturbatus.) Sic exposui uerbum καταρτίζειν, quod est fotum superne adhibere.

Folio. 197. a 24

Tum præcipue quum inaniti fuerint.) Græce est, ὅταν ἐπὶ τοῖς φέσις ἔχῃ, id est, quum alimento nondum destituti fuerint.

ANNOTATIONES

b. Linea. 22

Cutem linamento penetrabis. Hoc est, linamentis cuti infer-
tis curationem absolues. Nam διαμoρg signat linamenta
insinuare seu inferere.

ARGVMENTVM LIBRI QVARTI.

In hoc quarto totius operis libro affectus explicantur qui non
ceris assignari sedibus, sparsim exteriora potissimum corporis
infestant,

CAPITA LIBRI QVARTI.

I	De elephantia	161
II	De lepra & scabie, quæ pfora dicitur	163
III	De impetiginibus	164
IIII	De pruritu	165
V	De leuca.	ib.
VI	De alphi albo & nigro	166
VII	Ad stigmata, ex commentariis Archige- nis	167
VIII	De pituitæ eruptionibus, quæ exanthemata uocantur	ibidem
IX	Ad epinyctidas	ibidem
X	De pustulis quæ græce phlyctænæ dicun- tur	168
XI	Ad ambusta igni	ibidem
XII	Ad eos qui flagris cæsi sunt	ibidem
XIII	Quomodo pili adusti renascantur	169
XIIII	Ad abrasa, quæ aposyrmata Græci di- cunt	ibidem
XV	De formica & uerruca	ibidem
XVI	De ganglio	ibidem
XVII	De inflammatione	170
XVIII	De exterioribus corporis abscessibus	171
XIX	De gangræna & sphacelo	172
XX	De herpete	173
XXI	De erysipellate, sacrum ignem dicunt	174
XXII	De phymate, bubone, & phygethlo	175

XXIII	De furunculo qui dothien appellatur	ib.
XXIII	De terebintho	176
XXV	De carbunculo	ibidem
XXVI	De cancro	177
XXVII	De molli & laxo tumore, qui oedema Græcis dicitur.	178
XXVIII	De inflatione	ibidem
XXIX	De luxatis & contusis	179
XXX	De carne contusa, & sanguinis subter cutem ecitu, quod græce ecchymoma dicitur	ibidem
XXXI	De ruptis & conuulsis	ibidem
XXXII	De scirrhis	180
XXXIII	De strumis	ibidem
XXXIII	De steatmate, atheromate, & meliceride	181
XXXV	De fauis	182
XXXVI	De simplici ulcere	ibidem
XXXVII	Quæ ulcera glutinare possint	ibidem
XXXVIII	Si dolor & inflammatio ulcera exerceat	183
XXXIX	Si maturari & ad suppurationem perducī ulcera nequeant	ibidem
XL	De cauis ulceribus	ibidem
XLI	Quæ sordida ulcera purgent	184
XLII	Ad ulcerum uermes	ibidem
XLIII	Quomodo caro ulceribus supercrescens exedatur	ibidem
XLIII	De ulceribus serpentibus, & putridi, phagedæna	185
XLV	Quomodo cicatrix ulceri inducenda sit	186
XLVI	De maleficis ulceribus, dolosisque cacoethe Græci uocant alias Chironia & Thelephia	187
XLVII	Ad cicatrices nigricantes	ibidem
XLVIII	De sinibus	ibidem
XLIX	De fistula	189
L	De ulceribus disruptis	ibidem
LI	De articulorum ulceribus	190
LII	Quæ spicula, surculos, spinas, & consimilia educunt	ibidem
	Si ex	

LIII	Si ex uena, arteriave, & naribus sanguis profluat	ibidem
LIII	De nervis contulneratis	191
LV	De articulorum contractione, seu ligatione, quæ ancyle dicitur	193
LVI	De articulis relaxatis	194
LVII	De lumbricis	ibidem
XVIII	De ascaridibus	196
LIX	De dracunculis	197

ANNOTATIONES IN LIB. V.

Folio, 198. a 10

DE uirulentis bestiis præcipientes.) Græci uocant ἰοβο'λυσ, hoc est uirusiaculantes, siue ictu siue uorsu.

linea. 26

Melanthii, syluestris cumini.) Græce est μελανθί' & ἄρι' & κυ' μ' & σπέρμα. quod ad uerbum sic sonat, melanthii syluestris & cumini semen. Verum quum melanthii syluestris nec a Dioscoride nec Galeno, aliis uel scriptoribus qui de simplici medicina tractant, ulla fiat mentio, putavi legendum, Melanthii & cumini syluestris semen.

linea. 35

Præsertim pino aut picea.) Magna inter doctos concertatio est, de pinu & picea, quomodo Græcis appellari debeant. Alius enim pinum uocat πύ'κην, alius κω'νον: picea uero hic πί'τυν ille πύ'κην. Nos autem Theophrastum cum Plinio cōferentes. πί'τυν piceam dictam esse inuenimus, πύ'κην tēdā Verba Theophrasti ita sonant, σιω'ρεται μόν' πί'τυς ἐκ τῶν λιπαρώτατων ξύλων πύ'κης καὶ πί'τυος. hoc est, Colligitur præcipue pix ex pinguisimis lignis peuces & pityos. Quæ omnia Plinius pariter indicauit, libro decimosexto, capite decimo, & undecimo, copiosiore resinam & liquidam piceam fieri ex tēdā & picea testatus. Adde quod Scribonius Largus compositione ducentesima prima resinam pityinā interpretatur resinam e picea. Κω'νον, pinum dici multorum testimonio corroborare possem. Hoc itaque in uniuersum dictum uelim, semper in eum me uertisse modum,

k

ANNOTATIONES

præterquam hoc in loco, ubi πῦρ pinum interpretatus sum, Dioscoridis interpretes sequutus

b. linea. 12

Homo adhibendus est qui uulnus exugat.) Græce est ἐκμυζῶν, hoc Celsus ad uerbum fere expresit, lib. 5. ca. 27. Si, inquit, ne id quidem est, homo adhibendus est qui uulnus exugat.

b. linea. 18

Partes scalpello exasperentur.) Græce est uerbum κατὰ καὶ ξείν, quod est scarificare: quod Celsus nunc cutem exasperare, nunc cutem incidere dixit, ut libro sexto capite quarto. Quidam hæc genera arearum scalpello exasperant.

linea. 33

Lixiua. Sic interpretati sumus κοιλία γὰρ κτην. Rationē in annotationibus in lib. 2. reddimus.

Folio. 199. a 11

Desudationes.) Hoc est sudoris prouocationis, de quibus lib. primo cap. 48.

b. linea. 16

Hydrophobiam Græci appellāt.) Celsus hoc genus morbi miserrimum, aquæ timore appellat, lib. 5. ca. uigesimo septimo. Solet inquit, ex eo uulnere, ubi parum occursum est, aquæ timor nasci ὕδροφοβία Græci appellant: Miserrimum genus morbi, in quo simul æger & siti & aquæ metu cruciatur. Scribonius Largus eodem fere modo interpretatur cōpositione ceterima septuagesima prima, aquæ hoc est liquoris metum interpretatus.

b. linea. 18

Sui fastidio. Græce est μετα ἑαυτοῦ, quod alii interpretantur, cum suorum ignorantia grammaticos Græcorum citātes, qui ἑαυτοῦ exponunt ἑαυτοῦ. Non male autē dicas cū animi desponsione.

Folio. 200. a 27

Prius fomentis adiuta.) Hæc locutione utitur Celsus lib. 4. cap. 4. Thorax fomentis cataplasmatiscq; calidis, aut siccis, aut etiam humidis adiuuandum est.

Folio. 201. a 11

Lata manu morsum ferito.) Celsus libro quinto capite uigesimo septimo eandem sententiam fusius exponit. Sā

ANNOTATIONES

manus uulneri imponitur, superq; id duobus digitis uer-
beratur.

linea.21

Ad feruidas autem iam morsus.) Græce est προ δὲ τὰ ἡδ' ἢ
πεπρωμεν' α τὸν δ' ἡμ' α τὸν, hoc est ad morsus quos inflam-
matio iam feruida inuasit.

linea.32

Lac ficulneum.) Hoc est liquor ficulneus: sicut lac papaue-
ris. lac silphii, aliorumque consimilium, pro liquore aut la-
chryma.

b.linea.9

Lingua sermonē manifesto nō explicat.) Græce est γλωσ-
σῆς α σκφεια quasi dicas linguæ obscuritas. Celsus lib.4.ca-
pite secundo: Si lingua resoluta est, quod interdum per se
interdum ex morbo aliquo fit, sic ut sermo hominis non
explicetur.

b.linea.26

Periculo subtrahere.) Id est succurrere. Celsus lib.2.cap.7.
Vix ulla medicina periculo subtrahit.

Folio.202.a 9

Particula intenditur.) Hic particula pro pene ponitur,
Græce est μὲν.

Folio.203.a 14

Mali punici dulcis corium.) Mali corium dicitur teste Plin-
io lib.23.cap.6. quod ad coria perficienda eo utuntur.
Græcis est sidion, Scribonius Largus uocat etiam mali gra-
nati corium compositione ducentesima trigesima quarta.
Si inueniens, maior tumor erit, mali granati corium ex
aqua coctum & tritum lenticulæ pari pondere admisceri
oportet.

b.linea.9

Depastio ipsam inuadit.) Hoc est ulcera quæ depascunt, No-
mæ Græcis appellantur, quod serpendo depascendoque
corpora hominum infestent. Plinius etiam Græca dictione
utitur.

Folio.204.a 22

Similiter cum farinæ polline. Nempe ordeaceo farinæ pol-
line, quem Græcis diximus uocari πεπ' α λην α λφί τς, pro ip-
sa polenta, seu farina ordeacea.

linea.32

De amphibæna.) Hoc animal biceps est, autore

k ii

ANNOTATIONES

Galeno, & utraque parte ingreditur, unde nomen illi inditum est.

b. linea. 3

Dryinus in quercum radicibus.) Hæc belua a quercubus nomen sortita est, quod in radicibus earum uiuat in Hellesponto, odore tetro, qui & eam prodit.

b. linea. 15

Tormina.) Græce est *σποφός*. Nos tormina interpretati sumus, significantes ea dictione quemadmodum & Celsus graues quidem, non tamen omneis, nec in qualibet hominis parte dolores, sed eos duntaxat qui circa umbilicum, omneque id spatium quod in anteriore homine ab hostiolo stomachi ad umbilici partis descendit, hominem torquent, non morbi genus aliquod constituentes, sed alterius morbi comites & symptomata, ut Græci uocant. Tormina intestinorum ab his torminibus diuersa sunt, eadem tamen ratione apud Latinos nomen inuenerunt, Græci uocant dysenteriam.

b. linea. 22

Qui hæmorrhici ictum senserunt.) Hæmorrhoids & hæmorrhoids a sanguinis effectum nominantur, qui toto corpore percussis effluit; ille mas, hæc foemina est. Vtrique color arenaeus, magnitudo palmorum trium, crassitudine paulatim in tenuitatem descendente, incessu tardo & directo serpūt, rufis, ut quidam scribunt, pedibus; maculae per totas multae partim atræ, partim candidæ, squamis, asperæ, ob id ingredienti strepitu sese produnt. Foemina in aluum iacet serpēdo, meatumque uersus caudam inferiore situ continet; mas autem uersus aluum habet, ceruicemque serpendo porrigit. Foemina perniciosior, ut ex cuius ictu dentes, gingiuae unguesque decidant.

Folio. 205. a 21

Natricis morsu uulnus factum.) Natrīx primum in terra uiuit, & cherfydros appellatur, deinde in aqua. Similis est aspidi pusillæ, præterquam quod ceruicem latam non habet ut aspidēs.

b. linea. 1

Inexpugnabili dormiendi necessitate premuntur.) Græce est *ληθαργικοί*, quod sonat, lethargici fiunt.

ANNOTATIONES.

linea. 3

Resectis siquidem ipsis.) Hoc est dissectis ipsis & diuisis.

Folio. 206. a 12

Quum basiliscus momorderit.) Pestilentissimum sine dubio omnium animalium est basiliscus, quod a triplici frontis apice & candida in capite. ut ait Plinius macula, & quodam diademate insigni, ita appellatum est duodecim non amplius digitorum magnitudine, cuius uel sibilum animantes nullæ perferunt, præter mustelam, a qua uincitur. Adeo naturæ nihil placuit esse sine pari.

linea. 19

Pastinaca & muræna.) Pastinaca piscis Græce τρυγαν, turturi æquiuoca appellatione uocatur.

Folio. 207. a 24

De uenenosis medicamentis.) Sunt qui dictionem medicamenti de uenenis non recte dici putent, ut pharmacum de medicina, eoq; superiore anno quum librum quendam Galeni in lucem dedissem barbarum me uocabant, qui usurpauit pharmacum pro medicamento; nec grauatim id tuli, quum in ea re authores habuerim classicos, quos imitantes etiam errare honestum censuimus.

Eadem linea.

Ea pars quæ præcauere illa & declinare præcipit.) Hanc partem προφυλακτική Græci scriptores appellant, quæ uidelicet tradit, quomodo se quis contra iniurias insidiantium muniat.

b. linea. 19

Ipse rex Mithridates usus est.) Hanc historiam ad uerbum fere ex Galeni commentario de theriaca ad Pisonem transcripsit Paulus.

Folio. 208. b 30

Aphronitrum.) Græce quidem sic est, uerum corrupte pro aconitum; quum Paulus inter uenenorum remedia, aphronitri non meminerit. Aconiti autem remedia ponit cap. 46

Folio. 209. a 6

Vinum copiosum raptim.) Græce est αἰσῶς, quod raptim & uniuersim cumulatimq; significat, atque hoc post balneum nihil deterius.

linea. 10

Qui cantharidem assumpserunt.) Nomine cantharidum e

K iii

ANNOTATIONES

nostris aliqui etiam scarabeos, maxime pilularios accipiunt, qui canthari dicuntur. Plinius: Est (inquit) & cantharus dictus scarabeus parvus fruteta erodens. In qua parte cantharides uenenum habeant, inter authores non conuenit. Alii in pedibus & capite existimant esse, alii negant. Hoc inter omnes constat, pennas earum auxiliari, in quacunque parte sit uenenum.

b. linea. 1

Bubrestis potione ingesto.) Bouni pestis acerbissima est bubrestis ac inde illi a Græcis nomen inditum, teste etiam Plinio libro 30. cap. 4. ubi sic scribit: Bubrestis animal est rarum in Italia, similitudinem scarabeo multipedi. Fallit inter herbas bouem maxime, unde & nomen inuenit, deuoratumque tacto felle, ita inflammat, ut rumpat.

linea. 12

Quibus salamandra data est.) Salamandra bestia est lacerti figura, stellato capite, nunquam nisi magnis & continuis imbribus proueniens, & sequuta serenitate deficiens. Cuius teste Plinio libro uigesimo nono capite quarto, inter omnia uenenata scelus maximum est: Populos namque pariter necare improuisos potest. Nam si arbori irrepserit, omnia poma inficit ueneno, & eos qui ederint necat, frigida ui nihil aconito distans.

linea. 15

Picearum eruca pota.) Hortorum satorumque omnium pestis calamitasque sunt erucæ, dira animalia, lento & humido tempore nascentia, in uiribus & arboribus frondem omnem & florem erodunt, turpique facie depastam arborem relinquunt. Picearum autem erucæ, de quibus hic agit Pausanias, cæteris erucis similes & congeneres, discrimen ab arbore in qua nascuntur, nomine ipso offendunt, pityocampæ a Græcis appellatæ.

linea 15

Leporis marini potum,) Lepus marinus pusillum animal, odore tetro, inter loligines fere degit, quibus & similibus esse dicitur: uenenum est aliis cibo, aliis potu, aliis contuitu.

Eadem linea.

Piscibus non ab similibus.) Græce est. ἰσθίου ὁμοίᾳ ἰχθυός, hoc est gustus similis piscibus. Scribonius Largus manu-

ANNOTATIONES.

festius id explicauit compositione. 186. sic scribens: Leporis marini gustus non absimilis illotis piscibus, aut etiam putentibus.

Folio. 210. a 15

Rana rubeta aut palustris.) Rubeta rana dicta est, quod in uepribus uiuat, quâquam prius in aqua, postea fit terrestris. Perniciosa hæc ut chersydros. grandissima cunctarum magnitudo testudinis parua, geminis quandoque ueluti corniculis, ut inquit Plinius, dorsum exasperat, inflatque se irata, tam proterue audax, ut insiliat quoque proximum: bufo dicitur uulgo, ueneficiorum plena, præcipue ossiculis duobus.

b. linea. 19

Si altercum aliquis.) Hoc Græci ὑ' ασκν' α' μον uocant, quasi dicas suis fabam: Latini uero ab altercando altercū nomināt, ut testis est Scribonius, compositione. 181.

linea. 24

Vinum salsum.) Græce est α' λ' μ' υ' ρ' ο' ν. Puto autem idem esse π' ε' θ' α' λ' α' σ' μ' ε' ν' ο' ν, hoc est ex marina aqua factum, ut Plinius inquit lib. 23. cap. 1

Folio. 211. a 2

Quique uacuatis in sese detritis.) Hoc est, putaminibus ouitritis & infractis humore exempto.

linea. 30

Papaueris liquorem.) Hoc meconium nonnulli uocant. Scribonius compositione. 180. papaueris uiridis esse succum asserit.

b. Linea. 24

Lucernæ funiculi cōbusti extinctique.) Græce est. ε' λ' λ' υ' χ' ο' ν' κ' ε' κ' α' ω' μ' ε' ν' ο' ν' κα' ι' ε' σ' β' ε' σ' μ' ε' ν' ο' ν. Celsus lib. 4. c. 10. extinctum ex lucerna linamentum uocauit.

Folio. 212. a 32

Totum corpus prurire facit.) Sonat Græce, κ' η' ι' σ' μ' ο' σ' κ' α' θ' ο' λ' ο' υ' τ' ο' σ' ω' μ' α. Dioscorides etiam hunc in modū habet. Largus autem uetustissimus author, de eadem re tradens, pro corpus habet os. Verba eius sunt compo. 193. Ephemerum potum protinus quidem totum os prurire facit, uelut scilla tactum: postea etiam adurit, quasi pipere commanducato. Facilis lapsus est in Græcis dictionibus, ut σ' ω' μ' α ponatur pro σ' ο' μ' α.

k iiii

ANNOTATIONES

b. linea. 34. Carabi affaciq;.) Genera cancrorum sunt, teste Plinius lib. 9 capite. 31

Folio. 213. a 19

Pharicum dictū.) Multi scriptores dubitant, simplex ne an compositum sit pharicum. Largus compositione 195. ex compluribus componi affirmat.

Folio. 214. a 18

Lac coagulatum uniuersam.) Græce est, γάλα ἐμπυπιασθέν. Marcellus reprehendit Dioscoridis interpretes, qui lac coagulatum ubique reddiderint: ipse lac cui coagulum est admixtum, exponens. Nos cum Largo etiam gelatum lac diximus.

Linea. 24

Cinis lixiua.) Marcellus Dioscoridis interpres dum omnes alios reprehendit, ipse parum docte hanc dictionem ex Paulo πιλοποιητικὴν exponit. Galenus de compositione medicamentorum κατὰ τὸ πᾶν ex Largo transferens emplastra, ὅθεν πιλοποιητικὴν reddidit, quod Largus cinerem lixiuam dixit. Verba Largi sunt hæc, compositione. 216. Cerae pondo libra, resinae terebinthinæ pondo libra, nitri rubri pondo libra: hoc teritur ex cinere lixiua. Galenus sic habet idem emplastrum: Κίρη λι. α'. Τερεβινθίνης λι. α'. Ἄφρονι τρε λι. α'. ὅθεν πιλοποιητικὴν ξε. χ'. Cæterum quod est apud Galenum ὅθεν id Paulus dixit κοινόν.

Folio. 215. a 12

Coloris plumbei sunt,.) Largus ita reddidit compositione 183. Græce est, μολυβδόεις γίνονται.

Eadem linea.

Deformitas circa faciem deprehenditur.) Quamquam Græce est, ἡ πρὸς τὴν λαμβάνει, tamen quia Scribonius significantius circa faciem addidit, nos eum sequi malimus.

ARGVMENTVM LIBRI QVINTI.

Hoc quinto totius operis libro de theriacis & alexipharmacis tractatur, ut infra scriptum habes.

CAPITA LIBRI QVINTI.

I	Quomodo quis ab omnibus communiter uirulentis bestiis se tueatur	198
II	Communis omnium qui a uirulento quopiam morfi uel icti sunt curatio	ibidem
III	De rabiosi canis morfu, & metu aquæ, quæ hydrophobia dicitur	199
IIII	Ad morsus canis non rabiosi	201
V	De uespis & apibus	ibidem
VI	De phalangiis	ibidem
VII	De aranæ ictu	ibidem
VIII	De scorpionis ictu	202
IX	De scolopendra terrestri & marina	ib.
X	Ad stellionis transmarini ictum	ib.
XI	De fele	ib.
XII	De mure araneæ	203
XIII	De uipera tum mare tum foemina	ib.
XIIII	De amphibæna & scytale	204
XV	De dryino	ib.
XVI	De hæmorrhoo & prestere, hoc est, dipsa, de	ib.
XVII	De natrice, quam Græci hydron dicunt	205
XVIII	De cenchro	ibidem
XIX	De cerasæ & aspide	ibidem
XX	De basilisco	206
XXI	De pastinaca marina & muræna	ibidem
XXII	De dracone marino	ib.
XXIII	De scorpione marina	ibidem
XXIIII	Quomodo testudinis marinæ sanguis præparetur	ibidem
XXV	De crocodili morfu	ibidem
XXVI	De hominis morfu	ibidem
XXVII	De uenenis	207

XXVIII	De uenenorum præcautione	ib.
XXIX	Communis uenenorum quomodocunque assumptorum curatio.	ib.
XXX	Enumeratio simplicium uenenorum	208
XXXI	De cantharide	209
XXXII	De buprestî	ib.
XXXIII	De salamandra	ibidem
XXXIII	De picearum erucis	ib.
XXXV	De marino lepore	ib.
XXXVI	De rana rubeta & palustr	210
XXXVII	De hirudinibus	ib.
XXXVIII	De chamæleonte	ibidem
XXXIX	De alterco	ibidem
XL	De coriandro	ibidem
XLI	De psyllio	211
XLII	De cicuta	ibidem
XLIII	De papaueris liquore, quod opion uo- cant	ibidem
XLIII	De carpesiæ liquore	ibidem
XLV	De mandragora	ibidem
XLVI	De aconito	ibidem
XLVII	De ixia	212
XLVIII	De ephemero	ibidem
XLIX	De smilace	ibidem
L	De solano furioso, quod dorycnion a nonnul- lis dicitur	ibidem
LI	De sardonîa	ibidem
LII	De papauere cornuto	213
LIII	De pharico	ib.
LIII	De toxico	ibidem
LV	De fungis	ibidem
LVI	De sanguine taurino	ibidem
LVII	De lacte coagulato gelatoq;	214
LVII	De melle quod in Heraclia nascitur	ib.
LIX	De gypso	ibidem
LX	De cerussa	ibidem
LXI	De calce, sandaracha, & auripigmento	ib.
LXII	De argenti spuma	215
LXII	De plumbo	ib.
LXIII	De argento uiuo	ib.

LXV

De ueratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, & pappis. ib.

LXVI

De familiaribus ac domesticis, nempe uino & aqua frigida ibidem

ANNOTATIONES IN LIB. VI.

Folio. 216. a 11

TAm in fracturis.) Græce est κατὰ γμάσι. Hoc fere omnes fracturas uertunt, nonnulli tamen rupturas, quū Paulus ipse fracturam interpretetur, rupturam, κατὰ γμάσι, inquit, ἐστὶ διαρροή σ' ὅς ἐστι ῥήξις, ἢ διακοπή.

linea. 26

Ferramentis mucronatis.) Sic interpretor κοῦρη ῥαε πυρινεῖ δεις: nam πυρίνον. mucronem signat scalpelli, interim specillum: ut sit, ferramenta specilli modo facta.

b. Linea. 29

Perspiratu dissipentur.) διαπνοή ἢ Græci dicunt perspiratū latentem, per quem superflua difflantur.

b. linea. 11

Vitium proprie hydrocephalon appellatur.) Celsus libro quarto capite secundo: ubi humor cutem inflat, eaque intumescit, & prementi digito cedit ὑδροκεφαλὸν ἢ Græci appellant. Ad uerbum autem sonat, aqueus humor capitis.

b. linea. 23

Turgidus puluino sublimi.) Græce δὲ ὑψος κεκυρτομενός, hoc est, in sublime incuruatus, quemadmodum puluini in superficie tument, gibbero extante, ita quoque tumor hic capitis

Folio. 217. a 10

Duabus utemur lineis.) Hoc est, duas diuisiones moliemur. Celsus ubique sic loquitur, ut lib. 7. cap. 7. de pituita oculorum: Reperti in Græcia sunt, qui nouem lineis cutem capitis inciderent. Iterum: Reperti sunt qui a capite recte eas lineas ad tempora diducerent. Græce est, δι' ὅσας κίχρη μέθ' ἀπὸ τοῦ κεφαλῆς.

ANNOTATIONES

b.linea. 18

Per hamulum retusum.) Græci appellant τυφλά' γυςρον, quasi dicas, cæcum hamulum, cui acuties sit adempta. Celsus in chirurgia semper retusum uocat.

Eadem linea.

Membranam detrahemus.) Exemplaria nostra habebant, υ'φ' α': mihi uisum est υ' μων' α' legere. Quid sibi uelit prior scriptura, non assequor, signat autem, sub uno.

Folio. 218. a 20

Linamenta tortilia. Sunt ea quæ Græci dicunt στρεπτήσ' μο- 7σ', quod in tortis uulneribus inferantur. Vnum hoc genus est ex quinque, quæ Galenus in sua introductione enumerauit, hunc in modum, στρεπτήσ' ν, ξυσθ' ν πλ' τ' ν, ε' λ' λ' υ' χ' ν ι' ω' σ' τ' ν, πρι' α' π' ι' σ' κ' ω' τ' ν. Primum a torquendo, tortile; secundum a radendo rasile; tertium a discriptione filatim facta, filatim discerptum; quartum a funiculorum in lucernis similitudine, funiculare; quintum a genitalis humani forma, priapiscum aliquis dicat.

linea. 21

Panniculūq; implicitum.) π' ν' γ' μα & π' ν' γ' μα' π' ον Græci appellant.

linea. 34

Lineis transuersis coronæ modo.) Galenus in Isagoge, hoc modo periscythismum exponit. Sed lineis obliquis legendum est, propter dictionem coronæ. hoc quidem in Paulo non est, sed claritatis gratia addidi.

b.linea. 34

Piloꝝ subnascentium duplex triplexq; acies.) Hoc uerbi φ' α' λ' α' γ' ω' σ' i' s, latius fusiusq; explicant, ex Galeni Isagoge, latinis etiam authoribus ita exprimentibus.

Folio. 219. a 28

Deinde uibieibus.) Hoc est, sanguine inde manante deterfo. Græce est μ' ω' λ' ω' ψ, quod ε' ν' α' ι' μ' ο' ν' ρ' α' μ' α' dicitur, Latinis cruenta fluxio. Vibex autem est ex uerbere sanguis subsultans; transfertur etiam ad quæuis cruenta quæ fiunt excoriando aut uellicando.

Ibidem

Posca aquatica.) κ' α' τ' α' χ' ρ' η' σ' ι' κ' ω' τ' ε' i, pro aquosa & diluta.

b.linea. 26

Aut hapfulis quibusdam.) Magni aliquot uiri sic exponunt,

ANNOTATIONES

uerum dum authores Græcos penitus intropicio, signat
recisamentum alicuius rei, uel lamellam. Lege igitur lamel
lis pro hapfulis.

Folio. 221. a 2

Auersum scalpellum, quam partem Græci.) Sic interpreta
tur Scribonius compositione ducentesima uigesima septi
ma. Die auri scalpio auerso, quam partem κυαθίσκου
Græci uocant, sensum tentare, mouere ab alienatam o
portet.

Folio. 222. a 22

Procidentiæ occasio fiat.) προ' πωσιν intelligo. Celsus eo mo
do exponit libro sexto, capite sexto. Nonnunquam autem
ingens inflammatio tanto impetu erumpit, Vt oculos sua
sede propellat, προ' πωσιν id (quoniam oculi procidunt)
Græci appellant.

b. linea. 6

Vulsella prehensis.) Ita interpretor Græcum σαρκό' λαβον
aut τριχο' λαβον, Celsum in eodem argumento imitatus.

Folio. 223. a 18

De oculis purulentis.) Græce est ὁ πονύς. est autem autho
re Galeno, aliisq; Græcorum medicis ὁ πόνυον, quum totū
oculi orbem, qui iris dicitur, aut eius dimidium pus occu
pauerit.

linea. 26

Hypochymatis.) Hoc est suffusionibus. Celsus etiam hypo
chysin appellat, libro sexto ca. 6. ita scribens. Suffusio quoq;
quam Græci hypochysin nominant.

Folio. 224. a 30

Tumens abscessus.) Græce est ἀ' πειμωδὴ' εὐ' γκος, quasi di
gas, tumor abscessum referens.

b. linea. 7

Omphacomelle uel sidioto.) Quia in sequentibus capitibus
puta quadragesimo settimo & sexagesimo sexto, habebatur
Græci φακό' μελι putauī omissum esse ομ, eoq; hic omphaco
meli reddidi, ubi Græce φαβο' μελι est, quod latinam linguā
resipit. Coniicio itaque hoc fauomeli esse mel purum in fa
uis nulla re adiecta, quanquam apud nullum inuenerim fa
uomeli.

b. linea. 27

Spatula acutiore tollemus.) Intelligo instrumentum poly

ANNOTATIONES

po' sectando aptatum, Græce πολυ'πικον σπα'θιον, id est spatula polypodis.

Folio. 225. b 31

Plumbeas solenas naribus.) Solena instrumentum est canalis modo factum. cruribus aliisq; membris confractis idoneum, apud Hippocratem & Galenum frequens.

Folio. 229. a 22

Implicitum aliquod in longitudinem linamentum.) Sic interpretatur Celsus lib. 7. cap. 28. Intus & implicitum in longitudinem linamentum (λήμνισκον Græci uocant) in acetum tinctum demittere.

c. linea. 34

Medicamine linamentis illito.) μοτοφυλάκιον dicitur Græcis, quod linamenta continet, medicamentum, eodem fere sensu quo ε' μμοτον capitur.

b. linea. 8

In ceruice.) Superstitiosi quidam mutant ceruicem in colum, quod τρα'χιλος Græce dicitur, homines literarum meliorum rudes. Nam Celsus fere ubique ceruicem ponit pro collo, & Græco τρα'χιλος: manifestissime autem libro quinto, capite uigesimo octauo, de strumis eadem quæ hic Paulus scribens, ubi sic loquitur: Nascuntur maxime in ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus & in lateribus. Sic alibi sæpissime.

b. linea. 28

Arteriæ quas carotidas uocant.) Hæ arteriæ in dextra sinistraque circa guttur sursum procedentes, ultra aureis feruntur, quæ inde nomen sortitæ sunt, quod tensæ, aut altera, tentionem expertæ, caron inducunt, quemadmodum musculus Η' καροει δει s apud Hippocratem de articulis.

Folio. 231. a 20

Aut labore proficiscens.) κό'πης est Græce, quod notat lassitudinem interim laborem.

Folio. 232. a 16

Ligamine igitur arcto.) Fasciolam intelligo qua brachium eius qui sanguinem dimittit ligari solet.

b. linea. 29

Tenor fluxionem rumpens.) Exemplaria ita habebant ο' π'ρος πυ'σως ο' κ' λ' ζων, ut articulus ο' cum participio κ' λ' α'

ANNOTATIONES

ζων iungatur, uerum male, pro ὁκλ'ζων, ut sensus sit
senor fluxionis deflectens labensq; , atque in eum sensum
corrigere.

Folio. 233. a 5

Digitorum fotu dissoluentes.) Græce habetur πῶν δακτυ-
λων ἐπὶ θάλπει, quod est digitis ad fouendum adhibitis,
aut digitis concalefacientibus. Alterum exemplar manus
scriptum habet ἐπὶ θάλπει p ἐπὶ θάλπει, ut sit digitis extun-
dentibus.

Folio. 234. a 26

Cauterium.) Ferrum est candens, medicis non inuisi-
tatum.

b. line. 10

Vna uice.) Lege, in totum, Græce est διαμπαξ, quod ualeat
διὰ λυ, δ' ἰα' παντὺς.

Folio. 239. a 2

In quibus glans.) Ex Celso λειπὸν δερμονῖτα uerti, nam ille
ex eadem re scribens, id quod Paulus habet, eleganter ex-
pressit, de aliis Græcis authoribus transferens.

Line. 25

Nisi particulam admodum.) Hic quoq; particulam pro pe-
nie, ut superius accipit.

Folio. 241. b 19

Ligaminibus septem costarum ad calculos.) Lege, li-
gaminibus sex costarum, hoc est sex processuum, ἑξα-
σκελεῖς enim ad uerbum sonat sex crurum: a geome-
tris petita dictio est qui figuras quasdam ἑξασκελεῖς uo-
cant.

Folio. 243. b 9

In superuenienti ortum.) Hoc est accessorio; Græci dicunt
ἐν ἐπιγενήματι.

line. 27

Per inferiorem testiculum.) Scriptura peruersa est, ita tu
corrigere. per inferiorem sectionem testiculo insit.

Folio 45. a 1

Compressus tarde quidem.) Lege, compressus, quum nota-
tur tentaturque manu, tarde. Lascaris exemplar a Ruelliano
& impressio discordans, pro ὡς συμπίπτει, quod est in nota-
tione, habet συμπίπτει.

ANNOTATIONES

Folio. 247. b 10

In callum induratae.) Intellige callū duriores, qui topus latine, πῶρος Græce dicitur. Celsus in ani uitiis callum posuit, ubi Paulus πῶρον.

Folio. 248. b 29

Ac summis uulvæ oris diductis.) Sensus est, Summis uulvæ oris per ministrum diductis, sinistram manum contractis ualentibus digitis attenuatam in hostiolum inferemus. atque sic lege.

Folio. 249. a 28

Diuisam caluariam forcice.) Græci ὀστᾶ γράμ & ὀδοντᾶ γράμ forcipem dicunt, qua ossa dentesque extrahimus. In Celso male legitur in capite de dentibus, forcice pro forcipe.

Folio. 250. a 27

Ex ceriis.) De ceriis, hoc est, fauis, etiam libro. 4. tractatum est.

b. linea. 35

Caulis modo porrectum.) Græce est ἡ πεκαλιὰ ἐν, hoc notat caulium modo transuersim fractum.

Folio. 255. a 29

Telis extrahendis.) Telorum uaria est significatio, nūc pro ferro qd imponitur, nūc quocunque misili capitur.

b. linea. 3

Ea quæ imponuntur, ἡ τρακτα Græce dicuntur.) Nemo potuit, quantumlibet uersatus in authoribus, hoc quid significaret inuenire, deinde incidi in exegesi in Hippocratem, ubi habetur, ἡ τρακτον ἡ μοῖον τὸ νδς τὸ ἱερὸν ὅν χρῆσιμον, ἡ λλὰ καὶ τὸ εὐχρον βέλυσ, hoc est, Atracton non solum ad sacrificium utilem, sed etiam sagittæ lignum significat.

Folio. 256. a 13

Belulcum Græci uocant.) Hoc instrumentum etiam Celso dicitur βελυχοῦν.

linea, 27

Fœmina propulsorii instrumenti.) Instrumentum hoc duplex est, mas & fœmina. Mas habet penis modo prominentiam: fœmina, pudendi muliebris modo sinum: atque inde sic appellantur.

Folio

AN NOTATIONES

Folio. 157. b 1

Quæ gastroraphia dicitur.) Largus compositione, 206. ita exponit: Quum intestina prolapsa & reposita sunt, atque factum uulnus, quod a Græcis dicitur γαστροραφία.

Folio. 218. a 3

Ruptura ossis est.) Hic Græce usurpat ρήσις in osse, quod alioqui neruis & fibris lacescitis conuenit: ea ratione nos superius, primo uidelicet capite, rupturam diximus, ubi Græce erat κατάρμα.

Folio. 260. a 33

Modiolo quem choenicion.) Celsus choenicion sic exponit libro octauo capite tertio, ubi modiolum sic describit: Modiolus ferramentum concuum teres est, imis oris ferratum per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur.

Folio. 262. b 30

Iugulum.) Celsus iugulum reddit, quod Galenus κλειδά, hoc est clauiculam uocat, uterque eadem descriptione huius partis usus.

Folio. 263. a 2

Arundinis modo.) Græce est καλαμίδι, quæ autem fractura sit, in capite de fracturis dictum est.

Linea 14

Orbiculum bonæ magnitudinis,) σφαῖρα orbiculum circumue signat. Celsus inuit lib. 8. cap. 20. Rotundum, dicēs, aliquid super inguem ponendum.

linea. 23

Reuocetur. Hoc est, retrahatur, reuellatur.

Folio. 266. a 14

Cubitus radiusq;.) Non hic ἄγκων, hoc est cubiti flexum, qui interdum uoce cubitus significatur, ut quum dicimus, Sanguis excubito mittendus est, sed in totum quod a manu incipiens inferius ad brachium usque tendit. Radius, qui κεραῖς dicitur, superior cubito est breuiorq; barbari forcile uocant.

Folio. 267. a 10

Acies digitorum.) Græci uocāt σκυτάλιδες. Celsus li. 8. c. 11 manus aciem dixit.

b. linea. 6

Patella.) Os est paruum, molle & cartilaginofum, quo com

ANNOTATIONES

missura cruris tegitur.

Fol. 270. b 8

Aegri maxillas committunt.) Hippocrates adiectum habet inferiores, quod in omnibus exemplaribus desideratur, ut sit, Aegri maxillas inferiores difficulter committunt.

linea. 9

Talis autem repositio.) Ut sunt exemplaria corrupta, ita sententiam recte non potui reddere, quanquam uerba expresserim: hunc in modum ex Hippocrate legendum censeo: Qualis autem repositio ipsis congruat, manifestum liquet.

linea. 15

Diducat & concedat.) Hunc in modum habet Hippocrates: Simul diducat & remittat quammaxime, deinde subito hiet tribus pariter figuris mente adhibita.

linea. 19

Item maxillas.) Hippocrates sic: Item maxillas his factis committere.

linea. 27

Committere autem.) Græce erat ἵσον male pro ἴσως, ut sit, Committere autem hi minus os possunt.

linea. 30

Secundum ordinem.) κατὰ τὰ ἔτι habent Pauli codices, pro κατὰ τὰ ἔτι, hoc est, ὁμοιοπαρίᾳ & rectitudinem, ut uidelicet primores dentes in utraque maxilla primoribus, canini caninis, molares molaribus respondeant.

linea. 31

Si autem periculum.) Peruersa est sententia, ita lege: Si autem non inciderint loco suo maxillæ, periculum uitæ instat ex febribus continuis & torpido caro: Nam caroides musculi alterantur &c.

Folio. 272. a 1

Ut reliquum ægri corpus.) Mirifice hic deprauata sunt exemplaria, ita ut quilibet ingeniosum possint fallere: Græce est ὥς τε τὸ ἄλλο σῶμα τῶ καὶ μόνου τοῦ ποθεν τῶ καὶ τῶ μετῶρον κρεμασθῆναι: pro, ὥς τε τὸ ἄλλο σῶμα τῶ καὶ μόνου τοῦ ποθεν τῶ καὶ τῶ μετῶρον κρεμασθῆναι. Hoc est, ut reliquum ægri corpus post eum qui humerum suum alæ subiecit, sublime pendeat.

linea. 6

Hyperon.) Lignum est pastilli modo factum, unde nomen

ANNOTATIONES

habet, quo chirurgi humeros reponentes utuntur : frequēs
apud Hippocratem

ARGVMENTVM LIB. VI.

Hoc sexto totius operis libro de Chirurgica agitur, tum quæ
ad carnem, tum quæ ad ossa pertinet, quæ in sermonem de fra-
cturis & luxationibus finitur.

CAPITA LIB. VI.

- | | | |
|------|---|-----|
| I | Proœmium chirurgicæ | 216 |
| II | Quomodo caput aduratur in lippientibus,
ægre spirantibus, & elephantice | ib. |
| III | Quum humor capitis cutem inflat, eaq; intumescit & prementi digito cedit, hydrocephalon dicitur | ib. |
| III | Quomodo arteriæ diuidantur, arteriotomia dicitur | 217 |
| V | Quomodo latentia capitis uasa diuidantur, quæ angiologia dicitur, eorumq; adustio sit administranda | ib. |
| VI | Quomodo frons incidatur, hypospathismū uocant | ib. |
| VII | Quid agendum in sincipite secando, periscythismum appellant Græci | 218 |
| VIII | De superioris palpebræ futura aliisque modis | ib. |
| IX | Quomodo palpebræ medicamento urantur | 219 |
| X | Si oculus cute nō contegatur, lagophthalmū dicunt | 220 |
| XI | De inferioribus palpebræ futura, & uisione per medicamenta | ib. |
| XII | De ectropio | ib. |
| XIII | Quo pili palpebræ oculū irritantes euellantur, & ustio per ferrum adhibeatur | 221 |
| XIII | De hydatide | ib. |
| XV | De palpebris commissis | 222 |

XVI	De chalaziis	ibidem
XVII	De verrucis & encanthide	ibidem
XVIII	De ungue oculorum, quod pterygion a Græcis uocatur	ibidem
XIX	De staphylomate	ibidem
XX	De oculis purulentis, qui hypopii dicuntur	223
XXI	De suffulis	ibidem
XXII	De ægilope	224
XXIII	Si meatus auditorii non perforati sint	ib.
XXIII	Ad ea quæ in meatum auditorium inciderunt, extrahenda	225
XXV	De polypo	ib.
XXVI	Curta in auribus & labris quò sarciri possint	ib.
XXVII	Græci uocant colobomata	ib.
XXVII	De epulidibus & parulidibus, quæ sunt giuiarum tubercula	226
XXVIII	Quomodo dentes eximantur	ibidem
XXIX	De ligatione linguæ, quod ancylion dicitur.	ibidem
XXX	De tonsillis.	ib.
XXXI	De uua	227
XXXII	Quomodo spinæ gutturi eximantur	ib.
XXXIII	Quomodo guttur incidi debeat	228
XXXIII	De abscessu	ibidem
XXXV	De strumis	229
XXXVI	De steatomatis, atheromatis, & meliceridibus	230
XXXVII	De aneurymate	ib.
XXXVIII	De cervicis tumore, qui bronchocele dicitur	231
XXXIX	De glangliis	ib.
XL	De sanguinis detractione per uenas	ib.
XLI	De sanguinis detractione per cucurbitulas	233
XLII	Quomodo alæ adurantur	234
XLIII	De adnatis digitis, & sexto digito	ib.
XLIII	Quomodo purulentis adustio adhibenda	ib.
XLV	De cancro	235

XLVI	De iis quibus mammae foeminarum mod ^o inturgescunt	ib.
XLVII	Quomodo iecur aduratur	ibidem
XLVIII	Quomodo lien aduratur	ibidem
XLIX	Quomodo stomachus aduratur.	ib.
L	Quomodo aqua hydropicis emittatur	236
LI	De umbilico prominente	ib.
LII	De interiore abdominis membrana conuul- nerata, item de intestini aut omenti proci- dentia. ubi etiam tractatur quomodo uen- tris uulnera sarciantur, ex commentariis Galenii	237
LIII	Ad tegendam glandem colis, si nuda est	239
LIII	Quomodo glans penis contacta aperiri pos- sit, uitium dicitur hypospadiæ	ib.
Lv	De phymo	ib.
LVI	Si præputium glandi adhærescit	240
LVII	De circuncisis	ib.
LVIII	De thymis naturalium	ib.
LIX	De recto syphone qui catheter dicitur, & cly- stere uesticæ	ib.
LX	Quæ curatio calculosis adhibeatur	241
LXI	De testiculorum partibus	242
LXII	De aquoso ramice, hydrocele dicitur	ib.
LXIII	De carnosio ramice & tophaceo	243
LXIII	De uaricoso ramice & uentoso	244
LXV	De intestinorum ramice	ib.
LXVI	De inguinu ramice, bubonocoele uocatur	246
LXVII	Quum scrotum attritis uestimentorum frag- mentis similiter attenuatur	ib.
LXVIII	Quomodo fiant eunuchi	ib.
LXIX	De hermaphroditis	247
LXX	Quomodo nymphea excidenda sit & cerco- sis emendanda	ib.
LXXI	De muliebrium locoꝝ thymis, cōdylomatis, hæmorrhoidibus	ib.
LXXII	De non perforatis, & phymo	ib.
LXXIII	De abscessu uulue	248
LXXIII	Qua ratione partus ex utero excutiatuꝝ ex- cidaturq;	ibidem

LXXV	Si secundæ fuerint relictæ	249
XXXVI	Quomodo coxendices adurantur	250
LXXVII	De fistulis & ceriis	ib.
LXXVIII	De ani fistulis	251
LXXIX	De hæmorrhoidibus	252
LXXX	De condylomatis, tuberculis, & rimis	ib.
LXXXI	De ano non perforato	253
LXXXII	Quomodo uarices excidentur	ib.
LXXXIII	De dracunculo	ib.
LXXXIII	De extremarum partium uitio, acroterias non appellant	254
LXXXV	De unguium pterygiis	ib.
LXXXVI	De ungue contuso	ib.
LXXXVII	De clauis myrmeciiis, & uerrucis	255
LXXXVIII	De telis e corpore extrahendis	ib.
LXXXIX	De fracturis, & quot ipsæ sint differentiæ	257
XC	De fracturis capitis	258
XCI	De naribus fractis contusisq;	261
XCII	De inferiore maxilla confracta, & aure con- tusa	262
XCIII	De iugulo confracto	ib.
XCIII	De scapulis	263
XCIV	De pectore	ib.
XCVI	De costis	264
XCVII	De coxarum & pectinis ossibus	ib.
XCVIII	De uertebriis, spina dorsi, & sacro osse	ib.
XCIX	De brachio	265
C	De cubito & radio	266
CI	De summa manu & ipsius digitis	ib.
CII	De femore	267
CIII	De patella	ib.
CIII	De tibia	ib.
CV	De pede summo	268
CVI	Quomodo crus reponi debeat	ib.
CVII	De fracturis quæ cum uulnere incidunt	ib.
CVIII	Si præter modum fracturis callus obduca- tur	269
CIX	Si distortum membrum callus firmari	ib.
CX	Si fracturæ callo non firmentur	ib.
CXI	De ossibus luxatis	270

CXII	De maxilla inferiore	ib.
CXIII	De clavicula & summo humero	271
CXIII	De humero luxato	ib.
CXV	De cubiti gibbero	272
CXVI	De brachiali & digitis luxatis	273
CXVII	De uertebri spinæ	ib.
CXVIII	De coxa luxata	274
CXIX	De genu articulo	276
CXX	De malleoli articulo, ubi etiam de pedis digi- tis agitur.	277
CXXI	De luxatis cum ulcere	ib.
CXXII	De luxatione cum fractura facta	278

ANNOTATIONES IN LIB. VII.

Folio. 278. a 14

Quo sint calore.) Hoc est quo caloris ordine siue gradu.

Folio. 279. b 22

Succurrit in cibo potuq;) Græce est ωφέλει κατὰ πλάσσο-
μεν' η τε καὶ ποτῖα ποίμεν' η, καὶ ἐσθίόμεν' η. hoc est prodest illi
ta, alligata, & in cibo. Dioscorides cum aliis exemplari-
bus, habet πνοόμεν' η, hoc est pota, ut nos reddidimus, pro
κατὰ πλάσσομεν' η.

Folio. 284. a 36

Alii omphacocarpon appellant.) Manuscriptum exemplar
& Dioscorides omphalocarpon habent, atque sic legendū
est. Dioscorides nominis rationem exponit.

Folio. 285. b 2

Arsenici uis est caustica.) Hoc est adurens: cæteræ Plinius dic-
tione Græca utitur, ne quis nos cauilletur.

linea. 28

Vehementibus medicinis.) Græce est ἐν ταῦτοις, hoc est ue-
hementibus ad libidinem incitandam: ut lib. 3. capite quin-
quagesimo octauo uidere est. ubi de particulis inefficacibus
agitur.

Folio. 286. b 5

Ventrem quoque emollit.) Ad uerbum sonat Græce, per
uentrem transit, id autem nihil aliud est quam iubducit &
emollit.

ANNOTATIONES

Folio. 288. b 14

Populis albis piceisq;.) deprauata est scriptura, pro peucis
q; quod semper tedam interpretatus sum, hic peucen dixi
Plinium sequutus, qui eadem dictione utitur.

Folio. 290. b 13

Cordylon.) Dioscorides tordylon uocat. Marcellus Diosco-
ridis interpres uitiatum hunc. Pauli locum putat, & legen-
dum tordylon, literarum seriem, quam Paulus noster obser-
uat, non animaduertens.

Folio. 291. a 1

Aguas in uentre collectas.) Græce quidem est ὕδαρ, sed ab-
surdo sensu. Non enim urinæ in uentre colliguntur, sed a-
quæ, unde etiam Dioscorides ad aquæ affectus ualere
asserit.

Ibidem. b 21

Filicula dulcis.) Hæc filicula non proprie dicta est, quem-
admodum polypodium, sed querna filix potius dicetur, ut
Græcum nomen indicat.

Folio. 294. a 24

Cæcos cancrös illitu adiuuat.) Cæcos Hic uoco latentes, nō
exulceratos.

b. linea. 5

Et discutientis per halitum.) Quia dixit ephemerōn mistæ
esse potestatis, interim unius tantum qualitatis faciens men-
tionem, uisum est & secundam ex Galeno adicere librario
rum incuria forte emissam.

Folio. 296. a 19

Præsertim turturem marinum.) Verba quidem Græce sic ha-
bent, uex intelligere oportet pastinacam marinam, quæ æ-
quiuoca turturi appellatione Græcis τρυγίς uocatur.

Folio. 299. b 17

Tum in faciei medicamentis.) Græce est οὐδὲν ἔστι καὶ ἐν τῷ
τοῖς φαρμάκοις: quam sententiam reddidissim, & in obso-
lio & in aliis medicamentis, (quanquam οὐδὲν legendum
foret) nisi dictio ἐν τῷ τοῖς, quod est aliis, in priorem senten-
tiam me traxisset, tu utram mauis elige.

Folio. 302. a 10

Cneci semine ad.) Cnecum etiam cnicum dicitur eod. in
tertio libro indifferenter usus sum.

ANNOTATIONES

Folio.303.a.16

Anium cohortalium.) Alii hunc Pauli locum citantes gallinarum finum interpretantur: alii etiam anserum, anatum, gallinaceorum. Nam Græca dictio κατοιικίδιον uidetur omnes significare alites qui domi aluntur. Nos cum Columella aues cohortales diximus.

b.linea.2

Fluuiatilium.) Græce est, νειλοκροκιδίων, quod signat Niliacorum crocodilorum. Nos fluuiatilium reddidimus, quum certum sit, hoc genus solum in Nilo reperiri.

Folio.306.b.34

Menses stimulant.) Hoc est mouent. Pliniana locutio.

linea.16

Lachryma thuris.) Ita appellaui ubique Græcum λιβαριον distinguens ab arbore quæ λιβαριον dicitur, sequutus Galenum, ex quo Paulus ad uerbum hæc descripsit, quanquam differentia interim confundatur. Cæterum cortex thuris crusta ea est, quæ lachrymæ adhærescit, non quæ arbori,

Folio.309.b.26

Creta sutoria.) Melanteria Græce appellatur, quam in toto hoc opere cretam sutoriam dixi. Scribonium Largum imitatus, qui compositione ducentesima octaua ita scribit: Melanteriæ, quæ creta sutoria dicitur, qua ligulæ calceolorum denigrantur &c.

Folio.311.a.30

Medicamentis stomaticis.) Græce erat stomachicis, deprauate pro stomaticis. Nam medicamentum δια moron, non ad stomachi, sed oris uitia inscribitur.

Folio.314.b.22

Græci coremata uocant. Paulus, Galenus & Aetius, smegma uocant coremata a Græco uerbo κορεω, quod est extergo purgo.

Folio.315.b.36

Periclymeni folia.) Periclymenon Scribonius Largus compos. 129. syluæ matrem latinis dici testatur.

Folio.324.a.18

Lentisci flos.) Græce quidem sic est, sed corrupte, legendumque est χοῖνς pro χίνς. Quare tu legito Iunci odorati flos &c.

ANNOTATIONES

Folio.328.b.15

Ficus exterit.) Ficus uoco quod Græci uocant lycosin, quasi dicas ficationem, & ficosas palpebras.

Folio.331.b.27

Qui cynicus spasmus dicitur.) Hunc affectum Scribonius Largus compositione.255.eodem quo nos modo interpretatur.

Folio.333.b.13

Vnita fuerint.) Græce est *σινωστος* quod est, proiciens. Lege igitur. Vni proiectæ fuerint, admiscetur &c. Sensus est herbas proiicito deinde reliqua adijcito. Cæteræ cur unita reddiderim in causa fuit alterum exemplar scriptum quod habebat *ε'νωστος*.

Folio.335.a.10

Scrupula tria.) Exemplar Græcum habebat scrupula octo, qui numerus nulla ratione conuenit, quum plus dare conueniat iis quibus alius est difficilis quam iis quibus facilis, si liquæ autem uiginti tres quashic iubet Paulus in aluo difficili exhiberi, non efficiunt scrupula quatuor. Quamobrem tum ratione, tum authoritate Alexandri, unde hæc cõpositio trãscripta est, ut ipse Paulus tertio libro fatetur, tria scrupula legendum censuimus. Ex eodem authore id quod in hac compositione sequitur restituiamus.

Folio.337.a.10

Modus est denarii duo.) Græce numerus denarioꝝ desiderabatur, ex Oribasio restitutus a nobis est.

Folio.338.a.35

Vel clystere semel bisue iuxta uirium rationem sollicitata.) Præpostere hæc sententia posita est. sic lege: Vel clystere sollicitata: semel bisue iuxta uirium rationem. Omnium &c. ut sit hic sensus: Veratrum laboranti datur, semel bisue iuxta uirium rationem, ubi alius responderit, uel sua sponte, uel clystere sollicitata.

Folio.345.a.4

Caryi, hyssopi. Quid caryon sit non comperi nisi pro caros accipiatur. Significat autem caryon, ut hic scriptum est, nucem: quæ significatio pax huic loco conuenit. Nam species nucis semper in medicamentis solet addi.

b. linea. 27

Thodoretus altera dia anacardion.) Græce est, *Θεοδο' πητες*

ANNOTATIONES

ἡ δὲ ἀνὰ ἀνὰ δὲ ἴσως. Quid ἡ κὶ δὲ sit non satis constat, eoq; legendum putauerimus δὲ ἴσως, ut sit sensus: Theodoretus quæ sine anacardiis componitur. Nam anacardioꝝ in compositione nulla fit mentio, nisi in fine, ubi dicitur, nonnullos addere duo anacardia.

Fol. 347. a. 10

Quum uua inceperit maturescere.) Græce est, πρὸς ἔσθ, quod proprie significat nigrescere, atque hoc proprium maturescents uuæ indicium est. Vult igitur Paulus significare autumnum ineuntem.

Folio. 348. b. 14

Asari, piperis albi & nigri.) Græce quidem non est piperis, sed quia alarum non describitur album & nigrum a Dioscoride alijsq; qui de simplici medicina scripserunt, putauit adiciendum, quum frequens in superioribus compositionibus eius fiat mentio.

Folio. 352. b. 9

Pastilli, ceræ. Græce erat κίρρ, nullo sensu, eoq; nos κίρρ legendum duximus quum in sequentibus compositionibus in eum modum habeatur.

linea. 35

Rhus coriarii.) Græca exemplaria habebant adiectum συπνίς, hoc est aluminis. nos quia superius in hac eadem compositione omniū aluminis generum facta est mentio, nō sine ratione hic reliquimus.

Folio. 353. a. 24

Fingunturq; pastilli.) Græce erat, πλάττειν ἐν μήκει κοτύλης. hoc est, finge in longitudinem heminæ dimidiæ. nullo sensu. Quare nos simpliciter, Finguntur pastilli reddidimus.

Folio. 354. a. 30

Squamæ æris, mali punici.) Græce est ποικύριον a dictione simplici ποικύ quod est malum punicum: ideo sic interpretatus sum. Nam & rhoidia & rhoedia dicitur, ut Hermolaus ex authoribus testatur.

Folio. 355. a. 13

Stillæ ammoniacæ.) Idē est quod guttæ aut suffiminis, aut thymiamatis, ut Celsus Græco uocabulo utitur.

linea. 14

Herbæ ianariæ.) Scribonius Largus compo. 10. radicem la-

ANNOTATIONES

ianariam uocat, quod Græce struthion dicitur. Latini ab usu
ianariam radicem & herbam, atque ab eius præcipua & uti
liore parte, radiculum dixerunt.

Folio. 356. b 11

Aluminis scissi.) Græce est $\chi\iota\sigma\eta$ pro $\chi\iota\sigma\eta\varsigma$. Nam lapis schi
stos huc non facit, præterea $\lambda\iota\theta\varsigma$ semper habet adiectum;
alumen scissile sæpe per adiectiuum tantum $\chi\iota\sigma\eta\varsigma$, signi
ficatur.

Folio. 359. a 3

Hypocisthis.) Scribonius Largus compositione. 85. hypoci
stidem uocat succum rosæ syluaticæ, quam caninam quidā
uocant.

linea. 11

Alia xerocollyria, alia hygrocollyria uocantur.) Hæc latine
sonant, arida collyria, & liquida collyria.

linea. 17

Liquore non copiose affuso.) Græce est $\gamma'κα'θαρων$, quod si
gnat, non puro affuso. Qui sensus cum sequenti $\alpha'λλ'α' κα'
τα' βραχυ'$ id est sed modice & paulatim, non conuenire
uidetur. Puto igitur Græce fuisse $\gamma'κα' α'θροον$. tu utrum ma
ius lege.

linea. 15

Monohemeron appellatum.) Ad uerbum hoc sonat, quod
uno die per sanat. Scribonius compositione uigesima de
eisdem collyriis agens uidetur id expresse, ita inquit:
Fere enim uno die tollit epiphoram & præcipue in
cipientem.

Folio. 362. a 8

Dia ceratos dicitur.) In tertio libro citat Paulus hoc collyri
um dia ceratos elaphiu, quamquam a Celso etiam simplici
ter quemadmodum hic dia ceratos dicatur collyriū qđ ex
cornu ceruino constat.

Folio. 363. b 13

Harmation.) Scribonius Largus medicamentum eisdem &
simplicibus & eorum ponderibus constans harmia uocat,
quod ex quatuor rebus, ut quadriga equis conficiatur, &
celeres habeat effectus. Hoc autem discriminis interce
dit, quod Paulus addat æruginem, præter nominis ratio
nem.

ANNOTATIONES

Folio. 165. a 8

Alia sunt oleamenta.) Hac dictione quam aliqui putant esse barbaram, utitur Scribonius Largus compositione ducentesima uigesima secunda; quemadmodum & oleaminis uocabulo idem author utitur compositione ducentesima sexagesima nona.

Ibidem. a 28

Lapathi, thepelæi.) Quid rhepelæum sit nusquam compertum, nisi forte $\rho\upsilon\pi\epsilon\lambda\alpha\iota\omicron\nu$ legendum sit pro sordibus olei, quæ amurcam latini uocant.

Folio. 366. a 18

Hyssopi medicamenti.) Superius annotaui hyssopum corrupte sæpe legi, pro æsypo, ita hic quoque compositum medicamentum, male habent Græca exemplaria hyssopum pro æsypo. Hermolaus utroque modo posse legi, dicit.

Folio. 369. a 12

Hyssopi liquidi.) Hic quoque æsypum pro hyssopo legendum est.

Folio. 371. a 7

Olei ricinini aut ueteris.) Galenus quidem ex quo hæc compositio sumpta est, habet olei ricinini ueteris, sed non male Paulus posuit olei ricinini aut ueteris. Supra nanque pagina uidelicet. 172. linea uigesima secunda, dictum est, ricininum oleum æquales ueteri uireis obtinere.

Folio 373. b 16

Hyssopi cerati.) Et hic hyssopum deprauate est pro æsypo.

linea. 21

Dicitur Pamplethes.) Græce est pampathes quasi ad omnes huiusmodi affectus conueniens; Hermolaus Pamplethes legit.

Folio. 379. a 21

Embole prima.) Hoc est iniectio prima. Nam ea medicamenta diuersis uicibus iniecta componi solent ut ex sequentibus patet.

Folio. 382. a 5

Palmulæ magnæ duæ.) Græce nullus numerus additur; Nos ex coniectura duæ apposuiamus, quod si non placet, aliud quippiam substitue.

ANNOTATIONES

b. linea. 8

Alia emolliendi.) Exemplaria Græca habebant α'μικτια', hoc est non mixta, absurdo plane sensu, quod nos μα' λ'ακτια' legi debere ex sequenti sententia, & ratione iudicauimus.

Folio. 388. a 20

Aristolochiæ rotundæ.) Græce quidem nō est rotundæ, sed particula κω' satis indicat aliquid desiderari.

Folio. 389. a 8

E domo una in alteram.) Hic deprauatum exemplar existimo, quemadmodum paulo post, ubi numerus liliornum nō additur.

Folio. 395. b 29

Drach. 16.) Scribe drach. 6. ut ex iis qui præcesserunt liquido patet.

DE PONDERRIBVS ET MENSVRIS.

Quoniam multos ponderum & mensurarum difficultas a medicamentoꝝ lectione deterret, uisum est nobis planius rudiusq; ex Græcoꝝ scriptorum monumētis ceu in tabulæ modum quid singula ualeant, subiicere.

SILIQVA

Siliqua Græcis κερ' πον dicitur: capit æreolos duos & tres parteis.

OBOLVS

Obolus & Latine & Græce dicitur: siliquas duas ualet, sextans denarii seu drachmæ.

SCRVPVLVM

Scrupulum & scrupulum, græce γρ' μμα dictum, duos obolos pendet.

DENARIVS

Denarius qui Græce drachma uocatur, ualet scrupula tria. Vsurpant autem Latini scriptores sæpe Græcam dictionem, ut Plinius: Celsus nunquam.

VNCIA

Vncia γ' νία Græcis appellatur: Secundum Græcos octo ualet denariis seu drachmis: Celso septem. Omnes tamen, & Plinius & Largus aliq; octogintaquatuor drachmas in libra numerant.

LIBRA

Libram pondo etiam latini dicunt: duodecim autem continet uncias.

MINA

Mina uariat pro nationum diuersitate: Romana pendet uncias uiginti: Attica & Aegyptia sedecim: secundum alios, duodecim.

MENSURAE LIQVIDORVM.

Cochleare elementum est mensurarum, pendet drachmas. 2

Mystrum paruum continet cochlearia tria, pendet drachmas. 6

Cyathus capit mystra parua duo, pendet unciam. 1 & drachmas. 4

Acetabulum continet cyathum unum & dimidium, pendet uncias. 2. & drachmas. 2

Hemina capit acetabula quatuor, pendet uncias. 9

Sextarius continet heminas duas, pendet libram. 1. & uncias. 6

Choenix capit sextarium unum & dimidium, & pendet libras duas & uncias tres.

Congius continet choenices quatuor, pendet libras. 9

DE PONDERVN NOMINIBVS, quibus in toto opere usi sumus.

Duodecima pars assis	Uncia
Sextans	Unciae duae
Quadrans	Unciae tres
Triens	Unciae quatuor
Quincunx	Unciae quinque
Semis, quae & selibra dicitur	Unciae sex
Septunx	Unciae septem
Bes	Unciae octo
Dodrans	Unciae nouem
Dextans	Unciae decem
Deunx	Unciae undecim

As, libra	uncia duodecima
Dupondo	Librae duae
Trepondo	Librae tres
Sescuncia	uncia una & semis
Semuncia	uncia semis
Denarius	Drachma

ARGVMENTVM LIBRI VII.

In hoc septimo & ultimo totius operis libro de medicamentorum tum simplicium tum compositorum omnium, quorum potissimum per integros sex libros praecedentes fit mentio, uiris bus, disputatur, atque infra posito ordine ponuntur.

CAPITA LIBRI VII.

I	De temperamentis, quae per gustatus qualitas tisprehenduntur	278
II	De ordine interuallo temperamentoꝝ	ib.
III	De particularium simplicium medicamen- torum facultatibus	279
III	De medicamentis simplicibus quae fluxu bili purgandae sunt	330
V	De compositis medicamentis purgantibus	333
VI	Quomodo eos qui purgantur tueri conueniat, quidq; faciundum ubi medicamentum pur- gans nihil profecerit	335
VII	Si purgatio modum excedat	336
VIII	De hieris antidotis	ib.
IX	Quae sedi & umbilico illita purgent	337
X	Quae medicamenta uomitum citent, & quo mo- do helleboꝝ exhibeatur	ib.
XI	De differentia antidotoꝝ	339
XII	De pastillis	348
XIII	De medicamentis quibus aridis utimur, xer- ia dicuntur, & smegmatis	353
XIII	De medicamentis liquidis quae illinuntur, ad	

ANNOTATIONES

	oris uitia, unde stomatica dicuntur, ac gut tur accommodatis	356
XV	Dulces utilesq; poriones	357
XVI	De collyriis & agglutinamentis	358
XVII	De emplastris, & medicamentoz quæ in illa mittuntur coctione, tū qui ceræ modus cū oleo esse debeat, ex commentariis Antyl li	365
XVIII	De malagmatis & epithematis	378
XIX	De acopis, inunctionibus dropacibus & sinna pismis	382
XX	Quomodo diuersa olei & unguentorum ge nera conficiantur	385
XXI	De oenanthariis	389
XXII	De suffimentis & cyphi	ib.
XXIII	Cōfectio masuchæ, quod nonnullis masua phion uocatur	390
XXIII	Ex commentariis Antylli, de pessis	ib.
XXV	De medicamentis inuicem alternantibus, ex commentariis Galeni	391
XXVI	De ponderibus & mensuris	394

PAVLI ÆGINETÆ PERIODE VO
in suum de re medica opus, præfatio.

PAVLI LABOREM NOSCE ME^{vx}
qui plurimas inuisit orbis terras, ægina satus.^{lvx}



Non equidē opus hoc, quasi ueteres aliis
qua arti necessaria prætermiserint, com
ponere sum aggressus, sed totam ut dis
ciplinam in compendium redigerem.
Econtrario enim illi recte quidem omnia
& integre elaborauerunt: recentiores
autem præterq̃ q̃ illos ne legere q̃
dem curant, etiā loquacitatis adhuc co
arguunt. Quæ ratione impulsus uolumen istud elucubraui.
quod illis sanè qui ipsum, ut uerisimile est, habere uelint, eorū
quæ legerunt commentarius, mihi uero exercitii loco erit.
Absurdum nanq̃ fuerit rhetoras uti compendiosis iudiciali
bus libellis, & ad circumferendum accommodis, in quibus le
gum capita continentur, ut dum usus postulat, in promptu
habeant, nos, nullam eorum habere rationem: quum illis nō
pauco tantum, sed iam longo etiam tempore, ipsorum inspe
ctione supersedere liceat: nobis neutiq̃, aut certe raro ea facul
tas concedatur. Et enim usus in quibusdam morbis frequen
ter nullam ferens dilationem certamen inducit. ob q̃d recte
Hippocrates occasionem dixit precipitem. Illos p̃terea in so
lis fere urbibus rerum utilitas incitat, ubi & libri nequaquā desin
derantur: medicis autem non tātum in urbibus, aut agris, aut
etiam locis desertis, uerum iam quoq̃ p̃ mare frequenter in
ipsis nauibus subita morborū necessitas ingruit: in quibus dila
tio mortem, aut oīo extremum adfert discrimen. Quā igit̃
uniuersas medendi rationes, aut particularem oēm materiā
memoriter tenere uel difficillime uel nequaquā aliquis possit, cō
pendiū hoc ex ueteribus collegi. Nulla, n. de meo inserui, nisi
si paucula q̃dam in artis operibus mihi & uisa & comperta.
Nam quum plureis egregios authores, magisq̃, Oribasium

ipsum, unde primū librum, quo totā de tuenda ualetudine rationem cōprehendī, sum mutuatus, q̄ ille ex iis q̄ ætare Gale num sequuti sunt, adeoq̄ recentior adhuc extiterit, p̄legissē optima quæq̄ ex ipsis se legi, nihil quatenus licuit, ex morbis prætergressus. Etenim Oribasii ipsius uolumen, à septuaginta libris quos continet Hebdomēcontabiblon appellatum, qđ totam in se artis materiam cōplectitur, non oēs, q̄ grandius fit comparare sibi possunt. In huius autem Epitome ad Eustathium filium scripta, præterq̄ q̄ pleriq̄ morbi non attingātur, etiam imperfectam reliquorū speculationem uideas, partim causarum partim signorū: nonnunq̄ & curatio integra desideratur, ceu alia in memoriā uenerint.

P R Æ S E N S commentarius notas, causas, curationem, oīum morborū cōtiner, similiarium, instrumentariorū, & eorū quæ ad unitatis diuortium p̄tinent. id q̄; non summatim, sed quatenus licet ample & diffuse. Ante hæc aut oēm uictus rationem q̄ sanitati tuendæ facit, exposuimus. Postremū autem librū de simplicib⁹ cōpositis q̄; medicamentis cōscripsimus.

Q V I D S I N G V L I S E P T E M T O T I V S O P E R I S libri, nam totidem habentur, contineant.

P R I M V S omnem sanitatis tuendæ rationem tradit: item quomodo morbi peculiāres ætatibus, anni temporibus, temperaturis, aliisq̄; nonnullis, caueantur emendenturq̄. Præterea ciborum omnium uires & usus habet, ut in capitibus cōprehensum est.

S E C V N D V S febrib⁹ uniuerſas enumerat, ita ut præponantur ipsis, quæ eo conferunt, exempli gratia, notæ ex recrementis, diebus decretoriis, & id genus aliæ. Subiunguntur autem casus qui febrib⁹ superueniunt.

T E R T I V S affectus declarat, qui singulis corporis partibus obueniunt, sic ut à summo capite ad imos pedes, adeoq̄ ungues descendat.

Q V A R T V S agit de exterioribus & ueluti in aperto cōtractis uitiis, quorum non certæ sedes assignari possunt, sed plureis particulas infestant. In quo & de lumbricis, & dracunculis tractatur.

QVINTVS de animalibus et de morfu uenenum re
linquētibz differit, ubi & de rabiosi canis morfu & metu ag
quæ, adhæc de nō rabidi canis morfu hominisq; agitur. In
bi de uenenis eorumq; remediis disputatur.

SEXTVS chirurgicam oēm exponit, tū q̄ carnis uitia cu
rat, ubi & teli extrahendi ratio comprehenditur, tum q̄ ossiū
fracturas, luxationesq; artuum complectitur.

SEPTIMVS omnium medicamentorum uireis conti
net, primum q̄dem simplicium, deinde & cōpositorum, eos
rumque potius q̄ in sex alijs librorum discursu commemi
ni præsertim maiorum & nominatarū compositionum. Scio
enim illic non omneis diffuse explicari, ne disciplina tædium
afferat: tum, ut quærens aliquis unam, aut etiam plureis nobi
leis confecturas, facile inueniat. In fine adduntur nonnulla
ad medicamentorum compositiones utilia, item de alternan
tibus inuicem remediis agitur, ut totus liber in disciplinam
de ponderibus & mensuris definat. Incipiemus itaque pri
mum uolumen.

PAVLI

ÆGINETÆ LIBER PRIMVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco medico interprete.

QVÆ GRAVIDIS SUPERVENI
ant, & quæ uictus ratio eis conducatur. Cap. I.



VANDOQ VIDEM IN
ter ea quæ superueniunt graui
dis, hæc potissimum infestare so
lent, nausea, continuæ uomitio
nes, sputa, stomachi erosio, & ci
bi fastidium: non alienum fuerit
remedia quibus ab eis uindicen
tur, perscribere. Pro sunt itaq; ob
ambulationes, cibi non nimium

- 10 dulces, uina uermicula, odora, maxime quinquennia,
& moderata potio. Hæc enim omnia ne mulier nau
seet uomatq; impediunt. At medicamenti loco uincit
polygonium herbam aqua elixam bibere. item ane
thum & ponticam radicem, quæ indigeti uocabulo
15 rha nuncupatur. hæc tum ante, tum post cibum licet
assumere. Extrinsecus præcordia adiuuari debent, ca
taplasmate ex labruscæ & pumicæ syluestris flore, cy
tisi smyrniiq; coma, & foeniculi semine, siue per se, siue
quomodocunq; uoles miscere, cum palmulis & uino
20 ueteri. Aduersus stomachi rosiones confert, calidam
aquam bibere, quiete inambulare, præcordia contege
re lana molli. At eas quæ cibum respuunt, uariis & ad
uoluptatem quæsitis cibis amyloq; sicco sollicitabis,
magis autem hoc obtuleris iis quæ terram edere con
35 cupiscunt, ut in uitio quod Græcis Citta dicitur, acci

PAV. ÆGIN.

A

PAULI AEGINETAE

dere consuevit, id tertio à conceptu mense potissimū contrahitur. Nam tunc foetus omne quod ratione alimenti ad ipsum fertur, tanquam imbecillior, nequit cōsumere, unde fit, ut quum uaria ex eo recremēta in stomacho grauidæ redundant, uaria & naturæ aliena appetat, exempli gratia, carbones extinctos, cretā Cimoliam, aliaq; complura. Hanc enim ob causam appellationem huiusmodi affectus accepit, uel à picæ auis uarietate, uel quod eadē subinde hoc malo corripitur. Cibi facit appetentiam labor, & longior peregrinatio. Quæ uero mulier citra labores agere cōsuevit, haud commode repentinas subibit motiones. Verum acria quandoq; gustare, præsertimq; sinapi, cibum fastidiēti non fuerit alienum. Cæterum eximios pedum tumores quos œdemata Græci dicunt, anthyllis quæ in aceto maduerit super deligata, discutit: item folia brassicæ latoris atq; Cimolia creta ex aceto illita, similiter alumen cum aceto proficit. Recte etiam mala medica, quæ citria aliās dicuntur, aquæ incocta pedibus admoventur.

DE NVTRICE. Cap. II.

D Eligi nutrix debet, nulli morbo obnoxia, ætate mediocris, ita ut iunior quinque & uiginti annos compleuerit, grandior quinque & triginta non excedat: pectore sit amplo, mammis magnis, papillis neq; coniuuentibus neq; auersis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili. Præterea magnum est infanti commodum, si nutrix non multo ante pepererit, maiusq; si masculum. Vitanda ei sunt, admodum siccantia, salia, acria, acerba, acida, amara, & ualide calefacientia. Item odores tum foedi, tum suauēs præter modū, condimenta, aliaq; acria nocent. Ad hæc uenere nutrix abstineat, manus humerosq; molendo texendoq; exerceat: puerum ulnis gestet, ubi treis iam menses quatuorue excesserit.

DE LACTE NVTRICIS. Ca. III.

LIBER PRIMVS 2

L Audatissimum lac est, moderatū spissitudine co-
pia, colore, odore, & gustu. Commendatur &
quod in unguē pollicis instillatum, eo inclinato
ad lucem, neq; subito neq; tarde uidetur defluere. Iā
uero in hunc modum probari potest: infuso lacti in
uas uitreum, coaguli exiguū admiscetur, digitisq; agi-
tatur, in quo postquam concreuerit, inspicietur, num
casei portio minor q̄ serum fuerit, hoc enim lac inuti-
le est: contrarium huic, concoctu contumax: probatis-
simum quod utraq; habet mediocria.

QVOMODO LAC VITIA

tum corrigatur. Cap. III.

L Ac uitiatū hoc modo corrigi debet, si crassius
fuerit, pituita uomitu elicietur, qui optime oxy-
melite epoto citatur: laboribus cibum præcedē-
tibus eadem extenuabitur. Tunc nimirum in cibo cō-
ducunt, origanum, hyssopum, satureia, scandix & thy-
mus, item radícula exigua, uetusq; fassamentum cum
oxymelite. At si acrius tenuiusq; lac euaserit, multis q̄-
dem tunc laboribus nutricem leuare, sorbitionibus
autem & carnibus suillis, sapæq; & uini dulcis potu,
reficere conuenit. Si lac fuerit imminutum, sorbitionis-
bus & pleniori modo sustentāda est, uinum dulce po-
tui dabitur: pectus & mamillas perfricare oportet, qui-
busdam cucurbitula quoq; defixa abunde præstitit.
Medicamenta uero etsi lacti generando proficere qui-
dem aliquid sciam, non tamē frequenter ipsis uti præ-
ceperim, ut quæ uiolentius consumant, est autem foeni-
culi radix, & semen, ptisanæ incocta: item cyt si folia ex
uino nigro aut ptisana: melanthiū dulce & anethum,
pastinacæ radix atq; semen, quæ calida prius irrorata
admouenda sunt. Omne uero lac uitiosum, siue cras-
sum, siue acre fuerit & foetidum, puerum qui prius su-
xerit, eadem qualitate inficit. Lac autem acre nunquā
ieiuno exhiberi debet foetorem eius uinum odoratū
& cibi dulces emendare possunt. Porro de caseato

A ii

PAULI ÆGINETÆ

lacte tertio uolumine in capite de mamillis tractabimus.

EDUCATIO PVERI. Ca. V.

Primum infans recens natus melle nutriri debet: mox lacte, idq; bis die, aut plurimum tertium autem propte & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod oblatum est concoquere, tunc iam & cibus solidior recte datur qui non ipsum repleat. At si forte imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior autem statim & torpidus magis euadat, uenter intumescat infleturq; & urinæ aquosiores reddantur, quæ repletionis notæ sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumpserit. Abunde autem fuerit duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi.

DE PVSTVLIS PVERO OBOR

tis, exanthemata dicuntur. Cap. VI.

Pustulis quæ puero per cutem eruperint, primum sane nullum facessere negotium oportet, ubi uero probe decreuerint, tunc iam curare tentabimus, balneis, quibus iniiciantur myrti aut lentisci folia, aut rosæ, deinde rosaceo aut lentiscino utendum: ceratoq; cum cerussa, ad hæc nitro abstergere lenius expedit: nam ualentiora non sustinebit. Optimum uero est nutricem dulciori uictu uti, laudatur item maxime si puer ipse neq; pleniore, neque nimis tenui cibo alatur. At si uenter ipsius non respondeat, tunc mel cibo infusum simul coquere oportet: si ne sic quidem descenderit, terebinthinæ instar ciceris iniicies. Humerata aluo, milium potissimum offerre conducit.

DE TVSSI ET GRAVEDINE

ne pueri. Cap. VII.

Quod si quandoq; tussicula aut grauedo puerum affligat, linctus ex melle, quos Græci melitissimos uocant, adhibentur. Conuenit igitur puero beraliore aqua calida loto caput ipsius melle

LIBER PRIMVS. 3

copioso illinere, deinde digito linguam leniter preme-
re: multum enim hoc pacto pituita uomitu egeret.

DE GINGIVARVM PRV

ritu. Cap. VIII.

5 **P** Rurientibus gingiuis fomento utendum est, &
liberali unctione ex oleo discocto, in quo ceræ
momentum eliquatum sit.

DE DENTIVM ORTV. Ca. IX.

10 **D** Entiunt septimo mense pueri: tunc autem in-
flammationes gingivarum, maxillarum, & ten-
dinum, aliquando conuulsiones etiam eueni-
unt. Tunc igitur puero nihil dādum, quod mandi pos-
sulet, digito autem in lauacro gingiuae continenter
contrectari, & gallinaceo adipe uel leporis cerebello
15 emolliri debet. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, cap-
put, & maxillae delicatis lanis puris cōteguntur, oleoq;
dulci & calido fouebuntur: idemq; meatibus audito-
riis instillabitur. Cæterum plenius Infantem tunc ale-
re, & calida lauare oportet, & si alui profluuium expe-
20 riatur, tentabimus eam epithematis quæ præcipue sis-
tunt, contrahere, inspergendo lanæ cuminum: aut ane-
thum, aut apium. Salutare est etiam semē rosarum ad-
miscere, & summatim calidis desiccare. At si uenter ni-
hil reddit, melle in glandis figuram coacto, inferius leni-
35 ter irritabitur, aut nepita detrita cum melle illinetur.
Porro conuulsionibus puerorum optime uidetur au-
xiliari heliotropium in aqua elixum, si puer in hac la-
uetur, confert & irino aut cyprino & syncionio per-
ungere, & uniuersum calefacere. Quum autem exor-
30 tis dentibus digitos mordet uulneratq; benefaciet ra-
dicem iridis derasam, nec admodum siccam, ore con-
tinere. Hoc remedium ulceribus quoq; opitulatur: bu-
tyrumq; cum melle illitum adiuuat. Gingivarum autē
pruritus, ueteris salsamenti caro lenit.

DE ORIS VLCERIBVS QVÆ

35 aphthæ dicuntur. Cap. X.

A iii

PAULI AEGINETAE

Oboritur puero etiam ulcus quod aphtha uocatur, nunc subalbidum, nunc subrubrum, alias crustæ modo nigrescens, quod omnium periculosisimum & lethale est. Remedio erit, iris cum melle & sicca inspirata. Item rosarum folia contusa, earumque flos, crocum, myrrhæ exiguum, galla, lachryma thuris & cortex eiusdem, & simul, & priuatim singula melle tincta: ad hæc mulsæ, & mali Punici dulcis succus proficit.

AD FEMORVM INTER-
trigines. Cap. XI.

Femorum intertrigines myrtus arida, iuncus angulosus, & rosæ inspersæ iuuant.

AD AVRES HVMENTES.
Cap. XII.

Aurium humiditates lana ex alumine imposita aut mulsæ, aut uinum uetus instillatū, aut crocum ex uino detritum, desiccant.

DE SIRIASI. Cap. XIII.

Siriasis, quæ Latinis adustio infantium dicitur, est inflammatio partium circa cerebrum, eiusque membranas. concavum in ea sit sinciput, concavi itidem cum pallore oculi accedit & corporis totius siccitas. Succurrit huic malo uitellus oui sincipiti cum rosaceo linamenti impliciti modo impositus, sic tamen, ut continue renouetur.

ALIUD AD SIRIASIN.

Oportet eidem loco imponere folia herbæ quam Græci heliotropion, Latini solarem nuncupant, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem peponem dicunt, cum carnē adiacentem, aut hortensis solani succum cum rosaceo.

RATIO VICTVS INFAN-

tium atque reliquarum deinceps ætatum, ad usque declinantes.

Cap. XIII.

LIBER PRIMVS

4

Posteaq̃ lacte nutriti infantes desierint, liberiore
 eis modo & suo ingenio hilariter uiuere per-
 mittemus: exercitia autem & alimenta leuiora
 præscribentur. Ab anno sexto & septimo, tum pueri,
 tum puellæ, literatoribus blandis humanisq̃ traden-
 tur, tales enim cū animi renissione et gratia docent.
 Animi autem renissio ad probā corporis educatio-
 nem plurimum adfert momenti. Duodecimum annū
 egressi, ad grammaticos iam & geometras mittendi
 sunt, corpusq̃; eorum exercere oportet. A quartode-
 cimo usq̃; ad primū & uigesimum, mathematicis dis-
 ciplinis & sapientiæ studio incumbent; exercitiis plu-
 ribus propter corporis robur credentur, ut & animo
 & corpore laborantes, à libidinis impetu coerceantur
 his etiam uinum cū cuncidendum est. Aetate florentis-
 bus educatio absoluta tum animi, tum corporis con-
 gruit, eoq̃; exercitiis omnibus, præsertim q̃bus quisq̃
 assueuit utendum, cibo pleniore & ualentī. Declinan-
 tibus autem moderata competit & animi & corporis
 educatio. Exercitia enim qualiacunq̃ fuerint pro ho-
 rum ratione imminuere oportet: alimento detrahens-
 dum, ut quorum habitus iam frigescere incipiat.

DE FR I C T I O N E P R Æ P A R A T O R I A

torīa, quæ parascœuastice dicitur. Ca. XV.

An te exercitationem corpus mediocriter cale-
 facere oportet, frīctione linteis adhibita. dein-
 de nudis manibus oleo intinctis p̃fricare: usq̃
 dum bene incalescat emolliaturq̃; colore uiuido rus-
 bescat, & in tumorem attollatur.

DE E X E R C I T A T I O N E. Cap. XVI.

Exercitatio motus est uehemens. uehementiæ
 aut finis est, respiratio crebra. Id uero commo-
 di præstat, quod parteis instrumētarias morbis
 non opportunas efficit, & functionibus obeundis uas-
 lidas: præterea ut alimenta fortius attrahant, prōptius
 immutent, & liberalius reficiantur, caloris beneficio

A iiii

PAULI AEGINETAE

quem illa excitauit, adde quod meatus expurget, recrementa propter ualidam spiritus motionem, expellat. Quoniam igitur alimentorum per corpus membratim digestionem adiuuat, conuenit ut neque copiosi neque crudi, siue cibi siue humores, in uentriculo, aut in testinis contineantur. periculum enim est, ne priusquam probe fuerint concocti, in uniuersas animantis particulas distrahantur. Vnde manifesto liquet exercitationem cibum praecedere oportere. Notae autem quae opportunitatem laboris subeundi ostendant, ex urinarum colore petuntur. etenim aquosae nondum coctum humorem qui ex uentriculo distributus est, significant: rufae autem & biliosae, iampridem elaboratum esse esse notant: quae leuiter pallescunt, initium concoctionis quae adhuc fit, signant. Tunc igitur ad exercitia ueniendum est, ita ut uesica prius & alius recrementis leuentur.

DE EXERCITATIONVM

generibus. Cap. XVII.

Omnis exercitationis commune est, quod animi mali ex se ipsa caloris augmentum excitat. Ex singulis autem exercitationum generibus alia ualida, hoc est, uiolenta est, musculis & neruis robur praeparans, cuius generis est quum quis fodit, & maximo onere sublato, aut eodem loco manet, aut paululum procedit: item quum quis quantum maxime poterit inambulat: praeterea per funem manibus apprehensum scandit, aliaque plurima in eundem modum obit. Alia celeris exercitatio est, quae citra robur uiolentiamque peragitur, id genus sunt cursus, umbratilis armorum meditatio, aut quum duo summis manibus concertant, tum quae per corycum & paruam pilam fit exercitatio. Alia composita est ex ualida & celeri, quando quas ualidas diximus iis omnibus ut uehementibus uti licet, motus modo celeritatem adicias. Praeterea per alias exercitationes lumbi magis quam brachia curave las

LIBER PRIMVS.

borant: per alias spina tota, aut thorax tantum, aut pulmo. Exerceri uero oportet quousque corpus in tumore attollatur & rubescat, motus prompte, æquabiliter & concinne edat. Inter hæc autem sudorem cum calido uapore mixtum cernes. Pausandum uero ab exercitatione tunc primum est, quum aliquod horum fuerit immutatum, nempe si contractior corporis moles uidebitur, ilico desistendum est: similiter quum coloris gratia deperit, cessare oportet. Quinetiam quum motus remittere quippiam cernitur, protinus desinere conueniet. Idem si in sudore ulla qualitatis eius, aut quantitatis mutatio accadat: quum enim is aut minor, aut frigidior factus intelligitur, tunc desistendum scias. oleo mox corpori superfuso, apothera pia uti deinceps oportebit, inde frictionem apotherapeuticam adhibere: ut pædo ribæ facilius solent.

DE GENERIBVS FRIC tionum. Cap. XVIII.

Inter frictiones, dura ligare corpus potest: mollis, soluere. quapropter quæ supra modum resoluta sunt, duriter perfricare oportet: quæ autem astricta, molliter. At si mediocri quis corpore præditus sit, neque molliter neque duriter fricandum id esse constat, sed quatenus licet uterque excessus uitari debet. Siquidem multa & dura frictio, corporis molem deprimit: modica uero & mollis, e contrario implet. Porro tres quantitatatis frictionum differentias, si tribus quæ à qualitate ducuntur, iunxeris, nouem coniugationes effeceris, ut subiectum est. Etenim una iuxta quantitatem, nempe multa, si tribus quæ à qualitate sumuntur, duræ dico, molli & mediocri, adiungatur, treis secundum duritiæ differentias efficit. modica rursum si eisdem tribus addatur, treis alias procreat. At mediocris qualitate, eisdem tribus iuncta, alias treis progignit, ut in formula subiecta uidere licet.

PAULI AEGINETAE
Q VANTITAS. Q VALITAS.

Multa)	(Dura
Multa)	&	Mollis
Multa)	(Mediocris
Pauca)	(Dura
Pauca)	&	Mollis
Pauca)	(Mediocris
Mediocris)	(Dura
Mediocris)	&	Mollis
Mediocris)	(Mediocris

DE VOCIS EXERCITATIO
ne. Cap. XIX.

INter uocis exercitationes suavis aptaq; modula-
tio nihil ad sanitatem tuendam proficit: grauioris
autem uocis sonus utilis habetur, eoq; exercere
eum oportet. Ita enim aer copiosissimus inspiratu in
corpus attractus, thoracem, uentriculum & meatus to-
tius corporis deducit, dilatat, aperitq;. Quapropter
ipsa lectione humores qui redundant, excernit, fortius
igitur legentibus, magis & per sudores, lenius aut, p-
latentem totius corporis perspiratum. Accidit enim
propter extenuationem multa recrementa, nempe spu-
ta, mucos & pituitam, p-creatum excerni consumi-
lis uero qui propter frigiditatē exal fieri desiderant,
quodnam aliud praesentius remedium esse potuerit,
q; functio quae respiratione peragitur. Consilium igitur
est, hos frequenter legere. ut toto corpore relaxa-
to, fusaq; carne, arteriam & alios spiritus transitus stu-
diose rarefacientes, per grauiores uocis actiones mo-
dulentur. Vti autem oportet uocis officio neq; teme-
re neq; inconsiderate, sed quū nec uitiosis corruptisq;
humoribus repleti sunt, neq; magnae & euidentes sto

LIBER PRIMVS 6

machi cruditates apparent, ad uocis exercitationem accedendum est, ne corrupti uapores per corpus largius distribuuntur.

DE LASSITVDINIBVS OB

exercitationem. Cap. XX.

Vlcerosa lassitudo ab excrementorum tenuiū
 simul & acrium copia contrahitur. Tensoria
 nullum quidem excrementum, cuius ratio ali
 qua sit habenda, in corpore contineri indicat, sed in
 10 musculis neruisq; affectus quidam quo tendi uiden
 tur, residet. Ea uero quæ inflammationis speciem præ
 se fert, in qua nimirum ceu contusas, aut inflammatio
 ne obsessas parteis sentimus, tunc solet incidere, quum
 muscoli impendio excalfacti, aliquid ex circūfusi sibi
 15 recrementis attraxerunt. Est & alia quædā præter has
 quarta affectio quæ oritur quum muscoli supra q̄ par
 est, siccantur, ita ut cum se exuerint squalens corpus
 cōtractumq; appareat, atq; ad motus pigrum. Remes
 dium ulcerosæ lassitudinis est, si quæ redundant euas
 20 pores frictione multa molliq; cum oleo copiosiore,
 quod omnis astrictionis sit expers. Altera lassitudo in
 qua tensio sentitur, hoc pro curatione desiderat, ut res
 laxetur, sanè relaxatur quod distentū est. pauca & mol
 li frictione, eaq; ex oleo dulci atq; egelido: item inter
 25 missione omnino, quiete balneis temperatis, atq; in ca
 lida mora lōgiori: adeo si bis terve ipsum laues, plus
 profeceris. Tertiæ lassitudinis inflammatoriæ curatio
 nis consilium, ad tria dirigitur, nempe, superuacanei
 euacuationem, extenti remissionem, & inflāmationis
 30 refrigerium. itaq; & oleum copiosum tepidumq; &
 frictiones mollissimæ, & lenta in temperatis aquis mo
 ra, eiusmodi lassitudines perfanāt. pari modo & mul
 ta quies, *maxime cōtinua. Quarta affectio nihil sanè
 à priori consuetudine immutari postulat, nisi caldiore
 35 aquam, quæ sensim contrahat: altero die, apotherapie
 exercitationē, ad hæc soliū similiter calidū, sic, ut ægri

* Gale
 nus una
 ctio con
 tinua.

PAULI ÆGINETÆ

protinus in frigidam exiliant. Statim uero oēs qui lassitudinibus laborant, cibo refici debent.

DE CVTE ASTRICTA. Cap. XXI.

A Strictio quam Greci stegnosin uocant, accidit, aut obstructis, aut densatis meatibus. obstructio quidem, ex copiosis, aut ex crassis humoribus crudis concoctionemq; non expertis, oritur: densatio autem, ab iis quæ refrigerant, aut astringunt, aut deficcant. Ac deprehenditur sanè iam dictus affectus, statim ubi se exuerint, ex colore albo, & cutis tum duritie, tum densitate: tum quod in ipsa exercitatione uix incalescant. Succurrit huic affectioni calefactio, quæ ualentiore exercitio, balneisq; calidioribus petenda est. Mora uero in frigido solio diuturna non sit, imo nec ipsa aqua nimium sit frigida. Vbi uesteis sunt induturi, ungentur aliquo quod mediocriter calfaciat oleo, dulci ac tenui. Cutis autem densitatem abunde etiam sanat oleum anethinum, præsertim si uiride fuerit anethum: oleumq; ex populo nigra confectum.

DE SPONTANEIS LASSITUDINIBUS. Cap. XXII.

Quoniam ulcerosa lassitudo ex acrium recreamentorum uitio contrahitur, si quidem paucus omnino uitiosus humor fuerit, apotheraspiæ exercitatio suffecerit: si copiosior, & altius in corpore redundarit, eiusmodi malo obnoxius nec exercitationem nec ullum omnino motum iniungemus, sed quiete somnoq; recreatos abstinere cibo totum diem cogemus, deinde uesperis pinguius unctis, temperatoq; balneo lauatis, cibum boni succi & sordilem exiguum dabimus, non tamen à uino eos arcetes. hoc enim semicrudos humores, si aliquid aliud concoqit. Si ergo his peractis malum conquieuerit, ad pristinam consuetudinem pro ratione reducendi sunt: sin in posterum etiam diem remaneat, de ualentiore iam remedio considerandum est. Si enim uires consent, duorum

LIBER PRIMVS. 7

alterum, aut sanguis mittendus est aut purgatio exhibenda, sed ita ut discernamus, utrum magis expediat. Quod si vires inualidæ sint, sanguinē dimittere haudquaquam oportet, sed defectionem mediocrem tenere. At si crudi humores omnino fuerint, neque sanguinis detractio, neque purgatio, neque exercitium ex usu est, imò ne mouere quidem in totum, aut lauare expedit. Tales igitur in quiete omni seruandi sunt, cibis potionibusque, & medicamentis quæ extenuent incendantque, sine manifesto calore, reficiendi. Pro cibo igitur oxymel, modicum ptisanæ, nonnunquam & mulsa exhibebitur. Quoniam uero præcordia eiusmodi omnibus turgida inflataque sunt, ac facile quicquid assumpserint in flatu conuertitur, satius fuerit cum cibo peris aliquid offerre. Vtilius autem erit, & medicamentum quod diospolites dicitur, uti: item dia trion peperon simpliciter: utilissimumque ipsis est oxymel. Potui sument apomel, præsertim ubi coacuit, uinaque leuiter acescentia. cibi erunt qui sine calore attenuent, cuiusmodi est capparitis si ex oxymelite, aut oxelæo assumatur. Porro tensionis lassitudo quæ sine exercitiis oboritur, copiam innuit solidas corporis partes distendentem. Constat autem omnibus, optimum esse præsidium quum sanguinis copia subest, aut uenam incidere, aut malleolos scarificatu sauciare. Quæ uero inflammationem repræsentat lassitudo spontanea, ea ne paucis quidem horis, nedum duobus tribusve diebus eodem tenore consistit, sed protinus febrem accendit uehementissimam, nisi sanguinis detractioe malo prius occurreris. Præstiterit autem, si fieri queat, bis eodem die sanguinem detrahare: ac primum quidem ita mittere conuenit, ne animi defectu homo periclitetur: secundo autem, ne defectio quidem ipsa formidari debet. At qui sic affecti sanguinem non dimiserint, hi ut periculum euadant seruenturque bonæ fortunæ beneficio opus habent.

PAULI AEGINETAE
VICTVS SENVM RATIO

tio. Cap. XXIII.

Seneſtus quum ſicca frigidaq; exiſtat, per caleſas
cientia humectantiaq; corrigi debet. Frictio itaq;
adhibenda eſt, citra laſitudinem: imbecilliores
ter die cibo refici debent: ad tertiam quidem horam,
panis exiguo cum melle attico: ſeptima uero hora
ubi frictionem exercitationesq; ipsis congruas & bal-
neum fuerint experti, primum ſanè quæ aluum emol-
liunt, aſſument. deinde piſces, aut auiculas, hinc poſt
coenam ea quæ optimi ſucci ſunt & ægre corrumpũ-
tur. Non prohibeo item uinis ex melle præparatis uti
præcipue quibus de calculo in renibus creato, aut et
podagra ſuſpicio eſt quando petroſelinum uino recte
iniicitur. At ſi quando pituita in uentriculo contracta,
neceſſitas eſt aliqua quæ eam incidant, deligere, præti-
nus ad humectantem uictus rationem digrediendum
eſt: contra quod ſici maturæ ante alium cibum ipsis
exhibentur: per hyemen uero caricæ, ſi nullum in dexte-
ra præcordiorum parte uirium accidere ſentiant. At
quia ſeroſa pituitosaq; in ſenili corpore excrementa
colliguntur, urinam quotidie promouere conſiliũ eſt,
& aluum ſubducere, præſertim oleo ante cibum epo-
to. Clarum uero eſt, omnia olera ante cibum ex oleo,
garoq; ſumi oportere: itẽ oliuas muria ſeruatas, quas
halmadas dicunt, & damascena. Quod ſi uenter ma-
gis aſtriçtus nihil deiecerit, & mercurialis herba, &
unicum abunde ſunt, benefacit etiã reſina terebinthi-
na, interim unius auellanae, interim duarum triũve ma-
gnitudine ſumpta. Iam oleum quibus aluus contracta
eſt, per clyſterem utiliſſime infunditur.

DE RVGOSO CORPORE.

Cap. XXIIII.

FRugat corpus erui farina, uitæ albæ miſta.
ALIVD SMEGMA QVOD
continue illinetur. Fici pingues ſimul cum bryo

LIBER PRIMVS.

8

nia contusæ, farina erui uita, aut sepia testa cum melle
lis momento trita.

QVOMODO CORPVS SVA

uiter oleat. Cap. XXV.

VT corpus bene oleat eidem unctioni cupressi
comam aridam contusam admisceto, aut pio
ceæ corticem. Meminisse uero debes, ut ma
ne postquam corpus uestimentis munieris, pauxillū
cassia aut sabinae herbae degustes.

QVOMODO HABITVS IN

caleseat. Cap. XXVI.

AD habitudinem calfaciendam in balneo uten
dum est hoc puluere, qui recipit, nepitā, samp
suchum, hyssopum, baccas lauri, rorem maris
num, lapidem pyritem, salem, fecem combustam, nig
trum, pumicem, pro cuiusq; ratione: item sinapis, her
bae pedicularie & cocci gnidii momentum, a balneo,
acopiulus erit quod calefaciat: uinum uermiculum,
uetus potui dabitur, item potio medica ex mulso, pio
pere, ruta, & consimilibus, utilis est.

QVOMODO COLOR MA

lus emendetur. Cap. XXVII.

COrpus decoloratum pallidum uel uita iucunda
& cibus boni succi emendat. miscetur autem
huic radícula, porrum, & uiride cicer. Iam ma
li punici dulcis succus sorbitionis modo sumptus, bo
num colorem efficit. Proficit etiam oleum cui bryo
niae radix diutius sit incocta, idem & corporis cutem
intendit erugatq; smegmatis autem miscere oportet
glutinantia quæ sunt ex quopiam astringentium, fari
na, bulbo, narcisso & bryoniae radice. bene colorant, si
copia datur, tum radix tum semen amaræ amygdalæ
in aqua elixa, & in balneo adhibita.

AD LIVORES. Cap. XXVIII.

Luescere senum corpora prohibemus, si cu
tem ipsorum crassam, ita ut minus iniuriis

PAULI AEGINETAE

pateat, & habitum calidiorem reddiderimus. Ut autem celerius id assequamur, sale in balneis, super partem quæ nigruerit uti conueniet, eandemq; fomentis perspongias decocto radiculæ aut absinthii immerfas, adiuuare.

QVOMODO DENTES AB

iniuria asserantur. Cap. XXIX.

Dentes ab iniuria uindicabis, si primum caueas: ne cibi quos ingesseris corruptionem experiantur, mox cōtinuam uomitionem deuites: deinde escas dentibus incommodas, nempe ficus aridas: mel coctum & satis durum factum, palmulas uix fragiles, adhæc omnia glutinosa, quæq; adeo frangi contumacia sunt, ut denteis commoueant, insuper uisitare oportet, quæ denteis stupefaciunt, perfrigida cuncta & putrida. Conducit itidem secundum cibū denteis purgare.

QVOMODO GRAVIS AVDI

tus corrigatur. Cap. XXX.

Ad grauem auditum corrigendum, uincit primum meatus per quos audiendi facultas est, sordibus expurgare: per interualla autem lintheum dropaci intinctum ipsis demittere, atq; prius expressum retrahere, summè enim meatus purgat, & simul auditum auribus reddit. Deinde aliquo erui instar inserto, meatum ad diem obturabis: postea ipso exempto, quotidie oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut pingui anserino, cum exiguo fellis bubuli perunges. Rursus diebus aliquot interpositis sinapi & ficis contritis factum penicillum ad ad horas duas imponis, inde hoc exempto infundis oleum, quod in asphodeli radice succo deferbuerit.

AD OCULORVM CALIGI

nes. Cap. XXXI.

Ne caligine oculi corripiantur, quum in aquam frigidam te mergis, illos diu in eadem apertos esse

tos esse conueniet, hinc enim robur uisui adiici-
 tur. Lēctione uero non te fatigabis, uino crasso &
 dolci abstinebis, similiter cibus qui in superiore uentri-
 culo diu remorantur, concoctu difficiles, & qui humo-
 res lentos crassosq; generant: cuiusmodi sunt cruce,
 porrum, & omnia quorum acrimonia sursum effertur.
 Vitare item oportet supinum incubitum diuturnum,
 frigus, uentos contrarios, fumum & puluerem.
 Iam uero aquam oculis instillare quotidie ad mēsem
 totum, iuuat, quæ in hunc modum præparatur, fœnis
 culum uiride fictili uasi extrinsecus picato, cum aqua
 cœlesti demittitur, deinde exempto fœniculo quod
 reliquum est repones.

DE REPLETIONE. Cap. XXII.

Purimum noxæ ciborum repletio conciliat,
 quanuis probam in uentriculo concoctionem
 sortiti sint. Nam quum uenæ nimium repletæ
 laborant, distenduntur, rumpuntur, obstruuntur & fla-
 tu implentur, credibile admodum est, grauisimas ex
 hac causa ægrotudines procreari. Quum igitur uētris
 urget repletio, interim uomitu quod redūdat, interim
 per aluum excernitur: in totum inualidior hæc, ea est
 quæ uenis accidit, nō tamen & ipsa admitti debet, sed
 si quis impendio plura assumpserit, statim eum uome-
 re oportet. periculum etenim est, ne obita concoctio-
 ne uenæ repleantur: magisq; si intemperantius cibus
 continue assumptis, nullam deinde uacuationem ex-
 periat. uomitu igitur sollicitari debet priusq; cibi cor-
 rumpantur. At si aliquid eum impediāt, alius soluta
 frequenter succurrit. sin minus illa fluxerit, certe diu-
 tius dormire & potui aquam calidam frequenter su-
 mere, consilium est. Vbi iam abunde concoxerit,
 præsertim aluo largiter fusa, lauacris fomentisq; adiu-
 uare, salsamenti parum ac potionem dilutam exhibe-
 re oportet. At si neq; descenderit aluus neq; celeriter
 obita est concoctio, sed corpus uniuersum graue, ad

PAULI AEGINETAE

motus pigrum, & somno lentum fuerit, mens præter rationem quodammodo torpescat, uenarum repletionē esse cognoscas. Qui uero præter hæc lassitudine premuntur, eos conquirere dum uenterculus ingesta cōcoquat, deinde laboribus inanire expedit.

DE EBRIETATE. Cap. XXXIII.

E Brietatem uomitus repente obortus discutit: itē aquam & mulsam liberalius super bibere uincit, atque sic uomere, usque dum plurima reiecerint, ac stomachi uellicatus obtundatur. à uomitu solium in gressi copiose ungentur, reliquo tempore cōquiescent, & accurate cooperti diutissime dormient, quousq; temulentia discutiatur.

QVIBVS CIBI CORRVM puntur. Cap. XXXIIII.

C Ibis in uentriculo uitiat, si quæ corrupta sunt deliciuntur, maximum ad sanitatem est compendium: sin minus, iis quæ leniter subducunt aluus irritanda est. Huiusmodi autem malo affectis uomitus ante cibum, uini passiq; potu excitatus, conducit. Nihil præterea uel nidorosum, uel graueolens uel in totum cibum corruptioni opportunum assumere ipsos consuluerim, sed ea quæ boni succi sunt deligere. Iam per interualla temporis mediocria aluum subducere, ex iis quæ mediocriter purgant, ita affectis confert.

DE VENERE. Cap. XXXV.

V eneris hæc sunt commoda: humores superuacuos inanit, corpus agile præstat, in augmentū promouet, & uirile magis efficit. Quantum uero ad animum spectat, impeditam intelligentiæ uim dissoluit, iratos mitigat, eoq; melancholicis coitus, siquid aliud, remedium est accommodatissimum: item alio modo insanientibus integritatem sensuum restituit. Iā pituita redundantibus uenus est utilissima: alii enim cibum respuentes, eius cupiditatem hinc recuperarunt: alii, continuis per somnum ueneris imaginibus libe

ratū sunt. Caterum natura ueneri idonea est calida & humida, ut quæ reliquis salacior sit. Minime uero coitum excitat uictus qui siccatur refrigeratq; ætas senilis, tempus autumnale. Quapropter uictus ratio humida calidaq; adhiberi debet, mediocritas & laborum & ciborum. Quemadmodum uero moderati labores, ita etiam concubitus ipse mediocris conuenit. Nam & ad opus incitat, & facilitatem quandam consuetudini præbet. Requirit autem libido, si quid aliud, alimenti exuberantiam, eoq; cibi potissimum ualentis materiæ utiles sunt: ex piscibus autem polypodes. etenim præcipue ad uenerem incitare creduntur. his adduntur, molli cute præditi: ex oleribus autem, orminum, erysimum, eruca, & napi, quæ in medicamentorū uicem dantur: ex leguminibus profunt, faba, cicer, erui-
lia filiquæ, & pisæ quæ præter quod largiter corpus alunt, flatibus replent. Ruta igitur quia flatus discutit aboletq;, ideo etiam ueneris ardorem obtundit. magnifice autem probo uuas ut quæ humectent, & spiritu sanguinem repleant, qui in uenerem proritat. Quum igitur concubiturus es, nimiam satietatem, cruditatem, lassitudinem, cauebis: item ne uomitus, aut purgatio præcesserit similiter repentinum alui profluuium, licet nonnūquam uenus diuturnum fluorem desiccet. At uehementis coeundi cupiditates non laudo, sed potius resistere eis consulo, præsertim iis quos morbus aliquis infestat. Saluberrimum igitur post exercitationem, balneum moderatumq; cibum, uenerem exercere. ita enim uiribus conducit, & frigus obortum minus offendet. Tempus autem concumbendi opportunum est, secundum cibum, ut supra dixi, antequam somnus inuadat. lassitudo siquidem ex coitu contracta obdormienti statim remittitur. Id uero tempus etiam liberis procreandis accommodum est, tum aliis de causis, tum quod mulier
35 consopita, genituram facilius retinet.

PAULI AEGINETAE
AD EOS QUI VENEREM

exercere nequeunt. Cap. XXXVI.

Naturalia continue pingui ungentur, cui adiectum sit narcissi radice momentum, aut cocci gnidii, aut pyrethri, aut herbae pediculariae, aut seminis urticae, aut uiticis. Potiones congruunt, ex pipere, aut satyrio, aut euca, aut cnico, aut simul omnibus. esse confert ante cibum bulbos tostos, rubentes ac exiguos, cum sale & oleo, aut scillae tabefactae modicum: item compositis aduersus hoc uitium inscriptis remediis utendum est: item subinde lasciuia legere competit.

DE IIS QUI IMMODICE

coierint. Cap. XXXVII.

Quonia ex immoderata uenere corpus rarius, frigidius, siccus, & imbecillius euadit, ratio est ad mouere quae densent, calefaciant, humectent, confirmentque. Qui igitur immodico concubitu exhausti sunt, uestimentis calidis operiti coquiescent, somnoque longiore, donec corporis contentio subsidat, reficietur: atque sic ab imbecillitate sese uindicabunt.

SI SEMEN GENITALE RE

dundet. Cap. XXXVIII.

Nonnulli semine copioso, & calido collecto, in uenerem prouunt: quod cum egresserint, corpus inualidum, stomachum resolutum obtinent, extenuantur siccanturque: ob quam causam si rursus a concubitu abstinerint, capite grauantur, & ueluti ex repletionem cibum fastidiunt, deinde statim ueneris imaginibus obnoxii eodem modo afficiuntur. Nihil igitur his quod semini augendo efficax est, sed potius & cibi & medicamenta quae id corrumpant, offerri debent. a balneo renes oleo rosaceo, melino, & omphacino perungere oportet. Satius autem est oleum cera addita, ne defluat, crassius efficere, miscereque succum aliquem refrigerantem, nempe semper uiui, solani, cotyledonis

LIBER PRIMVS.

& psylli: ac horum quidem per æstatem, reliquis autem anni temporibus, tum aliorum, tum lactucæ succum: itē lini semen quod aqua fuerit incoctum, nam hoc quoque refrigerantem succum exhibet. Ad hæc lamina plumbea lumbis subiecta, ueneris insomnia cohibet. Iā herba refrigerante ui prædita si cum ruta substernantur, & teneris uiticis surculis, idem præstant. Præterea semen *lini & rutæ in cibo sumptum. Cauendum uero est, ne lumbis uehementer refrigeratis renes offendantur.

* Oribasius uiticis.

SI PERFRICTIO NOCVIT.

Cap. XXXIX.

Qui frigori nimio patuerunt, locis calidioribus decumbent, cyprino aut irino peruncti. postea ubi modice incaluerint, piper, myrrham cum uino dulci odorato & ueteri assument, aut liquorem cyreniacum cum uino uel aceto, aut pyrethrū castoriūve ex aceto: cibo autem calidiore recreandi sunt.

SI INSOLATVS ADVS

fit. Cap. XL.

Si qui uero exusti in sole sunt, his locis aeri expositis decumbendum est, perfundendaque frigida, facies, manus & crura: si siti conficiuntur, frigidam aquā qui assuerunt, bibent, atque hæc pro ratione, & non uniuersim facere expedit, cibum assument exiguum, quod facile in membra distribuatur, humidiores potius quam densiores.

DE PITVITA IN SUPERIORE

re uentriculo redundante. Cap. XLI.

Quod si in aliquem interdum incidat qui cibos ualentis materiæ auersetur fastidiaturque admodum & si assumere compellas, nausea afficiatur, sola uero acris appetat, neque iis quidem oblectetur, sed uentris inflationem nauseamque sentiat, ac paululum ructibus solis leuetur, interim uero & ipsi cibi quos assumpsit, præsertim in acorem conuersi, uidentur, omnino intelligendum tibi uenit summam curationis existere, ut pitui

B iii

PAULI AEGINETAE

tam à ventriculo abstergas. Ego quandoq; ita affectum
nou, q; radiculis ex oxymelite sumptis, incredibili cras-
sioris pituitae copia uomitu egesta, integræ statim sanita-
ti restitutus sit.

Q VOMODO FACILE Q VIS
uomat. Cap. XLII.

Quoniam laboriose uomentibus multa solent
absurda superuenire commodum fuerit quomodo
quis facile uomat, exponere. Etenim
uomitibus pituitam inanit, caput leuat, & ne qui audius
nonnunquam cibum ingesserint cruditate laborent, uis
noq; liberalius sumpto offendantur, prohibet. At quæ
offerentur, neque acerbæ neque sicca erunt, sed partim
dulciora quodammodo humidioraq; partim acriora.
Commendatur ad hæc radícula, eruca, salsamentum ue-
tus, origanum uiride, cepæ momentum & porri. Pro-
mouet uomitus etiam ex leguminibus ptisana cui mel
additum sit, lomentum, carniū pinguiā. uerum non
solum iura ipsarum, sed ipsas quoque integras degluti-
re oportet, eoq; uomiturus non diu madendis ipsis im-
morabitur, omnia uero per coctionem mollia flaccidaq;
erunt. Iam constat, uina dulciora deligi oportere,
ut quæ in stomacho magis supernatent, atque eam po-
tionem egelidam assumi. Confert etiā amygdalas mel-
li intinctas comedere, ac placentas gustare: item pepo-
nis & cucumeris semen maceratum detritumq; cum
melle assumere, radicemq; cucumeris cōtritā ex mel-
le. At qui ualentioribus uti uolunt, narcissi bulbo aquæ
incocto, uinum temperant. Mouet autem uomitiones
irinū quoque unguentum, si digitis eo perunctis, irri-
tes. Porro uomentis interest, ne cesset uel intermittat, usq;
que dum omnia eiecerit: à uomitu os colluat, faciemq;
posca aut aqua abstergat. id namq; dentibus conducit,
& caput releuat.

Q VÆ SANIS ALVVM SVBDV
cant, & quæ urinā moueant. Cap. XLIII.

V Eterum nonnullis satis esse ad secundam uale-
tudinem tuendam uisum est, si aluus quotidie
& urina pro ingestorum copia, sine uitio & abū-
de responderet, ac quum uacuatio iuxta proportionem
accidebat, commēdabant: sin minus, promouebant uris
nam quidem scandice, apio, asparago, petroselino, anis-
so, nepita, origano, absinthio, graminis carduiq; radice,
cytiso, adiantho, omnibus in aqua elixis, quorum deco-
ctum cum uino potui exhibebant. hæc enim per urinā
sanguinem repurgant, unde non parum utilitatis percipi-
tur. Aluū adiuuabant terebinthina, ex qua oliuæ ma-
gnitudinē dormituri deglutiedam offerebant. At quū
acrius subducere eam cogitamus, rheu momentum ad-
miscibimus. Accommodata deiectioni sunt, oua sor-
bilia: ex oleribus, beta, malua: item cochlearum ius. at-
que hæc forte abunde erunt. Efficacior est herba Mer-
curialis, in aqua cum sale elixa comestaq; eiusq; deco-
ctum potui datum: similiter folia sambuci, idem præ-
stat polypodii radix duobus denariis fassamento in-
persa, aut etiam in ptisana sorpta. ad hæc serum las-
ctis cum sale aut melle, ad treis heminas quatuorve as-
sumptum: ueteris quoque gallinacei ius, tum per se,
tum cum cnici denariis duobus, nonnunquam & aloe-
trium cicerum instar secundum cœnam recte assumi-
tur. Præstantissimum uero est epithymum in uino post
mediocrem cœnam potum: qui acrius uacuare deside-
ret, mane epithymi drachmā ex oxymelite, uerno tem-
pore ebibat.

DE CLYSTERIBVS. Cap. XLIII.

I N quibus uenter ægre descendit, & stomachus im-
becillis medicamenta ad subducendum efficacia
non sustinet, clysteribus utendum est, quum pitui-
ta quidem in intestino residet, iis quæ sunt deco-
cto caricarum, betæ, nitri, syluestris cucumeris
radicis, melle, oleo chamæmelino, aut anethis
no: quum siccitas magis urget, iis quæ constant

B iiii

PAULI AEGINETÆ

althæa, foenu græco, chamæmelis, oleo, mellis exiguo. Interim etiam oleum per se dimidiâ hemina mensura iniectum, abunde proficit, non tamen continue id faciendum est, ne natura his irritata, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

DE GLANDIBVS. Cap. XLV.

V Timur etiâ glandibus subinde stercoris excernendi gratia, & in quibus id quod per clysterē inditum est, non egeritur. Finguntur autē glandes ex sale tosto, melle & nitro: item thymus discocto melli additur. Fiunt etiâ ex resina terebinthina, & nitro: interdum & cocco gnidio modico. Sed quia uellicatus mouet, parteis ipsas oleo delinere conuenit. præterea pyrethrum aut piper admiscetur, conuenitq; resolutionem expertis, & iis qui ex perfrictione inflationes contraxerunt. Insuper centaurium pici & ceræ admiscetur, ac naturalium resolutionibus aptum est præsidium. Infantibus autem etiam salis grumus imponitur. Fit quoque glans ex ficibus cum nitro laut ex uua passa, ni-

Instauratum ex Oribasio.

tro & cumino. DE IIS QUÆ PER OS CAPVT purgant, apophlegmatismi uocantur, & quæ p nareis, unguentisq;. Cap. XLVI.

H Vmores in capite residentes per sputa uacuamus, quod si leuiter facere uoluerimus, piper cum mastiche temperabimus: si acius uacuare libet, pyrethrum aut herbam pediculariam mandi præcipiemus. Item anemonæ utriusq; radix mansa pituita prouocat, capparisq; radicis cortex, atq; huiusmodi res media serosum excrementum uacuant: crassam uero lentamq; pituitam, sinapi cum oxymelite gargarizatū, aut sapa in qua origanum, aut hyssopum sit incoctum. Ego autem eam sinapi ex oxymelite admisceo. At si cerebrum muco purgari desideret, acribus eum remediis, quorum nonnulla etiam sternutamenta mouent, euocabimus. Itaq; anagallidis utriusq; & anemonæ cu-

fusus, & betę succus per nareis purgat: item cucumeris
 syluestris foliorum succus naribus ipse & per se & cū
 betarum decocto succove infunditur. sternutamentum
 uero crudis humoribus qui in thorace, pulmone & ca-
 5 pite continentur, non expedit. os autem eiusmodi illine-
 tur ungueto, quod recipit sinapi cum betę succo: eo q̄;
 palatum & columellam ilinito. idem etiam per nareis
 purgat. Iam melanthio quod facile paratur, ad narium
 illitionem subinde usus sum, interim aceto acri pridie
 10 macerans, deinde postridie cum aceto rursus læuigans
 infundens q̄; naribus. Nonnunquam oleo ueteri idem
 melanthium detritum, similiter illeui. Ita & Archigenes
 eo usus est, quum narium foramina obstruerentur: prio-
 ri autem ex aceto, Criton in morbo regio uti sol. bat.

QVÆ MENSEIS DVCVNT.

Cap. XLVII.

Quæcunq; urinę ciendę sunt, eadem omnia
 menseis dicunt, nempe brassicę radice deco-
 ctum potum, Persicę radix, ruta, chrysanthe-
 20 mon, dictamnū & erucę semen: item quę ori uulvę
 apponuntur, menseis commouent, ut ruta cum melle
 trita, aut porri succus, aut allium tritum appositum, aut
 myrrha cum uino læuigata, aut leporis coagulum.

QVÆ SVDOREM MOVENT.

Cap. XLVIII.

Svdorem eliciunt chamæmelū aridum tritum q̄;
 et oleo inspersum, si summe curi ualide infricetur:
 seseli, pyrethrum, cachryx, anisum, similiter oleo
 inspersa. item nitrum tostum non nimis tenue, cū oleo
 30 efficax est: ad hæc salis flos oleo temperatus, & liquor
 cyrenaicus aqua dilutus corpori infricatus epotus q̄; ci-
 ceris magnitudine. Pari modo nepita & pota cū mul-
 sa, & extrinsecus cum oleo infricata proficit.

DE AERE. Cap. XLIX.

Laudatissimus aer est, qui exacte purus: is autem
 nimirum erit qui non ex stagnorum, aut paludū

PAULI AEGINETAE

uapore exurgit, neq; ex barathro quodam pestilentem
auram exhalante prouenit: ita qui ex cloaca magnam
ciuitatem purgante eructatur, uitiosus est. Quinetiam
nebulosus similiter sanitati non facit, quemadmodum
etiam qui in conualli altis undiq; montibus contentus,
nullam auram recipit. Hoc igitur modo uitiosus aer
omni ex æquo ætati nocet, omniq; temperaturæ: sicut
optimus prodest. At qualitate uarians aer, calore dico,
frigidityte, siccitate, & humiditate non similiter uniuersos
afficit. Etenim temperatis corporibus aer temperatus
utilis: intemperatis, qui contrariam temperiem habuerit confert.

DE AQUA VIS. Cap. L.

AQuarum præterea & uirtutes & uitia cognita
habere expedit, ut quæ in omnem ferè usum
magisq; ad quamlibet uictus rationem requis
rantur. Ea igitur optima aqua censenda est, quæ nullam
aut gustu, aut odore qualitatem repræsentat, sed protinus
bibenti suauis est, & uisu pura limpidaq; quum etiã
à præcordiis statim descendit, melior alia quærenda
non est. Nam quæ in præcordiis residet diutius, uentri
culum ferit, inflat, grauatq; uitiosa censebitur, huiusmodi
aqua neque cito calescit neq; refrigeratur, sed quæ in
ipsa elixantur, tardissime peiusq; decoquuntur. Præstat
itaque talem aquam experimento discernere. Qui
uero notis quoque eam uolet agnoscere, iis quæ dicen
tur attendat. quæ enim ad septentrionem spectat, à so
le auersa, tarde permeat, & indomita lente calescit & re
frigeratur, quæ autem ad orientem peruenas quasdam
terræ prorupens, citissime calescit, iterumq; refrigeratur
protinus, hanc optimam esse sperandum est. Probat
ur item quæ æstate frigidior, hyeme calidior est. Nonnulli
& pondere aquam examinant, leuem præstare creden
tes, hoc igitur si aliis à me commemoratis accedit, com
mendatur, uerum sola hæc bonæ aquæ nota non suffi
cit, quanquam imbrum aqua auctore Hippocrate les

uisissima fit, dulcissima, limpidissima, tenuissimaq; eo
quod sol leuissimum & tenuissimum attrahat, ac id
non ex alia aqua solum, uerum ex mari quoque &
corporibus: quapropter etiam omnium promptis-
sime computrescit, seu diuersis ex qualitatibus con-
flata. Nemo autem aquam putrefactioni opportunam
deterrimam esse existimet. nam mutationis fa-
cilitas uirtuti potius, quam uitio tribuitur. Quæ igitur
aqua optimæ notas habet, si prompte etiam pus-
trescat, ea censebitur saluberrima, etsi quum mutari in-
cipit, occasionem raucedinis, tusficulæ, & grauitatis uo-
cis, præbeat. At inter imbrium aquas, æstiuæ quæ to-
nitru decidit, præstantior est, quàm quæ nimbis de-
missa est. Ex glaciæ & niuib. aqua, insaluberrima est.
Nam ea congelascente, tota pars tenuior exprimitur.
Porro limosam fœdique odoris & absurdas respiciens
tem qualitates, recte decoques, atque ita meliorem
redditam potui dabis uino temperatam: si astringit
dulciori: aliam uero, acerbiori. Nonnullas percola-
re expedit, nempe limosas, salsas, & bitumen refe-
rentes. Cæterum frigida uehementer aqua à cibo al-
sumi debet, non tamen uniuersim cumulatimq;. Non
desunt qui cibos & potiones aduersus aquarum uio-
tia inuenerint: ac alii cicerum decoctiones præbunt,
uel eadem quoque edunt: alii caucalidem similiter
cum pisciculo quodam elixam, item fœniculum: reli-
qui betam & cucurbitam sale conspersam cum uino di-
lutiore præsumunt.

DE LAVACRIS. Cap. LI.

Quæ frigida lauationem ita quidem laudo,
ut nō is qui nullo uictus delectu agunt, ex usu
esse dicam, uerum solis illis qui eodem accura-
to, laboribus, & cibis sicut expedit, utuntur. Porro uulga-
ribus q̄ amplius interdū refrigerari desiderant, abunde
est natare p̄ æstatē, si iuuenes sint, carnosī & frīctionibus
ante excalfacti. Sint autē qui aquam ingredientur, neq;

PAULI AEGINETAE

uenere, neque alio quodam modo lasi, neque cruditate sentiant, neque uomitu, aut alio inaniti, neque uigiliis defatigati. Periculosum enim si quis ita affectus frigidae lauacro utatur. Calidum uero balneum & optimum & tutissimum est: lasitudinem soluit, humorum repletionem per halitum digerit: item excalfacit, mitigat, emolliat. Flatus ubicunque decubuerint diffundit, somnum conciliat, carne replet. Est autem aptissimum omnibus, & uiro & mulieri, & puero & seni, & priuato.

DE LAVACRIS NATURALIBUS.

Cap. LII.

Naturalium balneorum alia nitrum, alia salem, alia alumen, alia sulfur, alia bitumen, alia aes, alia ferrum repraesentant: nonnulla composita ex his omnibus reperiuntur. Itaque aquarum sponte prouentium uis est quae deficcet & calefaciat ampliter, ac humidis frigidisque maxime conducunt. Iam uero quae nitrum & salem obtinent, capiti, thoraci fluxione tentato stomacho humentiori, aquae inter cutem, tumoribus laxis qui ex morbis proueniunt, & pituitosis sunt accommodatae. Aluminosae sanguinis reiectioni, stomacho uomitioni opportuno, immoderatis mulierum purgationibus, continuisque; abortibus, utiles existunt. Sulfurosae neruos emolliunt, calefaciuntque, & dolores mitigant, stomachum uero eneruant eueruntque. Bituminosae caput replent, instrumenta sensibus distribuendis dicata, offendunt: si autem quis diu immoretur, calefaciunt, & temporis processu emolliunt. Quae aeris naturam occupant ori, tonsillis, uiae & oculis praecipue conferunt. Ferri uirtutem sortitae, stomacho & lieni sunt utiles. Oportet autem in aquam sine tumultu & lente descendere, quo uirtus corpori relaxato accedens immergatur.

QVAE VICTVS RATIO QVOT

libet anni tempore sit utilis.

Cap. LIII.

LIBER PRIMVS.

15

Non alienum est, pro singulis quoque anni temporibus uictum instituere. Ac hyeme quidem pluribus uti laboribus, plus esse conuenit, praesertim diebus aquiloniis, Nam austrinis laborare quidem

similiter, sed minus cibi & potus assumere oportet. Summatim humido tempore corpus omnino siccum reddere, quemadmodum in frigido, calidius: carnes calidas comedere & olera, largius bibere oportet. Ac uere iam ineunte, alius uomitu, alius per aluum euacuari debet alius sanguinis demissione, prout cuiusque consuetudo & uoluntas fuerit. Per aestatem à laboribus coquiescendum, ciboque demendum est, qui recte frigidioris erit naturae: potione largiore utendum, ac omnia fieri debent, quae ad refrigerationem humiditatemque conferunt. At in autumnno, quoniam prorsus inaequalis morbinatusque est, & omnigenos morbos inuehit, magna uictus habenda sollicitudo est: frigus uitare, concubitu & frigido potu abstinere expedit. item frigidus aurorae aer, meridianusque ardor recte cauebitur. fugaces fructus affatim assumere noxium est, ut qui non copia tantum obfint, uerum etiam uictiosos procreent humores, & inflationes. Etenim praestantissimi inter ipsos, nempe ficus & uuae, flatus pariunt corrumpuntque cibos, nisi ante alios praesumantur: ita uero neque inflant neque corrumpunt.

Vbi aer frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calescere, omniaque peragere oportet, ceu hyeme aduentante. Nihil mali autem fuerit post æquinoctium uacuationem ex commemoratorum aliquo tentare, ne aliquid superfluum in corpore retentum, hyeme faceat negotium.

VICTVS LABORIOSAM VI

tam agentium.

Cap. LIIII.

Si quis in laboribus uitam transigit, considerandum est, priusne is exerceri consueuerit, an minus: nunc autem exercitio se committens, mediocriter ferat, ita ut non morbo implicetur continue, facilitate praes

PAULI AEGINETAE

ditus meatuum, per quos humores noxii euaporant. eiusmodi enim corporis naturam ad aliam consuetudinem traducere non oportet. imò nec eius quod ex longiore temporis interuallo ægrotat. At si assidue quis morbo conflictari uidetur, idq; ex humorum redundantia, eo per totam salubrem uictus rationem, consilium diriges, ut humorum mediocris sit copia: sin ob eorum uitia, ut optimos efficias. Qui igitur succis ex æquo redundantibus scatent, in balneum deduci, deinde frictionem adhibere, & paululum dimoueri prius debent. Qui uero eiusmodi facere antea sunt aggressi, iis hæc paululum augere, cibo detrahere, eumq; imbecillis materia ingerere consulemus. At qui prauos humores colligunt, non uno consilio tractantur, quoniā neq; una uitiosi humoris species est. Nonnulli siquidē frigidiorē magisq; pituitosam colligunt, alii calidiorē biliosiorēq; quemadodum alii atræ bilis congeriem magis accumulānt. Quapropter singuli, cibo potuq; abstinebunt, quæ collectam ipsis humorum coluuiem solent generare. In omnibus autem his commune est præsidium alui subductio.

PROFICISCENTIVM VI

ctus ratio. Cap. LV.

Facillime quis fatigationem ex itinere uitabit, si inunctus sit, & non fortiter incedat. Præterea ad proficiscendi facultatem conducit per æstatem fascia mollis digitos sex, aut septem lata, quinq; autem cubitos non minus oblonga, lumbos ad ilia usq; complexa. Item baculus ad iter utilis habetur. etenim per decliua præmissus, corpus quod præceps ruit, ceu contocuidam innixum retinet, quum ascendendum est, ipsi innitentes facilius in accliua corpus promouemus. Porro cum in itinere cessamus, unctio & pauxillum cibi ex fructibus qui æstate proueniunt, potioq; modica eo tempore conuenit: à prandio antequam iter arripiamus, conquiescendum est. Si uero necessitas abeun-

di fuerit, & sitis urgeat, tenuis polenta ex aqua cum salis momento bibetur. æstus ardorq; solis caueri debet, cui nec corpus nudum exponere sed contactum esse oportet, ne ex itinere siccescens indurescat. Hac enim ratione, & minus lassatur, & nullum ex prædictis affectibus similiter percipit. Hyeme quum frigus urit, ante quã itineri te accingas, uentre subducto & unctiōe adhibita hyemaleis cibos copiose assumes, potionem modicam. Cæterum fascia longiore non solum lumbos sed spinam quoq; & pectus recte inuolues. Requiescenti autem, si interea uehemens frigus urat, neque ungi, neque cibum potumve assumere præstat. neque alio quodam modo refici debes, si inibi mansurus es. At secundum longas profectiones, aliosq; ualidos labores, etsi lassitudinem quis non sentiat, non aliter q̃ lassus curabitur, minus enim sic periculis erit opportunus.

NAVIGANTIVM VICTVS.

Cap. LVI.

Vomitionibus quibus nauigantes premuntur, primum oborientibus nec facile, nec utiliter succurrimus: ut quæ omnino magna ex parte præsidio esse soleant. A uomitu autem cibi non copiosi, nec quilibet offeri debent, sed aut lenticula uti sicca, decocta q; cui pulegii modicum sit adiectum, aut panem ex uino dilutiore & odore maceratum ingerere oportet: potio utilis est modica, ea q; uel ex uino prorsus aquoso, uel aceto mulso. Lenticulam incoqui dum emollescat conueniet, mox in tenuem puluerem redigere, inde ficcare, postea in uas fictile cōdere. At si diutius crebriusq; uomitus urgeat, cibo uehementiore, quo supprimatur utendum est, eademq; potione modica, uel aceto mulso cum aqua, in quo thymum aut pulegium commaduerit: item aqua cum polenta, aut uino odorato cum polenta diluta similiter recreatio tentabitur. Ad graueis autem nauium odores, aut mala cotonea naribus admouentur, aut thymus,

PAULI AEGINETÆ

aut pulegium. Mare nequaquam aspiciendum est, usque dum in nauibus uersari assuescas. Aquis porro cura adhibenda est, ne turbida, foedi odoris, ac salis existant.

Q VOMODO EXTENVETVR

corpus. Cap. LVII.

Q Vum immodice corpus plenum est, extenuare id atque imminuere oportet. Quia ergo calidior temperatura gracile corpus reddere demonstrata est, crassis eam, si mediocres reddere uoluimus, inducimus. Didicisti autem uehementes exercitationes, uictum extenuantem, similiaque; medicamenta, & animi curas, temperamentum siccius, eoque corpus gracilius efficere. Quæ igitur uictus ratio extenuet, nulli non cognita est: medicamenta uero acriora hæc sunt, rutæ semen, præsertim syluestris, cum ipsis corymbis, aristolochia rotunda, tenue centaurium, gentiana, polium quæque; ad urinam ciendam ualentiora sunt, nempe petroselinum: singula namque hæc & per se & cum aliis omnia, humores abunde extenuant, inaniuntque; corpus.

Quinetiam sales excrematis uiperis largiter extenuare solent: ipsaque; theriace digerit extenuatque;. Item oleum cui radix syluatici cucumeris, hibisci, gentianæ, panacis, et aristolochiæ sit incocta si illinatur, idem præstat: sic polium & centaurium. At cibus non statim à balneo dari debet, sed prius somnus est incidendus. Præstaret etiam aqua balnei ex his esse quæ digerant, modo sponte sua scaturientem habeamus, qualis est Mitylenæ: sin minus, salis florem aquæ marinæ commiscebimus. uino utemur tenui & albo. Cæterum frictio sicca linteis crassioribus durisque; adhibita, idem abunde efficit. Ad hæc oportet cibos magis quam exercitia requirunt, detrahere. Iuuat itidem plenos sol inurens: nec minus prodest, sine potione semel duntaxat die cibum assumere. item corpus nitro & sale asperiore infricare. In balneis copiosum nitrum extenuat, paucum, probam corporis nutritionem excitat. Postremo extenuat & medicamentum, quod

sum, quod recipit, piperis & petroselini duas portiones, asari, & anisi dimidiam. Hoc & urinæ & aluo promouendæ efficax est.

QVOMODO TENUES IMPLE

antur.

Cap. LVIII.

Quum tenues implere uolumus uinū crassum, cibus crassi succi, exercitatio modica ac lenta, frictio mediocris, & ut summam dicam, omnia prædictis contraria expediunt. Commodū est iisdē & pice, diebus tribus quatuorve interpositis, oblini. Si ieiunus aliquis lauetur, ante balneum linteis corpus donec rubescat, infricari debet, tum frictione dura non tamē multa cutem obstruere, quo densa duraq; euadat. Expedi igitur iis qui pallido sunt colore præditi, nec alimentum sentiunt, ab iracundia abstinere, & animi commotionibus.

DE PARTIVM ATTENVA

tarum curatione.

Cap. LIX.

Extenuantur plerumq; partes, uel diuturna ipsarum ætate, uel deligaturæ modo qua contracta fasciantur. Itaq; uirtus partis extenuatę firmari, sanguisq; ad eā elici debet copiosus, frictione moderata, aptoq; motu, & calentis aquæ mediocris superfusione. Hæc sanè tantisper facienda sunt, dum rubescens corpus atollatur. cessandum uero prius quàm collabatur. Iam & picationem tali parti, ut dictū est, adhibere congruit. Quum autē frigidiorē partē senseris, linteis ipsam confricare, ac calefacienti quodam medicamine oportet. Vt sum aliquando & thapsia, nunc cum melle, nunc cum cerato illinens.

OPTIMI TEMPERAMEN

tinotæ.

Cap. LX.

Temperatissimus homo est, cuius corporis compositio omnium extremorum exacte medium occupat, nempe gracilitatis, crassitie, mollitudinis, duritiæ, caloris, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis:

PAV. ÆGIN.

C

PAULI AEGINETAE

in uniuersum naturæ ac animi functiones habet inculpatas: medius quoque est glabri & hirsuti, nigri & albi: pilos in pueritia rufos magis quam nigros habet: in ulgore, e contrario.

INTEMPERATORVM CORP porum notæ. Cap. LXI.

Corpora moderato calidiora citius dentunt, in-
crescunt similiter: tangentibus autem calidiora,
minusque pingua apparent: colore sunt rubido,
pilis nigris, mediocriter hispidis, & latis uenis. At si quis
simul & pinguis & crassus latiores uenas habeat, is ob
consuetudinem, non natura pinguis euasit. Frigidioris
temperaturæ nota est, si ad tactum frigidius apparet cor-
pus, glabrumque sit & pingue, color una cum capillis ru-
fus, si multa inest frigiditas, liuens quodammodo & plu-
beus, uenæ angustiores: si gracilis est eo temperamento
præditus, neque is necessario talis, sed ex consuetudine fa-
ctus est. Arida autem temperies durior est graciliorque; tem-
perata atque hirsuta. durities igitur à sicca temperie om-
nino separari nequit, gracilitas autem non modo natu-
raleis temperaturas, sed etiam ex longa consuetudine
acquisitas comitatur. Indicium siccitatis est, si corpus
ægre mouetur, siccum, & squalidum à siccantibus euas-
dat. Humida intemperies cætera quidem temperata si-
milis est, sed mollior corpulentiorque; ac huius nota in-
separabilis est, mollities, quemadmodum & crassitudo
quæ non insitum modo temperamentum, sed ex longa
quadam consuetudine obortum quoque comitatur. Pe-
culiare uero humiditatis signum est, corpus ex humidio-
ribus grauari. Calidam siccamque temperiē testantur, cor-
pus maxime hirsutum, facilis pilorum capitis proventus,
uicque nigri, & p iuuentutē copiosi: pcessu tēporis caluitiū
segitur, uenæ latæ sunt, sicuti & arteriæ grandes, simulque
uenemētissime pulsant. præterea totum corpus ualidū,
articulatum, musculosum, pinguedinis expers apparet,
cutis dura & nigrior. Frigidam humidamque temperatu

ram testatur thorax angustus, totumq; corpus strictum
 & glabrum, cutis tenera & alba, capilli subrubi, præse-
 rim in iuuentute, hac præditi non caluescunt, uerum sta-
 tim timidi, pusillanimes, pigri, uenis latentibus, crassi pin-
 5 guesq; & femoribus & musculis indistincti, inarticulati,
 blefiq; magna parte fiunt. At si humiditas frigiditasq;
 magis fuerit adaucta, color unà cum pilis rufus uidetur:
 si plurimum increuerit, liuescit. Porro calidum ac humi-
 dum temperamentum mollius carnosiusq; optima tē-
 10 perie existit: auctum amplissime, putridis affectibus op-
 portunum est. Quum aut paulo humidius, multo calio-
 dius est, eo donati molliores paulo corpulentioresq;
 temperatis existunt, hispidores multo, ad tactum calio-
 diores apparent. At si frigiditas pariter cum siccitate ex-
 15 æquo augetur, corpus erit durum, gracile, album, non
 musculosum nec articulatum, pilisq; uacuum, tangentio-
 bus frigidum deprehenditur: pinguedo tamen, gracio-
 les licet eiusmodi existant, carni inspersa est, color autem
 capillorum frigiditati respondet. Quod ad animi mo-
 20 res pertinet, pusillanimes, timidos & tristes eiusmodi
 temperamentum efficit. Ac, ut semel expediam, in con-
 iugatis temperaturis semper euincens qualitas notæ
 superare solent.

DE CAPITIS FORMATIO-

ne.

Cap. LXII.

25 **E**Xiguum sanè caput prauam cerebri structuram
 proprie notat: magnum uero non necessario bo-
 nam testatur. Si namq; tale insitæ uirtutis materiã
 probam multamq; suppeditantis robore factum est bo-
 30 num indicatiu: sin ex solius materiæ copia, non item. Ve-
 rum distinguere ea conuenit figura, & iis quæ inde pro-
 uenerint. Figura quidem, si omnibus numeris absoluta,
 hæc enim semper bona est constructio: iis quæ inde
 proueniunt, num optime sint affecta, ac si neruea ip-
 35 si pars integra, bene habita ualens, siq; oculi acriter
 cernunt. In acutum fastigiata capita, deficientem

C li

PAULI AEGINETÆ

in fronte uel occipite habent eminentiam, aut magis q̄
decens est, auctam. Quemadmodum igitur paruitatē,
ita has quoq; uituperamus figuras, quarum nonnullæ,
quamuis raro, bonæ sunt, quæ formans scilicet uis haud
inualida fuerit.

TEMPERATURÆ CEREBRI notæ. Cap. LXIII.

Cerebrum temperatum mediocritate animi fun-
ctionum & recrementorum constat, minimeq;
ab omnibus exteris offenditur. Talium pili ca-
pitis in infantia subrubi, pueritia subflauī apparent: ubi
adoleuerint flauescunt, atq; mediū exacte inter crispōs
ac simplices habentur, nec facile caluescunt. Si uero ca-
lidius tēperato extiterit, omnia quæ circa caput existūt,
& calidiora, & rubicundiora apparent, oculorum uenæ
prominent, capilli his in lucem æditis protinus oriūtur.
Iis autem qui multo sunt calidiores, nigri, ualidi, & cris-
pi: qui non multo, iis flauī primum, deinde nigri proue-
niunt, procedente ætate caluescunt, interim his recremē-
ta sunt exigua & inculcata fruuntur uale tudine: capite
uero à calefacientibus cibis, potu, odoribus & foris an-
tecedentibus implentur grauanturq; modicus somnus
in huiusmodi temperaturis sufficit, neque is profundus
admodum. Frigidius ac conuenit cerebrum fatentur,
excrementa copiosiora per meatus ei peculiareis ma-
nantia, capilli recti, rufi, firmi, & facile à frigidioribus cau-
sis læduntur, destillationibus & grauedinibus continue
infestantur, oculorum uenæ latent, somno maxime pre-
muntur. Siccioris cerebri nota est, si nihil excrementi
emanat, sensuum acrimonia, uigiliæ, capilli sunt robu-
stissimi, statim ab ortu, ac iis crispī magis, uerum ex faci-
li caluent. Humidioris autem, capilli simplicis planiq;
& nequaquam caluitium experiuntur, sensus turbulens
ti, excrementorum copia, somnus multus & profundus.
Calido & sicco cerebro præditi, recrementis carent, exa-
ctos sensus obtinent, uigilantissimi sunt, facile caluent, pri-

num uero capilli celerrime ipsis proueniunt. & plenissi-
 mi, nigri, calidi ad tactum capitis, rubriq; usq; ad uigo-
 rem apparent. At si calori humiditas accellerit, ita ut
 utraq; paululum excedant mediocritatem, colorati cali-
 diq; sunt, uenæ oculorum grandes, excrementa pleniora
 mediocriter concocta, capilli recti, subflauī, caluitium
 haud facile experiuntur, uerum caput calefacientibus
 humectantibusq; impletur grauaturq;. Vbi uero utraq;
 increuerit qualitas, caput morbidum euadit, facileq; ex
 calidis & humectantibus noxam contrahit, eiusmodi tē-
 peramento præditi, uigilare diu nequeunt, dormientes
 autem imaginibus per insomniā torquentur, oculi calis-
 gant, non exacte sentiunt. Frigida uero simul & sicca tē-
 peramenta cerebri, frigidum pallidumq; caput efficiūt,
 oculorum uenæ non extant, à frigidis cibus similiter of-
 fenduntur, eoq; inæquali ualetudine fruuntur, sensibus
 per adolescentiam exactis inculpatisq;, processu tempo-
 ris subito contabescunt: summam omnes capitis pars
 cito consenescent, capilli à natali die uix erumpunt,
 exorti non aluntur, rufescuntq;. Humidum frigidumq;
 temperamentum cerebri, reddit soporosos, somnolen-
 tos, sensibus uitiosos, excrementicios, frigori opportu-
 nos, capitis repletioni, destillationi, grauedini obnoxios
 non tamen hi caluitium experiuntur.

25 VENTRICULI TEMPERATV

ra notæ.

Cap. LXIII.

Ventriculi natura ficcioris indicium est, si confes-
 sitim eo donati sitiant, modico contenti potu,
 largiore grauentur, fluctuationibus affligantur,
 eo quod redundat in uentriculo supernatante, cibusq;
 delectentur ficcioribus. Humidiorem notant, si nulla si-
 tis urget, & largior humor non molestat, cibiq; placent
 humidiores. Calidior natura uentriculi melius sanè con-
 coquit q̃ appetat, & dura potius, quæq; difficulter pos-
 fiat immutari, copia ciborum potusq; oblectatur, neq;
 à frigidis, modice usa, quicquam incommodi percipit.

C iii

PAULI AEGINETÆ

Frigidior, appetendo quidem ualet, concoquendo minus, præsertim si contumacia frigidaq; alimenta assumptis, quæ facile in eo acescunt, frigidis quidem gaudet, sed immoderatus assumptis prompte offenditur. At intemperies ex morbo contracta hac ratione ab insitis differunt, quod contraria sibi non similia appetant. Si igitur uenter probe concoctionem obit, temperatus: si non concoquit, intemperatus est. Item si nidorosos ædat ructus, immodicum etiam feruorem igneum fatetur: si acidus contrarium. Rursus si rebelles concoctioni cibos conficiat, immodicum: si pisces cõcoquat, illos minus, imbecillem. quod num ex humore quodam aliunde influente accidat, considerare oportet. Etenim pituitosi, acidum: biliosi nidorosos, graueolens, aliasq; extraneas qualitates ructant. Communiter autem utrisq; nausea superuenit, uerum si uitiosi humores in concauo uentriculi spatio supernatent, uomitu reiciuntur. qui autem corpore uentriculi contenti, tunicis eius adhærescunt, frustra ob inanem ad uomitum nauisam conturbant.

PULMONIS NOTÆ. Cap. LXV.

Non modo uenter sitim, uel adfert, uel ardet, ac frigida calidæq; potionis appetentiam, sed etiam quæ in thorace continentur uiscera, cor, pulmo, & iecur. Itaque calida pulmonum temperatura præditi si biberint, non statim sitire desinunt, ac frigida potio magis q̃ calida admodum sitim ipsorum restinguit: frigidus autem aer inspiratus refocillat, quum nihil uentriculi uitio sitibundos soletur. Hac ratione qui e contrario affecti sunt, à frigido inspiratu sensibilem molestiam percipiunt, quod maximum pulmonum frigiditatis indicium est, adeoq; pituitam creatu cum tussis reiciunt. Sicci autem pulmones excrementis carent, et pituita, quemadmodum humidi, excrementitii obscuram rauamq; uocem efficiunt: ac inde multa res

crementa per os egeruntur, ubi aut uehemētius, aut acutius quis loqui studuerit.

CORDIS NOTÆ. Cap. LXVI.

- 5 **C** Ordinis calidioris notæ sunt, respiratio magna, pulsus uelox & creber, iterum audacia, furiosaq; ferocitas: thorax tali præditis hirsutus, præsertim ad pectus existit, ac ea quæ præcordiis propinqua sunt: magna ex parte totum quoque corpus calidum, nisi iecur ualide renitatur. Etenim thoracis latitudo ca-
- 10 lorem notat, præterquam si & hic cerebrum ualde resistat. Porro cor frigidius, pulsus mediocri minor ostendit, ac qui tale habet, timidi natura sunt & pusillanimes, præcipue si pectus ipsis sit glabrum. Cor siccus pulsus edit duros, iram excitat non procliuem, sed feram &
- 15 quæ non facile queat placari, uniuersumq; corpus reddit aridius, nisi iecur repugnet. Humidius cor testantur, pulsus molles, mores ad iram proni, sed quæ facile pacari possit, ac totum corpus humidius, nisi iecur resistat. Calidum & siccum cor ostendunt pulsus duri, magni,
- 20 ueloces & crebri, ite respiratio magna, citata & frequens. hoc donati corde, maxime hirsutum pectus, nec non præcordia obtinent, impigri tractandis negotiis, furibundi, feroces, moribus tyrannicis, ad iram procliuēs, quæ non facile conquiescat. Si autem humiditas cum calore
- 25 superauerit, tales minus hirsuti sunt q̄ commemorati, prompti functionibus obeundis, neque tamen ferociter animo, sed ad iram proni duntaxat existunt, pulsus in eis magni, molles, citati & crebri. Humidioris frigidiorisq; pulsus quidem molles, mores autē pusillanimes,
- 30 timidi, & pigri: talium pectora pilis uacant, ac nequaquam sunt quemadmodum neque ad iram procliuēs sunt. Frigidum & siccum cor, pulsus duriores & exiguos efficit, huiusmodi corde donati minime omnium iræ sunt obnoxii, sed ubi semel eam con-
- 35 ceperint, diu retinent: pectora ipsorum, omnium minime sunt hirsuta,

PAVLI AEGINETAE
IOCINORIS TEMPERATV
ra notæ. Cap. LXVII.

IEcoris calidi notæ, uenarum latitudo, flauæ bilis co-
pia, per ætatis uigorem, etiam atræ sanguis calidior,
eoq; totum corpus existit, nisi cor obstiterit: præcor-
dia & uenter pilis obsita sunt. Frigidioris indicium, ue-
næ angustæ, pituita copiosior, sanguis totusq; corporis
habitus frigidior, nisi à corde incalescat: præcordia &
uenter pilis uacant. Siccius iecur testatur, sanguis cras-
sior minusq; redundans, uenæ siccæ, ac uniuersa corpo-
ris habitudo aridior. Humidioris notæ sunt, sanguis co-
piosus & humidus, uenæ molliores: sic etiam totū cor-
pus, nisi cor restiterit. Calidi simul & sicci indicia sunt,
præcordia maxime hirsuta, sanguis crassior simul &
paucior, amara bilis copiosissima, ac in ætatis uigore,
atra, uenarum latitudo duritiesq;: pari modo & totum
corpus calidum siccumq;. Siquidem calor à corde pro-
cedens, frigiditatem à iecnore prouenientem potest
euincere, siccitatem uero non potest cor humidius ad
contrarium perducere. Constat autem quòd si in idē
utriusq; principii temperamenta concurrerint, totum
omnino corpus illorum ratione affici. At humidum si-
mul & calidum iecur, minus q̄ calidum & siccum præ-
cordia efficit hirsuta, plurimum uero sanguinis, uenas
grandes, habitum humidum & calidum, nisi cor obsi-
stat. Quòd si utraq; qualitas longius à naturæ modo
recesserit, morbis qui ex putredine uitioq; humorum
habent originem, corripiuntur: idq; magis, si plurimum
humiditas, parum calor increuerit, ac humoribus uitio
si fiunt. Cæterum humidius frigidiusq; glabra reddit
præcordia, sanguinē magis pituitosum, uenas angustas,
totumq; corpus similiter afficit, nisi cor ad contrarium
deducat. Frigidum simul et aridum iecur, exiguum san-
guinis creat. uenas artiores, corpus frigidius efficit, præ-
cordia glabra, nisi & hic cor suprauerit.

LIBER PRIMVS.

29

TESTICVLORVM TEMPERA

turæ notæ.

Cap.

LXVIII.

Calida testiculorum temperatura, ad libidinem proclius est, fecunda, & masculos procreat partibus genitales celeriter hispida efficit, ac uicinas etiam attingit. Frigida, contra. Humida, copioso ac humido semine abundat. Sicca, pauci & crassi seminis efficax est. Calida & sicca temperies mediocriter crassum semen progignit, estque fecundissima, ac celerrime ad libidinem iam inde ab initio animal incitat. Tales itaque testiculi hispida statim genitalia, eorumque uiciniam efficiunt, sursum, usque ad umbilici regionem: infra, usque ad media femora. ac eiusmodi temperamentum abunde uenerem commouet, sed celerrime satiatur, & si compellas, offenditur. Porro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos reddit: qui copioso licet semine magis abundant, non tamen magis quam alii appetunt, minus autem frequentiori concubitu læduntur: si autem utraque & humidum & calidum impense creuerint, non sine noxa a uenere abstinere. At humidi frigidique temperamento testiculi, uicinas partibus glabras reddunt, ac tarde concumbere incipiunt, neque ad actionem expediti sunt, diluti, tenui, & inualidum semen, ac foeminae efficax proiciunt. Siccum frigidumque temperamentum, alia quidem similia prædicto, crassius autem semen & plane exiguum progignit.

QVÆ PRÆTERMISSA

sunt.

Cap.

LXIX.

Singulæ corporis nostri partes peculiarem quandam & temperaturam & uim sortitæ sunt: omnium uero notas hoc loco exponere necessarium non esse duco, quum infinitæ propemodum sint, & nos commodum scribere proposuerimus. Porro de iis egimus, quæ potissimum totum corpus consortii quadam lege afficiunt, de reliquis eadem ratione & uia considerare præcipimus, temperamenta ipsorum tum ab excre-

PAULI ÆGINETÆ

mentis, tum ex reliquis functionibus, tum iis quæ superueniunt agnoscentes. Tempestiuum igitur est, ut oratione conuersa, doceamus quomodo totius corporis intemperies corrigi debeat.

Q V O M O D O C A L I D A I N T E M
peries corrigatur. Cap. LXX.

Q Vum itaq; in calida intemperie bilis superet, per inferiora descēdit, notum est omnibus, nullum oportere negotium facessere: si ad superiorem uentriculum tendit, uomitu, qui post exercitationem ante cibum facta aquæ potu cietur, euacuare. Utis lius autem exercitium ipsis est, quod non uehemens ualidumq; est, sed remissius leniusq;. Nonnulli uehementer calidi nequaquam exercitationem requirunt, uerum obambulatio balneumq; ipsis sufficit, iidem lauacris quosque secundum cibum oblectantur. Quibus adiuncta est siccitas, hi ratione uictus humectante indigent, ex cibis humectis, balneis, & exercitiorum ualētium & multorum abstinentia. Quare per æstatem citius lauare, & à cibo rursus debent, frigida hos potio iuuat. Verum siccis temperamentis uenus maxime est inimica: cauetur ipsis recte lassitudo, æstus, sollicitudo & uigilia. Humida intemperies in pueritia morbis patet, & defluxionibus, plenitudini & præterea putredini feruntur accepti. Itaque ex usu est multa exercitatio, proba in uentre concoctio, excretioq; per urinas, quapropter si uel ante cibum bis terve ex aquis natura calidis lauentur, magnum sentiunt præsidium. Porròne defluxionibus tententur, prospiciendum est, lauacris, multa exercitatione, urina ante cibum aluoq; inanita. Nihil autem prohibet, etiam apophlegmatismis nonnunquam uti, & purgationibus, cibis boni succi, & uino quod urinam moueat.

Q V O M O D O F R I G I D A I N
temperies emendetur. Ca. LXXI.

INter frigidas intemperies, tres numerantur differen-
 tię, ex quibus sicca est deterrima, quod enim proces-
 su temporis senescentibus obuenit, id statim ab ini-
 tio hos affligit. Itaq; humectare eos & calefacere oportet, quod commodè fiet exercitiis mediocribus, cibo humido & calido, uini calidioris potu, somno pleniore, ita ut curam adhibeamus, ut quę in corpore recrementa quotidie procreantur, omnia euacuentur. Cæterum uenus omnes sicciores, & præsertim qui ad hoc frigidi sunt, offendit: solis autem calidis humidisq; tuta. Porro uitiosa quoq; frigida temperamenta sunt, quę humiditatem habent coniunctam, ut quę fluidis morbis maxime implicentur, his prodest balneo abstinere, largius exerceri, uiuere tenuiter, unguenta mediocriter calida adhibere. Qui autem frigidiores natura, mediocriter sicci humidiq; sunt, horum calor & exercitationibus suis scitari firmariq; debet, quantum ad totius uictus rationē attinet, eam quę inter humidum siccumq; media est, deligere oportet.

Instaura-
 tum ex
 Cribasio.

QVOMODO SICCA TEMPERIES
 in uentriculo, ueluti exemplo, deinde &
 alię corrigantur. Cap. LXXII.

INtemperies sicca, nūc est, ubi solida similiarium partium substantia reddita est siccior, quando nihil in medicina spei est: nunc quum propria humiditas unde partes nutriuntur omnino est absumpta: quę continetur in omnibus animalis partibus, roris modo eis inspersa, hanc igitur particulis sine nutrimento inferere, nulla ratione queas, ideoque difficillima est omnium eiusmodi affectuum curatio. At quę in propriis cuiusque particulę exilibus arteriis uenisq; consistit siccitas, curationem recipit, si singulas similiarium partium propria humiditate, humectantis alimenti auxilio repleas. Balneum igitur temperatum conuenit, in quo longissime uersari hominem expedit: inde statim lac exhibere asinum, quod recens mulctum

PAULI AEGINETAE

fuerit, & pauxillum mellis tepidi adiectum habeat. post
 hea conquiescere ad secundam usque lauationem per
 mittere, tum modice fricabis simul & pinguiter, utique si
 lac quod sumpsit, iam omnino confecit, id quod tu ex
 ructu tum uentris mole licet conicere, modicum uero
 temporis inter primam & secundam lauationem, inter
 uallum erit, ut quatuor, aut quinque & quinoctialium ho
 rarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare pa
 ras: sin aliter, plurimum. Quinetiam post unamquaque
 lauationem, hominem, priusquam se uestiat, oleo perun
 gemus: ac si quidem lacte oblectatur, post secundam quo
 que lauationem id exhibebis: sin aliter, ptisanam dilige
 ter incoctam, aut chondrum ptisanæ modo præparatam.
 hinc ubi rursus conquerit ad tertiam reducendus est
 lauationem, aut ilico ad coenam. Sit autem panis præ
 paratus illi purus, & qui curiose in furno sit coctus. ob
 sonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure
 asellus, & ut paucis alimenti summam complectar,
 concoctu sit facile, nutriendus, minimeque glutinosum &
 excrementitium. potus, uinum aquosum & album, pur
 rum, & quod minimam, si diluitur, aquæ mitionem sus
 tinet, oligophoron Græci nominant, modice astrictio
 nis particeps: atque hæc maximæ siccitatis curatio est.
 Modica uero non tam exacto uictu indiget, & plenio
 rem cibum admittit. Proponatur autem & nunc siccitas
 priori similis, copuleturque ei frigiditas mediocris: ergo
 calefacientis materię tantum iam dictis admiscendum
 est, quantum particula ad frigidius inclinauit: lacti quide
 mel copiosius adicietur: uinum autem minus aquo
 sum priore dabimus. Quinetiam esculenta omnia cali
 diora, idque non naturalibus modo ipsorum tempera
 mentis, uerum recentibus ex igni qualitatibus, exhiberi
 debent. Nardino præterea unguento ungendus assidue
 uenter est, aut mastichino. At uero si cum siccitatis intes
 perie multa sit frigiditas, primum ipsam difficillimam
 & uix emendabilem censeo: eisdem uero medicamen

tis utere, & melle per se discocto dispumatoq; : uinum
autem eliges semper antiquius. Optimum sanè medi-
camētum talibus omnibus est, quo picatores quotidie
utuntur. Ergo illinere eo totum uentrem conueniet, ac
5 post auellere etiamnum calidum. Cæterum ex iis quæ
uētri extrinsecus applicantur, boni habitus puellus unā
sic accubans, ut semper abdomen eius contingat. Huic
siccitati iuncta caliditas esto mediocris. In eiusmodi in-
temperie primum curationis modum seruabimus, ita
10 ut mel prorsus non degustetur, uinum uero exhibeatur
quod minime sit uetustum. Iam cibos egelidos & laco-
teos offeremus, & uentriculum oleo tum crudo tum
melino perungemus. Verum hos uehementer admo-
dum refrigerare periculosum est, quandoquidem hæc
15 affectio febris quodammodo naturam, ubi calor super-
rarit, imitatur. Fingamus itaq; rursus calidam intempe-
riem præpollere, huic autem adiunctam esse modo hu-
miditatem, modo siccitatem, frigida ipsam aquæ potu-
curabimus, huc optime facit esus ciborum astringen-
20 tium, sed qui citra calorem sint austeri. Quum humida
sola intemperies est, siccantes cibi, ita ut non calefaciāt
refrigerentq; ualide, auxiliantur, ad hæc consueta pos-
tionis penuria. Si cum frigiditate humida urget intem-
peries, optima remedia sunt, omnia acria, misceri autem
25 his debent, quæ sine manifesto frigore astringunt, opti-
ma simul his est exigua potio, eaq; uini ualide calefa-
cientis. Hoc igitur modo intemperies qualitatū cu-
rantur. Quoniam uero sæpe in ipso uentriculi sinu con-
tensus humor, interim autem in ipsas uentriculi tunicas
30 impactus, intemperiem procreat, non alienum est de
his differere. Prior itaque affectio si semel radices ege-
rit, purgatione per uomitum facile conquiescit, si autem
rursus ex alia quapiam aliisue particulis confluxerit,
exactam requirit dignotionem, curatio uero statim sub-
35 sequetur. Etenim uniuersam eam parti affectæ oportet
accommodare, cura adhibita, iis quæ recipiunt, ne facile

PAULI AEGINETAE

quæ confluunt admittant. Fiet autem hoc astringentibus
& iis quæ totum corpus ad bonam habitudinem per-
ducunt. At uitiosos in uentriculi tunica humores medio-
criter purgantibus educemus, cuiusmodi est aloë & ex
ea confectum medicamentum amarum quod hiera pi-
era dicitur. Verum quibus lenta pituita uentriculo impa-
cta est, iis prius exhibenda sunt quæcūq; hanc dissecet.
deinde purgatio tentanda. Quod si ad uomitum sunt
idonei, commodum est per radiculam ex oxymelite
uomere. Sin nec lentus humor sit nec crassus, utiq; abū-
de est à ptisanæ solius cremore uomuisse, item à mul-
sa. proficit & si mulla in qua absinthium incoctum sit,
bibatur. Cæterum reliquarum partium intēperies haud
absimiliter curare oportet, ita ut humores ad idoneos
meatus deducas. At si particula sensibilem meatum per
quem humores effluant, desideret, redundantem in ea
uel saniem uel humores, quemadmodum si spiritus id
quod continetur, flatulentus sit euaporatu discutere ac
uacuare conuenit.

DE ALIMENTORVM FAC- cultatibus. Cap. LXXIII.

QUum de alimētorum facultatibus sermo, pars
sit operis quod de sanitate tuēda præcipit, pro-
ximum est, ut iam dictis eum subnectamus, ubi
prius q̄ particulatim ipsa persequamur, pauca quædā
prælibauerimus. Quippe alimentorū uireis, si qd aliud
perceptas habere conuenit. Quæ igitur attenuandi uir-
tutem obtinent, meatus aperiunt, uiscosa adhærescētia
abstergunt, crassa incidunt extenuantq;. Quod si diutius
ea in cibo adhibeas, serosa biliosaq; contrahes recremē-
ta. ac si uberius ingeras, sanguis atra bile uitiosus reddi-
tur. Quare continuus ipsorum usus, præsertim biliosis
temperamento uitari debet. conueniunt autem solis iis,
qui pituitam, humoremq; crudum lentum, & crassum
collegerunt. Porro quæ incrassandi uiribus constant, ua-
lentis admodū materiæ sunt, & si in uentriculo ac iecio

LIBER PRIMVS.

24

nore decenter fuerint concocta, boni succi sanguine produ-
 dunt, sed lienem & iecur obstruunt. Ex his alia sunt
 crassi duntaxat succi, ut lenticula: alia uiscosa, sicuti mala-
 uæ: quibusdam utraq; cōtingunt, nempe ut & crassi sint
 succi, & glutinosa, ut testaceo tegmine prædita. Itaque
 uictus extenuans ad sanitatē tuēdam tutior, q̄ qui increas-
 fat, existit. Quum uero imbecillis sit materiæ nō robur
 ac uireis corporibus suppeditat, ac oportet nonnunquā
 ualentis materiæ cibum, quum inedia quædam presit,
 mediocriter exhibere. præsertim uero citra periculum
 assumunt, qui sese exercent, & quantum libet dormiunt.
 omnes autē quibus ante cibum exercitari non licet, cras-
 si succi alimenta euitabunt. Imò neq; in otio degentes
 eiusmodi cibos assument. Porro quemadmodū sum-
 mū otium maxime ualitudini tuendæ obest, ita medio-
 cris motus summū adfert præsidium. Cæterum mediæ
 materiæ cibi omnium sunt laudatissimi, ut q̄ mediocrē
 consistentia sanguinem procreent. Talis itaq; cibus cor-
 poribus nostris congruit: qui uitiosos humores gignit,
 noxius est, eoq; semper caueri debet. Iam & uaria ci-
 borum genera assumere, cautio est, præsertim si ex di-
 uersis consistant facultatibus. Non enim ingesta conco-
 ctionem, ut par est, sortiuntur.

DE OLERIBVS. Cap. LXXIII.

Lactuca manifesto & refrigerat & humectat, eoq;
 somnum accersit, ut autem inter olera ualenter
 nutrit, ita boni succi sanguinis efficax est. Intybū
 frigidi humidiq; temperamenti, sed minus q̄ lactuca exi-
 stit. Malua refrigerat quidem, sed non euidenter, ma-
 gis autem humectat: unde etiam aluum subducit, idq;
 propter genuinam eius uiscositatē. Beta absterforia
 uē uentrem subducit, eoq; stomachum largius comesta
 erodit, iecoris lienisq; meatus obstruit. Brassica bis co-
 cta si edatur, aluum cohibet: semel aut non tamen uehe-
 menter cocta, cum oleo & garo, uel sale comesta, ma-
 gis subducit, quemadmodum succus ipsius & lenticulæ.

PAULI AEGINETAE

efficacius purgat. Hac magis adhuc marina brassica al-
uum manifesto emollit, salsa, & subamara: idem præstat
halimon ut quod acriorem qualitatem salis repræ-
sentet, brassica uero magis stomacho cōduct, ceu atri-
tionis modicæ compos, lac autem & semen produ-
cit. Bitum & atriplex humida quidem uentrē solunt,
sed parum alimenti præstant. Omnia spinosa ut car-
duus, atractylis, eiusq; generis alia stomacho præter ci-
naram conducunt, quæ mali succi & dura existit, quæ
propter optimum est incoctam cum oleo, garo, et co-
riandro assumere. Apium, hipposeelinon, sion, & smyr-
uium, omnia urinæ ciendæ sunt, sed smyrnium odora-
tum, magis acre urinæ ducendæ proficit, & mulieribus
mensis commouet: apia suauiora sunt, ideoq; stomas-
cho magis amica. Eruca calida est, & seminis efficax,
ob quod libidinem & capitis dolorem, quam cepha-
læam dicunt, excitat. Nasturtium, ocimum & sinapi, cali-
da quidem & acria, sed maxime nasturtium: concoctu
uero difficillia, stomacho inimica, & uitiosi succi. Vrtica
extenuat uentrem subducit, modice alit. Gingidion si-
mile est scandici astringentis & non parum amaræ qua-
litis particeps. præterea stomacho congruit, ut etiam
cibum respuentibus cum aceto assumptum, proficiat:
parum uero alimenti corpori ministrat. Porro syluestria
dicta olera maxime uitiosos gignunt humores. Cappas-
ris cibi cupiditatē proritat, iecoris lienisq; meatus ape-
rit, pituitam subducit. Utendum uero ea est ante cibum
aliud, ex oxymelite aut oxelæo.

DE ASPARAGIS. Ca. LXXV.

B Liti, lactucæ, attriplicis, maluæ & betæ planta qui-
dem humida est, asparagus autem ficcus. Con-
tra, raporum, sinapis, radiculæ, nasturtii, pyrethri,
brassicæ, omniumq; aliorum quæ calida sunt, planta q-
dem sicca, asparagus autem humidus est. At à spinosis
stirpibus, hortensis, & qui in frutetis seu uliginosis locis
nascuntur asparagi, item qui à bryonia decerpuntur, sto-
macho

macho quidem utiles sunt, & urinam citant, sed inualide alunt. At si probe coquantur magis q̄ li qui ex oleribus sumuntur nutriunt. Cōsimili modo & chamædaphnes asparagus efficit.

DE RADICIBVS QVÆ CIBI

Rationem obtinent. Cap. LXXVI.

N Apus & rapa si bis coquantur, nihilo minus q̄ reliquæ stirpes alunt, continue autem assumpta crassum succum procreant. Bulbi astringunt,

abstergunt, cibi cupiditatem mouent, stomachum confirmant, & uiscosos è thorace humores eliciunt: bis in coctū ualentius quidem nutriunt, sed nihil emolliuntur, amara, ipsorum qualitate sic abolita. præterea semen genitalē augent, libidinemq̄ excitant, inflationes & tormina,

modo largius eis utare. Quod si ex garo & oleo edantur, suauissimi sunt, flatu discutiunt, ualenter alunt, concoctū faciles. Pastinacæ uero, dauci & cari radices minus q̄ rapa nutriunt, calēt tamen odoratæq̄ sunt, & urinam manifesto cient, abutentibus uitiosos humores

gignunt & ægre concoquuntur communi radicum ratione. Nonnulli syluestrem pastinacam daucum nominant, efficaciore ad urinam ciendam uirtute præditum: radícula extenuandi calefaciendiq̄ uireis obtinet sumitur recte ante cibum ex aceto aut garo, alui ducendæ

gratia: secundum cibum, nequaquam. Cēpa, allium & porrum, acri uirtute donata, corpus calefaciunt, extenuant, & crassos in eo humores incidunt, bis cocta, parum alunt: cruda, omnino nihil. Atqui allium magis meatu reſerat, humoresq̄ discutiit. Sunt autem porris ficciora

ampeloprasa, utpote syluestria. In totum omnia cruda olera, si edantur, peiores q̄ cocta succos procreant, ac plus humoris excrementitii continent. Verum quæ condita uel muria uel oxalme reponuntur, stomacho profunt & appetentiam excitant, crudos humores incidunt, sed ægre concoquuntur: & si abutare, uitiosos succos gignunt.

PAV. AEGIN.

D

PAULI AEGINETAE
DE TVBERIBVS ET FVN-
gis. Cap. LXXVII.

TVber humorem de se reddit qualitatis expertem, sed frigidiorē & crassi succi. Fungi uero frigidi pituitosi & mali succi sunt: in his ipsis minus nocentes boleti sunt, qualitatis expertes, si probe coquantur. Qui uero ammanitæ dicuntur, secundum ab his ordine obtinent: aliis fungis abstinendum. plerique siquidem ipsorum lethales. Ac si ipsi boleti nisi exactius decocti edantur, periculi occasionem præbent.

DE FRUMENTACEIS.
Cap. LXXVIII.

Eorum quæ frumentacea nominantur, chondrus egregie nutrit, & glutinosos parit humores, uerū plus ex eo confecta nocet, quoniam quæ primum crassescens incocta permanet. probatur magis succus ipsius ex integro chondro bene decocto expressus, ptisanæ similis, Alica in cæteris chondro quidem respondet: sed aluum magis astringit. Triticum, elixum sanè, coctum difficile est & inflationes creat: ubi uero concoctionem expertum est, alimentum præbet ualentissimū. In panem autem coactum, minus inflat, minusque ægre concoquitur, utpote fermenti & salis particeps. Inter panes firmissimus est, siligineus, deinde ex similia, tertius, à quo cribro nihil excussum est, Græci syncomiston appellant. cibarius panis minus nutrit, sed magis, per aluum deficitur. Amylum parum alimenti præstat, quemadmodum & panis elotus. Ordeum frigida facultatis est & absterforia: ptisanæ modo incoctum, humectat: torrefactum, quemadmodum in polentis fit, desiccatur. Polenta per ætatem ante balneum cum aqua pota, siti medetur. Panis ordeaceus fragilior est, & parum nutrit. Maza difficilius concoquitur quæ panis ordeaceus, inflationesque gignit: melle autem adiecto aluum citat. Avena & calida est, & imbecillis materia. Milium & panicum refrigerant, siccant, paucillum nutriunt & aluum cohibent.

Omnino autem milium panico est præstantius. Oryza uix concoquitur, parum nutrit & uentrem retinet. Porro ptisana in hunc modum coquitur: uni eius parti aquæ quindécim & olei momentum adijciuntur, ubi ebullierint acetum quoque addes, quum iam exacte cocta fuerit, sal tenuis superiniicitur. Nonnulli porrum & anethum ei miscent. Cæterum auena chondrusque in ptisanæ modum decoquuntur.

DE LEGVMINIBVS. Ca. LXXIX.

EX leguminibus, lenticula uitiosi succi est, & atrem bilem producit, imò etiam, præsertim bis cocta, aluum cohibet, decoctum uero ipsius cum oleo & garo potum aluum proritat, at quia inflationes mouet, satureia uel pulegium admiscendum est, Fabæ leues sunt, inflant & abstergunt. Aegyptia autem faba humidior nostra est, & excrementitia. Pisum laxum quidem, non tamen adeo flatuosum est. Cicer inflat, abstergit, genitale semen auget, libidinem incitat, & calculos confringit: frictum, minus quidem inflat, sed ægre concoquitur. Lupinum concoctioni rebelle, haud facile transmittitur, crudi humoris efficax. Fœnugræcum si ante cibum sumatur, calefacit, & aluum mouet, Eruilia & phaseolum macerata donec radices succreuerint, ex garo ante cibum sumpta, aluum subducunt, ac plusquam fœnu græcum alii menti exhibent. At phaseolum quod & dolichon appellatur, integrum cum siliquis uiride comestum, excrementorum est efficacius.

DE FVGACIBVS FRVCTIBVS.

bus. Cap. LXXX.

Curbita refrigerat humectatque, & uentrem subducit, sed parum alit. Pepon in totum uitiosi succi est, frigidus, humidus, & uomitioni dicatus: non coctus, bilem generat, semine eius urinam citat & calculos in renibus confringit, ac in totum, abstergit uehementer. Melo pepon omnia quæ de pepone dicta sunt, inualidius efficit. Cucumer minus pepone frigidus humidusque est,

PAULI ÆGINETÆ

sed acrius cit urinam, difficilis concoctu & uitiosi succi, etiam si coctus fuerit. Summatim omnia poma refrigerant humectantq; imbecilliter alunt, & uitiosum humorem progignunt.

DE ARBORVM FRVCTIBUS. Cap. LXXXI.

Ficus & uua inter omnia poma principatū obtinent, ut quæ minus uitiosos humores generent, & magis nutriant. Inter hæc ipsa ficus probioris succi sunt, ualentiorisq; materiae aluo & urinæ ducendæ, renibus purgandis, idonea, præsertim admodum maturæ. Idem præstant carica, quæ inflationes & sanguinem non probum pariant: eoq; frequentius usurpata, pediculos procreant. Vua si non descendunt, nullam cōcoctionem experiuntur, imò etiam crudum humorem generant: si uero deficiuntur, moderatiores sunt. Vua passæ aliis calidiores sunt, stomacho gratiores, ualentius alunt, sed minus subducunt aluum. Mora quæ alias sycamina Græce appellantur, impense humectant, mediocriter refrigerant, ac ante alios cibos præsumpta, uentrem soluunt, non admodum ingrata stomacho, sed exigui alimentum. Ex cerasiis, dulciora quidem aluum subducunt uerum stomacho inimica: quibus inest astrictio minus stomachum lædunt, sed non uentrem citant. Atq; hæc ratio tum in uuis & moris, tum in aliis compluribus seruatur. In uniuersum, astringentia si prius ante alium cibum aut eduntur aut bibuntur, aluum comprimunt, quibus autem ob imbecillitatem uenter non respondet, ii molliendi uirtute prædita, nempe olera aut pisces, aut id genus aliud præsumunt: deinde astringentia, quæ dū ipsum firman, deorsum propellunt, & ad excretionem incitant. Pini nucleus, qui & strobilus dicitur, boni quidē succi est crassiq; ad nutriendum ualens, non tamen ex facili concoquitur. Persica prauis succi, acidiq; sunt, & facile corrumpuntur, eoq; primū exhiberi debent, quo protinus deficiantur, nullamq; in uentriculo diutius imo

morata, corruptionem sentiant, Præcocia, doracia & ag
menia, Perficis præstant, neque enim acescunt, neque si
militer uitiuntur, ac sunt etiam gustu gratiora. Malorū,
dulcia sane aliis calidiora sunt, & facile in corpus distri
buuntur, præcipue uel assa uel elixa acida, magis refrige
rant, & humores uentriculo impactos incidunt: austera
stomachum firman & uentrem reprimunt, atq; his ma
gis cotonea. Idem præstant pira grandia maturaq; sed
ualentius nutriunt. Mala Punica frigefaciunt, & parū ali
menti præbent. Mespila sorbaq; uehementius astrin
gunt, eoq; aluo fusæ accommodantur. Palmulæ, nisi
admodum sint pingues, stomacho profunt, uentrem re
tinent, crassos, glutinososq; humores gignunt, capiti fa
ciunt dolores. Ex oliuis, druppæ stomacho aduersan
tur, crassi humoris efficaces: muria conditæ & colym
bades si ante cibum sumantur, appetentiam faciunt, &
aluum subducunt, ac magis quæ ex aceto & oxymelite
præparantur. Inter nuces, iuglans, auellana minus nutrit,
stomacho gratior. Nux uiridis humidior est, & uentrē
citat: arida, si ubi in aqua cōmaduerit membrana ipsius
interior adimatūr, cōsimilem uiridi potestatem obtinet.
Amygdala incidēdi extenuādīq; uiribus pollent, ideoq;
uiscera & thoracem expurgant, idq; efficacius amara.
Similiter & pistacia, uerum iecur efficacius obstructione
liberant. Damascena ante cibum sumpta & cruda & in
mulsa elixa uentrem soluunt. Syriaca ægre coquuntur,
stomacho noxia, modiciq; alimenti. Siliquæ ægre con
ficiuntur, aluum cohibent, & humores creant uitiosos.
Sycomora manifesto frigefaciunt & humectant. Citrei
mali pars exterior acris & concoctioni rebellis est: caro
ualenter alit, & ipsa ad concoquendum contumax: in
terior pars siue acida siue aquosa fuerit abunde refri
gerat. Glandes non minus quā frumentacea alunt, sed
concoctu difficiles, crassi succi, & tarde permeant. Cas
staneæ omni ex parte his præcellunt.

PAULI AEGINETAE
DE ANIMALIBVS, ET PRIMO
de uolatilibus. Cap. LXXXII.

ANimalia quæ uolatu nituntur, minus quidem quæ pedibus fidunt, & præcipue sues, alunt, sed promptius concoquuntur, magisque; perdix, attagena, pullus columbinus, gallina & phasianus. At turdi, merulae, & exigui passeris, inter quos sunt etiam à turribus ubi nidificant, pyrgitæ appellati, solidius alimentum præstât, atque his magis adhuc, turtur, palumbus, & anas: sed multo durius, cōcoctu difficilior, magisque; fibrosum patio exhibet. Anserum uero & struthio cameli caro excrementicia, ægrius quæ omnia commemorata concoquitur, si alæ excipiantur, quæ non minus quæ aliarum auium probi succi existunt. Porro gruum caro fibrosum solis dumque; præbet alimentum. In totum iuniora ueteribus humidiora sunt, promptius cōcoctioni parent, ualentior rem cibum præstant, atque per aluum facile descendunt. Similiter elixa ab assis, & in sartagine frixis differunt. Iam quæ in siccis locis & montosis proueniunt, citius concoquuntur minusque; excrementicia sunt, quam quæ in paludibus nascuntur.

DE OVIS. Cap. LXXXIII.

OVa gallinarum, phasianorumque; omnibus præstant. Anserum & struthio camelorum praua habentur. Ex omnibus autem recentia ueteribus multo sunt præstantiora, ac tremula plus alimenti habent: sorbilia magis descendunt, ac faucium asperitates læuigant. Reliqua omnia ad concoquendum rebelliora, tarde transeunt, & succum gignunt crasfiorem, præter ea quæ plicata dicuntur, hæc autem sunt si cruda immergantur in aquam calidam cum garo, uino & oleo & in uasa mediocriter coagulentur. Huiusmodi enim coqui facilia & boni succi habentur. Omnia uero quæ sartagine friguntur deteriora sunt.

DE PEDESTRIBVS ANIMALIBUS. Cap. LXXXIII.

INter animalium quæ pedibus fidunt, carnes, suilla
 maius quàm alii cibi alimentum præbet, eo quòd gustus
 et odore familiaritatem cum humanis corporibus
 sortita est, ut nonnulli qui imprudenter humanas carnes
 5 gustarunt, cognouerunt. Alimentum uero quod ex illis
 contrahitur, uiscosum est, & non facile in membra pos-
 test detrahi. Ouilla excrementicia prauiq; succi est. Cap-
 rilla acris est malumq; succum efficit. Deterrima hirci-
 na, siue succi bonitatem, siue concoctionem respicias.
 10 Bubula atræ bilis efficax. Leporina crassi succi est, sed
 minus quàm ouilla & bubula. Ceruina dura est, et cōcoctio-
 ni rebellis. In totū, noua uetustis humidiora, mollioraq;
 & ad concoctionem facilia sunt. Item castrata non ca-
 stratis, pinguis macris præstant.

DE PARTIBVS ANIMALIUM

& sanguine. Cap. LXXXV.

SVMMA corporis particulæ neruosæ sunt, citra pin-
 guedinem & ex carnes, eoq; glutinosæ, exigui ali-
 menti, ac ad aluum mouendam efficaces, si exci-
 20 pias quæ uolatu nituntur, ob nimiam siccitatem. Ro-
 stra & aures cartilaginossæ, et ad concoctionem sunt po-
 tinaces. Lingua, laxa, exanguis, parum alimenti habet.
 Glandulæ suauessunt, et flaccidæ, sed mammarum præ-
 cipue suum, quum lacte scatent, pulciores habentur, hæ-
 25 aut nō minus quàm carnes alūt. Renes et testiculi gustu in-
 suaues & concoq; difficiles. At saginatorū gallinaceorū
 testiculi & suaues sunt, et probū corpori alimentū præ-
 stant: quæadmodū taurorū, hircorū et arietū concoctio-
 ni resistunt, et uitiosos creant humores. Cerebrum pitui-
 30 tosum, crassi uitiosi q; succi, lente transit, concoctioni ad-
 uersatur, stomachū lædit, et nausæa excitat: si aut probe
 coquatur, plurimū exhibet alimenti. Medulla pinguis et
 cerebro suauior est, in cæteris ei respōdet. Pinguedo et
 adeps pauci alimenti sunt, et stomacho nocent. Cor et
 35 iecur crassi succi, ægre cōcoquantur & lēte trāseunt. At
 suillū iecur aliis præstat, Lien tū prauos humores, tum

D iiii

PAULI ÆGINETÆ

atram bilem efficit. Pulmo facilius quidem, utpote fungosus, concoquitur, sed leuiorem cibum præbet, pituitæ generandæ efficax. Ventriculus, uulua, intestinaq; dura, cōcoctioni aduersantur, pituitæ efficacia. Summatim fera animalia sicciora, q̄ domestica alimentum exhibent, minusq; excrementicium. Sanguis quilibet, uix concoquitur, præsertim crassus & melancholicus, qualis nimis est bubulus. Leporinus utpote suauissimus commendatur. Ac multi ipsum cum iecore solent incoquere, quidam uero & cum aliis uisceribus. nonnulli & iuuenis procelli sanguinem edunt. Caprillum uero nonnullos comedisse, etiam Homerus testatur.

DE LACTE. Cap. LXXXVI.

Lac coctum probe nutrit, gingiuis autem & dentibus nocet, quapropter ubi assumptum est, primū mulsa, deinde uino astringenti os colluere oportet. Item caput tentat, præcordia uentremq; inflat, calculos in renibus gignit. Ac dilutior ipsius pars, minus quidem alimenti præbet, sed magis aluum proritat: crassior autem econtrario, magis alit, minus descendit. At caprillum lac, mediocri consistentia est, sicut bouillum, crassius: & quod statim à partu redditur tenuius est, procedente tempore crassius deteriusq; efficitur.

DE LACTIS POTIONE.

Cap. LXXXVII.

Qui lac potare uoluerit, ab aliis abstinere cibis debet, donec concoctum fuerit, & inferius descenderit. Satius itaq; est de mane recens mulsum bibere, ac post id nihil assumere, nec non labores nimios deuitare, nam laborantibus, acescit, præstatq; interea uigiles conquiescere, hoc enim pacto q̄ primum per aluum descendit. Vbi deiectum fuerit, aliud bibendum est: ac si hoc quoq; descendat, aliud. Initio itaque purgat utiliter, non quidem copiosum ex reliqua corporis mole, sed quæ in uentriculo continentur: mox, uenas ingreditur, ac optime nutrit, atque non amplius deit

LIBER PRIMVS.

29

citur. Porro in biliosis fluxionibus, & quum tabida corporis ad uentriculum concurrunt, coctum lac exhiberi debet. Coquetur autem primum lenta paulatimq; ut pars descendat, pars consumatur, deinde magis ac magis incoquetur, cura adhibita, ne aduratur, aut in caseum coalescat, quod optime fiet, si leniter ipsum coquamus, & agitando id quod recesserit undiq; detrahamus. Agitabitur autem ferula concisa & tenui: & si quid oris ollae inferuescat, hoc quoque spongia adlimere oportet, id enim subinde etiam reliquum hac corrumpit. Eo igitur modo quo dixi, lac coquendum est, usq; dum æquabiliter crassius dulciusq; crudo euaserit. Quod in eo tenue est & serosum, calculis marinis ignitis in id demissis, ebibitur consumiturq;. Atque hoc alui fluxionibus, præsertim biliosis est accommodatum.

DE LACTE SCISSILI.

Cap. LXXXVIII.

Serosa lactis portio à caseo discernitur, si uehementius ad ignem largiorem citra fumum excoquantur, deinde colo aut panniculo exacte traiciatur. Porro miscetur sero mellis momentum, aut oxymelitis aliorumve, daturq; subducendi uentris gratia, ætate quidem florentibus ad duos sextarios: iunioribus, non minus sextario. Quod uero marinis calculis ignitis aut ferro candenti demisso lac incrassatum est, intestinorum torminibus & alui profluuiis recte exhibetur.

DE CASEO. Cap. LXXXIX.

Omnis caseus acris est, sitim facit, ægre concoquitur, uitiosos succos, calculosq; generat. Laudatior est recens, fungosus, mollis, suauis, & modici salis particeps: qui secus habet, pessimus est.

DE PISCIBVS. Cap. XC.

Omnēs pisces frigidioris, humidiorisq; temperamenti esse, nulli non constat. Omnium uero optimi sunt, saxatiles, ad concoquendum prompti, boniq; succi, modice humectant, ubi non duram carnem

PAULI AEGINETAE

occupauerint. Verum ex non saxatilibus, qui in pelago degunt, multum ab iis uariant qui in limo sunt æditi, uel ubi flumina irruunt, sed omnium deterrimi qui uel in stagnis uel paludibus uiuunt. Particulatim uero capito, si ex pelago fuerit, mediocriter suauis est, minus cōcoctio ni rebellis, & boni succi, sanguinem uero gignit tenuiorem imbecillio remq; Similia & lupus præstat. Mullus qui & ipse in pelago editur, aliis piscibus durior est, fragilis, concoctu facilis, ualidæ ad alendum materiæ, suauis & pinguedinis expers.

DE TESTACEIS. Cap. XCI.

Generatim pisces qui testa cōteguntur, Græci uocant ostracoderma, salsum crudumq; humore producant. Ex his ostrea mollissimam carnem obtinent, facilius descendunt, Chamæ uerò, purpuræ, ungues, spondyli, buccina, cochleæ, atq; huiusmodi alla dura, ac quæ crustata quoq; nominantur, nempe grammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ cōcoctioni repugnant, sed alimentum præbent & uentrem comprimunt, si in aqua dulci sæpius decoquantur. Omnibus uero crustatis inest succus, aluo subducendæ utilis, eoq; etiam terrestribus cochleis. Ac quum, hæc duram carnem cōcoctu difficilem ualentis materiæ & succis uitiosam sortiantur, nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad aluum subducendam adhibent. Echini modice frigefaciunt, exigui alimēti, & urinæ ciendæ efficaces.

DE MOLLIBVS QVÆ MALACIA dicuntur. Cap. XCII.

Molles pisces, utpote polypi, sepiæ, loligines duri & coqui contumaces sunt, præcipue polypi, salsum humorem modicum obtinent: cocti autem non parum alimenti, corpori exhibent.

DE CARTILAGINEIS.

Cap. XCIII.

Cartilagineorum, quæ selache Græci dicunt, torpedines, pastinacæ, mollem suauemq; carnem

occupant, quæ celeriter descendit, facile concoquitur, & probe alit. Raia, leuiraia, squatina, atque eius generis reliqua, duriora sunt, concoctioni renituntur, & ualētius nutriunt. In summa quibus dura caro est, & ægre concoquuntur, & plenius alunt: ubi uero concocta fuerint, copiosum solidumq; alimentum præbent.

DE CETACEIS. Cap. XCIII.

Cetacea, utpote, balenæ, uituli marini, libellæ, delphini & prægrandes thynni duram, cōcoctu difficilem & crassi succi carnem habent. Sale cōdita eiusmodi moderatiora efficiuntur, aliisq; piscibus humidiora, magis excrementitia, perturbationi uentris magisq; sunt accommoda. Salsamentorum uero differentia piscium unde constant, naturam imitantur.

DE VINI VIRIBVS. Cap. CXV.

Qui sanitatis tuendæ curam suscepit, eū quodque uini facultates cognitas habere expedit. In uniuersum itaq; uinum omne nutrit, uerum rubens, & crassum, magis: boni autem succi non est efficax. Item dulce & ipsum quidē impense nutrit, sed stomacho nocet. Austerum stomacho quidem amicum est uerum ægre in corpus distribuitur leuiusq; alit: hoc aut magis, albū. Præstantissimū est colore uermiculum. Porro uetustius nouo magis & calefacit & desiccatur. hæc igitur uini sunt facultates, ueluti summamini exposte. Ceterū calorē in nobis refocillat, unde cōcoctio melior, & sanguis pbus euadit, cibū p oia corporis mēbra, ut qd facile penetret, deducit. Quamobrē ex morbo emaciatos reficit, corpusq; ipsorū auget. Etenim cibi cupiditatē facit, pituitā extenuat, bilē p urinā educit, & bonū colorē cōcillat: aio lētiā uoluptatēq; parit, & robur adiscit. Harū itaq; comoditatū moderata uini potio, cōtrariorū immoderata occasionē pbet, eoq; temulēti aio turbant, desipiūt, & graui sōno p̄muntur. qua de cā immodica uini potio diligenter uitanda est, quanquam longiore tēporis interuallo liberaliter bibere conducat. Ita namq; urina

PAULI AEGINETAE

largius & sudores promouentur. Vincit autem mox præsumpta mulsa uomere, quo ne paululum quidē ab eo noxæ percipiatur. Qui igitur potationi indulgebit, alio cibo non admodum repleti debet, sed inter potandum brassicam elixam esse, & bellaria præsertim amygdala assumere, ut quæ capitis dolores leuent, & uomentibus nihil adferant molestiæ. Præstaret autem absinthii dilutum ante potionem ingerere, ut quod omnium maxime crapulæ discutiendæ sit efficax. At si aliquis rosionem à uino sentiat, frigidam: insequenti die absinthii dilutum bibet utiliter, ob ambulatione itidē, frictionibus, balneo, & exiguo cibo reficietur.

DE MELLE ET MULSA.

Cap. XCVI.

Mel coctum ualentius nutrit, q̄ subducatur aluum: non coctum, e contrario, ac frigidis humidisq; temperaturis conducit: calidis, in bilem uertitur. Mulsa uero non admodum biliosis utilis est, ut quæ in bilem de generet. Itaque in eiusmodi naturis dilutior mulsa recte dabitur: iis qui uiscera habent affectibus opportuna, incommoda est. Cæterum hoc modo præparari mulsa debet. Octupla aquæ portio melli admiscetur, incoquiturq; donec spumare desinat. Spumam uero continenter ab ea tollere, simul atque orta est, oportet.

DE SOMNO. Cap. XCVII.

Posteaq̄ omnia quæ ad uictus rationem spectant, sumus executi, superest ut de somno, eò quod omnium postremus magna ex parte initur, disseramus. Itaque somnus uirium animalium (ut ita dicam) requies est, utili humiditate cerebrum madefaciente proueniens. Qui si recte ineatur, multa præstat commoda, cibum elaborat, humores excoquit, dolorem lenit, lassitudinem solatur, intentia laxat, animi uero ægritudines obliterat, rationem uitiatā corrigit. Porro tempus somni optimum est à cibo, sed interdiu captus haud omni

nibus est idoneus. Tempus enim quo obdormiscunt ad absolutam ciborum concoctionem non sufficit. interrupta enim ante horam suam concoctione, à meridie resurgentes, subinde acidus ructus ædunt, crebro etiam flatibus replentur. Nonnulli fluctuatione uentris infestantur, nisi uel ex consuetudine, uel sufficienti somno usi, eiusmodi mala effugiant. Cæterum optimus somnus est nocturnus, quoniam nox naturali humiditate, silentioq; somnum accersens, absolutam molitur concoctionem. Item post illum plurima parte ad excretionem recrementorum instigamur. Terminus autem somni esse debet perfecta ciborum concoctio, quæ tum ructibus, tum uentris contractione deprehenditur, secundum quâ uigilantia non inutilis, ut quæ recrementorum ex concoctione deiectionem moliat.

DE VIGILIIS. Cap. XCVIII.

Vigilias quæ laborantes iam affligunt, ex dolore aut febris, aut acutius quodam casu oboriētes, secundo libro de febribus persequemur: quæ autem sanos infestant, hoc loco nobis exponendæ sunt. Si igitur aliquis ob moerorem, aut curam, aut quandam animi ægritudinem uigilauerit, primum id quod molestat, quatenus licet protinus amputabimus, deinde suauium sonorum auditu mens à sollicitudinibus abducenda est, id quod nonnulli leni aquæ murmure machinantur. qui enim sic permulcentur somno facile capiuntur. Præter balneis præsertimq; uespertinis quum bene coxerint utentur, ciboq; humectanti utpote lactuca & id genus aliis. nonnunquam nigri papaueris folia uiridia obsoniis admiscebunt. Piscibus ad concoctionem promptis, uino largiore tenui & nō uetusto recreari debent. Dormituri rosaceo caput perungent, aut oleo in quo papaueris capita, aut mandragoræ sint incocta. itē anethinum non uetus somnum accersit. Noui autem q post lassitudinem quiete subito permissa, somno capeatur. Adhæc uenus moderata id ipsum præstat. Alii

PAULI ÆGINETÆ

caput aut pedes refrigerantes, facile somno corripiuntur. At si ex cibi copia uitiove stomacho grauato uigila uerint (nam hoc etiam accidere nouimus) quemadmodum rursus alii præter consuetudinem inedia pressi, aut modico cibo sumpto, uigiliis sunt infestati, considerare id, ac causam succidere, oportet.

DE SOPORE. Cap. XCIX.

AT si e contrario alti grauesq; somni, quæ cataphora dicitur, urgeant, ab assiduis lauacris & refrigerante unctione abstinemus, medicamentis pituitam per os eliciētibus utemur, atq; in totum ad calidiorem uisus rationem, sicciorem imbecillioremq; ipsos traducemus, quandoquidem huiusmodi affectio à frigidiore, ut plurimum & humidiores materia cerebrum irrotante accidit.

DIOCLIS EPISTOLA AD VALETUDINEM TUENDAM CONSCRIPTA.

Cap. C.

DIOCLES ANTIGONO REGI.

QUoniam tibi omnium regum literatissimo esse contigit, & multum iam ætate profecto, omnis philosophiæ disciplinarumq; mathematicarum peritia excellere, existimaui eam philosophiæ partem quæ ualetudinis tuendæ præcepta tradit, haud alienam à regia maiestate fore: eoq; tibi præscripsi unde morbi hominibus oriantur, & quibus signis præcedentibus quomodoq; ipsis succurrere conueniat. Quemadmodum enim in cælo nunquam tempestas ingruit, quam non indicia quædam præcedant, quibus nautæ cæteri q; probe periti homines certiores reddantur, ita humanam naturam nullus inuadit morbus, quem non signum aliud quod denuntiarit. Tu itaq; si iis, quæ à nobis dicentur, animum attendas, exactam illorum cognitionem indispiceris. Hominis corpus in quatuor partibus diducimus: caput scilicet, thoracem, uentrem & uesicam. Igitur ubi

caput morbo conflictaturum est, hæc plurimum notæ
solent præcedere, uertigo, capitis dolor, superciliorum
grauitas: aures sonant, tempora salunt, oculi rane illa
chrymant, caligantq; , nares oppletæ odorem non sen
tiunt, dentium gingiua attolluntur. Quum ergo ex his
aliquid accidit, caput purgari oportet, nullo quidem me
dicamento, sed uel hyssopi uel origani capitibus tritis, q̄
in ollula cum musto deferbuerint, aut sapæ heminae di
midio ieiunus os colluet, & gargarizando humores ex
alto deducet, eaq; capitis affectuum curatione, nulla le
uior est alia. Optime facit etiam, si sinapi mulla calida
dilutum, ieiunus absorbens gargarizet, pituitamq; ex
capite eliciat. Cæterum caput operimentis prius calefas
cere oportet, quo pituita liquefacta, prompte effluxioni
pareat. Si quis hæc signa neglexerit, huiusmodi ægritu
dines solet experiri, lippitudinem, glaucomata, parotis
das, in ceruice strumas, cerebri tabem, grauedinem, an
ginam noctu, teredines, uuam, capillorum defluxus, ca
pitis ulcera, & dentium dolorem. Quum autem à tho
race morbus nascetur, totum corpus incipit sudare, tho
raxq; , lingua fit crassior, sputum salsum aut amarum aut
biliosum existit, dolor costas aut scapulas sine occasio
ne inuadit, oscitatio frequens, sine somno & quiete, sus
focatio, sitis ex somno, animus tristior: pectus frigidum,
brachia & manus tremiscunt. Succurrendum est prudē
ter hoc modo, uomitus q̄ optime fieri potest, post coe
nam sine repletionem, sineq; medicamento citari debet.
utiles sunt & uomitiones ante cibum, quas Græci syr
maismos appellant. Oportet autem eum qui sic uomet
radiculas tenuis præsumere, nasturtium, erucam, sinapi,
& portulacam, mox aqua tepida superbibita, uomere.
At si huiusmodi indicia cōtēnātur, hi morbi solēt obue
nire, pleuritis, peripneumonia, melancholia, febres acu
te, phrenitis, lethargus, febris ardens cū singultu. Q uod
si à uentre morbus orietur, hæc erunt signa, uenter prius
cruciatur, turbaturq; , cibus & potio amara uidentur,

PAULI AEGINETÆ

genua grauantur: lumbi nequeunt flecti, totumq; cor-
pus etiam sine occasione laborat, crura torpent, febricu-
la exigua affligunt. His itaq; cognitis, uentrem emolli-
re oportet, non medicamentis, sed uictu. Tutius enim
est uti iis, quibus nullus error committi potest, utpote
betis mulsæ incoctis, aliis elixis, maluis, lapatho, Mercu-
riali herba, et ex melle confectionibus. Omnia siquidē
alio subducendæ sunt. Si aliquod ē signis intendatur,
cnici succum omnibus decoctis admiscere oportet, ut
quæ suauiora & sine periculo sint. Iam & læuis brasica
in aqua largiore cocta, eiusq; succus ad heminas qua-
tuor potus cū melle & sale, utilis est: uel ciceris aut erui
decocti aquam eodem modo ieiunus utiliter bibet.
Qui nullam eiusmodi signorum rationem habent, ii
his morbis tentari solent, a lui profluuiio, intestinorum
torminibus, eorumq; læuitate, ilio, coxendice, febre ter-
tiana, podagra, apoplexia, hæmorrhoidibus, morbo ar-
ticulari. A uesica qui nascuntur morbi, hæc dabunt si-
gna: pleni ex cibo modico esse uidentur, inflationes uē-
tris urgent, ructus, pallor totius corporis, somni graues,
urina liuida & uix erumpens, naturalia tument. Quum
itaque huiusmodi notæ apparuerint, odoratis urinam
cientibus tutissime occurrere malo oportet. Itaq; fœni-
culi apiiq; radices, uino albo odorato madefacito, at-
que huius diluti cyathos duos, mane ieiuno singulis die-
bus propinabis cum aqua: item dauci * myrti, helenii,
quodcunq; horum habueris (nam omnia proficiunt)
aquam exhibebis: ad hæc aqua ciceris macerati cum
uino, idē efficit. Qui hæc signa negligunt, hos morbos
expectent, aquam inter cutem, lienem magnum, iecoris
dolores, calculos, renū cruciatus, urinæ stillicidiū & uen-
tris tumore. In oībus huiusmodi indiciis infantes sane,
leuiori: adultos, acriore curatione tractabimus. Cæterū
anni solstitia in quibus hæc solent ingruere, silentio præ-
termittenda non sunt, sed quæ in singulis alimenta con-
ueniant, paucis exequemur, auspiciati ab hyemali.

SOLSTITIVM

* Græce
erat σμυ-
κός pro
μυρτινός

LIBER SECVNDVS

33

SOLSTITIVM HYEMALE.

Solstitium itaq; hyemale usq; ad uernum æquinoctium, auget in hominibus destillatiōes humiditatesq; ac propterea calidioribus uti cibis, pleniori potu ac meracior re, atq; ex origano bibere oportet, nec nō ueneri indulgere. Numerantur dies ad æquinoctium, nonaginta.

ÆQVINOCTIVM VERNVM.

Hoc tempore pituita in hominibus crescit, & dulcis sanies sanguinis usq; ad uergiliarum ortum, eoq; tunc maxime succosa acriaq; assumi debent, corpus exerceri, uenus tutissima est. Sunt autem ad usq; uergiliarum ortū dies sex & quadraginta.

VERGILIARVM EXORTVS.

Hoc tempore bilis atra augetur, amaraq; sanies, usq; ad æstiuum solstitium, dulcia tunc quæ alui moueant, conueniunt, uenus inutilis est, hinc ad solstitiū æstiuum dies quinque & quadraginta existunt.

SOLSTITIVM ÆSTIvvm.

Hoc anni tempus atrā bilē ad usq; æquinoctiū autūnale promouet, quapropter aqua frigida atq; odoratis omnibus utendum est: uenus perniciofa: aut innocentius saltem quæ de ea præscriptimus adhibeto. Porro sunt ad æquinoctiū autūnale, dies tres & nonaginta.

ÆQVINOCTIVM AUTVMNALE.

Hæc anni pars pituitæ copiam generat, tenuesq; defluxiones, donec uergiliæ occidant. Conuenit igitur tunc humores ex capite elicere, atq; acerrima, maximeq; succosa assumere, uomitu non sollicitari, exerceri, atq; concubitum uitare. Numerantur ad uergiliarum occasum dies sex & quadraginta.

VERGILIARVM OCCASVS.

Hoc tēpore pituita ad usq; brumā in hominibus redundat, quā ob rem acerbissima quæq; uinum suauissimū, assumere oportet, pinguibusq; uti & exercitari. Sunt autem ad solstitium hyemale dies quinque & quadraginta.

Primi libri Finis.

PAV. ÆGIN.

E

PAVLI ÆGINETÆ LIBER SE-
cundus de Febribus, Ioanne Guinterio
Andernaco interprete.

CAPVT PRIMVM.



BSOLVTIS de ualitudi-
ne tuenda præceptis, exequi ag-
grediemur, quomodo eos, qui
morbis iã consiliantur, ad me-
liorem statum perducere oport-
teat: à similaribus utpote simpli-
cioribus morbis exorisi. quales
nimirum sunt, quos febriles ap-
pellant. Rursus igitur nos Oribasii compendio, quod
ex Galeni commentariis est excerptum, aliorumq; com-
plurium breuiori disciplinæ uia utentes, paucula quoq;
ab illis omissa adiungemus.

QVOT ET QVÆ PRINCIPA-

lia in morbis potissimum febrilibus
perquirenda. Cap. II.

PRimum quidem perquirere conuenit, morbus
salutis ne spem promittat, an desperationem mi-
netur. Alterum, si uitæ securitatem pollicetur, utrū
acutus sit, an longus. Hæc sane in aliis quoq; magnis af-
fectibus commode quærentur. Tertium, nunquid una
uice iudicium subeat, quod febribus potissimum pecu-
liare est, an particulatim soluator.

EX GALENI COMMENTA-

riis, quale morbi principium dicamus.

Siquidem capitis dolores & febris haud eadem existū t,
quemadmodum neq; uigilia, & cibi fastidium, totiusq;
corporis grauitas, & sensus lassitudinis. Verum unum
quodq; licet à febre sit diuersum, ipsam tamen denūtiat.
portò febris inuadens, præsertim acuta, neq; nos potest
neq; imperitum quenq; latere. Sed finge, si placet, etiam

latere, miraculum tamen iudicauerim, si hora amplius ægrum subterfugerit. Quamobrem illud tempus morbi esse principium dicemus, quo manifesta primum febri correptus decubuerit.

VNDE COGNOSCENDVM,

morbis ne sit sanabilis, an perniciosus.

Cap. III.

L Etas notæ sunt, facies cadauerosæ, nares acutæ, oculi concaui, reliquæq; ab Hippocrate commemorata: multoq; magis si hæc ita sunt, ut neq; uigilia præcesserit, neq; uentris resolutio, neq; inedia. Item in propinquo mors est, si oculi lumen refugiunt, & citra exteriorem quandam causam ilachrymant, idq; nullo peculiari uitio affecti. Ad hæc si alter ipsorum minor appareat: quæq; in iis alba esse debent, rubescant, aut liueant, aut nigrescant. Aut si pituita crassior ipsis inhærescat, perq; somnum alba oculorū appareāt palpebris extrinsecus nō cōmissis, nisi ea uehementer fluens alius expresserit, aut ex consuetudine ipsis hoc acciderit. Iā illa mortis sunt indicia, dentibus stridere, aut desipere, aut in ueste floccos legere, aut fimbrias deducere ac festucas carpere. Attendendumq; est, si æger supinus cubat, & ueluti membris laxatis, uel si deorsum à lecto ad pedes delabatur, quod extremam imbecillitatem fatetur. Multo peius est, frigidum spiritum ex naribus & ore elidere, pulsus languidum crebrumq; sentire. Qui si deficiat, ægerq; ad animi deliquium sudore digeratur, perniciem prælagit. Si igitur omnia, quæ retulimus indicia, aut plura his appareant, aut etiam pauciora, sed ualida, nullumq; salutis argumentum affulserit, periculum mortis inuitabile signat. Contra spirandi facilitas, pulsus uegetior, mens sibi constans, ad hæc facies iacentisq; habitus, sani similis, cibi appetentia, nihil mali, sed securitatem portendit. In uniuersum quæ à naturali habitu maxime abhorrent, pestifera sunt. quæ ipsi respondent, salutaria.

E ii

Ceterum præſagia ex urinis, deiectione, & ſputo, paulo poſt exequemur.

Quatuor notis morbi dignoscuntur: ipsorum mo-
tu, ægrotantis habitu, pulsu, febrium specie. Mo-
tu quidem in eum modum: si quatuor particu-
laris accessionis tempora, ocyus & breuissimo spatio
inuasent, peracutus erit affectus, cuius extremus termi-
nus est, septimana. magna uero ex parte quarto die cris-
sim experitur. At si longius quidem q̃ hic affligerit, sed
duodecim horarum spatium non excedat, acutus præ-
dicitur, qui intra quartumdecimum diem soluetur. Qui
pluribus horis protenditur, ut initium duntaxat & incre-
mentum longiore tum diei tum noctis tempore absol-
uat, eiusmodi longus morbus existit. Sin autem particu-
lares accessiones morbus non habeat, sed inde ab ini-
tio ad usq; finem continuat, tanquam una sit accessio,
ueluti in continuis, etiam hunc nimirum acutis adscri-
bes. Aegrotantis habitu hoc pacto deprehenduntur. Si
quidem facies est mediocriter habita, licet totū corpus
collabatur, acutum morbum prælagire est. Si prorsus ni-
hil emacrescit, longus erit quippe copia materiæ longio-
re spatio concoquendæ signatur. Ex arteriarum motu
ita diuinaris: Magnus pulsus, uehemens, citatus, creber,
acutum morbum indicabit. contrarius, longum. A fe-
brium specie hunc in modum: quatenus calidæ & uren-
tes, acutum signant morbum, mitiores & ueluti elangue-
scentes, diuturnum.

Hoc quoque præscire licet ex iis, quæ modo sunt nobis dicta, nempe ex febrium specie, & tempore. Forsan autem totum ex febrium specie. Siq̃dem calidæ, & perurentes, breui finiuntur, & excretionis

LIBER SECVNDVS

bus solui solent. Mitiores, languidioresq; prorogantur diutius, & in abscessus magna ex parte erumpunt. Hinc liquido constat, non solum quando morbus soluetur, sed etiam quo pacto. Nam acuti per excreta iudicantur: per abscessus, longi.

DE DIEBVS DECRETORIIS.

Cap. VI.

Dierum decretoriorum alii de ægris frequenter, cum fide, salubriter, perfecte, manifesto, & insigniter iudicant, alii contrario his modo. Tertius decimus medium quendam inter utrunq; dierum genus ordinem habere monstratus est. Ac sunt ex ipsis, quæ uel exiguum naturæ impetum nacti, de morbo possunt decernere: quemadmodum septimus, quartus decimus: plerique uero, nisi in uehementibus naturæ motibus, morbos neutiquam possunt soluere. Verum nec uniuersi boni, simili inter se modo boni sunt: nec omnes mali, pari ratione sunt mali, item nec certo ordine bonitatem malignitatemue obtinent. Qui igitur primi sunt ordinis, nempe bonorum numero comprehensi, hunc in modum se habent. Præstantissimi omnium sunt, septimus & quartus decimus: mox nonus, undecimus & uigessimus: deinde decimus septimus & quintus. hos sequitur quartus, post hunc tertius & decimus octauus. His contrarii, ad secundum ordinem referuntur, pessimus, quiq; cum periculo, nec clare de morbis iudicat, ac ueluti ex aduerso septimo diei opponitur, sextus est. Huius consimiles, octauus & decimus: secundum quos duos decimus, sextus decimus & decimus nonus habentur. Medius horum est tertius decimus, nec ita repudiandus, sicut ordini secundo ascripti: nec tam feliciter morbum potest soluere, quam qui ad primam classem pertinent. Atque hoc dignitatis ordine Galenus est usus. Numerorum uero ordine boni sunt: tertius, quartus, quintus, undecimus, quartus decimus, decimus octauus, uigessimus. Mali autem: sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextus

E iii

decimus, decimus nonus. inter hos medius consistit, tertius decimus. Porro ex his decretoriis nonnulli quoque aliorum sunt indices, quos Hippocrates appellauit speculatorios, eo quod iudicia alio die futura prænuntient, contemplandaque exhibeant: exempli gratia, quartus, iudicium septimo die futurum præmonstrat: dum uidelicet sudores quosdam, aut madores, aut eiusmodi particulares uacuationes molitur, aut significationes prius non factas, aut concoctionis notas repræsentat. Iam uero Galenus etiam sexti, licet non boni, quartum esse indicem asserit. Unde decimus quartidecimi index est: septimus decimus autem, uigesimali. Itaque ad quadragessimū usque diem ualentissima de morbis sunt iudicia. proxime succedunt, qui usque ad uigesimum habentur. Qui post hunc ad usque quadragessimum porriguntur, paulatim uehementiam remittunt. Primæ dignitatis sunt, uigesimali septimus, trigesimali quartus & quadragesimali. Hos sequuntur, uigesimali quartus, trigesimali primus, trigesimali septimus. Qui uero dies à uigesimo quartum decimum usque intercedunt, omnes iudicii sunt expertes. Sicut qui post quadragessimum habentur, omnes prorsus elanguescunt, concoctione potius & abscessu, quam crisi morbum finientes. Atque alios quidem à quadragesimo die Hippocrates omnino negligere uidetur, sexagesimi uero, octogesimali & centesimali rationem habet. Ab his deinde alios morbos septem mensibus, alios septem annis, alios, ut uerisimile est duabus annorum hebdomalis, alios ternis iudicio solui tradit.

DECRETORIA INDICIA IN

morborum principio esse praua.

Cap. VII.

Concoctionis signa nunquam sinistre apparent, quippe omnis concoctio, naturæ uincens opus est, eoque semper securitatem pollicetur. Decretoria uero signa interim incommode apparent, propterea quod crisis ipsa ambigat, nunc bona, nunc mala con-

tingat, uti prius in decretoriis diebus est cōprehensum.
Neque igitur per initia, neq; in augmento ipsa commo-
de apparent, sed ubi morbus inclinauerit, quo tempore
natura ipso ualentior est.

QVEM AD MODVM FVTV

rum iudicium prænoscendum sit.

Cap. VIII.

Si accessiones intenduntur, præueniantq; tempus
consuetum & multo fiant uehementiores, ac ter-
tio quoq; die significationem sui præbeant, tū con-
coctionis signa in urinis, aut deiectionibus, aut sputis cer-
nantur, sine mora plane morbus iudicabitur. Sin acces-
siones lente moueantur, eadē q; hora inuadant, ac quo-
tidie affligant, lōgiore temporis spatio interposito, mor-
bi solutionem expectabis. Item iis qui rigore uehemen-
ter febricitant, fieri non potest, ut morbus ante soluatur,
q̄ ille fuerit lenitus. Nisi enim rigor momentum remittat,
haudquaquam morbus ad statum peruenerit, multoq;
minus inclinatio ipsius speranda est.

QVOMODO INSTANS MOR

borum iudicium agnoscatur. Cap. IX.

An te quamlibet iudicationem agrotus male ex-
cruciat. Atq; si interdiu illa continget, nox su-
perior inquieta est. Si noctu futura est, dies ante-
cedit tristior. Ac superueniunt symptomata, utpote ca-
pitis dolor, quem prius non sensit. præterea collum do-
let, præcordia sursum conuelluntur, spirandi quædam
difficultas repentina oritur, aliaq; graui symptomata,
quæ superiori tempore non percipiebantur, apparent.
Atque his ita obuenientibus si pulsus nō concidant, sed
elatus attollantur, uehementioresq; fiant: ad hæc dies
decretorius indicetur, isq; potissimum ex illorum ordi-
ne, qui probe decernunt, non iudicium modo futurum,
uerum salutiferum quoq; expectato. Neq; deterrere in
his te debet, si agrum delirantem, exiliētemve conspis-
cias, Etenim & hæ succorum ad superiora tendentium

E iiii

PAULI ÆGINETÆ

notæ sunt: sicut ediuerso inferiora petentium, aliæ, puta
 imi uentris rosio, circa umbilicum tormina, lumborum
 dolor, uentris murmuratio. Est cum alia quoque indicia
 similia deprehenduntur. Ad hæc si per hæmorrhoidas
 uacuari laborans consuevit, etiam huius uacuationis cir-
 cuitus una incidit repetitque. Pari modo in menstruis, si
 mulier est quæ laborat, non absurdum fuerit per talem
 uacuationem morbi fieri iudicium. Iam sudores tum
 ex corporis madore qui præcescit, ut uerisimile est, &
 præsertim in die contemplatorio erumpentes, tum ex
 meatuum reclusionem prænoscenti sunt. Ac quæ per sus-
 perna uacuationes futuræ sint, ex his maxime intelligas
 licet. Nam præter ea quæ iam nobis sunt exposita, etiã
 ægrotantis facies intuenda est. Itē si qua partium ipsius
 palpitet, aut uenæ in temporibus pulsant, aut gena, aut
 nasus, aut oculus rubicundior appareat, maior spes ua-
 cuationis per superiora futuræ subest. Quod si etiam
 sine uoluntate illachryment, aut splendores oculis obdu-
 ci imaginantur, ac naribus ueluti scabēdi studio manus
 admovent: tunc quidem non amplius morari, sed iam
 adesse fluorem sanguinis uidebis. Vbi enim semel ac
 iterum scaberint, erumpit. Rosio uero stomachi, & labri
 inferioris tremor, crism per uomitiones futuram subin-
 de nuntiarunt. Atque de his abūde est. Accedit ipsis, ægro-
 tantis ætas & natura, quæ spem nostrā confirmant. præ-
 terea anni tempus, & præsens constitutio. Nam si æger
 adolescens est, aut alioquin naturæ calide, aut sanguinis
 copiosi compos, multo magis sperandum est. Quod
 si etiam antea, uel æger, uel sanus, ut supra dictum est, ua-
 cuationem sanguinis expertus fuerit, hoc uel solum ad
 profundendi sanguinis spem exhibendam satis est. Iam
 uero si anni tempus æstas est, aut si non æstas, certe ca-
 lidus aeris status, ac sæpe illo tempore per sanguinis pro-
 fluuium crism sustinuerunt, corpusque sanguine redun-
 det, quod *πληθωρινόν* nominant, & consuetarum excre-
 tionum sit retentio, hæc quoque spem tibi auxerint. Simi-

lis porrò & in reliquis uacuationibus ratio habenda est.

At si horum nihil apparuerit, sed æger in aliquo decre-
toriorum, qui post uigefimum maxime sunt dierum cō-
flictatus sit, id q; dum morbus consistit, ac dolores qui-
dam in articulos aliquos decumbant, aut secundum au-
res, aliasve particulas hæreant, aut dolores quidem mi-
nime, uerum sudores continui ex particula aliqua mem-
bratim erumpant, abscessu morbum finiendum expe-
ctabis. Ac in illa potissimum particula abscessus se pro-
met, quancunque uel sudores, uel dolores, uel tu-
mores exerceant.

QVEMADMODVM OPTI-

mum iudicium peractum agnosca-

mus. Cap. X.

SI uacuatio competens secundum concoctionem
acciderit, & febris æger leuatus, aliisq; accidētibus,
coloratio euaserit pro uacuationis ratione, pul-
sumq; uegetiorem acceperit, ac tum insurgendo, tum
se se erigendo fortior sit redditus, quodq; omnium secu-
rissimum est, si ad morbum ferendum facilitas subsequi-
ta sit, ea sane laudatissima iudicatio habetur. Quod si
horum aliquo deficit, tantum ab optima abest, quātum
id ualeat, quo deficit.

DE PULSIBVS EX GALENI

commentariis.

Cap. XI.

PULSUS motus est, quo cor & arteriæ attolluntur,
submittunturq;. Vfus ipsius duplex est. Etenim
elevatione, Græci διαστολήν appellant, qua arteria
ueluti explicatur quodāmodo, ac patescit, frigidus aer
ingreditur, uitale robur accendens, recreansq;, ex quo
etiam animalis spiritus habet originem. Submissione,
συστολήν Græcis uocatur, qua arteriæ extrema ad mediū
sui concidunt, conuiuentq;, fuliginosa recrementa expel-
luntur. Cæterum hæ arteriæ, oblonga sunt uasa, uenarū
modo concaua, sed duplici tunica muniuntur, tum præ-
dicti motus gratia, tum quòd sanguinem, spiritumq; cō-

PAULI AEGINETAE

tinent. Originem trahunt ex corde, sed per totum cor-
 pus membratim distribuuntur. Omnes igitur pulsus mo-
 do et sibi inuicem, et cordi respondent. Quamobrem
 ex una ipsarum, omnium rationem queas colligere, non
 item uniuersarum ex æquo motum percipere. Sed eas
 rumquæ ex carnes corporis partes perreptant, prom-
 ptius, quæ carnosissub sunt, obscurius. Porro iis quæ p
 brachiale excurrunt omisiss, nullam aut congruentius,
 aut usu commodius attigeris. **P R I M V M** pulsuum
 genus ex motus tempore sumitur, ut quod eleuatione
 arteriarum, atque submissione examinetur. Differentiæ
 ipsius sunt, citatus pulsus, tardus, et mediocris: quoniam
 omne quod motui est accommodatum, aut celeriter,
 aut lente, aut mediocriter pro temporis ratione moue-
 tur. Citatus est, qui exiguo tempore multum spatii mos-
 tu emetitur. Tardus, qui longo tempore, paruum inter-
 uallum perficit. Mediocris qui medium quendam mos-
 tum inter citatum et tardum, peragit. **A L T E R V M**
 genus submissione quantitate constat. Nam quodlibet
 corpus tria sortitur interualla, longum, latum, profun-
 dum. Quare etiam arteriæ corpus tribus constare inter-
 uallis, necessum est. Verum in naturali animantis habitu
 mediocriter ipsam unde quaq; eleuatam reperiess. Con-
 trā, cum animal præter naturam habuerit, nonnūquam
 in aliqua horum distantia deficit, aliquando excedit. In
 quo statu meminisse cōuenit, qualis pulsus naturalis fue-
 rit, si latitudine maior inueniatur latum uocabis, si longi-
 tudine, longum, si profunditate, altum. Liqueat autem cō-
 trarios quoq; ipsis, et naturali minores, ad eum esse mo-
 dum appellandos, arcum, breuem & humilem. Qui
 uero omni distantia æqualiter in statum naturæ contras-
 rium uertuntur, ex iis alius hac ratione imminutus, par-
 uus: alius auctus, magnus nominatur. **T E R T I V M**
 genus pulsuum, ad uirtutis robur exigitur. Differentiæ
 ipsius tres sunt, uehemens, languidus et mediocris. Ve-
 hemens quidem est, qui tangentis manum ualide percu-

tit. Languidus, qui inualide et imbecilliter. Mediocris, horum medio consistit, quem nonnulli naturalem esse putauerunt. Nam ira et exercitiis uehementiorem fieri pulsum asserunt, qui à naturæ habitu recedit, quorū dicitur Galenus uenit obuiā, non firmiter inquiring, sed propter mutari eum pulsum, qui ex causis non naturalibus uehementior euadit. Pulsus igitur uehementior, qui non expedite mutatur, is nimirum naturalis et moderatus fuerit. Q V A R T V M genus, instrumenti constitutione constat: dico autē arteriæ corporis statu differentia huius quoque tres sunt. Vel, n. instrumentum durius est, quam natura exigit, ac pulsus uocatur durus. Vel mollius, ac nominatur mollis. Vel mediocriter habet, ac moderatus inde nuncupatur. Q V I N T V M genus, ex quantitate infusionis arteriæ pendet. Hæc habet discrimina. Plenus est, uacuum et mediocris: quoniam totum uas, aut plenum est, aut uacuum, aut mediocriter repletum. Plenus itaque est pulsus, uti Archigenes definit, qui arteriam pleniorē representat, et submissionem succo impeditam, uacuum quod undæ modo arteriam excitat, ut digitorum impressione loci inanitas confidat. Hæc igitur quinque pulsum genera, uno arteriæ motu constant, quoniam uero caloris, qui in corde habetur qualitas, ex arteria quodammodo magis euidenter apparet, dignati sunt etiam hoc pulsum genus. S E X T V M, commemoratis annumerare. Ad reliqua uero genera, tum quæ uno, tum quæ multis pulsibus comprehenduntur, pertinet quod quietis tempore constat, ei quod numero, et quod æqualitate et inæqualitate, insuper quod ordine et inordinatione constituitur. Quod itaque quietis tempus spectat. S E P T I M V M à primo numeratum, diuiditur in frequentem et rarum et moderatum. Nam cum arteria duplici agitetur motu, qui contrariis absoluitur motibus, necesse est ut duplicia intervallo la cum ipso incidant. Alterum quod post elevationem, ante submissionem est: alterum quod secundo

PAULI ÆGINETÆ

dum submissionem, eleuationem præcedit, quæ etiam
 plerisq; imperceptibilis esse uidetur, ut inter duos mo-
 tus quies aliqua media existat. Cui iã longū getis tēpus
 est, is rarus dicitur: cui breue, creber: cui mediū modera-
 tus. OCTAVVM genus pulsuū ad rhythmū sum-
 matim ptinet, est aut rhythmus qdē habitus, aut tps ad
 tēpus proportio. In pulsu autē, iuxta quædam tempo-
 ra motus, ad quietis tempus, utpote eleuationis & sub-
 missionis, ad nonnullam quietem intercedentem. Secun-
 dum alia uero tēpora, ad motus quietisq; tempus, aut
 motus ad motum, nempe eleuationis ad submissionē,
 aut quietis ad quietem, puta interioris ad exteriorem p-
 portio. Differentiæ numeri seu rhythmī principes sunt
 duæ, pulsus boni rhythmī, & nullius rhythmī. Porro uo-
 catur pulsus nullius rhythmī, non qui nullum rhythmū
 obtinet, id enim fieri nō potuit, sed malo rhythmō præ-
 ditus, quemadmodum nullam habere uocem, nullam
 ceruicem eum dicimus, qui malam ceruicem malamq;
 uocem sortitus est. Cæterū pulsus cui nullus rhythmus
 adest, triplex differentia existit. Alius siquidem est para-
 rhythmus, mediocrem boni rhythmī peruersionem ob-
 tinens. Alius heterorhythmus, id est, alterius rhythmī, q
 longius à bono recessit. Alius ecrhythmus, qui omnis
 no bonitatem rhythmī corrumpit. Veluti cum puerum
 significas, peculiaris quidem puerili ætati iuxta rhythmū
 pulsus eurhythmus appellatur: qui ad uigentem ætatē
 pertinet, heterorhythmus: qui nihil huius seruat, ecrhy-
 thmus dicitur. NONVM pulsuū genus est, qd
 in omnibus prædictis inuenitur iuxta æqualitatem &
 inæqualitatem generatum, quod uel in uno pulsu, uel
 in pluribus spectatur, systematicum quoque uocant. de
 quo prius tanquam manifestiore dicendū erit. Aequa-
 lis itaque pulsus est, qui ordine par est siue magnitudine
 siue robore, aut uelocitate, aut reliquorum aliquo, aut
 etiam omnibus. Inæqualis, qui ordine impar est. Si enim
 subsequentes uniuerſi pares magnitudine qualicunq; in

ciderint, eiusmodi pulsus æqualis uocatur. At si primus, secundus & tertius pares fuerint, quartus autem impar: talis nimirum ceu in magnitudine inæqualis dicitur. Huius generis sunt, & deficiens & coincidens. Non solum enim in uno, aut etiam pluribus magnis unus minor apparet, sed nonnunquam totus quoque motus omnino aboletur, & pulsus deficiens appellatur, sicut alter huic contrarius coincidens, cum expectata quiete in medio tanquam superuacaneus aliquis pulsus inciderit. Sin autem secundus primo paulo minor factus sit, tertius secundo & quartus tertio paritate, idque deinceps longius, illiusmodi pulsus myurizondas & myuros nuncupant, nomen à figuris, quæ in mucronem desinunt transferentes. Qui quidem perpetuo ex ipsis imminuuntur, ac nunquam decrescere cessant, in absolutam motus defectionem finiunt, ac uocamus ipsos myuros deficientes. Qui uero cessant, duplici continentur differentia. Nonnulli siquidem ipsorum in qua primum desierant paruitate, hanc perpetuo conseruant. Quidam uero augescunt rursus, uel in parem priori magnitudinem redeunt, uel ad minorem, uel ad maiorem, si myuri recurrentes dicuntur. Iam uero & in unius pulsus inæqualitate myuri pulsus fiunt, de quibus illis paulo post tractabitur. Huiusmodi sanè quædam est pulsuum inæqualitas, quæ systematica appellatur, atque uno in pulsu deprehenditur, uel in una arteriæ particula, uel in diuersis accidit. quemadmodum in motu, exempli gratia, in una quidem particula arteriæ inæqualitas dicitur, cum aliter inceperit, ac aliter desierit moueri circa unum digitum arteria, incipiens quidem citatior, desinens autem tardior, uel e contrario. Atque hoc triplici modo accidit, uel motus continue manet, uel intercudit, uel repetit, & ueluti bis percutit. Si igitur manens continuus & non intercisus, à celeritate ad tarditatem transferit, aut e contrario, impar citatus Græce ἀνισοταχὺς eiusmodi pulsus, & est & dicitur. Quod si quiete intercisus cætera uelocior appareat, caprifans

PAULI AEGINETÆ

appellatur, ex capra animante sumpta translatione, quæ
 saliendo sublimis in aere consistit, et secundum quendam
 motum inopinatum priore citatiorem molitur. Porro
 si ab eleuatione recurrerit & ante submissionem absolu-
 tam, secundo manum ferierit, dicrotus huiusmodi pul-
 sus appellatur, simile quippiam in incudibus fieri cernas
 licet, quippe mallei simulatq; semel per manum in ipsas
 illati percusserint, reulbrantes. Incudum renixu & secun-
 dum rursus, uel etiam tertium feriunt. Atqui non solum
 in motus tempore inæqualitas quæ uno ictu in eadēq;
 arteriæ particula accidit, potest fieri, uerum & illa quæ
 uirtutis robore constat: non aut ea, quæ distantiarum q̃-
 titate comprehenditur. Nullo. n. modo idem pulsus ea-
 dem in particula magnus, & paruus queat effici, neq; in
 alio genere, sed in diuersis particulis. porro in uariis ar-
 teriæ particulis unoq; ipulso duplex fit inæqualitas. nūc
 quidem cum motus manet continuus, & arteria iuxta
 quosdam digitos citius mouetur, iuxta quosdam uero
 tardius. nunc autem cum motus quoq; interciditur, ut
 nonnulli quidem digiti motum apprehendant, nonnul-
 li uero non. Ac iuxta eleuationis quantitatem in pluribus
 quidem particulis inæqualitas manifesta est. Ex quo ge-
 nere sunt myuri uno in ictu inclinantes, quos Græci uo-
 cant *ἐπενδυκός*, & *προπενδυκός*. Si namq; in digitis in-
 terioribus manus subincidit pulsus, curuatus inde iuxta
 rationem minuatur, ut exterius ad ægrotantis pollicem
 minima arteriæ pars appareat, myurus uocatur ad mu-
 ris caudæ similitudinem, uel meiurus quod caudæ mo-
 do imminuatur. At si iuxta medios digitos magnus in-
 cidens, curuatusq; utrobique minuatur, minor apparens,
 hunc Archigenes *πενδυκός* & quasi dicas Latine inclinan-
 tē, & *προπενδυκός* & appellauit, manifesto significare uo-
 lens eleuationis breuitatem cum extremorum utrorumq;
 ueluti inclinatione. Non enim ut abscessis protinus
 utrinq; partibus, sed ueluti inflexis in arcum contractus
 est, cum sit myurus magnitudine utrisq; in partibus. Ac

cum iuxta magnitudinem inæqualitatem partim maturius partim tardius assumpserit, tū fluctuantes, tum uermiculātes pulsus oriuntur. q̄ si eam q̄ in situ est receperint cōuulsorii & turbulenti, ut uocāt, cōstituuntur. exordiendū igitur est à fluctuosis, in q̄bus nō simul apparet in tali inæqualitate arteria oīs eleuari, sed pars illius alia primum, mox alia, dein alia, postremo quarta, ut motus cōtinuus maneat in modū undæ se eleuantū, ac non nulli undā in rectū tendentem obtinent qdā in obliquū inclinarūt, & alii in breui lōgitudinis distāria, altitudinē magnā habēt, alii cōtrā, aliq̄ latitudinē, aliq̄ angustia. Similiter ēt celeritate & robore inæquales sunt. Fluctuosus totus in paruitatē cessans, uermiculās appellat uermis gressui assimilatus. Quēadmodū uero fluctuosū pulsū minorē factū uermiculās excipit, ita uermiculante formicās, ubi motib⁹ multis abolitis in unū eundēq; perq̄ exiguū defierit. Vocatus hic quoq; est à formicæ aiantis similitudine, tū ob paruitatē, tū ob mot⁹ speciem. Est. n. formicās admodū exigu⁹, ut quo minor alius nō extet. Pari modo lāguidissimus oīum, creberrim⁹, nedū citatus, ut Archigenes existimauit. Huic cōfinis est Hecticus. quemadmodum enim febris, sic ēt pulsus Hecticus est, qui nullam magnam mutationem subit, sed perpetuo cōsimilis manet, trahitq; ut ab initio incepit, & nunquam soluitur, toto habitu in morbum conuerso. Porro cōuulsorii pulsus utrinq; ab extremis retrahere tendere, & conuellere uidentur, ceu chordæ cuiusdam tensæ sensum præbeant: at in turbulenti nihil tale reperitur. Sed maior in his eleuatio est, ut arteriæ particulæ quædam sursum ferantur, uno eodemque tempore, ac motum ipsarum spiculis rectissime assimilaueris: quę ualidius emissa celeriter feruntur conquassanda. Serratus pulsus est, cum alia pars arteriæ elata, alia minus, ob duritiem nimis ipsius esse uidetur. Cæterum pulsus hic etiam turbulenti quippiam possidet, ac citatus quidem est,

PAULI AEGINETÆ

creberq; nō semper aut magnus. Decimum genus pul-
 suum ex inæqualitate profectum commemoratis succe-
 dit, quod ordine, & inordinatione complectimur. Nam
 ordinatus & inordinatus inæquali in parem: iuxta cir-
 cuius rationem, & in imparē prorsus diuiso ex utraq; 5
 sectione originem trahunt. Ex circuituum paritate ordi-
 natus, ex absoluta uero imparitate inordinatus. Siquidē
 pulsus æqualis ex toto est etiam ordinatus, quia ordine
 parem ipsum dicebamus: inæqualis autem non omni-
 no inordinatus est. Si namq; paritatem corrumpat, circui-
 tum uero seruet aliquem, ut in eleuationis quantitate,
 uerbi gratia, si duo magni, & unus paruus sit: deinde rur-
 sus duo parui, et unus magnus, atq; sic deinceps, uoca-
 bitur inæqualis quidem, sed ordinatus. At si ad hoc pa-
 ritatem corrumpat, neque ordinem quempiam inæqua- 10
 litatis conseruet, præter inæqualitatem, & inordinatus
 talis est: similiter in aliis quoque generibus horum se ha-
 bet. Inordinatorum quidem, alii sunt ex toto inordina-
 ti, ne uel exiguum quendam circuitum cōseruantes, alii
 uero secundum circuitus ordinati, quatenus enim con- 15
 tinuam ordinationem non habent, inordinati uocabun-
 tur: quatenus autem diu circuitum quendam tuentur,
 secundum circuitus ordinati sunt. Exempli gratia, si con-
 tingat duos magnos fieri, duos item paruos, deinde tres
 magnos, & tres exiguos: quatuor magnos, & pares exi- 20
 guos, & econtrario tanquā reflectentes duos magnos,
 & duos exiguos: tres magnos, & totidem exiguos: &
 deinceps similiter. Scire uero conuenit, inter alios quidē
 contrarios singulos, quendam esse medium. Aequalis
 autem & inæqualis medium nullum: neque ordinati, 30
 neque inordinati: nisi uoles secundum circuitus ordina-
 tum medium dicere ordinati & inordinati. Cæterum
 aliorum omnium medii, secundum naturam sunt, præ-
 terquam uehementis & languidi, ut à nobis ostensum
 est. Inter hos autem æqualis solus secundum naturam 35
 est, reliqui præter naturam, inæqualis ordinatus et inor-
 dinatus.

LIBER SECVNDVS

41

dinatus. Hæc pulsuū genera uniuersa sunt, & generales
ipsoꝝ differētiæ. Nōnulli uero his ēt alia duo annu-
rarunt. Primum à situ arteriæ sumitur, quatenus sursum,
deorsum, dextrorsum, sinistrorsum deducta esse, uidea-
tur. Alterum quo maturius, aut tardius: ex quorum nu-
mero fluctuosos turbulentosq; pulsus esse diximus, ac
nos compendii gratia simplices solum differentias pro-
didimus. ex dictis autem si coniungamus has, facile erit
etiam compositas inuenire. Porro opportunum erit
deinceps, causas quoque pulsibus conuenientes expo-
nere, quas comitatur etiam prælagium ab ipsis desum-
ptum, ac initium à magnitudine capiemus, quoniā hæc
aliis est manifestior. Magnus igitur pulsus redditur, uel
propter usum urgentem, qui calor est in corde exupe-
rans, externæ appetens refrigerationis, & ueluti euentis
lationis, aut propter corporis subtilitatem, ut posterius
ostendetur. Porro augefcit calor, aut ex causis naturali-
bus, utpote ætate florida, aut puerili, aut simpliciter cali-
da, anni tempore, regione & temperamento calidiore.
Aut causis non naturalibus, ueluti aere qui nos ambit
calidiore, balneis calidis, exercitiis, cibis, uino, medica-
mentis calfacientibus. Aut causis naturæ contrariis, puta
intemperie calida, aut humorum putredine, aut ira, aut
similibus. Discernes uniuscuiusq; pulsus hoc discrimi-
ne, quòd causæ naturales magnitudinem ipsius faciunt
stabilem, & quæ difficulter mutari queat. Reliquæ uer-
o, ex facili mutabilem, ut etiam manu adhuc admota
frequenter aut certe paulopost subsidat. Iam uero pulsi-
bus, qui sane ob balineas calentes magni sunt, mollities
quoque accedit, quemadmodum iis, qui ob calidam &
præsertim cum siccitate intemperiem magni existunt,
durities. Exercitatis uero mediocriter, aut perfricatis,
nec duri, nec molles sunt, medio statu præditi. Pectoris
autem regio, multo calidior est, quod iam & iratis acci-
dit. Ex cibo autem magnis, aut uini usu, aut ira, præter
magnitudinem etiam uehementia inest. Qui uero oc-

PAV. ÆGIN.

F

PAULI AEGIN ETÆ

cultare iram student, aut aliud qd præter medici pmissio
 ne factū, uerbi gratia, medicamen calidū sumptū, eundē
 medicū simul atq; manū attingat, interrogatē celare uo
 lentes, iis præter magnitudinē manifesta quoq; obori
 tur inæqualitas. Ad hæc ægrotātis mores & cōsuetudo
 nō mediocriter ad pulsus dignotionē faciunt. Consuetu
 do qdē, si medicaminū appetens sit. mores, si opinionis
 eximendæ peritus & callidus sit. Ex humorū putredine
 magnus, ad magnitudinē adhuc submissionem magis
 citatā habet. Verū ad magnū pulsum efficiendū, nō solū
 usus abunde est, sed et uirtutis ministeriū desideratur, in
 strumētūq; cōmoderatio inter siccitatem & mollitiem.
 aucto igitur cordis calore pp quālibet causam ex cōme
 moratis, primum qdē magnus pulsus efficitur: ubi uero
 magnitudo usui non suffecerit, statim et celeritas ipsi ac
 cedit. At si ne sic qdem satis fuerit, mox frequentia assu
 mit, parui aut, tardi & rari pulsus, itidem à cōtrariis fiunt.
 Sed quādocunq; à magno citato & crebro ad contras
 rios sit mutatio, usu nimirū postulante, nō amplius id qd
 in pulsu primum est, id et primū cessat, uerum quod po
 stea acquisiuit, id primū abiicit, statim quidem rarus euas
 dens, deinde tardus, postea quoq; exiguus. Sin aut tardi
 tas paruitasq; accreuerit, rursus raritas in crebritudinem
 transmutatur, ut p eam utcunq; usui fiat abunde. Hæ igi
 tur magnitudinis, celeritatis, frequentia, & contrariorum
 ipsis pulsum causæ habentur. At iungetur ipsis ea quo
 que pulsus conuersio, quæ una solum distantia constat.
 Itaq; latitudo sola augetur, dum humiditas potissimū,
 uel secundum naturam, uel etiam ab exterioribus cau
 sis redundat, quemadmodum altitudo dum uirtus ob
 instrumenti mollitiem simul augetur, longitudo à siccit
 ate, & carniū circumpositarum emaciatio palam inno
 tescit, reliquis distantis collapsis. Non enim arteria lon
 gior, q̄ postulat natura, fieri potest, ac proprie magis pul
 sum huiusmodi gracilem appellaueris, quemadmodū
 ipsi contrarium secundum latitudinem solam, & profun

ditatem adauctum, amplum. Contrariis autem horum affectibus pulsus nonnunquam incidit, & in aliqua, aut aliquibus distantis prohibetur humilis, aut arctus aut brevis, cum talis non sit, sed ob pinguedinis cuiusdam aut carniū, aut membranarum oppositarum crassitiē apparens. Interim etiam totus paruus uidetur, cum res uera paruus non sit, & obscurus & languidus similiter.

Quid opus est uerbis? sæpe absoluta pulsus defectio quibusdam esse putatur in omnibus arteriis, cum uere non sit, & maxime iis qui negligentius ipsum tangunt, uerum motus ob carniū copiam delitescat, reuera languidus. non enim extrema pulsus defectio homini potest accidere, quoad uita fruatur. quemadmodum igitur e contrario in locis ex carnibus, etiam parui pulsus, magni esse uidentur, corpore scilicet uehementer emaciato, arteria spinam perreptans, sæpe tangentibus abdomen, motum representat, ac nonnulli etiam ex his, quæ prius in artubus non erant conspiciue. Quamobrem omnibus causis diligenter attendendum censeo, ne dignotio ipsorum nos lateat. Pulsus autem uehemens uirtutis robore efficitur, si nulla ex causis reliquis renitatur, utpote usus dissolutus, aut instrumenti durities. Languidus autem pulsus, imbecillæ uirtutis & solius soboles est, aliud licet nullum adfuerit. Siquidem uehemens omnibus causis ad sui generationem indiget, languidum etiam sola imbecillitas efficit.

Qui igitur per initia uehemens est, ætates, anni tempora, regiones, & temperamenta moderata comitatur, languidus immoderata. Porro qui à languore in uehementiam incidit, uirtute uindicta ab imbecillitate prius occupante efficitur. Vindicatur uero, aut ex his quæ in ipso corpore continentur, ueluti humorum concoctione, uel excretionē, uel ira: aut ab exterioribus, nempe uino, cibo, exercitiis, ac aliis quæ intemperiem adiuuant. Vires dissoluunt, inedia, uigiliæ, uacuatio nes immodicæ, tristitia, curæ & dolores, maxime

PAULI AEGINETÆ

animæ defectionem inferentes, ac id genus quæ interm
periem faciunt. Quidam uero ex rudibus ac inexercit
tatis, durum pulsum uehemẽtem esse putauerunt, quod
discrimen exercitatum, tum ratione, tum tactu, nunquã
latuerit. Nam uehemens magna ex parte cum magnitu
dine in sublimitatem attollitur, tactum ualide percutiẽs:
durus magnitudinem non recipit propter arteriæ con
tumaciam. fit igitur durus, ob instrumenti duritiem, quã
refrigeratio immodica, aut siccitas, aut tensio ab inflam
matione profecta, aut conuulsio generat. Statim uero
duritiem etiam paruitas, & celeritas nõnunquam, & fre
quẽtia magnitudinis loco propter usum sequitur. Mol
lis pulsus, arteriæ humiditatis comes est, quam humidi
rem reddunt ex iis quæ secundum naturam sunt, hume
ctiores, cibi, balnea frequentia, somnus multus, uictus, ra
tio & copiosior & delectabilis. ex his quæ præter natu
ram sunt, sopores, lethargi, aquæ subter cutem, & reli
qua pituitæ uitia. Plenus pulsus, aut humorum copiam
aut ciborum, aut uini potionis abundantiã indicat, quẽ
admodum uacuuus contraria, aut enim inedia, aut ua
cuationem. Vbi calidius arteriæ corpus occurrit, multã
in corde caliditatem, reliquo corpore refrigerante, aut
conuulsoriam quampiam arteriarum uiolento motu in
calescentium, dispositionem fatetur. Archigenes uero
tradit arteriæ locum proprie in catochis calidiore de
prehendi, quemadmodum in iis, qui grauem animi in
somnia delationẽ patiuntur. At rhythmus, de quo dispu
tatũ est, si par sit motu & quiete, p̄bã totius corporis tẽ
perie præ se fert, quantũ ad se p̄tinet, uel nõ magnam à
bona declinationem, sicut in ætate puerili, & corporis
bus alioquin tẽperatis. Ac si lōgius quietis tẽpus fuerit
eo quo motus peragitur, calorẽ præpollere notat, quẽ
admodũ in ætate florentibus, & his proximis, ueluti in
corporibus sensilibus æquabiliter frigidis, diuturnius
motionis tẽpus est q̄ quietis. Notare aut oportet rhy
thmi inæqualitatẽ mensurã esse motus q̄ celeritate &

frequentia cōsistit hanc aut ueluti materiæ rationem & rhythmū obtinere. Iam uero deficientes, coincidētesq; pulsus fiunt, uiribus oppressis, & ueluti aggrauatis, sed coincidētes minorē offēsam, deficientes maiorē significānt, ac in uniuersum uirtus oppressa grauataq; pulsus mutat ad inæqualitatem inordinationemq; tum aliam quālibet, tū eam q̄ uehementia & magnitudine constat. Ac ex myuris pulsibus genere duplicibus demonstratis (uel enim in systematica, ut uocant, inæqualitate, uel in ea quæ uno fit ictu, deprehenduntur) deficientes quidē extremā uirtutis internicionē notant, repetentes aut recurrentesq; & ipsi quidē imbecillē, sed repugnantē adhuc resistantemq; & reuentē indicant. in uno aut ictu myuri & inclinantes, quos ἐμνευτικοὶ τὰς uel πρὸς ἐμνευτικοὶ τὰς appellamus, maxime iis fiunt, qui paulatim cōtabuerunt, itē inflammationibus nō solutis, prætereaplurimis quomocunq; tabescentibus, dum partes q̄ circa artērias habentur, emarcescunt. Porro inæqualiter citati & caprisantes, febriles potissimum calores comitantur: uerū si pulsus eleuationis principia dissoluens, extremum ipsius acceleret, & submisionis initiū, putredinem exuperantē notat, natura fuliginosis recrementis excernendis incūbente. Sin aut econtrario submisionis initium dissoluerit, ad eleuationem uero magis instet, calorem præpollere scias, q̄ refrigerationē desideret. Comitatur hæc in febrī et crebritudo plurima ex parte, interdū magnitudo quoq; nisi uirtutē instrumenti duritia impediat. Cum aut hæc in arteria intenditur, & uirtus nō sit inuasa, pulsus fit q̄ à bis feriendo dicrotus appellatur. Porro fluctuosus humidiores potissimū affectus sequitur, atq; que his magis aquæ subter cutem genus, qd̄ Anasarca uocant, itē lethargos, & peripneumoniam. At cū uirtus dissolui inceperit, sed paululū adhuc resistat, fluctuosus in uermiculantē decidit: ubi extreme collapsa fuerit, et hunc formicans excipit. Hecticus aut pprie contabescētes & alioqui emarcescentes sequitur. Conuulsorius fit,

F i li

PAULI AEGINETÆ

quum neruorum origo inflammata quadam affectio-
ne conflictatur, sicut in phreniticis, & acuta epilepsia cor-
reptis, quando etiam moriuntur adhuc calētes: qui hoc
uitio sunt occupati, contrario his modo quos syncope
inuadit, illi nanq̃ uehementer etiā frigidi, adhuc uiuunt.
Turbulentus autem pulsus efficitur, cum usus magnam
eleuationem requirit, ac uitale robur eam potest creare
solum uero arteriæ corpus præ duritie, in magnam at-
toli diastolen, ut in magnis inflammationibus, obstruc-
tionibusq̃ diuturnis, impotens refragatur. Pulsus serra-
tus in totum index est inflammationis, & præsertim par-
tium quarundam neruolarum: quinetiam pleuritidi pes-
culiaris est: remittens quidem, mollis & ex facili conco-
quendæ: intensus autem difficilis, & concoctu peruias-
cis: quæ cum imbecilla quidem uirtute, subito in peri-
culum præcipitat: cum ualida, longo tempore conco-
quetur. Vel enim in uomicam transit subinde, uel mar-
cida tabes ipsam exceperit. Iam uero sciendum uenit, inor-
dinationem comitari inæqualitates, raro siquidem inue-
nire est inæqualem pulsum, ordinatum. Minores offensæ,
inæquales pulsus & ordinatos: maiores, inæquales et
inordinatos procreant. Hæ igitur simplices pulsum
causæ sunt & præsagia. Ex his etiam compositas, ut in
sermone de differentiis ipsorum dicebamus, haud ne-
gotiosum est inuenire.

DE DEIECTIONIBVS.

Cap. XII.

Aluus optima est, mollis, cohærens & eodem
tempore quo in secūda uale tudine assueuit, red-
dita. Talis nimirum est, quæ in rufum elangue-
scit, simul & conuenienter spissa, non nimis foetida: quæ
talis non est, mala censetur. Quæ igitur colore similis
cibo ingesto cernitur tenuis, nō liquida, & celeriter des-
cendens, cruda est. Rufa & intēperata initio qdē bilio-
siorē morbu indicabit: sin aut in declinatione talis excer-
natur, corpus probe expurgari denuntiat, uiridis ærugis

notæ bilis nota est, nigra, uel atræ bilis, uel sanguinis cuiusdā indidem adusti, liuida, refrigerescere quodāmodo, & emori penitus interiora significat. oleosa, pinguisq; corporis pinguitudinem cōsumi innuit: quæ admodum
 5 eadē uiscosa, pingui cū sit deterior, animantis particulas rū tabē præ se fert. Nimis foetida haud exiguum fateor putrefactionē. Porro in omnibus hisce, si alius cibo assumpto qualitate nō respondeat, eodē modo iam dispositio quoq; considerabitur. Omniū deterrima & pestifera, erit nigra, liuida, oleosa, celeriter transiens.

DE VRINARVM NOTIS.

Cap. XIII.

Quemadmodum in deiectionibus, ita in urinis quoq; regula, quæ sanos arguit, usi, ægrorū notas exequemur. Vrina igitur præstantissima est,
 15 quæ sanis simillima. Talis nimirum est subrufa simul & subflaua statim uero hæc & crasitiem moderatam habet. At cum triplex turbidarum urinarum sit differētia, (uel enim redditæ tales, paulo post subsidunt, uel confusiles perpetuo manent: uel puræ excernuntur, deinde uero turbantur) uitiōsa quidem existit tertia ordine dicta, proba uero benigna; prima: medio utriusq; confusit secunda, summe cruda est, adamsim diluta, ueluti desperatæ concoctionis uenosi generis accidens. Quā
 20 do autem celeriter descenderit diabtees, ut Græci appellant, efficitur. Verum hæc inter urinas crudas deterrima est, succedit ipsis, tenuis admodum & aquæ modo exalbida. His uicina est alia urina, quæ multis in morbis apparet: ut uideatur mixtam habere speciem uini tenuis & albi. Suppallida uero hanc sequitur: quæ pallida quidem modo erit, & subrufa, concoquitur autē iā
 30 quantum ad colorem ipsius attinet. Tantum uero crasitie ipsam à diluta recessisse oportet, si probe concoqui debeat, quantum etiam colore. Quo secundum naturam adamsim seruato, si subsidens albū, leue, æquale, & copiosum reddit, exactæ nimirum cōcoctionis nota

F iiii

PAULI AEGINETAE

fuerit: plus aut crudi humoris expurgari signat. Non tamen si crassa modice fuerit, habeatq; subsidēs aliquod exiguum, non cōcocta iam ex toto erit. Si enim subsidētia parti farinae crassiori, aut laminis similia, aut fursuri, aut nigra, aut liuida, aut uiridia, aut foedi odoris habeat, prāter q; quāuis huiusmodi in cruditate est, et mortis periculum ostendit. Porro boni coloris urina, quæq; simul uel subsidētia alba, leuia, & æqualia repræsentet, uel nebulas quasdam similes, uel suspensa, oīum urinarū est laudatissima. & præcipue, si quod in eis desidet, tale extiterit. Deinde cōmendatur cuius suspensa huiusmodi cernuntur. Tertium bonitatis locum habet, cuius nebulæ tales apparent. Ac, ut uno uerbo expediam, quæ urinis probe innatant, quanto inferius subsiderunt, tanto magis laudantur.

DE SPVTI NOTIS. Cap. XIII.

Sputum subflauum, subrufum, leniter spumans, & tenue, solam cruditatem, malum uero nullū insignius denuntiat. At syncere flauum, rufum, spumosum, uiride, glutinosum, rotundum, atque his adhuc magis nigrum, prauum est. Etenim præter sanguinem, alterius humoris cuiuscunq; intemperati prauā ostendit dispositionem, caloris inflammati sobolem. Cruenta igitur sputa mediocria sunt, flauæ aut nigræ bilis, difficilia. Cæterum quomodo ipsa edantur, inspicere simul expedit. Nam si prompte excreentur, liquido constat talia quædam esse salubria, contraria uero periculum testari. Absolutam itaque concoctionem fatetur sputum leue, album, æquale: consistentia neque liquidum neque crassum. Summæ uero cruditatis nota est, si nequicquā expuitur. At si non atrum, sed tenue sputum fuerit, languidæ concoctionis argumentum est. Sin autem syncere rufum prodierit, aut flauum, nihil boni pollicetur. Si liuidum, aut eruginosum, aut atrum, summam perniciem portendit.

LIBER SECVNDVS 45
DE FEBRIBVS DIARIIS DI

gnosendis curandisq; Cap. XV

- D** iarias febres, urinarum in primo die concoctio
calorisq; suauitas ceti propria ipsarum & inse
parabiles notæ testantur. Verum à prima febris
um solutione, certiorum habiturus es earum cognitio
nem. Quippe articularum in hac motus ei qui in secun
da ualitudine fuit, ex toto respondet, cum nulla ex aliis
febris in naturalem statum reuertatur, iam uero qd fa
cile morbum fert æger, maximum & id indicium est.
Opportuni sunt, id genus febribus, in quorum corpore
quod transpirat, halituosum non est, sed mordax & acre
fumo fuliginive non absimile. Hi autem sunt calidi & sic
ci-temperamento: breuiter biliosi, quos *πικροχολαί* Græ
ci uocant, qui igitur ob lassitudinem febricitarunt, pin
guiter simul ac molliter fricandi sunt, in balneumq; du
cendi. Quibus siccitas febrem intulit, fricandi hi quidē
minus, sed lauandi sunt liberalius. Quos curæ, mæro
res, uigiliæ & ira exercuerunt: lauare quidem non subin
de oportet, uerum oleo copiosiore tepido, cui minima
astringens uis insit, tum paululum fricare, tum ex consue
tutine lauare conuenit. Ab insolatu uisti, protinus ab ini
tio refrigerationem desiderant, tum crebriorem lauatio
nem: minime uero aut oleum largum, aut crebram fric
tionem. Sint autem quæ refrigerent & rosaceum & om
phacinum, quod nihil in se salis habeat: eadem uero sin
cipiti uehementer superfundere oportet: & ubi febris in
clinauerit, in balneum æger ducendus est. Siquis ex fri
goris iniuria febrem concipit, etiam is in remissione la
uandus est. At si cum grauedine & destillatione febricitat,
priusquam hæ concoquantur, lauatiōni non committe
tur. Porro qui æstus iniuriis patuerunt, ii, uel cum hæ
adsunt, commode lauantur. Post lauacrum uero caput
perfundendum est: eorum quidem qui ex uisione febr
citarunt, refrigerantibus: qui autem ex frigore, calefacien
tibus mediocriter, cuiusmodi irinum est, & nardinum

PAULI AEGINETAE

unguentum. Verum in quibus meatuum constipatio fe-
brem excitat, his conuenit ex aqua dulci, & temperata la-
uatio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modi-
cæ, uictusq; dulcibus procreandis succis idoneus. At
cui propter inediam febris contracta fuerit, ei opus est
statim, ubi prima accessio remiserit, in balneum perdu-
ci, & tepente oleo largissime perfundi, tum molli manu
perfricari, lente in calidi solii aqua immorari. Simulatq;
exierit, ac sese recollegerit, denuo balneum ingredi, po-
stea aquam calidam potare, mox prisanæ cremorē, de-
inde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum qui
molli sunt carne, ex albo iure. Omnium uero commu-
nis esto uictus species, quæ & boni sit succi, & concoctu
facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhære-
at. Vinum propinetur & aspectu, & uiribus aquosum.
Oportet autem in primo febrium insultu nonnunquam
primæ accessionis horum aliqua mutare, in quibus cor-
poris intemperies ad calidius, sicciusq; transiens, febres
accendit. Qui ex inguinum inflammatione febrem con-
ceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit fa-
ciendum, sed ulceri, quod in inguinibus, excitatum est,
prospicientes, lauant, ubi accessio declinauerit. Cæterū
a uino ipsi sunt arcendi, priusquam inflammationes in
guinum fuerint solutæ, & tenuiore uictu enutriendi.

DE PUTRIDARVM FEBRI- um agnitione. Cap. XVI.

Putridæ febres dignoscuntur his notis: nulla ipsas
exterior causa præcedit: neq; a rigore incipiunt,
neq; æstu, neq; frigore uehementi: quod & ipsum
est peculiare febrium putridarum indicium, sicut & pul-
suum depressio. Nominant sic, cum incipiente accessio-
ne perexiguos quidem ipsos & inæquales obtinent: ut
qui singulariter illiusmodi febribus sint peculiare. iam
& caloris qualitas maxima putridarum febrium nota
est, qui fuliginosus adeo existit, ut manum erodat. Simi-

liter ad ipsas proprie spectat etiam urinarum cruditas, et obscura concoctio. Magnum uero & notabile concoctionis indicium, in primis urinis nunquam eiusmodi febres repræsentant.

CVRATIO FEBRIVM PV
tridarum. Cap. XVII.

- S**I uires sint ualidæ ei qui ex putredine febricitat, sanguinem dimittes protinus, modo cruditas uentriculi non infestat. At si uires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes, a cuius uacuatione putrida per urinas, aluum & sudores expurgare conuenit. Sin autem sponte sua nonnunquam impetum ad os uentriculi capestant, etiam per uomitum: alioqui non oportet ea præter naturam irritare: uerum de ilgi materiæ debent, quæ sine calefaciendo siccandoq; ualenter, prædictas uacuationes moliri possunt, ueluti ptisanæ cremor, aqua mulsa, oxymeli, & apomeli, apiiq; radix in aqua potabili incocta. Cum aluus nihil deicit, ex aqua mulsa cum oleo clystere ducenda est, uerum totum corpus rarefacere prius non expedit, quæ uacuatum fuerit: ubi uacuaueris, rarefacias utique licet, oleo tepide calido, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore uinum aquosum potui datum, uniuerfas promouet uacuationes: eiusdem facultatis est temperatum dulcis aquæ lauacrum. Quod si uero febris magnitudo obstiterit, neque uino utendum, neque lauacro, neque uinationibus rarefaciendi uirtute præditis, sed aqua frigida his in febribus commode bibitur, nisi quid & hanc prohibeat. Ergo si quidem & uires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa plane euidencia, frigidam cum fiducia exhibebis. Præterea si bona corporis habitudine sit æger, tum status coeli calidus ac siccus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haudquaquam læsetur. † Graeci habet uas lidæ. in stauratū ex Galeo no.
- 35 detur: sin autem mediocris existat febris, & uires inualidæ, sed cum notis concoctionis, iis qui ita se

habent balneum prodest, & uini potio. Tū uero ex uisionibus eæ quæ rarefaciunt.

DE TERTIANARVM AGNITIONE. Cap. XVIII.

Tertiana febris cum sit flauæ bilis commotæ soboles, protinus ab initio rigorem, hoc est totius corporis concussionem haud exiguā infert. hoc discrimine à quartanæ rigore uariat, quod pungere uideatur & cutem conuulnere. In quartanis autem, accessionis insultus uehementem perfrictionem habet. Quotidianas nequaquam rigor præcedit: sed membra solum perfrigescunt. Ceterum tertiana etiam exactum pulsuum ordinem obtinet. siti uero uehementi in statu affligit, & hominem perurit, ac paulo post consistit, calorq; æquabiliter per omnes corporis partes diffunditur, nihiloq; magis pectus q̄ extrema calent. Et si manū iniicis, primo quidem contactu, calor copiosus & acris occurrit ueluti cum uapore quodam erumpēs, sed paulo post à manu remanente uincitur. Vbi potione æger fuerit recreatus, statim copia uaporis calidi per cutem emergit, sudorum nuntia. Bilis uomitio superuenit, aut aluus soluitur, perq; urinam biliosa redduntur. Præterea ad integritatem tertiana definit, ubi accessionis tempus, horarum non plurium duodecim expedierit. Febrem igitur quæ intra duodecim horas terminatur, exactam tertianam nominamus: quæ uero diuturniorem accessionem habuerit, illam simplici uocabulo tertianam nūcupamus. quæcunque autem longissime productā accessionem seruauerit, exiguum uero interuallum, hanc rursus extensam tertianam dicimus.

CVRATIO TERTIANÆ. Ca. XIX.

Exquisitam tertianam, ut quā flaua bilis procreet, humectare oportet ac refrigerare. & sane quod in uentriculum confluit, uomitionibus, quod ad inferiora uergit, alui deiectionibus elicere. Item per urinas & sudores uacuare idipsum conuenit. Aluus itaque

5 mollibus clysteris euocatur:urina potionibus, in quibus
 apium & anhetum maduerunt. simulatque coctionis signa
 10 deprehenderis, magna iam confidentia etiam absinthii
 dederis. Balnea uero *ex aqua calida potulenta conue-
 niunt: quibus neque nitrum, neque sal, neque sinapi adiu-
 ci, sed oleo quam maxime calido infuso ægrum oportet
 15 in aquam descendere. At qui balneis admodum gau-
 dent, eos etiam si bis die laueris, haud peccabis. Vbi ue-
 ro concoctionis notas perceperis, tunc, uel si sæpius la-
 ueris, nihil offendes. Porro uinum priusquam morbus
 concoquatur, ex toto circuncidendum est. simulatque
 20 concoqui inceperit, tenue, aquosum, modicum, primo
 die exhibendum. Cibi humectantes refrigerantesque; uti-
 liter assumuntur. A melle abstinendum, sinapi, salis & a-
 25 cribus omnibus, uinis autem admodum uetustis, & na-
 tura calidis. Cæterum nihil miri est, si in hominibus pri-
 mum exercitis, in ediamque expertis, nunc autem ordine
 conuerso otiosis ciboque; usis plenior, bilis maxima ex
 30 parte mixta pituita reperitur. Cuius rei gratia complu-
 res tertianæ, aut citra totius corporis concussionem fi-
 unt: aut perexigua ipsis oboritur, unde etiam animaduer-
 sionem propriam desiderant. Neque enim balneum, ne-
 que cibus aliquis liberalior tertianis spuris ante conco-
 35 ctionem conuenit: quoniam ne panis quidem micæ, o-
 ua, & consimilia.

CURATIO TERTIANÆ

notæ.

Cap.

XX.

30 **L** Auare in tertianis spuris per initia salubre non est,
 sed quando iam concoctionis notæ apparent: ne-
 que cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus
 abunde est. Quies autem, & præcordiorum fatus ipsis
 35 conducit, tum sorbitiones concoctu faciles, & clysteres
 aluo inditi non admodum molles. Atque si sanguinem
 detrahare opus est, neque hoc omittere oportet. Tota
 uero uictus ratio erit, non quæ refrigeret uniuersum cor-
 pus, humectetque; uerum etiam modus aliquis qui magis

*Oribasius. Balneum
 in aqua
 dulci &
 fluuiali
 calida.

PAULI ÆGINETÆ

incidat, ac calefaciat, adhibeatur. Maxime uero condu-
 xerit ipsis ptisanæ cremor pipere iniecto, uel hyssopum
 quoque nonnunquam, uel origanum, uel spica nardi, a-
 quæ mulsæ admixta incoctaq; potui exhibetur, & alia,
 quæ urinæ ciendæ sunt, præterquam ea, quæ uehemen-
 ter calefaciunt, exiccantq;. Maxime uero absinthii coma-
 post septimum diem continue porrigitur. Iam & oxy-
 mel epotum, multis fuit auxilio, ad hæc nonnulla ex his
 quæ molliter uentrem subducunt. Porro uomitus secun-
 dum cibum, is quibus hæc febris in uetustatem incidit,
 utilisimus est.

QVARTANARVM CO-

gnitio. Cap. XXI.

Quartana inuadit multa cum perfriktione, ut q̄
 ex frigido humore, atra bile originem trahat.
 Calorem uero feruoremq; febrilem tertianæ
 modo non obtinet, imo nec bilis uomitus eam comita-
 tur. Adhæc si urinæ tenues, albæ, & dilutæ fuerint, quar-
 tana erit febris. Eximia uero ipsius nota est, pulsus exi-
 guus, & rarus. Cæterum in autumnno potissimum incipit
 erraticis superueniens febribus, ac nonnunquam in for-
 ma eius potissimum subsistit quæ quarto die reuertitur:
 aliquando etiam plurium dierum interuallo, iuxta quos-
 dam circuitus accessionem habet.

CVRATIO QVARTANA-

rum. Cap. XXII.

Quartana laborantes leniter tractandi sunt, neq;
 medicamento ullo forti sollicitandi, neq; uacua-
 tione, nisi forte sanguis uehementer exuperare
 uideatur, cum uenam dissecare conuenit. Victus eis os-
 feretur optimus, q̄ non inflat, & uenter his qbus uti con-
 suevit, emolliri debet. Quod si hæc nihil proficiant, ely-
 steribus per initia mollibus, deinde acribus utendum est.
 A suilla carne prohibeantur ægri, atq; ab omnibus cibis
 qui glutinosi, ad exitum tardi sunt, tum qui refrigerant
 corpus humectantq;. Vinum utile est tenue, album &

modice calidum. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum tri-
 duo assumptum medicamentum diatrion pipereon, id
 est, quod triplici constat pipere, uel quod diospoliticon
 appellant. Iam & piper solum recte ex aqua quotidie
 sumitur. In morbi statu uictus egro tenuissimus præci-
 pietur, statim uero etiam ut diu conquiescat, iniungen-
 dum est, tum uisceribus prospiciendum per ea quæ eo
 molliunt, relaxantq; . Insecutis diebus medicamenta cō-
 ferunt, quæ urinam cient, atq; si concoctionis notæ ap-
 paruerint, cum fidutia tunc quoque iis uti expedit, quæ
 atros humores uacuant, idq; non semel duntaxat, uerū
 etiam sæpius. Porro secundum ualidam purgationem,
 & medicamentum quod uiperis constat, exhibetur, &
 alia quæ ad eiusmodi febres commendantur, inter quæ
 est & nobis familiare, omnium probatissimum, qd succo
 cum cyrenaicum recipit.

QVOTIDIANA Æ AGNITIO. Ca. XXIII.

Quotidiana haudquaquam cum rigore primo
 statim die inuadit, sed temporis spatio perfrictio
 magis q̄ rigor oritur. Ægre uero incalescit, &
 diurnum habet incrementū, non tamen adurit ægros,
 neq; multum, & crebro spirare compellit, ac ueluti flam-
 mam ex ore elidere, uel frigidam bibere. pituitosi autē
 uomitus hic accidunt, & quæ aluum uacuantur, frigidiō
 ra, crudiora, dilutiora† & pituitosiora cernuntur: totum
 corpus crudis humoribus redundat: sudores minime
 primis diebus erumpunt, neq; ad integritatem uenitur,
 cutis ægrotantibus albecat, urinæ uel tenues sunt & ex
 albidæ, uel crassæ, turbidæ & rubræ.

† Galenus
addit.

CURATIO QVOTIDIANÆ. Cap. XXIII.

Quotidianā curantes, oxymelite primis diebus
 utimur, tum iis quæ urinam probe eliciunt, ac
 uniuersa uictus species incisoria esto, circa sta-
 tum uero uentris habenda est ratio, præsertim ip-
 sius orificii, deinde ægris iubendum est, ut a radícula,

PAULI AEGINETÆ

& cibis assumptis uomant. Itidem utantur iis quæ pituitam subducunt, idque tam diu, quam febris cessauerit.

DE HEPIALO FEBRI ET

rigore, quæ nullo calore possunt euinci. Cup. XXV.

† Exēplar
inuulga-
tū ꝑ ꝑꝑ
male pro
ꝑꝑ ꝑꝑ ha-
bet.

S I uitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, nondum putrefacta toto in corpore exundauerit, inexpugnabiles, & qui nullo euinci calore possunt, rigores, sine febre excitat. In febribus enim quæ humoris uitio accenduntur putrefactio maxime febrilem calorem suscitatur. At si tota hæc pituita putruerit, quod tamen raro fit ob immensam ꝑ putrefactionem quotidianæ febris causa redditur. Quando uero non tota æquariter, sed ex dimidio ipsius putrida fuerit, aut aliæ quæ ipsius partes, nonnullæ uero non putruerint, Hepialum febrem hanc facit: in qua simul & rigor & febris caliditas est. Particulæ quidam humoris eius necdum putredinem expertæ, omnibus uenis, uel etiam reliquo corpori communicatæ & sparsæ rigorem creant: putrefactæ uero febrem accedunt. Dicta est autem Hepialos per translationem à sale: dico autem mari, quod à principio tranquillum apparet, cum turbatur difficillimum euadit. Vel ab Hepios, quod est molliter & alexanin, quod signat calefacere, quasi dracas, quoniam blande & leniter calefacit. Atque hæc febris cum ex quotidianarum genere existat utpote ex pituita nascens, illarum curationi subiicitur speciali, nisi quod tanto commemorata quotidiana calidioribus magisq; incidentibus præsidii indiget, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali uero rigor multo magis calefacientia requirit. Itaque medicamentum ex triplici confectum pipere: ex calamin & the, præterea & quod liquore cyrenaico constat, his sunt accommodata. Item ex castoreo, similibusq; præparata remedia conueniunt. Latius autem diffusiusq; explicatam curationem horum reperiens in capite XLV, de perfrictione

perfrictione. Insuper Lypyriz & Tiphodes, quæq; præter commemoratas febres dicuntur, cum sint ex relatarum numero, etiam curationes, tum in illis expositas, tū exponendas postulant.

5 DE FEBRIBVS CONTINENTIBVS. Cap. XXVI.

10 **C**ontinentes finitimæ sunt, singulis intermittentibus: tertianæ quidem exactæ ardens, quæ causos dicitur: quotidianæ, ea quæ singulis diebus accessionem habet, non autem ad integritatem definit. Sic et quartanæ ea quæ quarto die accedit. Exactus namq; causos, cum omnes alias exactæ tertianæ notas seruet, hoc solo discrimine uariat, quod non cum totius corporis concussione, p^rios appellatur, inuadat, neq; ad integritatem ueniat. Qui singulis diebus accessionem obtinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præ se fert, quod autem ad integritatem non peruenit, hac re à quotidiana specie consimili differt: ea ratione & quæ 20 quarto quoq; die accessionem habet, uerum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Continens itaq; febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur, q̄ ex toto fuerit soluta, etsi inclinatio aliqua sensibilis appareat. Quum autem nulla accidit, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardētium genere habetur, sed acrimonia ab ipsis uariat.

AGNITIO FEBRIVM CONTINENTIVM, & curatio. Cap. XXVII.

30 **C**ontinentium febrivm origo ex sanguine est, q̄ nunc efferuescens, tantum nunc putrefactus obstruitur. Quapropter accessio ipsis ad usq; finē una est. Indicia uero sunt, pulsus maximi, uehementes, citati, crebri, æquabiles, non mordaces. Vrinæ nō multū adeo à sanis recedunt. Curatio est, sanguinis quousq; deficiat anima, dimissio. Qui si non fuerit detractus, febricitantes in summum ueniunt discrimen. At si quid p 35 uenæ sectionem uacuare prohibuerit, aliis uti remediis

PAV. ÆGIN,

G

PA LI ÆGINETÆ

oportet, quæ meatus recludunt, copiam materiæ uacuant, & febrium feruorem leniunt. Cum aut euidētes humorū concoctionis notas in ipsis uideris, neq; in principio particula inflammatio quædam, aut tumor œdematis speciem repræsentans, aut scirrus fuerit, neq; particula aliqua tēperamento adeo frigido, ut in hanc noxa procumbat, cū fidutia frigidam propinato: maxime si æger eius potioni assueuerit.

ARDENTIVM AGNITIO.

Cap. XXVIII.

Ardentibus hæc superueniunt, arida lingua, crassa & nigra uentriculi rosio, deiectiones pallidæ, sitis uehemens, uigiliæ, nonnunquam etiam delirium.

ARDENTIVM CVRATIO.

Cap. XXIX.

Horum alterutrum fieri necessarium est, si perfectus morbus solui debet: aut biliosos excerni humores, aut eosdem extinguere. Excernuntur itaque per sudores, uomitiones, & imum uentrem. Extinguuntur autem frigida potu: quo nos ardentissimas febres, causos appellant, ex toto curauimus. Sustinere eos qui his cruciantur, non aqua sola conuenit: neq; mulsa duntaxat, uerum diluta mulsa exhibita. Nam qui huiusmodi morbis conflantur, sola potione sustentandi sunt. Porro balneum illis solum usui est, qui citra tumorem inflammationi, aut erysipelati consimilem, ardenti febre laborant. Quod si uero concoctionis notæ percipiuntur, multo magis ipsis conducet. Qui ex falso humore: febrim ardentem conceperunt, his est inutile. Verum iisdem ptisanæ etiam cremorem cibi loco offerre conuenit.

FERRIVM QVIBVS EX AFFE

fectu erysipelas reuerente origo est cui

ratio et agnitio. Cap. XXX.

Febres quæ ex affectu uiscerum erysipelas referēte procreantur, his notis agnosces. interna feruent immodice, dolor urget uehemens, præterea sitis excruciat, & æstus immoderatus. Summatim ex indicis acerrimæ bilis cum paucis sanguine putrescentis deprehendēs. Hunc in modum curabitur: A balneo in totum abstinere decet. Aqua frigida per morbi statum uehementi, hoc est frigidissima utendum est: per initia non item. Extrinsicis uero refrigerantia imponuntur.

Et si nihil hæc promouerint, etiam intro sumere cogen-
tur. Maxime ipsis conueniunt lactucæ, & quæ parem
his facultatem obtinent. à foris & ipse lactucæ succus
idoneus est, adeoq; intybi & semper uiui, & reliqua res
frigerandi uirtute prædita. sed præstantissimo parte plu-
rima utimur. Nam humorem refrigerantis alicuius ex-
pressum pilæ cum portulaca iniicimus, deinde contus-
sum exprimimus. cū usus exigit, modico polentæ mix-
to & in aqua frigida merso, partem refrigeramus. Lin-
teum uero duplicatum in ea intinctum extrinsecus, aut
ubi calor sentitur, præcordiis obtendimus, nō diu adhæ-
rere sinentes, uerum aliud frigidum eius loco applican-
tes. Iam uero & oleum omphacinum medicamini non
nunquam miscemus.

HECTICARVM FERRIVM

agnitio. Cap. XXXI.

Hectica febris non in humoribus, & spiritu solū, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc dolorem nescit, & qui ea detinentur, nequaquā febricitare se existimant: neque enim calorem percipi-
unt, cum uniuersæ ipsis particulæ æqualiter sint excalsa-
tæ. Duplex hecticarum febrium species est, prima ardē-
tibus magna ex parte superuenit, quæ prorogantur
adeo ut tempore corporis ipsius cordis madorem
absument, uel etiam si copiosus adhuc subsistat: alia
manente etiamnum humiditate cordis corpus occu-
pans, inde potissimum accenditur. Vnam sane ipsius

PAULI MAGINETÆ

Generationem prodidimus, reliqua est, cum statim ab initio inuadit, primam originem diariis similem, ex mœrore, ira, lassitudine maiore, una cum exustione sortita. Hæc igitur non difficulter cedit remediis. Quæ uero ex ipsis in marcorem qui Græcis dicitur *μαρμας* deuenit, omnem respuit curationem. Atque hæc sanè cognitu est facillima: oculi siquidem præter modum concaui testantur, & lemæ ipsis inhærescentes aridæ, tum dispositio quædam squalida, uiuidi ipsorum coloris flos emarcuit, frons sicca est & intenta. Quinetiâ conuiuent plurimum, hac occupati, quemadmodum dormituri entes, uerum affectio, somnus non est, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa sunt, & quid enim aliud præter ossa & cutem solam habent? Nam si denudatum uentrem inspexeris, neq; intestinum, neq; uiscus ullum superesse tibi uidebitur: præcordia sursum conuelluntur, & cutis ipsis extrema reficcata est, pulsus gracilis, creber & durus. Caliditas autem primo occurso languida, paulo post acris & rodens erumpit, quousq; igitur humiditatis aliquid reliquum est, hectica solum febris dicitur. Cū uero periclitatur, ne nihil amplius humoris superfit, absolutus iam marcor constituitur.

HECTICARVM FEBRIVM curatio. Cap. XXXII.

Hectica febre laborantes, statim ab initio nutriri desiderant, humorum rodentium gratia. Maximum uero remedium huius est, uictus humefans. Conuenit igitur q̄ maxime ptisanæ cremoris halicæq; sorbitionibus, & pane præterea adiecto ægrum nutritum, moderato frigida potu curare, si neque inflatio quædam, neq; humorum putrefactio subest, at si magnam inde offensam fore cōlecturaueris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autem impositis, quæ refrigerant auxiliis, uti. Balnea uero hoc morbo obnoxiiis, quolibet tempore sunt idonea.

LIBER SECVNDVS
DE SEMITERTIANIS.

Cap. XXXIII.

QVandoquidem tertiana cum rigore, quotidiana uero citra illum inuadit, quæ ambarum mixtura constat, horrorem inducit, qui minor quidam res est rigore, maior autem perfrictione. Quapropter cum horror æquali ab utrisque extremis interuallo, mediū amborum rigoris nimirum & frigoris occupet, quod cōtēperatis inuicem extremis accidit, non abs re nomen huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur: uel enim duæ accessiones in idem tempus cōcurrunt, uel statim ab initio ambæ inuicē iunguntur. Quādo igitur tertiana præpollet, magis horifica febris efficitur, & rigoris et nonnihil per accessione assumit. Protinus aut talis calidior est & ardentior, tum uomitionem quandam bilis, aut deiectionē, aut madorē adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidem summa exercent, pauci uero horrores: neque tamen sitis, neque ardor in his affligit. Cū pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana continua, insultus quidem accessions cum horrore accidit. At cum ex pituita proueniens febris præcelluerit, submisiones pulsū sunt, & horrores. Si uero calidior præualeat subito incalescunt. Talis sane est exacta semitertiana, ex æquivalente duarum febrium, puta tertianæ intermittentis & quotidianæ continuæ temperatura proficiscens. Non exquisita uero uel bilem largiorem, uel pituitam causatur, quæ iam magis etiam curationi renititur, cum paucus humor à copiosioris excellentia artisque auxilio expedite uinci possit. Si autem pituita sit superior, præsidii maxime utemur quæ in quotidiana exposuimus. Sin autem flaua bilis, iis quæ in tertiana cōprehensa sunt, in totum ei quod urget incumbentes, sed ita, ne alterum prorsus negligamus.

DE MORBIS PVBLICE GRAS
santibus, Cap. XXXIII.

G iii

PAULI AEGINETÆ

Pvblice grassantes communesq; morbos nominant, qui multis simul obueniunt, quorum ut generatio, sic etiam causa communis est. Cibi igitur communes prauī, illiusmodi morbos pariunt. Item communis aquæ uitiatæ potio, nimis laboriosa uitæ ratio, labores quibus quisq; assueuerat omīssi, inedia, repletio, idq; dum fames grassatur, aut fœcundus annorū prouentus est. Item regionum naturæ, communes subinde morbos intulerunt, quæ nōnunquam palustres aliquando barathrum uicinū habentes uaporem exitiosum prauūq; exhalant. *Hæc igitur continue acciderē consueuerunt. Aer uero nos ambiens, temperamētū corporum commutat, uel calidior impendit, uel frigidior, uel humidior euadens, siquidem in alias causas neque omnes simul incidimus, neque eis toto die immoramur. At quoniam aer qui omnibus circumfusus est, & per inspiratum attrahitur, ut animalium corpora pro temperamenti ipsius immutationibus afficiantur, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non solū morbos ex unoquoq; aeris statu futuros prælagiet, sed etiā ne fiant prohibebit, contrarium immoderatis circumflui aeris temperaturis uictum indicens. Itaq; corpora morbo alicui ex propria intemperie uicina, hæc à simili circumdantis nos aeris temperamento deprehenduntur. Quæ contrariam cœlo temperiem obtinent, præter nullam offensam experiuntur, etiam meliora sunt, dum repugnans aeris immoderatio tēperamenti immoderationem punit, ac qui hoc nouit, secundam ualitudinem tenebitur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerantia scilicet, nunc calida: aqua quidem super infusa refrigerans, itidem otio, ciborū inedia, & potu largiore: calefaciens autem, operimento, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parciore. Præterea pyre incendio haud mediocriter aerem ad calidum & siccum mutaueris, si tunc humidus fuerit, quo modo Acronem acragantinū factitalse ferunt.

*Oribasius hēt: Hæc ergo omnia q̄ diximus non frequēter solent euenire.

LIBER SECVNDVS. 52
DE PESTILENTIA EX COM
mentariis rufi. Cap. XXXV.

Pestilentia grauisima quæq; supueniunt: nihilq;
in hac sicut in aliis morbis singulis definitum. Etenim
delirium accidit, & bilis uomitio, præcordia intens
duntur, labores afficiunt, sudores largi erumpunt, extrema
algent, alui profluvia urgent biliosa, tenula & flatulenta,
urina cernuntur diluta, tenues, biliosæ, nigrae, mala hab
bent subsidencia, quæ superinnatant, pessima, nares sanguin
nem destillant, pectus ardet, lingua torrida est, siticulosa
tristitia oboritur, torquent uigiliae, convulsiones uiolenta,
aliaq; multa praua. At si quis pestem uentura prænosceret
ex malignorum anni temporum, & uitæ studiorum ad sanitatem
haud conducentium animaduersione, aliorumq; animalium
præcedente interitu, his apud se consideratis, & illud præ
terea ppendito cuiusmodi sit præsens anni tempus, quas
lisq; uniuersus annus. Inde siquidem qualis uictus ratio
esse debeat, optime deprehendes: utpote cum anni tempus,
si quidem rite ortum est, ex sicco humidum nunc euaserit, ne
cessum est uictus ratione deficcare, ut humor superfluus
absumatur. Cæterum uentris habenda est ratio. Quibus
superior uenterculus pituitam continet, uomitionibus
solicitare, quibus sanguis inundauerit, secare uenam
oportet. Item per urinas, & ex toto corpore facta purga
tio, aliaq; hoc in casu sunt utiles. Quod si etiam
æger ardore aestuet, & flammam usque ad pectus per
tineat, haud abs re fuerit refrigeria pectori applicare, &
potionem frigidam offerre, idq; non paulatim, nam
magis hoc pacto incendit, uerum uniuersim ut flammam
extinguat. In quibus autem ardor interiora oc
cupat, summa uero inalgescunt, cutis in superficie frigida
percipitur, præcordia contenduntur, uenter syntes
xim patitur, aut uomitu, aut infra reiectiones fiunt, uigiliae
urgent, mens desipit, lingua est aspera, hi calefacien
tia requirunt remedia, ut calor per totum corpus dis
strahatur, ac si alio quopiam modo ab internis foras

G i i i i

PAULI AEGINETAE

poterit elici. Iam uero & haec potio utiliter praesumitur: Aloes partes duae, guttae ammoniaci partes duae myrrha pars una. Haec in uino odorato contrita instar dimidiae cyathi exhibetur, nimirum quotidie. Haud noui, inquit Rufus, quod post hunc potum peste non superauerit. Haec quidem Rufus memoriae prodidit, Galenus autem tradit ad pestilentialia putredines, bolum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate est Theriacen ex uiperis magnam prodesse. Et enim in pestilentia quae Romam internecino morbi genere depopulata est, omnes quos nullum ex his medicamentis adiuuit, interiisse scriptum reliquit.

DE IIS QUI EX REDVNDANTIA

crudorum humorum syncope periclitantur. Cap. XXXVI.

*Galenus
in Metho
do, totum
corpus
habet.

Nonnulli febricitare incipiunt, ubi magnam crudorum humorum copiam ore uentriculi simul offenso, uel ex cruditatibus, uel alia quapiam occasione contigerunt. His & praecordia inflantur, & os uentriculi uastiore mole, quam pro naturae modo cernitur: adhuc color ipsis ad albidius, aquosiusque; quam naturaliter esse debet, & eorum species quos aqua inter cutem male habet, magis est mutatus. quibusdam ad nigrius liuidiusque. Nulli talium sanguis mitti sine maximo dispendio solet, etsi uacuationem desideret. Verum nec sanguinis dimissionem, nec purgationem sustinent, utpote quos est sine his syncope subito adoriatur. Ratio igitur medendi talibus est quam frictione molimur. Incipere uero per initia statim morbi oportet, ac primum a superiore crurum parte deorsum, idque; linteis non admodum mollibus, sed modice asperis. Deinde tota brachia ab humeris usque, & superiore parte deorsum si mili modo sunt fricanda. Vbi uero artus omnes abunde calidi uidentur, & metus est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxante uteris, quale est Sabinum: ab astringente uero abstinere, cuiusmodi Hispanum est, Histricumque; et quod una cum germi nibus uel ex oliua adhuc immatura conficitur, per

hyemem uero digerentium usus erit, quod genus est
Sicyonum & chamæmelinum. Cum iam artus pluris
mum perfricueris, postea oleum detergetur, inde ad spi
nam dorsi transitus est: hæc q; tota perfricabitur simili
5 ter, ab hac rursus ad crura te cōferes: & hinc ad brachia.
exinde rursus ad spinam: ita toto die facies. Porro muls
sa, in qua coctum hyssopum fuit, his est aptissima. cauē
dum q; ne uel cibū, uel sorbitionem, uel aquam exhibe
as, uel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsam tri
10 bus primis diebus duntaxat, tuis ipse manibus, quas dixi
partes ordine perfricans. Sin pulsus robore mediocri
sit, ac magnitudine, considera quæ ad aluum spectant,
ac si sua sponte commode non deficiat, cum fiducia ali
quid in aluū ab inferioribus partibus infundes. Quod
15 si maior iusto recrementorum impetus ad aluum cite
tur, principio quidem percoquere mulsam amplius o
portebit: minus enim ea subducit, magis nutrit: cruda ue
ro minus nutrit, magis subducit. At si plenius superuas
cua descendant, ne sic quidem sistenda aluus, sed exhi
20 bendus pro aqua mulsæ ptisanæ cremor est. Si uero flue
re pergant, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsus im
becillitata uires quoq; collapsas didicerimus, panem
ex uino diluto exhibere conueniet, utiq; si nec uenter,
nec iecur inflammatione laboret: quando si hac infestē
25 tur iam corpore crudis succis referto, nulla plane medi
cina periculo subtrahit. Atqui si quandoque crassi abun
de humores deprehendantur, oxymeli pro mulsæ con
tinue exhibebitur. Ergo si æstas sit, & æger frigidæ po
sitioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis: sin hyemis
30 sit, calidum omnibus. Sane balneum his est aduersissim
um, tum aer ambiens uel nimium calidus uel frigidus.
Porro iis quos syncope iam premit, si partes modo cō
memoratę inflammatiōe uacent, panis exhibebitur mo
dicus, isq; ex uino quod celerem in corpus digestiōē
35 adiuuet, statimq; ad frictionem ueniundum est, quæ pro
tradito quoque iam modo administrabitur: uerum quō

PAULI AEGINETÆ

bus ex flaua bili, quæ os uentriculi infestet, syncope incidit, iis frigida offerenda potio est, uinum tamen tenue, rubens & uetus.

DE HIS QUI OB PRÆ, tenuēs humores syncope oppri- muntur. Cap. XXXVII.

QVI tenuium humorum uitio syncope premuntur, diuersam à supradictis curandi rationem considerant, ut quos dignoscendi notæ illis contrariæ testentur. Nutrire hos oportet paulatim & continue. Porro ad exitium spectare existimandi sunt, si uel iecur ipsorum, uel uentriculum inflammatio obsedit, uiribus iam languentibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sane nutrire quicquid horum inciderit, est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non secus quàm priorum rarefacere, & frigidum ipsis aerem accersire. Ungendi sunt præterea astrictioris unguentis, tum cibi iis dandi, qui non admodum prompte diffuant, non aqua mulsa, non ptisanæ cremor, sed panis & sorbitio ex chondro & fugaces fructus austeri, qui non facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum uero & cum pane, Vinum iis aquosum necessarium inter initia est, sumptum post cibum.

DE RELIQVIS OCCASIONIBUS quibus syncope succedunt. Cap. XXXVIII.

Reliquæ occasiones, quæ syncopas concitant, quatuor sunt numero: dolor uehemens, uis giliar, immodica uentris inanitio, ac in iis qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quins tam, si placet, addas, nempe principiorum interperiem. Celerrime igitur cor affectum in perniciem præcipitatur, mox cerebrum, deinde breui iecur.

LIBER SECVNDVS. 54

DE DOLORE. Cap. XXXIX.

I Taque dolor, qui stuporem inducit ex frigida oritur dispositione. Pulsatilis labor magnæ inflammationis comes est. Sin autem tanquam ab aculeo impacto, aut ueluti à terebro forari putes, crassi intestini species doloris est. pulsatilis, circa membranas constituitur: pertundens uehementissimis non heterocraniis solum, sed cephalæis quoque accidit. Interim hic à parte primario affecta, ceu à radice subito in uicinas perfertur. Porro distendentes utrinque neruorum dolores sunt, cum & laborant, & ad utraque extrema tenduntur: minime, uero in latitudinem porrecti nerui dolores percipiunt, membrana uero sub cute porrecte tensuos, stupefacientesque dolores inducit, quæ inter carnem hærescit, tanquam dilaniantem cruciatum excitat. multæ siquidem & inæqualiter inhærescunt, & ipsam carnem amplectuntur. Quæ uero membrana ossibus circundantur, profundæ sunt, ipsorumque ossium tanquam dolentium imaginem repræsentant. Quando igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri apparet, præcedens uictus ratio uenit inspicienda, fuerit ne præter consuetudinem otiosa, aut cibus homo usus sit largioribus, iisque ex ualenti materia uel solita excretio sit retenta. Nam si ex his aliquod, uel omnia quoque appareant, doloris causa est repletio: ac quam citissime homo uacuari debet. Sic enim licebit tibi maxima cum securitate iis uti remediis, quæ fluxiones dolentibus particulis incumbentes repellant. Si igitur sanguinis sit copia, quod distendit, ueluti in inflammatione oriri solet, protinus si uires patiuntur, sanguis dimittendus est. Sed si æger sanguinis missionem timeat, uel imbecillis sit uiribus, tum auertendus in diuersum sanguis est, tum per magnam uenam patienti particulæ propinquam deriuandus. Vbi uero uitiosus humor duntaxat affligit, purgandus est. Si utraque coeant, ambabus utere uacuationibus,

PAVLÆ GINETÆ

sanguine prius emisso. Quod si his peractis dolor etiā remanet, constat profecto in agrotante particula impa-
ctum esse, quod afficit. Patet uero non minus & cura-
tionem ipsam per digerentia medicamenta esse moliē-
dam. Pari ratione & qui ex flatuoso spiritu dolores con-
trahuntur, curabimus: sed simul in his potius tum exte-
nuantibus cibis, tum potione, tum per sedem iniectioni-
bus, tum cataplasmatibus auxiliantes, tum irrorationibus
atque fomentis ambiens ipsum corpus rarefacientes.
Sin moles aliqua grauando, contundendoque dolorem
excitet, moli eidem est medendum. Sin rodens humor
est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant &
calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, &
somniaferum est: & uiride sicco magis.

SI CORPVS TABE CON-

sumatur.

Cap. XL.

QUum per uentrem aliquid non ex esculētis po-
culentisq; uerum ex ipsius corporis substantia
excernitur humore in aluum ipsam confluyente
qui quidem flauæ bili continue per uomitum, & infra
erumpenti consimilis est, odoris autem foeditate, tum
quod deiectus flauior & crassitie glutinosus, interim o-
leosus appareat, ab ipsa differt, tunc nimirum caro pin-
guis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eli-
quescit. Malo inueterante, nonnihil etiam ex ipsis solidis
partibus absimitur. In hac perniciosissima febre frigi-
dæ potio utilis est, quæ ex terra frigidissima petitur.
Huiusmodi quoque esse conuenit cataplasmata, &
epithemata, quæ refrigerent, thoraci & præcordiis im-
posita. Item cibi refrigerantes recte offeruntur.

DE VIGILIIS IN FEB-

bribus.

Cap. XLI.

AT uero eorum, qui Immodicis torquentur uigi-
liis, crura & manus uincire, quo tempore som-
num ceptare solent, iubemus & excitari. nonnun-
quam palpebras aperire, uel conuiuere compellimus,

donec abunde fatigentur. Inde subito uincula soluimus
 lucernamq; tollimus, & altam esse quietem inuigimus.
 si nihilominus uigiliæ pertinaciter urgent, ubi accessio
 remiserit, fr̄s nigri papaueris caput decocto, illuitur,
 naribusq; offertur papaueris albi cortex torrefactus de-
 tritusq;, & mandragoræ radicis lauigatæ tantundem
 cum uino. Item rosacei malagmate facies illinitur, ser-
 pilloq; cum meliloto in passo decocto. Hoc etiam in
 accessionibus est utendum, uel trita papaueris capita ex-
 cipientes pane cum rosaceo, uel eiusdem cerato illini-
 mus. Cibus quodammodo sit plenior, exquisitiorq;.
 Adiciatur autem sorbitionibus caput papaueris albi
 seminis cochlearium trium instar. Oleribus commiscea-
 tur papaueris nigri, si quidem folia fuerint uiridia, quan-
 tum tribus digitis potest comprehendere: sin minus, tria
 quatuorve papaueris capita sicca, simul incocta deligan-
 tur. Si ne sic quidē somnus accesserit, papaueris lachry-
 ma, aut succo mandragoræ circumlinentur. Iam ecleg-
 ma ex papaueris capitibus compositum, & præsertim
 ex decocto, mensura cochlearii, uel unius, uel dimidii
 potum, somnum frequenter accersuit. In quibus autem
 caput non est repletum, & uigiliæ infestant utere in de-
 clinationibus etiā tali suffitu. folii amomi, costi, anabo,
 singulorum uncia, carpobalsami libra, styracis, amomi,
 ammoniaci, bdellii scythici, mandragoræ radicis, lachry-
 mæ papaueris, singulorum drachmis quatuor. Ex lignis
 cupressi accensis suffito.

CURATIO SOPORIS NO

xii, qui cataphora Græcis dicitur.

Cap.

XLII.

FRons posca, cui lactis aliquid sit adiectum, abster-
 gitur, & summa ualide ligamenti excipiuntur. na-
 ribus admouetur quæ incisoriæ facultatem ob-
 tinent. In remissionibus etiam cucurbitulæ ualēter dor-
 so, & spinæ defiguntur. Si morbus his non cedit reme-
 diis, etiam quæ sternutamenta excitant, obiciuntur. Ci-

PAULI AEGINETAE

borum materia sit quæ incidat diuidatq; ueluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

CURATIO DOLORIS CAPI

tis in febribus. Cap. XLIII.

SI capitis dolor in febribus affligit, post conuenientem febrium uacuationē in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, uel rosaceo, cui etiam aceti pauxillum sit admixtum: si æstas sit, & febris ardens, frigidus: si hyems neque febris ardens, calidus, aut tepidus. Incoquatur nonnunquam oleo & serpilli polygoni q; succus. per æstas etiam papaueris capita, uel ipsum papauer: quem admodum hyeme peucedani momentum. Quod si uero dolor in fronte perseueret, sinciput q; pilis careat, hoc quoq; oblinendum est ueteri polenta & polygonio: uel pane similiter & rosas, uel modica myrto, uel serpillio. Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum ignis sensus inest, psyllium polenta temperatum profuit, uel ipsum per se in uiscum coctione redactum, & continue mutatum. Item corianū similiter cum polenta, & aloe cum aceto illinitur, myrrha q;, & ammoniacum pari modo, necnon crocomagma. Pulsatiles dolores ruta, menta q; cum pane diffat, rosaceo quoque superaddito. Atqui si dolor commoratis auxiliis non eliditur, primum caput ad cutem adtondere oportet. deinde pinguioribus asperginibus totum ipsum foueri, mox cucurbitulæ occipitio aglutinari, & summæ partes deligari debent, permulceri q;. Iam uero hircines recte affiguntur. Cæterum si defluxio quædam à capite, uel grauedo oborta capitis dolorem suscitauerit, iis utendum est auxiliis, quæ aduersus hæc suo loco perscribentur. Sin autem à stomachi regionibus uapores sursum tendentes caput offenderint, etiam horum ratio habenda est, ueluti præceptum à nobis est.

LIBER SECVNDVS. 56
QVOMODO STOMACHI

curam habere conueniat.

Cap. XLIIII.

Si stomachus imbecillis fuerit, corroborantibus oblinetur, quod genus palmulæ sunt, uinum, farina, crocus, mastiche, & aloë. aspergiq; debet medicamentis ex absinthio, melino, mastichino, nardo, & uino confectis. At si ardorem experiatur, miscendum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitæ succus, lactuca, portulaca, solani, sereos, & uuæ immaturæ. Sin autem inflammatio quædam in uisceribus appareat, etiam relaxantia quædam adiungenda sunt: asperfusionibus, oleum chamæmelinum, cyprinū, adipēs gallinæ, aut anseris, bdellium, uel ammoniacum, & similia, cataplasmatibus autem apii semē, foenugræcum, althææ, chamæmelorum flos & ut uno uerbo expediam, compositam habeant facultatem, tum relaxantem subtilium partium amaramq; tum astringentem.

DE IMMODO FRIGORE

in febribus & rigore. Cap. XLV.

Rigori, qui crisis ratione obuenit, remediis occurrere non oportet: nec uehementiam eius dissoluere. Quod ex sudore frigus prouenit, prompte remittitur, ac nihil adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut algore, ex frigidissima copiosaq; potissimū pituita nato, primum quidem artus plurimis in locis cōstringendi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino aut cyprino, aut irino. Sin autem maiore auxilio tibi opus sit, etiam piper oleo admiscebis, uel caychy, uel adarcen, uel castoreum molliterque totum corpus infricabis. Porro ne facile oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdum & ceræ momentum colliquefacere. At si per hæc rigor non possit excalferi, ualentioribus quoque ex his factis acopis necnon dropacibus & sinapisinis uti consilium est, aliaque fomenta rite admoliri. Item acrota ex iis quæ

PAULI AEGINETAE

admouentur naribus, commode faciūt, calaminthe, pu
legium & hyssopum. Potui dabitur ante accessionem
mulsa. in qua piper, & ruta sit incocta. ad hæc liquoris
cyrenaici cocto melle formati instar mihi duabus horis
ante accessionem præstabimus. Similiter & liquoris syl
phii. Ad hæc quod in quartanis ex liquore cyrenaico
componitur, multis fuit auxilio. Iam uero in oleum lar
gius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pe
tinacissimos absterferunt, ut Archigenes memoriæ pro
dedit. Galenus autem ante accessionem, cutem abrotas
no infricandum præcipit, uel calamintha arida, uel cuni
la tum foliis, tum floribus, uel costo, uel pyrethro, utro
que horum cum oleo, unde fiet, ut uel nequaquam, uel
certe minus rigeant.

DE SVDORIBVS. Ca. XLVI.

Svdores, quibus morbus soluitur, excipere oportet,
quandiu satis uacuatum fuerit. adiutareq; fotu
mediocri, & quiete. quamobrem non abstergendus
est: nam alius quoque alium elicit, & calido clystere in
aluum dato, & sorbitione, & somno. At sudores in re
missionibus morborum erumpentes, simile iis qui mor
bum finiunt, *κρίπκω* appellant, ad ministerium capiēt.
Itaque præsidia quibus sudores euocantur, libro super
iore capite quadragesimo octauo abunde sunt compre
hensa. Cum enim sudores largius eruperint, abstergen
do, leuandoq; operimēta refrigerare conuenit. Etenim
lassant supra modum excidentes, ut in syncopen frequē
ter ægros perduxerint. Leui ueste madidaq; debent ef
se coniecti, fenestris patentibus, ut perflatus aeris frigi
dior accedat. his somnus adiungatur, & euentilatio.
Inspergatur myrtus nigra in pollinem coacta, corpori insper
gatur. Similiter galla, picea cortex, electrum & polenta
cum uino astringente, particulis sudores recipientibus
imponantur, faciesq; posca per spongiam aspergatur.
Archigenes etiam calcem non restinctam, & floces uini
combustas, tum in his, tum in rigore, quem nullus eui
cit calor,

cit calor, assumit. Ambo siquidem, inquit, perfotus calidos siccescunt. Media uero corporis loca delinenda succo arnogliffæ, uel coriani, uel portulacæ, uel brasicæ præcipit, ut constricta, sudores reprimant. Idem præstat reprimendo creta cimolia aqua dissoluta, dorso per somnum, & thoraci subiecta. Totum uero corpus rosoraceo perungitur, uel melino, uel myrteo, uel lentiscio, uel ceratis quæ ex his confiunt. Nam magis sunt his idoneæ reuñctiones, quæ latentes meatus obstruendo, humoris exitum prohibeant. Patet autem omnibus quod cibus quoque siccior his conuenit, & uirina mediocriter astringentia. Caterum largiore potu, & præsertim humidior, tum crebris iniectionibus abstineant. Si autem fieri potest, gestatione corpus agitandum, in frigidior ædificio, ut summæ his partes quæ maxime res frigescant. Qui porro per elisum sudores fiunt, (hi autem uel ob dolores excitantur, uel conuulsiones) & retentione, fotu quæ extremorum, & refrigerio per panniculos laneos accersito, leuiter curantur.

DE TVSSI IN FEBRIBVS.

Cap.

XLVII.

TVssi in febribus, præsertim cum rigore obuenientibus occurrere conuenit. Nam tussis intentione, febris quæ inclinabat erigitur colligitur quæ. Aduersus hanc formulæ medicamenti ex melle cocto coacta quæ, hypoglottia uocant, offerruntur. Linguae autem supposita, unde nomen habent, eliquescent: & quod spirandi impedit facilitatem, discutiunt: tempus ipsarum est in accessionum statu, & spatio quod paulum accessionem præcedit, datur etiam hydromeli discoctum. Quibus autem de neruoso genere metus non est, temporis processu exhibebis cum fidutia & oxymeli. sin minus, hyslopi decoctum, quod etiam rigentibus auxiliatur. Item castoreum cum febris ardens non est, neruoso quoque generi commiscetur. Adhæc eclegma ex piceæ fructu, nucleis pineis, iride, semine lini, amygdalis amara

PAV. ÆGIN,

H

PAULI AEGINETÆ

ris, & urticae semine plurima uero ex parte cibis quoque hæc simul adiungentur. Ac resina quoque & terebinthina in ouo exhibetur. Extrinsecus autem thoraci, & locis arteriarum uicinis, lana sulfure infecta imponatur, ac pingue, oleum uerutaceum esto, uel irinum, uel anethinum. Præterea deligatura ualida in longum exacte porrecta, tussim cohibet: dico autem per medias partes extremasque. Non ratione caret, & apophlegmatissimis tussis gratia uti, utroque herbarum pituitariarum genere, & syluestri, & fatiui commanducato. uel cum mastiche summa debent infricari, contrectari, & ligaturis intercipi, deinde rursus soluenda est retractio. At si propter febris acrimoniam tussis concitatur, utendum est gargarizationibus ex aqua tepida, nec non frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum decocto, uel rosarum, uel dulcis radiculae. Visceribus autem, uel etiam cordi ipsi iniiciuntur quæ modice refrigerant.

DE STERNUTAMENTO.

Cap. XLVIII.

Sternutamenta dum febribus incidunt, subinde molestant. Etenim caput replent, & uirtutem arguunt. Nonnullis sanguinem quoque eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incommoda. Quare aduersus ipsa remediis pugnandum est. Cohibet itaque sternutamentum inuadens, nasi perfrictio, frontis & oculorum apertio, studiosa palati frictio, ructus, illius intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque ad latus, summorum musculorum contrectatio, maxillæ musculorum perunctio, calentis olei in aures infusio, ligamentum calidum mento impositum. Caueri debet repentina ex somno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus piperis, castorei, sinapis, mente, suauitas malorum, & farinae odor. obtundunt enim sternutamenti elisum, & spongiæ ex mari inanes. Vbi uero cupiditas sternutandi oborta fuerit: non autem sternutamentum erumpat, labii quies

idonea est. tum acriorum odorum experientia, & animi remissio.

DE CIBI FASTIDIO.

Cap. XLIX.

5 **Q**uibus uitiosi humores fastidium procrearint, ii cibus & poculentis sollicitandi sunt, qui huiusmodi succos uel per uomitiones, uel per aluū excernere soleant, uel contemperati, meliores reddant, quorum materiam libro superiore, qui totius operis pri-
 10 mus est, comprehendimus. At si ob uirtutis imbecillitatem, cibum respuant, quoniam omnis facultas ex particularum intemperie infirmatur: conuenit intemperamenti speciem, contrariis medicari. Plura de fastidio, in stomachi uitis, libro tertio pertractabimus. In febricitantibus autem, statim per initia cibi cupiditas, iis quæ odorem mouent, recuperanda est. Potissimum uero polenta in aquam mersa, uel poscam, uel dilutam uini potionem, uel cuiusdam odorati, & fructuum fugacium qui astringant decoctum, item perunctione blanda, & moderata totius corporis frictione, eliditur cibi fastidium,
 20 ac contrectatione tum frontis collutione, aquæ sorbitione modicæ. Cæterum stomachus digito immisso turbatus, ad cibum assumendum quodammodo sollicitatur, idque potissimum bilioso quodam humore, aut acido sursum educto. Secundum primos dies, cataplas-
 25 matis quoque à foris stomachus ad cibum conuertitur, ex palmulis, malis, œnanthe, absinthio & aloë confectis. Cibi autem præparentur plures simplicesque & frumentacei. Insuper alterius generis uarietatem quandā
 30 sortiti, qui tamen non ab iis abhorrent, qui in febris dantur, in quibus & fructus fugaces conueniunt, qui non ex facili acescunt, neque nimium dulces sunt, sed maturi, neque ad satietatem exhibendi, uerum quantum ad aliorum ciborum cupiditatem excitandam sufficit. Præsto autem sint reficiendis
 35 familiarissimi, qui tum corripere ægros, tum adhor-

H ii

PAULI ÆGINETÆ

tari queant. Porro febribus solutis, si in uirium recreatio-
ne perduret fastidium, etiam fifarum cum oxymelite
coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, fassamentū,
bulbi & qcquid ad bonitatem stomachi facit, accommo-
detur. Nec non & illud ipsum in memoriam reducas-
tur, quibus cibis per sanitatem maxime usi sint. Item am-
bulationes, gestationes, clamores, dropacismi, frictiones
& exercitia adhibeantur. Præterea absinthii succi potio,
uel aloes, aceti q; scillitis instar mistri absorptum, in id
uehementer efficax est.

DE GRANDI FAME, QVÆ

græcis bulimos dicitur. Cap. L.

SI uero in grandem famem, quam bulimon appel-
lant Græci (dico autem cum minus q̄ par est, ci-
bos corpora sentiunt) fastidium inclinauerit, hisce
reficiemus, tum aliis, quæ naribus admoventur, suillis q;
carnibus assis, & hoedinis. In summa omnibus, quæ ni-
dorosum odorem repræsentant. Acrimonia sanè febrili
lenita, & extremæ partes deligari ipsi q; excitari debent,
maxillas pungendo & crines, uel auriculas uellicando.
refectis, panis ex diluta uini potione, uel aliud quippiā
distribui facile exhibetur.

DE CANINO APPETITV.

Cap. LI.

ET si hoc symptoma febribus non adeo superue-
niat, sed nonnunq̄ secundum ipsas, præsertim gra-
tia cognationis, quam cum fastidio contraxit, nil
tamen fuerit mali, etiam de immodico appetitu, quum
ambo naturæ modum excedant, sermonem instituere.
Quoniam igitur à pituita potissimum acida constitui-
tur affectus, iis utendum est, quæ hanc incidunt repuro-
gent q; Talia autem sunt maxime, dulcia, salsa, & alios
quin abstergentia calida. Vinum igitur ipsis recte datur
copiosum, ex eorum numero quæ impense calefaciūt,
cuiusmodi habentur colore uermicula, aut rubra, astris-
tionis expertia. Verum dulciora potius propinantur,

uel non sitientibus. At cum optime habuerint, primum
 ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præpa-
 rata, quibus nihil austerum, aut astringens sit adiectum,
 offerentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam
 5 manifeste non pugnent, attamen impotentem ad cibos
 animi impetum dissoluunt. Horum autem penuria con-
 sistentiâ pituitæ stomacho inhærentis absument, minuitq;
 Iam fassamenta ipsis commode exhibentur, ab his uis-
 na commemorata liberaliter assumpta prosunt, quod
 10 ubi longiori tempore fecerint, caninus appetitus finitur.

DE SITI.

Cap. LII.

Sitim admodum longam fieri existimabis ex sicci-
 tate, aut caliditate, particularum per quas humor ex
 ore in uentriculum defertur. & siccitatis quidem
 15 remedium est somnus, caliditatis autem uigiliæ. Non
 nulli uero sitibundi ex uino ciborumq; caliditate fiunt, q-
 bus medetur frigida potio. Prauas autem qualitates de-
 siderant, quemadmodum & cibos, præpollenti humo-
 rum uitio respondentes. Cæterum siti pressos inextin-
 20 guibili, unde etiam mortem oppetierunt, noui qui uipe-
 ras dipsadas aliquando uorassent, item qui uino ueteri
 sese inebriassent, item nauigantes, qui ob aquæ potabilis
 defectum, marinam bibere ausi, interierunt. Verum
 sitim in febribus placare solet, fotus capitis ex oleo frigido
 25 dissimio, uel rosaceo, uniuersim superaccommodatus.
 Optime facit ad sitim nigræ lactucæ semen commandu-
 catum. itē glycyrriza appellata, adhæc cucumeris semen
 in ore retentum. Datur etiam ad sitim hoc catapotium.
 cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi dra-
 30 chmæ quatuor: tragacanthū soluitur ouorū crudorū re-
 centium albumine. & cū fuerit dissolutū cōtritumq;, cu-
 cumeris semini prius leuigato adiungitur. Postq; emol-
 lieris, pilulæ formantur, in umbraq; siccantur, ex his una
 sub lingua tenenda exhibetur: humor paulatim salua
 35 solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydonio-
 rum, uel pīrorum, uel mespilorum, uel pampinorum

PAULI AEGINETAE

uitis, uel mali granati succus sorbitioni datur.

DE LINGVÆ SCABRITIE.

Cap. LIII.

Humectanda est linguæ scabrities, lini seminis decocto ægris in os dato: melius autem facit myxa cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum demerso lingua infricata, aqua puriore abluitur, uel spōgia abstergitur, deinde rosaceo illinitur, iā ipsum rosaceum melle cōtemperatum, in id ualde efficax est. & portulacæ succus in ore retentus. item rhu obsoniorum mulsæ admistum bene facit. insuper Damascena, & myscion (hoc autem est myxa) ore retenta & lingue circumdata. His adde etiam lactucæ cauliculum. Archigenes autem tradit etiam salem indicum, colore quidē & substantia communi similem, gustu autem mellitum, lenticulæ instar, uel plurimum ad fabæ magnitudinem deuoratum, uehementer posse humectare. Cæterum in latus decumbere prodest, nam supinus cubitus exiccat, item os conuiuere, hiatus enim madorem absumit. Sternutamenta porrò accersita, linguas quouis alio plenius humectant.

DE NAVSEA. Cap. LIIII.

Cum sine cibo assumpto nauseabundus æger efficitur, cuius licet, arbitror ratiocinari prauos humores uentriculum obsidere. Nonnulli uero turbantur, sed nihil euomunt, humore ipsis tunicis imbutis. Pituitosos itaque succos concoquere oportet, seruando ægrum in quiete, inedia, & somno. tenuiores uomitus elicit, qui nonnunquam ex pitisanæ cremore, uel mulsæ excitatur. glutinosi humores & crassi, attenuantia desiderant, quod genus est oxymel, & similia. Humiditate aut praua tunicis impacta, picra ex aloe utilis est. uerum quæ astringunt, haud mediocrem noxam conciliant, quemadmodū rursus, cum humiditas multa citra malthiam inest, astringentia quidē q̄ utilissima sunt: medicamentum uero ex aloe in marcorem perducit.

LIBER SECVNDVS. 60

Cum uero frigiditas humori adest, astringentibus mis-
seri etiam debent calefacientia. Nota est frigidi af-
fectus, quod neque sitim, neque ardorem eo deten-
ti experiantur.

DE BILIS VOMITIONE.

Cap. LV.

Bilem uomentibus cataplasma applicandum est
ex palmulis, malicorio, galla uino incoctis, uel
posca, pane simul contrito. Item acacia, hypocy-
stis, balauitium, & rhu cataplasmati adiungantur. Præ-
ter hæc cucurbitula admota magnifice auxiliatur, cum
largiore flamma. Cibum uero frequenter paulatim da-
bimus. In his autem qui atram bilem uomunt, & in-
flationes stomachi experiantur, spongas aceto q̄ acer-
rimo calente madidas imposito, uel hederæ folia uino
incocta illinito.

DE SINGVLTIBVS. Cap. LVI.

Singultus oritur uel ex repletione, uel inanitione,
uel succis acrioribus stomachū erodētibus, quibus
per uomitionē redditis, cessat. Pleriq; uero medica-
mentum dia trion pepereon assumentes, si statim uinū
supbiberint, singultiunt. q̄ aut nōnulli ēt cibo intus cor-
rupto singultu infestentur, cuilibet notum est, iā nō pau-
ci rigore correpti singultiunt. Vomitus itaq; iis qui ex
repletionē, aut rosione stomachi singultu cruciantur, me-
deri abunde comperimus. calida uero, iis qui ob perfri-
ctionem. At quū ab humorū repletionē, singultus origi-
nē habuerit, uiolenta indiget euacuatione, quā sternuta-
mentū præstat, ob inanitionē creati singultus, sternuta-
mento nō finiuntur, datur aut singultientibus ruta cū ui-
no, uel nitrū in mulsā, uel seseli, uel daucū, uel cymīnū,
uel gingiber, uel calamintha, uel nardus gallica. Hæc sa-
nē singultus ex ciborum corruptione, aut frigore, aut
repletionē contracti, auxilia sunt. qui autem ex frigidorū
um uiscosorumq; humorum copia singultū experiuntur,
castoreum tribus obolis potui sument ex posca, idē

H i i i

PAULI ÆGINETÆ

cuti impositum unā cum oleo ueteri sicyonio adiuuat.
Insuper acetum scillites, uel oxymeli potum conuenit.
deniq; spiritus retentio, præsens est remedium.

DE ALVO IN FEBRIBVS

astricta, & cita. Cap. LVII.

Quæ arefcentem aluum proritant, libro priore
quantum res exegerit comprehendimus. quorū
nam uero eadem quoque liquida febribus in
cidit, in præsentiarum mētionem ipsius facere oportet.
Multi enim non febris ratione, sed ob hoc solum acci
dens in perniciem præcipitati sunt. Principio igitur exci
piemus quæ egeruntur, nullo remedio occurrentes à
corruptione & cruditate emanantibus. Sin autem uacua
tio modum excedat, cohibenda aluus est, & si quidem
acriora efferuntur boni succi esse, & alioquin crassioris
conuenit, quæ assumuntur. huiusmodi existunt ex chō
dro, & ptisana sorbitiones. balnea his postquā morbus
ematuruerit sunt idonea. Cum uero pituitosiora & flui
da erumpunt, contra sicciore calidioresq; cibi erunt,
quatenus febres permittant. Huius generis habentur, q
ex panificiis calefacientibus consiunt. Balneis hi prohi
bendi si nihil aliud compulerit. Porro ubi concoctrix
facultas infirmatur, astringentibus tum cibis, tum reme
diis utendum est. cibis sanē, in qbus maxime malū gra
natum, aut poma, aut pira, aut mespila sint iniecta. uel ēt
hisipis, & uino tenui odorato astringēte: remediis aut,
cataplasmatīs, nimirū ex polenta, palmulis, absinthio, ro
sis, myrtis, & cōsimili materia. Cæterū cōsiderandum ue
nit, quibus potissimum particulis cataplasmata debeant
imponi. dico aut stomacho, aut imo uentri: nonnunq; &
circa lūbos applicamus. Cruentas aut excretiones repri
mūt ex thure cōfecta, deficcātq; uel pollē polentæ, uel
farinæ, uel thus, uel māna uino macerata, uel posca. Por
rō acriorē humiditatē ēt iniectione p aluum, edulcare
cōpetit, nunc ipsa aqua, nunc ptisanæ cremore, uel chon
dri, uel oryzzæ, uel tragi, idq; non semel uerum sæpius.

LIBER SECVNDVS

66

Postea uero adiungentur etiam rosa sicca, uel myrti,
nonnunquam & galle, & ouum simul cum rosaceo ui-
noq; tenui astringeti, uel rosarum decocto inditum: uel
sedi quoq; appositum excernendi cupiditates retundit.

5 Cum frequens desidendi est appetitus, agatium sedi ac-
commodatum ex calidis spissamentis immittatur.

DE SANGVINIS DISTIL-

latione, & eiusdem ex naribus pro-

fluio. Cap. LVIII.

10 **Q**uoniam distillatio totius corporis, aut capitis
redundantiam innuit, per extusionem, uel den-
sitatem eueniens: largior autem excretio habilis
est laxare & minuere copiam, ratioq; est inde ipsam mo-
liri, unde natura proclinauerit, his ego consideratis au-
15 sus sum in quartanarum distillationibus scalpello, ut mos
est, narium uasa conuulnere, oportet autem non ex
guo fluore contentum esse, sed pro uiribus detrahete.
Spontanea in febribus per nares sanguinis profluvia, si
in crisi fiant, excipere conuenit, sin autem sanguis immo-
20 dice erumpat, sistere conandum est. Primum itaq; extre-
mae partes ualide deligabuntur, & ger sublimi capite figu-
rabitur. Videtur etiam praeputii deligatura sanguinis pec-
culiariter ex naribus profluvia cohibere. & ger non ex-
purget narium foramina, neq; irritet, uerum sanguinem
25 concreescere sinat, nasus spongia, quae in posca maduerit
refrigescat, ac obturamen ex linimento naribus proflu-
tibus demittatur, medicameto quodam ex eis quae san-
guinem comprimunt, inuncto: horum materiam, & re-
liquam locorum affectoru curationem libro subsequen-
30 ti uerbosius persequemur.

SI ANIMA DEFICIAT.

Cap. LIX.

35 **Q**ui ex cholera, alui profluuio, aliisque multis, &
uniuersim factis uacuationibus, resoluuntur, iis
aqua frigida aspergitur, & nares comprehendu-
tur, os uentriculi infricatur, uomitus praecipitur, stomachus

PAULI ÆGINETÆ

turbatur, uel digitis immisissis, uel pinnis. præterea pluribus uinculis ualide deligari debent. Cum per imas particulas uacuationes sunt, manus: cum per superiores, crura. Cæterum sanguinem fundentibus prospicienda est figura sine dolore sublimis, & cucurbitula defigetur, quæ particulas retrahat contrario uacuationem expelluntibus modo. Curat etiam uinum aqua temperatū resolutiones ex subitis uacuationibus ortas, nisi uiscerū inflammatio, aut uehemens capitis dolor, aut attonitus aliquis affectus, aut febris ardens, in crudo morbo prohibeat: in his siquidem magna uinum adfert incommoda. Et si æstas fuerit, calidiq; temperamenti æger, ac frigida assueuerit, frigida exhibebitur. sin contraria euenerint, calida. At si ex sudoris copia animæ deficiunt, cutis densanda est, quemadmodum à nobis prius est dictum. Tum ut frigidus aliquis perflatus accedat, prospiciendū est. Porro in uentriculum defluxionibus nihil horum conuenit, præterquam ipsi uentriculo stomachoq; corroborantia ad mouere, & affectos in balneum ducere. Hoc siquidem illiusmodi fluoribus est accommodatissimum, uerum sanguinis profluvia, & sudores uehementer proritat. Qui ob plenitudinem animo destituuntur, uino ciboq; abstinebunt, item balneis, si febricitent. Potio autem mulsæ datur, in qua uel thymus, uel origanū, uel pulegium, uel hyssopum sit incoctum. Propitium uero iis est & oxymeli. At si propter humores uitiosos in stomacho contentos anima defecerit, iubendi sunt uomere ab hydrelæo, digitis aut pinnis in os demissis. Sin autem uomere nequeant, oleum q̄ laudatissimum ipsis propinabitur. hoc enim & aluo ex inferioribus partibus infusum, subinde uacuat. Iam uero absinthium ipsis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dissoluantur, iis uti expedit quæ firmando ipsi sunt: ueluti antea in capite de eodē comprehensum est, summaq; perfricare oportet. Exusti in sole ad balneum ducuntur, q̄ perfrixerunt, medicamen diatrion pipereon, ipsumq;

LIBER SECVNDVS. 61

piper assumant. Qui uero ob caliditatem largiorem,
 estumue; aut lentam in balneo moram, animo deficiūt,
 curantur frigida aspersa, aeris perspiratu, stomachi fric-
 tione, uini cibiq; usu. Sin autem propter inflammatione
 nis magnitudinem, aut febris malignitatem in accessio-
 nibus animus deliquerit, perfrigescentq; artus, fricare ua-
 lenter iubeto, fouere & deligare. Ad hæc uigillas in eo-
 diamq; præcipito. Ea uero & ante accessionum faciun-
 da sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tri-
 busue horis ante accessionem, cibus offeretur, uel chon-
 dri cremor, uel panis ex aqua simul cum mali granati
 nucleis, aut pomis, aut piris. Si autem magni periculi me-
 tus sit, etiam uinum dabitur. item iis qui subito animam
 perdunt, his remediis succurrendum est. ac ubiq; cau-
 sam considerare conuenit, propter quam animæ defec-
 tus accadat, atq; contra hanc pugnandum est. Nonnun-
 quam uero & symptomatis maior habenda est sollicitu-
 do, nempe cum periculum, uel etiam mortē minatur.

QVOMODO VLCVS CIRCA OS

20 sacrum proueniens curetur. Cap. LX.

ET hic affectus, febribus potissimum lentis, ex diu-
 turno decubitu superuenit. Cum itaq; sacri ossis
 regio incipit rubescere, circulum ex lana iuste ma-
 gnitudinis, parti subiicemus. postea rosaceum, uel myr-
 25 teum ceratum, quod argenti spumam, aut cerusam ha-
 beat, superaccommodabimus. Inflammatione autem
 oborta, cataplasma ex pane cum solano, uel polygonio
 uel arnoglossa, uel tenera brassica applicatur. Si ulcus
 30 serpat, lenticula cum malicorio illinitur.

Finis libri secundi.

PAULI ÆGINETÆ LIBER TER

tius, Ioanne Guinterio Andernaco
medico interprete.

DE PILORVM AFFECTIBVS.

DE AREIS, ET CALVI

tio.

Cap. I.



VEMADMODVM STIR-
pium nonnullæ humoris defectu
inarescentes contabescunt: aliqua
uero alienis contrariisq; humoris
bus infectæ emarcent, haud dissi-
mili ratione id ipsum quoque pilis
usu uenit. Etenim Caluitium: humi-
di penuria fieri consuevit: prauitate
autem uitioq; succi, Areæ, nempe Alopecia, & Ophiasis
sola inter se figura differentes. Quoniam hæc, partem
oblæsam, serpentis modo glabram, ostendit: illa, quod
uulpes continue infestet, sic appellata est. Itaq; coniectu-
ram de humore, qui superat, ex cutis colore sumentes,
uacuationem medicamento purgante prius moliemur
deinde loco uitato auxilia inducemus. Si igitur corpo-
ris color nigrior, albidiorve solito existat, antidoto hie-
ra quod pituitæ educendæ, humorisq; melancholico est
utemur. Sin pallidior, catapotia ex aloe exhibebimus:
quorum descriptionem in libro de medicamentis com-
positis inuenies. Vbi corpus iam totum inanieris, medi-
camenti quod pituitam per eos extrahit, apophlegma-
tismum Græci uocant, usus erit, ex aceto, sinapi, & melle:
isq; non semel, uerum crebrior. Satiùs autem fuerit, si e-
tiam in aceto origanum, uel pulegium, uel thymus, uel
hysopum commaduerit. Cæterum in aliis quoque ca-
pitis affectibus eadem utemur curandi ratione: primum
humorem, qui præpollet euacuantes, uel alui deiectionis

LIBER TERTIVS.

63

ne, uel etiam sanguinis emissionem, si eius subest copia, de
in ad presidia quę parti extrinsecus iniiciuntur, transgre
di conuenit.

DE ALOPECIA.

5 Cutis nitro infricata, linteoq; aspero, lanave potius de
terfa, adeo ut ruborem contraxerit, uerbenaca ex aceto
detrita, in sole illinitur. Aut alcyonio primę asperitatis
combusto, reductoq; in puluerem cum oleo ex lucerna
inungitur. Aut calami radix, seu amygdalę amarę
10 cortex torridus, oleo, uel adipe ursina exceptus induci
tur. Hęc itaq; sunt mitiora medicamina, uerum ex eu
phorbio, thapsia, & adarce, oleo soluta laurino, uel pi
ce liquida, uehementiorē uim repręsentant. A L I V D.

25 Erinaceorum marinorum testa ignem experta cum adi
pe ursino excepta, cuti prius nitro extersę illinitur. A
L I V D. Piperis, stercoris ouilli sicci, erysimi, ærucę se
minis, singulorum drachmę quatuor, ueratri albi drach
mę treis, murium stercoris drachma. Excepta felle tau
rino, aut hircino, aut suillo delinuntur. A L I V D. E X

20 P E R T I V M A D A L O P E C I A M. Man
dragorę radices, mali terrę, ari radices, cerę, picis liqui
dę, singulorum congii octo, axungię porcine infusę,
nerii herbę medullę modicum. Axungia cum Nerio
incoquitur, donec eliquescat: deinde exemptam herbę
25 projicito: & reliqua axungię aduungito, incoquitoq;
mox ceram, & picem liquidam. Vtitor in sole audacius.
Vbi iam ulcera ad cicatricem uenerint, caput uulpecu
lę urito, & alcyonium, anchusęq; nigrę folia omnia cō
trita super inunctioni inducito, ut caput pilis contegatur.

30 A L I V D. Canini capitis combusti pars una, testarum
marinarum tantundem axungię porcine modicum.
omnia in fictili coquuntur. Eisdem etiam siccis utitor.

A L I V D. E X T H A P S I A A D O M

nes inueteratos affectus.

5 Euphorbii, thapsię, baccarum lauri, singulorum ꝓuncia,
sulfuris ignem non experti semuncia, ueratri tantundem

In manu
scripto
exempla
ri non ha
betur.

Galenus
uncias
duas.

PAULI AEGINETÆ

*** Galenus** ceræ uncia sex laurini, uel recinini ueteris quod satis est.
cardami. In ualidioribus etiam uti uincit *cardamomi uncia, alcyonii combustæ uncia : iis q; non solum ad Alopecias, uerum etiam ad omnem diuturnam perfrictionem. Cæterum in Alopeciis primum omnino cutis nitro est abstergenda infricandaq; & frequenter pili nouacula radēdi. Si quidem plerisque noui ex sola infricatione, frequentiq; rasura pilos recuperasse.

QVOMODO CALUITIVM

abicitur & pili crescant, ex Critonis commentationibus.

† Galenus Leporum uentriculi quinque arefacti diligenter olla fœtili friguntur. His myrti comæ tres uncia adiciuntur, acaciæ fructus, acaciæ succi, rubi canini, adiant singulorum tantundem. Hæc omnia accurate resiccata in pollicem coguntur, & subtili cribro incernuntur: deinde ad libram unam pis urfini & phocæ utriusq; libris quatuor admistis denovo tunduntur. Excepta pyxide plumbea reseruantur. Cum usus postulat, cuiuslibet unguenti liquore diluuntur.

QVÆ PILOS CONSERVENT.

Polytrichi herbæ pars una, ladani partes duæ, uino myrteoq; oleo exceptæ in usum adhibentur. ALIVD. Anemonæ flos tritus cum oleo inungitur: idem uero & nigrefacit. ALIVD. Verbenacam rectam unam cum radicibus torrefactam, tusamq; tenui cribro incernito, oleum quoad sordium habeat spissitudinem admiscens. Confectum medicamen æreo uase reposito. ubi opus fuerit, cum oleo similiter utitor.

AQVA PILOS AVGENS,

eorumq; denigrans.

Aquæ pluuiæ sextarii sex, rhus Alexandrini sextarii tres polytrichi pondotrens, brathios tantundem, ladani uncia, myrti uncia, cucurbitæ aridæ tantundem. Sinito ad dies uiginti uitreo uase commadescere, bis mouēs quod die rudicula tedacea, Inde in aquam pilos tingens, uti

LIBER TERTIVS.

64

tor quotidie. Item semen altheæ in balneo illitum pilos
conseruat augetq; pari modo oleum inunctum in quo
semen ipsum altheæ decoctum est, uel liquefactum.

QVÆ MEDICAMENTA

pilos extenuent.

Ficus foliorum, uitis agrestis albæ corticis, pumicis, tes-
tarum, buccinorum, terræ cimoliæ singulorum minā.
Omni bus in nouam crudamq; ollam coniectis, lutoq;
oblitis, in fictili coquito, teritoq; adiciens aphronitri mi-
næ semissem, gallas immaturas numero triginta. In pul-
uerem redacta excipito, ac utitor. A L I V D. Aphro-
nitri minæ septem, pumicis tosti minæ quatuor, alumie-
nis fissi, iridis, siccæ, myrti syluestris nigræ, gummi, bryo-
niæ radicis singulorum drachmæ quatuor, lupinorum
crudorum in pollinem detritorum, conglutina pars quartæ.
Vtere absq; pingui.

AD FLVENTES PILOS.

Aloe ex uino nigro austero illinitur, uel purpuræ tegmi-
na ex oleo cocta, uel myrrha, & ladanū cum uino, myr-
teoq; uel capillum stercus in testa leui combustum ex
oleo cuti prius rasæ inungitur.

QVOMODO PILI CRISPI

fiant, & tincturis inficiantur, ex Cleopæ-
træ libris, quos de capillis crispis
faciundis prodidit. Ca. II

C Apite prius deterfo, spondylii radix cum me-
ro pilis inungitur. A L I V D. Nucleus pineus
recens ad pollinem usq; comburitur, iniectusque
pilæ teritur, myrteum unguentum superinfunditur, do-
nec mellis fiat spissitudo. Atque sic pili raso ca-
pite purgatoque deliniuntur. A L I V D. Myrti & betæ
pari mensura cū oleo pili absterguntur utiliter. A L I V C.
Gallæ uiginti numero adianthi uncia duæ, aqua marina
in mellis crassitiem coactæ inducuntur, sed pilo urina-
rias deterfo, uel lixiuio, & aqua calente abluto, caput

PAULI AEGINETAE

oblinitur medicamento ad biduum, tertio die ablui debet, piliq; resiccati myrteo iniungi. Id tenerum crispūq; nigrum efficit capillum. At si prius caput nouacula raseris, crispior euadet.

QVÆ CANOS ARGENT,

& eosdem denigrant.

Olei, quod immaturæ oliuæ fuderunt sextarii tres, spice nardi drachma, unguis odorati drachmæ quatuor, iunci floris tantundem; incoquantur cum oleo, seorsim habebitur acaciæ succi uncia una, uino soluta leuigataq; diligenter. Vbi uero tertia pars olei fuerit relicta, hanc percolato, & acaciæ mixtam in fidelia excipito, ac uti tor quotidie pilos inungens. A L I V D. Nucum uiridum corticis uncias tres, ilicis radicis tantundem, uini nigri sextarios tres, ad tertias decoquito, expressoq; succo cum olei myrtei sextario contundes, usus eius est quotidianus.

AQVA PILOS DENIGRANS.

Gallæ sextarius unus, rhus coriarii sextarii duo, myrti nigre totidem, cyperi foliorum æqualis mensura, cinaræ manipulus, papaueris nigri tantundem, aquæ lacustris sextarii duodecim. Omnia multis ante diebus macerata, ad tertias decoquantur. Deinde illinuntur, absterfis, siccatisq; crinibus. At cimoliæ terræ acetabulum cum uiua calce pari mensura inungitur. Hæc autem succo betæ elixæ soluta illinuntur. Deinde betæ folia tegminis gratia superaccommodantur, ac ubi satis adhæserint, in balneo abluuntur.

VT RVFI CAPILLI TIN

gantur & flauescant.

Myrrhæ pars una cum salis floris altera, accurate teritur, ubi sordium facta est crassities, caput prius detersum medicamento inungitur, ac post noctem diemq; unum sic ablui præcipies. A L I V D. Lupinos crudos cum aqua illinito. A L I V D. Argentæ spumæ drachmam terræ creticæ drachmas quatuor, calcis uiuæ drachma,

Aqua

LIBER TERTIVS 65

Aqua mellis cras sitiem faciens inungito, & betæ folliis adiectis ad duos tresve dies, ita adhærere fines, deinde ablues.

VT PILI NIGRI FLAVEScant.

5 Flores uini in balnei sordes mittuntur, & spissitudine ce-
rati facta sub somnum illinuntur. & mane pili flavesçut.

ALIVD. Cyperi folia succo struthii fruticis made-
scunt, Et diluto uteris.

QVÆ CAPILLVM RED-

dunt colore aureum.

Aluminis, sandarachæ, singulorum drachmæ sex, croci
drachmæ duæ, thapsi qua tinctores utuntur, Romani uo-
cant herbam robiam, drachmæ octo, cineris lixiui dra-
chmæ quatuor. Cinis cura thapso contusa incoquitur.

15 ubi dimidia portio relicta fuerit, humorem exprimito
quo alumen, sandaracham & crocum dilues. Deinde.

uase uitreo condes. Vbi usus uenerit, pilos prius abster-
sos illinito, postquam uero combiberint, ablues deco-

20 cto fœneu græci, hordei & cumini, aquæ prius tepidæ
superfusæ, quod sufficit, ad hæc saponis quantum sa-
tis est adicies. ALIVD. Flores uini usque unâ

cum oleo balanino, pilis oblinuntur. ALIVD. Sa-
pone gallico cum aqua in singulis balneis pilis abo-
sterguntur.

ALIVD VALDE GENEROSVM.

Rhus rubri sextarius, gallarum libra una S, elydrii uno-
ciæ duæ, herbæ aurum colore imitantis (quam Roma-
ni robiam uocant) uncia duæ, polytrichi fasciculi duo,

absinthii unus, lupinorum quibus cortex sit detractus
30 cyathi duo, aquæ sextarii septem. Omnia in uitreum uas

coniecta, dies nouem finito commadescere: quotidie
bis rudicula agitans, cum usus exigit, auferes quod sa-

tis est, & hoc spongiam madefaciens, pilos confricato,
humectosq; combibere finito, ubi siccati fuerint, sapo-
35 ne calida aqua soluto, abluuntur.

PAV. AEGIN.

I

PAULI ÆGINETÆ
QVÆ PILOS ALBOS FA-
CIVNT.

Verbasci candidus flos combustus aceto mergitur, &
in saponem miscetur. A L I V D. Verbasci fructus,
aluminis, radicularum corticis, singulorum drachma.
Contusa, glutini quod ex tergoribus boum confit dra-
mis quatuor temperantur.

DE CAPITIS AFFECTIBVS
cutem infestantibus, sulfuribus, seu por-
rigine, quæ pityriasis dicitur.

Cap. III.

Furfures capitis, seu porrigo, quæ pityriasis græce
dicitur, est cum tenues & furfuraceæ squamulæ
ex capitis, uel etiam reliqui corporis superficie
resoluuntur, nullò ulcere relicto. Id autem euenit uitio-
so corporis humore, salsave pituita, aut bilioso & melā-
cholico sanguine caput subeunte. Itaque corpore toto
(ut dictum est) inanito, subscriptis facultatibus utemur;
Cimoliam aqua prius maceratam betæ succo miscebis
illinesq; & tantisper ita permittes, donec inaruerit. De-
inde postquam ablueris, thus ex uino oleoq; detritum
perunges: die insequentī staphida agriam, hoc est, herbā
pediculariam, ex oleo inunges. A L I V D. Niti, fe-
cis concremata, myrobalanorum, singulorum libra,
herbæ pediculariæ libra una semis. uino dilutis caput
abstergitur. sin autem reliquum corpus pruritu uexetur,
siccis. Ad humidiores uero pityriasis, muria, uel lupi-
norum decocto caput abluendum est, hoc enim subino
desum expertus.

AD PSYDRACIA ET EXAN-
themata capitis.

Psydracia exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia,
quæ summam cutem excedunt. Exanthemata uero cu-
tis sunt exulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Vtrum-
que uitium facultatibus infra positis exteritur, Argentæ

Spumæ, † cerusæ singulorum drachmæ quatuor, aluminis drachmæ duæ, rutæ foliorum uiridium totidem, ex aceto myrteoq; oleo leuigata cuti illinuntur. ALIVD. Ruta & alumen cum melle trita, capiti prius raso inunguntur. Sin autem cutis à capite abscedit, oleæ folia elixa cum melle inducuntur. ALIVD. Argenti spumæ, cerusæ singulorum. * uncia duodecim, sulfuris uiui drachmæ octo, cerato myrteo excipiuntur.

AD HVLCVSCVLA CA

pitis densa rubbaq;.

Hæc papillis sunt similia, ex quibus quædam ueluti sanies defluit. Caput prius nouacula raditur, & aqua frigida nitroq; abstergitur. Deinde sulfure uiuo ex hominis urina contrito utitur. Vel cretam sutoriam, *μελανιθ* *π* *α* *υ* uocant Græci, cum aceto inungito.

DE MANANTIBVS CAPITIS

ulceribus quæ Achores Græce dicuntur, & Fauis.

Inter capitis uitia, quæ in cute oboriuntur, unum est, quod appellatur Græcis Achor, à nostris manantia ulcera, tenuissimis cutem foraminibus perforans: per quæ glutinosa fertur sanies. Simile ipsi malum specie est, quod à faui similitudine *μύριον* à Græcis nominatur. quod magis amplius foraminibus exasperatum est, quibus humor crassitudinem mellis referens sicut in apium fauis, continetur. Origo est ex nitrosa salsaq; pituita, uictus igitur ratio ex cibis boni succi constare: omnia acria & saliosa uitari debent: præsertim si inflammationem affectus resipiat, postquam corpus superfluo decenter erit leuatum, derasis capillis caput fouendum bis terve die, aut etiam sæpius, aqua calida, in qua myrtus sit decocta, uel rubus, uel lenticula, uel amari lupini, uel asparagi radix. Quum uero plus saniei emanat, recte illinuntur salicis folia cum aqua, uel lenticula. Delinuntur autem terra cimolia, uel cretica, uel samia, uel pompholix, uel spodium, uel argenti spuma, uel cadmia,

† Alexander medicus. Argenteæ spumæ drachmæ. 3. cerusæ drachmæ 4.

* Melius est drachmæ. 12 Sic habet Alexander medicus.

PAULI EGINTAE

uel charta combusta, uel etiam medicamentum ex charta siccum, omnia ex aceto inducuntur. Smegmate uero hoc utendum est, sulfure uiuo, & perdicii herbae, saponisq; æquali pondere. Composita hæc sunt, argenti spumæ drachmæ duodecim, rutæ foliorum drachmæ octo, herbae pediculariæ quam staphida ægriam Græci uocant, drachmæ quatuor, chalcantii drachmæ duæ, Aceto myrteoq; in sordidum spissitudinem coacta illinuntur. **ALIVD.** Sandicis, myrrhæ, mannae, singulorum pondo drachmæ quatuor, sulfuris ignem non experti pondo drachmæ duæ. ex oleo ueteri inunguntur.

ALIVD AD ACHORAS.

Qui hoc uitio infestantur, stercore argenti, uel molibdena contrita oblinuntur. **ALIVD.** Humentes aufert achoras, rhododendri pondo triens, rosarum, sulfuris uiui pondo triens, picis liquidæ, & picis aridæ utriusq; pondo quadrans, ceræ selibra, olei myrtei quantum opus est. in pueris autem, lacte soluta illinuntur.

DE FICIS.

Ficus, nominant eruptiones ulcerum modo rotundas, cum duritie quadam rubentes, quas dolor etiam comitatur. Fit uero hoc mali plurima ex parte in capite, nascitur tamen & in reliquo corpore. Probatum maxime contra hos alumen fissile, æris flos tostus, & glutinum pari mensura cum squamæ æris duplo. Teruntur ex aceto illinunturq;. Præstans etiam remedium est menarum capita combusta, elixiq; bulbi, & cinis ex aceto.

ADVERSUS CAPITIS ET MEN

ti eruptiones, exanthemata uocant, ficum referentes, xeraphium.

Misyos *drachma una semis, chalcitidis drachmæ duæ semis, squamæ æris, aluminis fissi, singulorum drachma. Bene loto hoc aridum impositum dimittitur. Die insequenti rursus pars lauatur, spongiaq; detergæ idem

*Alizæ
drachmæ
duæ, s

LIBER TERTIVS

67

applicatur. Decidit enim ramentum crassissimum. Et si diebus subsecutis idem fiat, sine cicatrice breui con-
sanescit. Cæterum medicamen hoc non mediocriter
adhæret.

AD CAPITIS PEDICVLOS.

Lupinorum in aqua coctorum diluto caput utiliter des-
tergetur, uel herba pedicularia, uel sandaracha, uel utraq-
que contrita ex oleo ueteri, seu aceto illinitur, uel pipe-
ris momentum ne exulceret cum oleo, aut hæderæ suc-
cus cum melle, aut minium synopicum cum aceto, aut
cedrinus liquor, aut pix liquida cum alumine, aut bacca-
rum lauri expressum, aut oleum raphaninum. Ego pe-
diculariam ex aceto oleoq; tritam inunxi, ac semper qd
uolui, sum assecutus.

DE CAPITIS DOLORE, QVEM græci κεφαλαλγία vocant. Cap. IIII.

Capitis dolor qui Græcis dicitur κεφαλαλγία, ma-
lum est inter ea quæ corpori accidunt, grauissi-
mum, nunc ex sola corporis intemperie oritur,

nunc ex nimia humorum copia. Interim ex utraq; cau-
sa: interim uero ex primitiua & foris accidente causa
alia nempe, solis æstu, frigore, ebrietate, aut ictu. Vehe-
mentissimi igitur capitis dolores ex factiuis qualitatibus
nascuntur, & potissimum caliditate. At siccitas non
æque uehementes inducit. Humida qualitas sui ipsius re-
spectu, nullum plane dolorem cõciliat nisi caliditati, aut
frigori, aut humorum copię adiuncta. Itaque de eo
capitis dolore qui cum febris est, eo loco explicitum
est, quo febrium curatio exposita est, nunc de cæteris
dicendum est.

DE CAPITIS DOLORE EX solis æstu contracto.

Qui ex æstu capite dolent, eorum cutis tactu calida
est, & primo statim manus iniecta aridior apparet: ocu-
li rubent, frigidi fatus, & inunctiones placent, ipsisq; ius-
uantur. Cæterum curatio his conueniet etiam ea, quam

I iii

PAULI AEGINETAE

dolori in febribus præscripsimus. Si dolor remanet, in præscriptis utendum est cataplasmatibus. Prodest fronti & temporibus inductus panis ex posca, & rosaceo. Interdum cum amygdalis, uel rosis siccis, aut mollibus uel menta cui pulegium sit adiectum, uel panis cum perfici foliis, facit etiam ocymum ex aceto & rosaceo tritum, uel hæderæ corymbi in aceto elixi, & rosaceo contriti, uel serpilli ex aqua decocto hordeaceam farinam miscere conuenit, uel cardamomum torridum leuigatumq; aceto & rosaceo: uel fermentum cum rosaceo, uel iridem aridam cum aceto. Sed mutantur continue singula: Nam uetustate fiunt inefficacia.

PASTILLI AD CAPITIS DOLOREM ex intemperie calida.

† Alexan-
der Cro-
ci, chalcæ-
thi dra-
chma de-
cem.
* Alexan-
der Alu-
minis scilicet.

Croci drachmæ† quinque, chalcanthi drachmæ decem, aluminis * drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ septem, omphacii, chalcitidis, gummi singulorum drachmæ tres. Vini austeri quod sufficit. Ex posca sumuntur. Sin etiam uigiliæ infestent, aliquid ex somniferis applicatur utiliter.

DE IIS QUIBVS CAPUT EX frigida intemperie indolescit.

At si frigus nocuit, contraria, iis qui ex solis æstu dolent, affectos signa testantur. Etenim facies ipsorum non con-
cidit, sed colorem decoremq; amisit. Item frigidis nec
gaudent, nec iuuantur. Verum horum agnitionem tum
uictus ratio, tum reliqua concurrentia firmabunt. Inun-
ctiones igitur adhibendæ ex oleo rutaceo, laurino, uel
irino, uel nardino, uel etiam opobalsamo, præsertim si
excrementitii humores fuerint crassiores uiscosiq;. Frös
autem tum hoc liquore, tum iis medicamentis debet
illini, quæ ex pipere, & euphorbio præparantur. Vinum
subtilius propinandum: corporis motio adhibenda est.
Item balneum calidum prodest: interim à radícula uo-
mitus. In quibus autem qualitas citra humorum co-
piam, persistat, hoc utendum est medicamine. Pipe-
r

ris albi, crocomagmatis singulorum drachmæ duæ,
euphorbii recentis drachmæ octo S, stercoris colum-
bini drachma una S, aceti acerrimi quantum satis est.

Illinitur pars laborans, sed prius infricata ut cōcalescat,

SI BILIOSVS HVMOR DO-

lorem inuexerit.

Notæ horum per similes iis, quos ob solis æstum do-
lor affligit, Sed maior ipsis rosio accedit, & faciei pal-
lor, interim etiam os inamarcescit. Porro affectus hic
ætatibus uigentibus & temperaturis calidioribus, uitæ
solicite & bilem flauam coaceruantibus solet accide-
re. Quamobrem balneum temperatum his, in unctio-
nes, aquæ potus, & uniuersa uictus ratio humidior, bon-
niq; succi utilis est. Biliosus humor absynthii diluto, uas-
cuabitur. Vel aloe aut ipsa picra, i. amaro antidoto per
se, aut cum modica scāmonia, aut catapotiiis quæ aloe
constant. Inungenda frons, aut croceo pastillo, aut trigo-
no, aut quodam simili.

SI CAPVT CONSORTII

lege indolescat.

Si caput consortii lege afficiatur quod ei cum toto est
corpore, cura adhibenda, quomodo contra intempe-
riem, superantemq; materiam pugnemus. Si copia qui-
dem premit & maxime inuenis, sanguis mittendus
est: Sin autem magis qualitas urgeat, purganti uten-
dum medicamine. Quod si particula laborante ali-
qua simul condolescat, ueluti iecinore, aut uentri-
culo, aut stomacho, his succurrendum est. Vbi cas-
lida afficit intemperies, panis ex aquoso uino exhibeo-
tur, uel etiam ex chondro sorbitiunculæ. Extrinsecus
uincit superfundere, quæ modice refrigerent, uiresq; cō-
firment, sicut à me prius cōprehensum est. At si glutinosi
crassiq; humores in stomacho infarcti, capitis dolorē
concitant, hos quoque amoliamur potu oxymelitis,
tum simplicis, tum Iuliani. Insuper medicamentis ex
hyssopo & origano, & his adhuc calidioribus magisq;

I fili.

PAULI AEGINETAE

incidentibus. Iam uomitus à radícula utilis, fomenta q̃
calidiora, & cataplasmata recte admoventur.

DE CAPITIS DOLORE
EX VINO.

Si uinum adhuc incoctum in stomacho fluctuet, tepen-
tis aquæ potu uomere dolentem iubebis. Quod si et
post concoctionem caput indoleat, refrigerantibus res-
pellentibusq; utemur, quale est rosaceum priuatim sum-
ptum, & cum aceto, uel hederæ succo, uel brassicæ.

Quin & ipsa brassicæ folia in aquam calidam demer-
sa, & capiti circumdata ligataq; naturaliter ebrietatem
arcent. eiusdem decoctæ esus in id efficax est. Item
lenticula hos adiuuat, potissimumq; uentriculo humi-
diore præditos. Adhæc alica, malicorium, & mala ipsa,
pira q; tum aquæ potio, utiliter assumuntur.

DE CAPITIS DOLORE
EX ICTV.

Qui ex ictu capitis dolorem conceperunt, iis, nisi sum-
ma cute percussi sint, sanguis statim emittendus est,
& fots alii atque alii capiti sunt applicandi, lanis oleo
dulci imbutis ipsum operietur. Vino ciboq; pleniori,
præsertim si febris adest, ægros coercere expedit. Et to-
ta curatio ceu ad neruorum partium inflammationē
& præcipue membranarum cerebri quas meningas ap-
pellant, adaptabitur. Si uero & uulnus factū fuerit, huic
quoque decenter medebimur.

MALAGMA AD CEPHA-
LALGIAM.

Ceræ drachmæ septem, amygdalini olei uncia tres,
terebinthinæ drachmæ octo, æruginis rasæ, cimoliæ,
chalcitidis singulorum drachmæ quatuor, pumicis
drachmæ tres, æris usti, squamæ stomomatis singulo-
rum drachmæ duæ. Si uidetur paulo esse durius, amyg-
dalino emolliendum.

DE CEPHALAEA, ET HE-
micrania, Cap. V.

VTerque hic affectus, stabilis ac permanens capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, claritate lucis, uini potu, & implentibus caput odoribus excandescit exacuiturq; . Ac aliis totā feriri caput i hoc dolore, aliis alterā ipsius partē duntaxat excruciar i uidetur, quos etiam hemicranicos nominant. Quibus sanē intra caluariam malum consistit, iis dolor ad oculorum radices porrigitur: quibus extra est, circa ipsam caluariam in dolescunt. Quapropter dolores cum grauitate molesti, plenitudinem testantur, cum erosione infestantes, uel humorum, uel uaporum acrimoniā: qui cum pulsibus obueniunt, inflammationem: qui cum tentione, si quidē grauitas & pulsus non adsit, spiritus tenuis, & flatulenti redundantiam innuunt, si cum pulsu, membranosa paritis inflammationem: cum grauitate, humorum qui intra membranas se receperint, copiam. At si putridus etiā humor, calidior euaserit, iam cum febris simul caput dolitat, febriunt autem omnino, & quibus inflammatio dolorem parit. Quum igitur corpus totum succis & quabiliter omnibus redundat, quod plethoricum dicitur, uenam secare si uires patiantur, & acrisoribus uti clysteris cōuenit. Inde si adhuc sanguis uidetur exuberare, etiam uase narium adaperto quantum satis esse uidetur, detrahes. Mox hiera acris exhibenda, deinde pituita eductio nibus, apophlegmatissimos uocant, utendum est, tum his qui per nares uacuant, ἑρπια Græcis dicuntur. Eiusmodi est elaterii succus, cum lacte infusus, uel etiam aridū elaterium inspiratum, succusq; cyclamini & porri. Hæc quæ sequuntur, sunt composita. Medicamentum quod naribus inditur ad ueteres cephalæas, lippitudines & morbos comitiales. Nigellæ pondo drachmæ octo, salis ammoniaci, elaterii, singulorum pondo drachmæ quatuor. Tunsa, oleo sicyonio, uel irino, uel cyprio no excepta, ut cerati fiat spissitudo naribus demittuntur.

PAULI ÆGINETÆ
MEDICAMENTVM QVOD

pituitam extrahit, naribus inspiratum.

† Galenus Cyclamini sicci denarii octo, † nitri rubri denarii quatuor
adiicit iri or. Sin autem in uicem nitri elaterium indideris, magis
dis dena proficiet. Tritum accurate calamo scriptorio naribus in
rios duos spirabitur. Porro epithemata quoque capiti utiliter ap
plicantur. Item inunctiones, ubi morbus in uetustatem
inciderit.

EPITHEMA AD CEPHALÆAM.

† Galeno Vnguenti irini, peucedani, castorei singulorū drachma,
agnifemi baccarum lauri drachmæ duæ, † rutæ summitatū drach
nis, rosaz mæ quatuor. Excipitur cerato rosaceo, rasoz; capiti, to
sic caz sin ti ipsi imponitur. Mulier quædam in hemicranicis hoc
guloz etiam quod sequitur epithemate usa, mirandum in mos
drachmæ dum inclaruit. Radicem cucumis syluestris uiridem mi
duæ, rutæ nutim concisam, absinthiumq; cum hydrelæo incoque
bat: dum intabescerent. Ac hydrelæo calente mediocri
ter partem affectam irrorabat, radicem uero, & absin
thium in puluerem contrita oblinebat. Atq; hoc solo
medicamine, hemicranicos, id est altera capitis parte do
lentes & cum febre, & sine ipsa, curauit. At si malum ma
xime increuerit, ut dolorem ferre nequeant, utitor meo
dicamentis etiam quæ lenire possunt, & noxia euocare,
quale est quod sequitur.

VNGVENTVM AD CEPHALÆAM.

Liquoris peucedani drachmæ sedecim, lachrymæ pa
paueris, anisi, alterci quod hyoscyamum Græci uocant,
croci, myrrhæ, scammonia, singulorum drachmæ due.
Aceto excepta in pastillos coguntur. Cum usus postu
lat, ex aceto uel posca illinūtur iis, quibus humores cras
si, uel spiritus flatulentus dolorem fecit. Iam dropax &
sinapismus iisdem benefacit. Item pastillus ex thapsia,
præterea medicamen ex atramento scriptorio mirifice
eidem causæ medetur, quo in his eo modo utendum
est, sicut in opere de compositis docebitur. Quin &
istud mirabilem in modum ad hemicranicos ex crasso

glutinosoq; humore dolescentes efficacē est. Euphorbi
portio una cum pari castorei modo aqua excepta auri
culæ demittitur qua parte indolescit, inde balneum ad
eundum, ubi paululum immorati ipsum assument, & cō
suetō more lauabunt. Sic quidem expertum est, uerū
non alienum absurdumq; fuerit, & oleo ipsa excepta in
aurem instillare. Quod medicamē ad coxendices inscri
bitur, etiam longo capitis affectu laborantes, & hemicra
nicos ex toto per sanat.

AD HEMICRANIAM VETEREM.

Scordii drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, axung
iæ ueteris drachmæ duæ, cantharidum drachmæ
duæ. Vesperti illitum finito per noctem adhærere. Ma
ne rupta papula per liquido medicamine, *πρὸς τὸν* ap
pellant, ei medeberis. A L I V D. Baccarum lauri quib
bus cortex fit ablatu, ruræ foliorum, singulorum dena
rii duo, sinapios denarius. Aqua dilutum oblinito. At
iis qui frigori patuerunt, utilissimum est infra scriptum
medicamentum ut plerōsq; semel ante balineas illitum
confestim affectu liberaret & à lauacro (qui antea labo
rabant) in totum sanitati pristina restituerentur. Olei sa
bini pondo, ceræ quadrans, euphorbi uncia. Hoc dimi
diæ frontis parti, nempe qua temporum musculus
habetur, delini debet. Qui uero frigoris iniuriam
non senserunt, iis gallæ, & crocomagmatis parent
portionem cum uino detritam inungito. Sed qui
ex calidis uaporibus, uel succis capite dolitant, iis
medicamenta quæ euphorbio constant, non appli
cabis.

A P O P H L E G M A T I S M V S,

id est medicamentum pituitam

per os purgans contra

Cephalæam.

Sinapeos contriti & expressi, aceti, mellis, singulorum * drachmæ
35 unciæ quatuordecim herbæ pediculariæ drachmæ qua quatuor,
tuor, pyrethri tantundem. Tunsa cribrataq; miscentur, decim.

*Forte

PAVL ÆGINETÆ

& in sole gargarizanda dantur. Porro si ob biliosum humorem, aut quandam intemperiem orta Cephalæa diutius prorogetur, eorum usus ueniet quæ in capite de cephalalgia comprehensa sunt. Si ne sic quidem dolor finitur, neq; cucurbitulis, neq; hirundinibus adhibitis, sed humores per arterias distributi subsistant morenturq; in didem, non absurdum fuerit & arteriam post aures incidere. Porro humidioribus, etiam balineæ naturales recte adhibentur.

DE PHRENITIDE. Cap. VI.

Phrenitis membranarum cerebri, quas meningas appellant, inflammatio est, sicut ipsum quoque cerebrum eadem modo confligitur, modo calore à natura remoto æstuet. Causa morbi est, uel sanguis superans uel biliosus humor: nonnunquam & flaua bilis perusta, adeo ut in nigram degenerauerit, quæ etiam grauissimam phrenitidem contrahit. Aliquando cerebrum sincipitis consortio dolens, ex neruis qui in ipsum sparguntur uitium concipit, idq; in ardentissimarum febrium uigore, Porro quæ stomachi consensu gignitur mentis perturbatio, phrenitis non est, sed hoc solum puta delirium. Propria phrenitidis comes est plurima parte somnus difficilis: interdum quoque somnus turbulentus accedit, ut consurgant ægri, exiliant, & furibunde uociferent. Quibus sanguineus humor morbum fecit, cum risu ii insaniunt. Quibus flaua bilis, ferociter, quem admodum quibus atra uitium contraxit, tam immaniter sæuiunt ut coerceri nequeant, omnium quæ dicunt faciunt uel obliuiscuntur. Oculos habent cruentos ac sæpe perfricant: interim aridos, interim lachrymantes, uel ut crassior pituita innatet. Lingua est aspera, sanguis è naribus destillat: floccos festucasq; colligunt, febri per totum morbi decursum acuta conficiuntur: ut quæ in alto malignius delitescat. Pulsus edunt exiguos, languidos, & quadantenus duros. Respirant magnum, & raro, cum cerebri affectus per se excruciat. At si phrenitis

LIBER TERTIVS.

71

Septi transuersi, quod Græci phrenas uocant, consortio concitetur, & respiratio inæqualis est, & præcordia sursum conuelluntur, & multo calore ardent: sicut iis qui ex cerebri uitio insaniunt, frons incalescit & subcruenta est, uenarum puluini turgescunt. Quod si humor pituitosus sit temperatus bilioso, ut mixtam habet originem ita nomine composito uigilans coma uocatur. In uersum enim succo superate bilioso, uigil efficitur phrenitis. Contra pituitoso præstantiore, grauioris modo somni, quem *κοῦμα* Græci dicunt, sopiuntur. Atque hoc malum antiquiores Galeno medici, Catochon uocauerunt.

CVRATIO PHRENITIDIS.

Quod si uires egri patiantur sanguis protinus è cubito mitti debet, & copiosior. At si desipiens manum non porrigat, aut si porrigat, metus sit secundum uacuationem, sanguinis profluuii, dum manum æger subinde ob mentis turbationem iactitet, recta in fronte uena diuisa, una uice quod satis est auferemus. item clysteriis utemur, & enematis ex hydrelæo uel rosaceo cum ptisanæ cremore. Si uigiliæ urgent, rosaceum, uel oxyrhodinum in caput dandum est. Aliquando calida ipsum aqua fouendum, & medicamentum ex papauere exhibebitur, nisi uirtus imbecilla prohibeat. Et alia quæ ad somnum conciliandum superius scripta sunt huc transferemus. Decumbat æger in loco, tum lumine, tum temperie moderato: & uariis quibusdam picturis libero, nam hæc deterrent. Quo amici quidem gratisimi ingredientur, & commodum incident, qui nunc blande ægrotum alloquantur, nunc acerbius corripiant. Cibus primum esto aqua mulsa, deinde ptisanæ cremor, & sorbitiones ex chondro cum quadam dulci potione, uerbi causa, apomelite, uel hydrososato, uel rhodomelite, uel diluto hydromelite. Nam uinosum hydromel, quod in paruis uasculis ex Cibra apportatur, repudiandum, ut quod grauiores uino noxas in talibus excitet, & maxime in

PAULI AEGINETAE

capitis affectibus, idq; ante concoctionem. Panis quoque aqua lotus recte exhibetur, intubi, lactucæ elixæ. Si multus feruor conficiat, et cruda hæc dantur. Item cucumeris medulla, peponis, dorycnii, & similia. A quæ frigida potu coercendi sunt, potissimum si septum transuersum, consortii lege malo dedisse originem deprehenderimus. Quod si urina ipsis, ut consentaneum est, delirii uitio cohibeatur, calentis hydrelæi imbre & pubem & uesticam fouebimus. deinde digitis manus, loco innixis ad reddendum urinam incitabimus. Reliquum corpus ipsis decumbentibus calido oleo perungi debet. Etenim in quiete, quoad eius fieri licet contineri, si diuites fuerint, à famulis, si pauperes, uinculis conuenit. Nam inordinata motio uires conuellit. Iam uero alia etiam de causa pedes, prius foti, deligaturis constringi, manusq; contrectari debent, nempe quo humores deorsum reuellantur. Porro si longior affectus, & contumax fuerit ab iis quæ stuporem membris accersunt, abstinendum: ea uero quæ digerendi facultatem obtinent, capitis perfusionibus miscenda scilicet mentæ succus, uel serpilli, uel calaminthæ, uel rutæ. Tum iis quoque utendum quæ naribus inseruntur. A septimo die si uiscera sentiant inflammationem, cataplasmatibus ex lini semine, & hordeacea farina cum hydrelæo leniemus. Deinde cucurbitulas leues, aut cum scarificatione, tum his ipsis, tum occipitio, & spinæ accommodabimus. Si corpus squalidum perustumq; esse coniectaueris, febrisq; adsit, etiam balneis utendum aquæ potabilis, & unctione liberaliore. Vinum tenue & dilutum quod ἀλικοφόρον appellant uiribus recolligendis propinabimus, nullam inde mentis alienationem, ut est uerisimile, futura suspicantes. Aut enim nulla sit, cum status morbi est: aut certe si sit, ex facili subsidet. Cæterum ubi morbus se remiserit, gestatione corporis uti expedit, & congrua uirium recreatione. Sed ita phrenitici sese recolligent, ut ebrietas, otium, ciborum corruptiones, & in primis solis

æstum caueant.

DE INFLAMMATIONE cerebri.

Cap. VII.

5 **C**erebrum inflammatione laborans, sæpe ita intus
mescit, ut capitis futuræ distendantur. Dolor co
mitatur maximus, & diuturnus, uehemens ex res
pletione cibi fastidium, rubor in facie multus cum tu
more molli: oculi sunt proterui, caput inturgescit. Qui
hoc malo impliciti sunt, sanguinem ex cubito mittere,
10 item ex naribus, & uasis linguæ subditis debent. Por
rò ad inflammationes tum resperiones, tum cataplas
mata, quæ humectare & mollire sunt idonea, capiti re
cte inducuntur.

DE ERYSIPELATE CERE

bri.

Cap. VIII.

15 **A**ccidit quoque erysipelas cerebro, quo labo
rans hæc patitur capite dolet uniuerso, adeo ut
flammi id uri putet, facies frigida est, & subpal
lida, os aridum. Quare qui in tanto affectu sanguis des
trahendus est, & potissimum ex uenis sub lingua sitis.
20 Refrigerantia conueniunt: quibus in aliis quoque erysi
pelatis utimur.

DE LETHARGO. Cap. IX.

25 **L**ethargus itidem, cum ratiocinatricis animæ noxa
sit aliqua, locum eundem quem phrenitis, nempe
cerebrum, occupat: origo uero mali, contraria
est. Nam ex pituita, quæ frigore nimio & humidis
tate cerebrum imbuerit, contrahitur. Lethargicos
comitatur febris lenta, non impense acris commo
30 uensq; , cum profunda animi in somnum delatione.
Pulsus his magni, rarique sunt, & turbulenti.
Respiratio nimis rara & imbecillis. Marcorque &
prode inexpugnabilis dormiendi necessitas. Vix,
quocunque modo interpellentur, respondent. Om
35 nium ueluti amentes obliuiscuntur. Oscitant crebro,
& hiante ore aliquandiu persistunt, tanquam claudere

PAULI AEGINETAE

Id oblitum. Deliciunt per aluum magna ex parte, liquidiora. Nonnullis contra uenter inarescit. Urinam reddunt iumentis similem. Quidam ex eis tremiscunt, & sudoribus undiquaque madent. Huic affectui respondet Carus ex eadem materie proficiscens: sed hoc discrimine uariat, febris Carum praecedit, eaque uehementior. Lethargum subsequitur ignauior. Item Carus aliquot aliis affectibus superuenit, febrium, exempli gratia, accessionibus, comitalibus: cerebri compressionibus, modo caluaria confRACTA, modo oblata membrana, quae priorem cerebri uentriculum contegit, μηνι' Γ' οφύ' λ' α' κ' α' Graeci nominant. Lethargus autem peculiarem causam obtinet.

CURATIO LETHARGI.

Vires si permittunt, etiam hic uena secari debet. Sin minus, clysteris acerbis aluum ducemus. Aeger decumbet in domo spatiosa, mediocriter lucida. Caput eius oleo perfundi oportet, cui etiam castoreum sit adiectum. Nonnulli inuicem olei oxyrhodino cum castoreo utuntur. Robur hinc capiti caloremque simul accersentes. Reliquum uero corpus, & praecipue extrema, oleo impleta ueteri cum nitro tosto, uel pyrethro, uel pipere, uel cocco gnidio extergunt. Licet & cerato quod his, & castoreo simul constet, uti. Porro naribus admoventur thymum ex aceto contritum, aut origanum, aut pulegium. Os ungitur, & palati coelum detrito sinapi, cum mellis momento. Conarique oportet pituitam indidem affixam digitis elicere. Si admittantur, etiam apophlegmatismi usus erit ex oxymelite cum hyssopo, aut pulegio, aut origano, aut ipso quoque sinapi. Potui exhibebitur aliquid ex iis, quae cito transeunt, praesertim diospolites cochleari mensura cum posca. In iis qui tremore concutuntur diuturno, castorei quoque scrupulos duos tres uedabimus, si humoris inest copia, nihilque aliud prohibeat, scammoniae scrupulum, castoreo temperatum. At si his affectus non discutitur, caput radendum, deinde fouendum

fouendum est sale, milio, & similibus per sacculos adhi-
bitis. Ad hæc sinapismis uti in capite prodest, tum iis
quæ per sternutamenta euocantur. Postea cucurbitulas
occipitio agglutinare: partim leues cum multa flamma,
5 partim cum scarificatione. Præterea ad natura excretio-
nes frequenter sollicitare oportebit, tum iniectionibus, tū
iis quæ urinam mouent. Pubem oleo rutaceo, aut sycio
nio, cui sit adiectum castorei paululum, aspergere. Iam
uero ut deglutiant crebrius admonebimus ex calida
10 aqua dulcem quandam potionem, præsertim ex apo-
melite confectam, bombylio ori instillantes. Quod si
mediam infestet regionem cerebri inflammatio, huic
istidem medebimur superfusionibus & cataplasmatibus.
Naribus sinapi aceto tritum, uel castoreum ustum ad-
15 mouere profuerit. Alimentum esto cremor ptisanæ, uel
auenæ, uel alicæ cum oxymelite, uel salibus, uel pule-
gio: nunc quotidie, nunc uno die interposito. A cibo, uin-
ci debent: summa diu cedere oportet, cruraq; punge-
re: nonnunquam pilos etiam in ipsis uehementius eue-
20 lere coniti quo excitentur. Iam femora & crura exulo-
cerata subinde profunt. Cæterum ubi morbus inclinare
inceperit, gestatio statim continua utilis est, & balneum.
Vitus qui res recolligat, recreetq; deceter adhibendus.

DE CATOCHO, AUT VI-

gili comate.

Cap. X.

35 **H**uius morbi causam, ubi de phrenitide sermo
est habitus, sumus cōplexi. notæ, ut summatim
dicam, communes quodammodo sunt phreni-
tidis & lethargi. Sed pro materia abundante uariant, pe-
culiares autem hæ. Inuadit hoc mali hominem supinū,
30 ex porrectum q; cuius alias facies subtumescit, & modice
lethargicorum modo liuet: alias rubescit, & superior
gena sursum conuelli uidetur, ac excedere ut ne conu-
uere qdē æger queat: respiratio nulla apparet, sed quasi
35 emortuus decūbit. pulsus est exiguus, languidus, & cre-
berrimus. Urina & aluus nihil, aut certe parum reddūt.

PAV. ÆGIN.

K

PAULI AEGINETÆ

Qui meliuscule habent, nec tam graui premuntur affe-
ctu, liquorem aliquem infusum deglutiunt: qui uero ma-
lo uicti sunt, ad nares regurgitant. Itaque pituita bilem
superante affectos à lethargicis discernimus, eo quòd
neq; facies tumescit, neq; liuida est, sicut lethargicis. præ
terea quòd paulatim etiam leuiter desudant. In iis pe-
riculum maius est, quibus peruigilium adest continens,
urinæ non respondent, difficilis inspiratio intenditur, su-
dores erumpunt, & ad nares potus resorbetur. At si mu-
lier hoc laborare uitio cœperit, ab ea quæ uulua strans
gulatu corripitur, hac nota discernes, quòd naturaliter
iacere uideatur, & inclamantes percipiat, excitetur, rur-
susq; somno graui sopiatur. Interim dicunt etiam pri-
uatim diuersum q; à uigili comate catochon fieri, cum
simplicem non mixtam habebit causam, nimirum fri-
gidiorē sicciorēq; materiam, quæ posteriore cere-
bri uentriculo repleto malum hoc excitarit. Quo qui
corripitur repente, in illo permanet habitu, quo corre-
ptus est, stans scilicet, uel sedens, clausis oculis, aut respi-
ciens. Quam ob causam antiquiores Græci hoc deten-
tos morbo, catochos uel catochomenos, quasi dicas
occupatos deprehensosq; nominauerunt: recentiores
affectum fœminino genere catochen & catalepsi uelu-
ti detentionem & deprehensionem. Curatio prædictis
est similis, sed ea quæ superueniunt diuersam postulant
animaduersionem.

CURATIO CATOCHI.

Huic quoq; malo sanguinis missione succurritur, præ-
sertim in quibus facies rubescit, modo uires suadeant:
aut clysteres iniiciendi, partim q; pituitam pollentem eli-
ciant, partim qui bilem abundantem leniant. pari modo
aliorū quoq; præsidiorū ratio utilis est. Similiter ægros
nutrire confert, interim diebus singulis, interim uno in-
terposito. Porro affectus admodum periculosus est, si
aut uictu aut potu erretur. Quibus uomere ex usu est,
si statim ad id cogendi sunt, ac ore uentriculi submisso

cura adhibenda ne aluus irriteretur, ac uiscera resperfusionibus ex cumino aut ruta foueantur. Qui ex ebrietate uitium conceperunt, crapula dissoluta, humidior cibo tractandi sunt, qualis est ptisanæ cremor. Præterea caput inunctionibus congruis perfundetur, per æstatem frigidis, per hyemen egelidis. Si nequaquam crapula soluitur, neque ad sobrietatem reditus est, tanquam deplo-rata ualeitudinis hominem uitare oportet.

DE MEMORIÆ IACTURA,

& ratiocinationis, item de sopore, & fatuitate. Cap. XI.

Memoriæ iactura partim per se, partim etiam cū quadam ratiocinationis labe accidit: quemadmodum & mentis seu ratiocinandi facultatis noxa priuatim prius incipit, deinde memoriæ iactura insequitur. Verum cum utraq; pars, mens inquam & memoria male fuerit affecta, tunc fatuitas seu stultitia, quæ Græcis morosis appellatur, oboritur. causa malorum est, noua intemperies, quæ partes illas pertinaciter obsidet. Quod si humida solum fuerit, memoriæ & ratiocinationis uitium creabit, torporesq; quos Græci *θωπντας* uocant, & in somnum longas profundasq; delationes. Si uero humori frigiditas etiam accesserit, sopores & lethargos. Eodemq; modo si sola fuerit siccitas, uigilias tantum inducit. At si calor accesserit siccitati, deliria, & phrenitidas mouebit. Porro intemperies hæ nonnunquam obueniunt humoribus: nonnunquā cerebri uentriculis, uel ipsius uasis: uel utiq; humiditati insparæ, uel ipsimet cerebri corpori, uel etiam temporum musculis tali modo uitatis. At si humores cum ipsis sint mixti, similem quoq; morbum experientur: uerum simplex, an composita sit intemperies efficiens, ex specie excrementorum condisces. Quod enim memoriæ & ratiocinationis iactura, frigiditatis soboles existat, compertum habemus. Humiditati uero, an siccitati iuncta sit, ex recrementis, ægri habitu, temperatura,

K ii

P A V L I Æ G I N E T Æ

nictus ratione, anni tempore & loco deprehendemus.

C V R A T I O.

Si frigida male habuerit intemperies, calefacere, si humiditati iuncta sit, etiam exiccare oportet: rursus si mixta cum siccitate, humectare simul & calefacere. Pari modo etiam in calida intemperie refrigerare conuenit. si siccitas accesserit, pariter humectare: si humiditas, refrigerare simul & siccare. In quibus sanguinem deprehendis abundantem, uenam aperire, uel clysteriis acerbis uti consilium est. Deinde etiam hiera amara, & apophlegmatissimis. Item inunctiones capiti sunt inducendæ ex oleo, cui adiecta sint quæ refrigerant exiccantq; , rosæ dico, myrti, iuncus, aliaq; similia. Ad hæc totius corporis sollicitudo habenda est. Quod si æstu & lassitudine orta fuerit intemperies, caput oxyrrhodino perfundendum, tum reliqua curandi ratione frigida humectaq; uti conuenit. Inter cætera & cibo & potu simili. Quod si caros fatuitati, uel obliuioni accedat, huic etiam succurrendum est, ut in lethargicis prius comprehendimus, ubi & ipsorum discrimen explicitum est.

D E V E R T I G I N I B V S. Cap. XII.

Vertiginum affectus nascitur cum frigidus, glutinosusq; humor cerebrum occupat. Vnde leui occasione protinus etiã concidunt, ueluti quando aliqua circūagi extrinsecus aspexerint, ut rotas, turbinesve, aut quando etiam ipsi circūaguntur. Interim ubi capite incalescunt humoribus in eo commotis, uel et spiritu: Interim prioribus cerebri uentriculis, caluariæ cōfractæ perforatu pressis, in quibus etiam uehementes oboriuntur cruciatus. præcedit autem primarium capitis affectum uehemens dolor, torpor, & aurium sonitus. quidam olfactu læduntur, nonnulli gustu. Quibus autē uentriculi oris consortium rosionem stomachi, quam cardiogmon Græci appellant, accersit, etiam nausea susperuenit.

Vertiginosos in accessione quidem medicamentis quæ
 odore mouent, excitare conuenit, item frictionibus, &
 id genus aliis. Vbi morbus conquerit, eius discutiendi
 5 gratia sanguis primum mittendus est. deinde purgatio
 ex hiera præstanda. Interpositis diebus acri clystere ex
 centaurei, uel cucurbitæ syluestris decocto utendum est.
 Secundum huiusmodi uacuationes caput ipsum cucur
 bitulis ad occipitium cū scarificatione lancinari debet,
 10 mox apophlegmatismi, id est medicamenta quæ pituita
 per os eliciant assumi, & sternutamēta moueri. At quos
 capitis calor, aurium q; sonitus male habet, ceu uaporis
 bus calidioribus per arterias sursum elatis, etiam arterie
 sectio retro aures iis adhibenda est: ut in parte chirurgis
 15 ca sumus dicturi.

DE MORBO COMITIALI.

Cap. XIII.

MOrbus comitalis, cum totius corporis sit cons
 uulsio, sed ita ut principis animæ functionū no
 20 xa comitetur, partim in ipso cerebro, partim in
 uniuerfis huius uentriculis causam habet subsistentem:
 modo humorem pituitosum, modo melancholicū. Itē
 ore uentriculi affecto consortii quadam lege oboritur.
 quēadmodū in colicis quoq; sicut in illorum capite exe
 25 quemur. Iam uero aliis quoq; partibus contagionem
 impartiētibz nascitur, cum ueluti aura quædā frigidior
 ad cerebrum ascendit, alias à crure, alias à manus digito
 tis. Insuper uisus est quandoq; prouenire ēt in quadam
 muliere ab utero quo tpe esset grauida. A partu edito
 30 cessauit. Occupat hoc morbi genus maxime pueros
 eosq; adhuc paruulos. deinde adolefcētes & iuuenes,
 minime senes & decrepitos. Præcedit igitur comitiales
 corporis animiq; status minime arbitrarius, tristitia, eorū
 q iuxta sunt obliuio, turbulentæ insomniorū imagines,
 35 capitis dolor, eiusq; repletio cōtinua, ob iracundiā ma
 xime pallor faciei, & inordinatus lingue motus: nōnulli

PAULI AEGINETÆ

ipsam quoque commordent. Quibus à stomacho uitiū
 oritur, palpitatio ipsius præcedit tumultus & erosio. Iam
 ex inedia seu cibo tardius assumpto, excandescunt. In
 hoc casu, quamprimum inuasit, ægri concidunt, con-
 uellunturque, tum impotens quædam uox interdum sub-
 oritur. Sed peculiaris admodum mali nota est oris spu-
 ma. Quippe alia communiter aliis quoque morbis eue-
 niunt. Non desunt etiam quibus urina & stercores præter
 uoluntatē excernitur. nonnullis & genitara. In quibus igitur
 acutissimus est effectus, statim iugulat, & tam crebris
 accessionibus, & eorum quæ accidunt, uehementia. Ac
 plerisque longus esse solet. Nam si non pubertate uel men-
 struorum initio, uel puerperio solutus fuerit, uel si post
 hoc tempus remanserit, sæpe usque ad mortis dilem pro-
 rogatur, nisi congruam medici curationem fuerit affecu-
 tus. Coarguunt comitiales suffimenta, bitumen, uel lapis
 gagates, uel cornu caprillum, iecur hircinum comestū,
 & iecoris tosti odor.

CURATIO.

Si infans ægrotus fuerit, nihil moliendum est. nam æta-
 te ad biliosiores, siccioresque, statum uergente, & uictu
 moderatiore, sua sponte plerumque morbus finitur. adeo
 ut solius uictus infantium, & eorum qui lacte nutriuntur
 ratio sit habenda. quæ post annos pueriles in morbum hunc
 plabuntur, eorum partes conuulsæ ac distractæ pingui asp-
 ergine adiuuari, contineri & in rectum dirigi debent. Deinde
 ore distento digitus demitti, aut pinna oleo irino uncta,
 pituitæ auferendæ gratia. Quin & medicamentis quæ
 naribus adhibentur sensum mouere cōuenit, exempli gra-
 tia, peucedano, cyrenaico liquore, bitumine, pice cedri-
 na. Post accessiones si nihil prohibet, sanguis utique à cu-
 bito mittendus est. At si nihil remittat accessio, summæ
 partes sinapi implendæ sunt. cucurbitula præcordiis de-
 figetur. Quod si nec his morbus cōprimitur, minimū
 in medicina spei superest. nihilo secius tamen medicus
 animo confidente castoreum necessitate adactus & liq-

quorem cyrenaicum cū melle & aceto ori infundet. in
anum centaurei decoctū, uel cucurbitæ syluestris dabit.
Qui conualescunt uiribus ante recreatis purgatione ex
hiera sollicitandi sunt. Hæc sanè est recētis & acuti mor-
bi comitialis curatio. deiceps quomodo inueterato suc-
curratur trademus. Itaq; ægrotos aquam diu bibere
expedit, ac si nihil obest, sanguinem dimittere. Interpo-
sitis quatuor aut quinque diebus corpusculum reficere, &
sic purgante medicamento sollicitare, præsertim ueratro
nigro, uel cucurbita syluestri, uel certe scammonia. Por-
ro ueratrum sine medulla tunsum cribratumq; aquæ
mulsæ cyathis quinque; uel sex inspergere oportet, aut
melle crudo cum piperis momento excipere. Cucurbi-
tæ uero, semine eiecto medullaq;, implebis ipsam pas-
so, finesq; totā noctē cōmādescere. Mane passum tēpe-
ratū potui dabitur. Vel ēt medicamēto ex ueratro albo
purgationē molieris: qđ hæc recipit: baccarū lauri pur-
gatarū, piperis albi, alypiados, euphorbii, ueratri albi, sin-
gulorū drachmas octo. Hoc totū datur cū passo qđ in
cucurbita syluestri pnoctarit, probe uacuat per uomitiū.
Vbi uero sat purgati sunt, ægri balneo credētur. Tertio
die in præcordiis & dorso cute scapello incisa cucur-
bitulæ affigendæ sunt. Deinde cōplusculis diebus inter-
positis corpus nutriendū est, & hiera diacolocynthidos
assumi debet, postea capiti & occipitio cucurbitula ag-
glutinari. Sequenti die panis coctus in mulsæ, tritus autē
cum amaris amygdalis, uel serpillio, uel menta, uel cala-
mintha uel ruta superdandus. Atque id per triduū con-
tinuabitur. Ab hoc, caput tondendum est, & peucedani
liquore cui spondylium incoctum sit, ex aceto diluto
perungendum. Rursus corpore interea recreato anti-
doti diacolocynthidos, oboli nouem ex aqua mulsæ
exhibentur. Interposito tempore, interpositis rursus die-
bus clyster ex centaurio & colocynthide, deinde hiera
rursus dabitur, iterum tres ex antidoto offerre conue-
nit. Inde medicamentis uti quæ sternutamenta citant.

PAULI AEGINETÆ

Post quinque decemve dies, castoreum ex mulla præbe-
tur, mox quæ pituitam per os & nares educant, deinde
sinapismus capiti inducitur. Item uomitiones ciborum
acremento, cum opportunitas est, ciere expedit. Auxil-
liatur his etiam oxymel scilliticum quotidie potum, &
mel, in quo scilla intabuerit, instar cochlearii assumptum.
Victus ratio utilis est quæ incidat extenuetq;. Capparis
igitur frequenter esus & salsamentum prodest. Fugere
oportet carnes, legumina, uinum copiosius, uenerem li-
beraliorem, balnea, sinapi, & potum statim à balneo, præ-
sertim uini meraci. Exercitia profunt & frictiones, sed ca-
piti post reliquas omnes corporis partes adhibita.

DE IIS QUI STOMACHI VI-

tio comitali morbo corripuntur.

Si stomachus primario affectus, morbum inuenerit, sol-
licitudo habenda est, ut ex facili æger concoquat. Panis
igitur accurate elaboratus ex uino temperato quod leui-
ter astringat, albumq; colore sit, ad horam tertiam res-
te assumitur. Item medicamentum ex aloe, bis terve
singulis annis dare his expedit. Noui autem quādoq;
puellum (inquit Galenus) neutiquam hoc tentatum po-
stea morbo, quā radice glycydis (dicit autē pæo-
niam magnam recentemq;) ex collo suspensam gesser-
at. Insuper agaricum opitulatur comitalibus, idē præ-
stat seseli, spondylii fructus, radixq;, aristolochia rotunda
ex aqua pota. Non parum huc facit & continua cru-
rum scarificatio.

DE IIS QUI A PARTICU-

la quadam morbum concipiunt.

Vbi casus hic inuadere hominem ex particula percipi-
tur, siue ea fuerit manus, siue pes, siue excipi ualenter
debet quæ superposita est. Cum remittit, adurens quod-
dam medicamentum particulae inducetur, cuiusmodi
est lepidium, & diacantharidos similiaq;. Ad hæc oxy-
mel Iulianum comitiales uehementer adiuuat, particu-
latim materiā cōmouens. Post omnia cōmemorata &

Theriace, & naturales balineæ locum obtinent. per totum autem uitæ curriculum cauenda maxime cruditas cibis ante concoctionem obitam, isq; crassi succi, tarda nutritio, commotio, uinum largius & potus à balneo, sicut comprehensum est, maxime meracus, præterea ualde uetusta, crassaq; uina, tū acria ex his quæ odore mouent, & caput replent, loci præcipitis inconuiuentis conspectus, in balneo mora, Postremo curandum ne caput insolatu uratur.

DE MELANCHOLIA. Cap. XIII.

Melancholia mentis quædam alienatio est sine febris, ex melancholico maxime humore nascens qui mentis sedem occupauerit: aliàs cerebro ipso per se ægrotante, aliàs cum toto corpore immutato. Tertia uero melancholiæ species est, quam flatulentam & à præcordiis hypochondriacam appellant, ob inflammata circa stomachum præcordia proueniens, quæ modo auram quandam maligniorem, modo substantiæ humoris partem ad cerebrum sursum transmittant. Communia omnium signa sunt, metus, tristitia, odium hominum. Item alii se credunt animalia quædam bruta esse, & uoces ipsorum imitantur. Alii uasa fœtilia, metuuntq; ne rumpantur. Hi mortem expetunt, illi eandem expauescunt, nonnulli semper rident, nonnulli plorant. Alii uero putant à maiore quadam ui se defendi ornariq; & uaticinantur futura, non aliter quàm uates & diuinaculi quos Græci *μάντις* proprie nominant. Peculiare notæ eorum sunt, qui ex totius corporis consensu melancholia laborant, gracilis corporis habitus, niger, hirsutus & ex toto melancholicus, uel natura, uel etiam ex acquisito per sollicitudines quasdam, aut uigilias aut prauorum ciborum esus, aut emorrhoidum, aut menstruorum suppressionem. At qui ex præcordiis hoc uitii conceperunt, eos testantur cruditates acidi ructus, ardor, & ipsorum grauitas, tum quod præcordia sursum conuellantur, interim inflammatione consistantur. Ad

PAULI ÆGINETÆ

hæc quod tam incipientem morbum q̄ maiorem iam effectum melancholica comitentur symptomata, quod q̄ hac leuentur, concoctione, uel excretionē, uel multis flatibus, uel uomitu, uel ructu. Cum autem nullum ex his, aut certe pauca eueniunt, melancholica quæ apparent signa cerebrum primario affici in totum succi contagione melancholici fatentur. Porro si quando flauæ bilis supra modum exultæ in nigram fiat mutatio, insaniam dictam græce maniam inferet, cuius impetu ferarū modo redduntur effrenes, ut etiam eos qui imprudentius ipsis occurrunt, manu uiolenter tractent.

CVRATIO MELANCHOLIÆ.

Quiligiē ex primario cerebri affectu melancholici sunt crebris balneis, uictu boni succi & humido curantur, unā cum decenti animi delectatione, sine alio præsidio, cum humor qui molestat nondum ob temporis longitudinem excerni contumax est, quando ualentiora magisq̄ uaria tentare oportet remedia. Itaque purgentur per initia epithymo, aut aloë. Nā uel pauxillū ex his sumptū quotidie maxime iuuat, & leuiter aluum subducit. ubi purgati fuerint, uti dictum est, absinthium propinabitur: nunc herba ipsa duobus aq̄ cyathis perfusa incocta q̄, nūc eius succi drachma semisis, aqua continue liquefacta. Aceti q̄ acerrimi modicū sorbitioni datur somnum inituro. Iam multa obsonia in id intincta esse conuenit. præstantius autem erit acetum, in quo scilla, polium, & tenuis aristolochia commaduerit. Cum igitur morbū forte curandum susceperis, qui quidem ex totius corporis affectus consortio, ut supra dictum est, trahit originē uires aut sint ualentes: a sanguinis misitione incipiendum est. Interposito deinde tpe, uiribus relictis, inferius purgare conuenit medicamento ex cucumere, tum eo quod constat nigro ueratro. Porro si hæmorrhoidibus aut mensibus suppressis malum fuerit concitatum, horum quoq̄ purgationem moliemur. Laudantur etiam facultates, tum quæ urinæ ciendæ sunt, tum quæ per

sudores purgant. Si præcordiorum offensione morbus
 debetur, & horum habenda erit sollicitudo. fovebuntur
 ipsa rutæ decocto perfusa: item anethi, absinthii, pulegii
 agni seminis, & fructus lauri. Hæc etenim dolores quos
 5 que leniunt, & flatus discutunt, oleo incocta, & sic affec-
 tæ parti applicata. Cæterum præter hæc insint cataplas-
 matis etiã ea quæ flatibus discutiendis faciunt. nempe
 apium, uel anisum, uel cuminum. Nil mali fuerit, si inda-
 tur cataplasmati & cyperus, & iris, & libanotis quam ros-
 10 marinum uocant. Cum hæc admoues, longo tempore
 per diem & pasto & ieiunio adhærere fines. Vbi ademe-
 ris, aliud quoddam operimentum superaccommoda-
 to, lanam scilicet latiore. Cucurbitulis ad flatus diges-
 rendos leuibus utitor ad dolores inflammationesque
 15 cum scarificatione. Porro adhibita curationi diligen-
 tia, nec sinapis obliuiscere, sed acribus incidendi uirtute
 præditi, & dropacibus super dorsum, uentremque uti
 conuenit. Quibus uitium inueterauerit, præsentissimũ
 est remedium perueratrum album uomitumque purga-
 20 tio. Viæus omnibus melancholicis conferet probi suc-
 ci, & mediocriter humidus. Vitanda sunt, caro bubula,
 ceruina, lenticula, brassicæ, cochleæ, uina, crassa & nigra
 breuiter, quæ atram bilem generant.

CVRATIO INSANIÆ.

25 Insanientes consimilem melancholicis curationem re-
 ciunt. Propriam uero habent, ut caput ipsorum ros-
 faceo tum unguine, tum aceto perfundatur. Item
 per antidotum picram, id est amaram, utilis est post san-
 guinis dimissionem purgatio, necnon hirudines capiti
 30 admotæ. Vnice ipsos iuuat hippomarathi radix, semẽ
 eius ex aqua potum. Insuper bryoniæ radice dena-
 rius ex aqua quotidie assumptus. Sin aut delirantes purgã-
 tium medicamentorum potionem renuat, interim ut fa-
 cilius fallat ipsos, cibus nepe buccellis, uel ficubus pingu-
 35 bus, uel palmulis, interdum potionibus adicienda sunt. An-
 te oia uero in lecto uinciendi, ne uel sibi, uel alteri noceat.

PAULI AEGINETÆ

Aut gestandi lectulo, intra cubile quoddam insanientibus dicatum, pensili.

DE INCVBONE, QVI

ephialtes Græce dicitur.

Cap. XV.

EPhialten, qui latinis incubo est, aliqui ab eius nominis homine dictum asserunt, uel inde quod hoc malo, correpti ab aliquo se inuadi imaginentur. Themison tamen decimo epistolarum uolumine à suffocando pnigalionem appellauit. Constituitur id uitii ex crapula, & continua stomachi cruditate. Comitatur eo detentos difficilis motus, torpidus in somno sensus, suffocationis imaginatio, & ueluti ingruentis cuiusdam mali occupatio. Ad hæc uox supprimitur aut incerta in discretæq; editur. Nonnulli in se grassatos etiam audire & ab eis uenerem exigere putant. sed compressis eos digitis fugere. Cui malo succurrendum est per initia. Nam si diutius se prorogauerit crebroq; eos per nocte opprimat, grauius aliquod nuntiatur malum, ut apoplexia, insania, & morbus comitialis, cum primum in caput huius uitii causa ferri coeperit. Quæ enim comitiales interdium, eadem ephialtici dormientes noctu patiuntur. Itaque commodum est sanguinis detractione & purgationibus uniuersum ægri corpus uacuare. Maxime his opitulatur, nigri ueratri denarius, cui scammonia obolites sint adiecti. Item nonnulla ex odoratis, anisum, daucum, petroselinum. Iam hiera diacolocynthidos, id est ex cucurbita syluestri strenue auxiliatur: est autem ea quæ ad Rufum authorem refertur. Viduus sit tenuis, non qui inflationes pariat. Succurrit ipsis & pæonia semen. Dandaq; sunt potui continue grana eius quindecim nigra in aqua contrita.

DE LYCAONE, VEL LY

canthropia, id est hominum in lu

pos conuersione.

Cap. XVI.

Qui lycanthropia detinentur, noctu domo egres-
si, lupos in cunctis imitantur, & donec dies illu-
cescat, circa defunctorum monumenta plerun-
que uagantur. Hæ comites ipsorum notæ sunt, facies
pallida, oculi sicci, & ad uidendum imbecilli, lingua ar-
disima, nulla in ore saliuæ, sitis immodica, tibiæ sine re-
medio exulceratæ, quod frequenti per noctem eius par-
tis offensione accidit. Tales quidem sunt notæ. Species
autem melancholiæ hoc malum est, curandumq; in ac-
cessione tempore: sanguis ex uena ad animi usque de-
fectum detrahatur, cibus probi succi æger, & balneis dul-
cis aquæ sustinendus est. deinde lactis sero per triduum
usus, etiam hiera diacolocynthidos, bis terve purgabi-
tur. Ab his purgationibus, theriacen quoque ex uiperis
assumet. ac alia reliqua in melancholico affectu com-
memorata. Inuadenti iam morbo, asperginibus som-
num accersere conuenit, in id efficacibus, ubi sonnus ac-
cesserit, nares opio illinuntur.

DE AMANTIBVS. Cap. XVII.

AMores cerebri affectibus annumerare cum sint
quædam curæ, haud fuerit absurdum. Cura ue-
ro affectus est animi, ratiocinatione in motu la-
borioso occupata. Hæ sequaces amantium sunt notæ.
Oculi concaui non illachrymant, sed tanquam uolupta-
te pleni apparent, continens palpebrarum motus, & cū
reliquæ corporis partes non collabuntur solæ hæ amā-
tibus concidunt. Pulsus ipsorum proprius nullus est, ut
quidam opinati sunt, uerum qualis eorum deprehendi-
tur, qui cura conficiuntur. Cum uero res amata in men-
tem ipsis uel auditu, uel uisu, & præsertim repente uene-
rit, tunc pulsus animo turbato contingit immutari, ne-
que naturalem æqualitatem, neque ordinem retinere.
Hos igitur & tristes, & uigiliis torfos nonnulli qui dispo-
sitionem ignorarent, nullo balnei usu, solitudine & te-
nui uictu consumpserunt, in quibus sapientiores cum
amantem deprehendunt, ad balnea, computationem,

PAULI AEGINETAE

gestationem, ludos fabulasq; animum abducunt, nonnullis metum incutere conuenit. Nam qui amoris semper indulgent, iis difficulter abigi potest affectio. Quidam igitur obiurgandi sunt, ex ratione uitae quam singuli delegerint, In uniuersum mens ad alias curas abducenda est.

DE APOPLEXIA ET HEMIPLEXIA, uel paralyfi. Cap. XVIII.

Quando commune neruorum principium affectum est, eoq; omnes corporis particulae motum simul & sensum amiserunt, apoplexia morbus appellatur, acciditq; principalibus animi functionibus oblaesis. Sin autem in altera corporis parte obstrutio fuerit oborta, hemiplexia & paralyfis nominatur. Si unam quandam particulam talis nox occupauerit, illius affectio particulae dicitur: quippe Hippocrates memoriae prodit, Attonitum ipsi crus euaserat. Seruatur itaque in attonitis modica quaedam respiratio: quae si per multum a naturali functione recesserit, maximum inferet malum: si paululum, exiguum. Deterrima uero est, cum intermittitur, uel etiam ubi magna cum uiolentia ingruit. Origo uitii est ex frigidiore pituita, quae principalissimos cerebri uentriculos una uice & cumulatim repleat. Cum spinalis medullae principium quandoque totum huic conflictatur malo, omnes faciei subiectae partes resoluuntur, ipsa manente incolumi, eo quod sensum motumq; partes quae ibidem habentur, a cerebro excipiant. Cum dimidia ipsius regio infestatur, eius paralyxia constituitur, si odoratus uitiatus fuerit, uel ad priores cerebri uentriculos intemperiem expertos, uel ad meatus qui a percolando ethmoides dicuntur obstructos talis referetur affectio. Itaque procumbunt attoniti, intermoritur uox, sensus motusq; citra febre. Praecedat hoc mali, capitis turbatio, acutus dolor, & uenarum circa guttur extantium, sphagitidas Graeci uocant, thorus ruli prominentes, tenebrae oculis offusae: itemq; splendores eisdem oborti, extremarum partium sine ratione

algores, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentium inter dormiendum stridores, urina, ueluti æruginosa, atra, modica, & quod in ea subsidet, farinæ speciem refert. Id genus occupat senes potius, & temperatura pituitosiores, uictuq; ufos consimili. At si iuuenes, & per æstatem infestet, uagnam necessitatem fatetur.

C V R A T I O.

Apoplexiæ morbus, nequaquam. aut raro cûratur, ut t mortem in propinquo minetur. Si uero etiam remedia ipsum sustulerunt, plurimum cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit. Qui igitur quoquo modo curationem recipiunt, iis statim sanguis ex uena detrahendus est, & si remissionem quandam habuerit, detrahendum eadem die, aut sequenti, aluum acri clystere ex muria & melle contemperatis ducere. Deinde oleo copiosiore sulfurato totum corpus perungere caputque chamemælinò, uel anethino, oleo quo spondylium decoctum sit calamintha, mulsæque instillatur, ea quæ odore mouent, naribus admouentur, uti opopanax, uel sagapenum, & galbanum, uel castoreum. Oportet autem & ori per uim aperto digitum, uel pinnam oleo madefactam inferere, ut ea quæ insunt eiiciantur. Cæterum sedes etiam iis que flatus educunt, perungenda est: mulsæ uel oxymel potioni dabitur.

Quinetiam apophlegmatismis ex thymo, uel origano cum aceto decoctis utemur. Vbi morbus se remiserit, cibis mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Si uox nondum redit, & uires permittunt, cucurbitulæ occipitio cum scarificatione defiguntur. si fieri possit etiam præcordiis. deinde gestabuntur ægri curru, aut lectica, aut lecto pensili. Valetudini faciunt & quæ sternutamenta excitant crebrius adhibita. Item quæ pituitæ per os educendæ sunt, apophlegmatismos nominant. Vbi quatuordecim dies morbus excessit, ad reliquas gestationes ducetur. Cæteræ sermonis sollicitudo habenda est. uetus apomeli cû micis panis, uel alica dabit: mox paulillū ex hiera. Post XX I diē balneo ægroti credentur.

PAULI AEGINETAE

Vinum tenerum calente aqua temperatum potui exhibebitur. vires autem balneis & unctionibus reficiendae sunt. Loca uero mari uicina, si fieri potest, huic morbo deligentur.

CVRATIO RESOLVTIO

nis, quae paresis dicitur.

At si principis animae functionibus liberis, omnium particularum resolutio acciderit, etiam qui has molestat humor, qualiscunque ille fuerit, euacuari debet. Mox hiera, cui castorei quoque pars sit adiecta, dabitur per initia drachma semisis, cum tantillo, mellis, & aqua calente diluta, uel per se, piperis dimio scrupuli addito. Quatuor deinde diebus interpositis integra drachma assuetur, dehinc una & semis, postea duae, atque tres. Rursum totidem diebus interpositis quatuor drachmae, si aegri vires sustinent, offeretur mellis adiecto cochleario. Membris autem quae deficiunt, medicamenta quaedam digerentia, & ea quae cutem possunt cruentare, imponuntur: quibus castoreum quoque, aut piper, aut pyrethrum, aut cachry, aut euphorbium accommodatur. Prodest etiam super ea oleum rutaceum, uel scyonium, uel uetus infundere. Cibi conueniunt frumentacei, sorbiles, uel alioqui ad concoctionem expediti: nec recrementici. Cucurbitulae resolutis partibus agglutinantur, si multae fuerint, distinctim: si paucae, uni: post cucurbitulas delinuntur medicamenta ex pice, uel resina, uel manna, optime autem faciunt simul incocta artemisia, & calamintha, cunila, & nitrum ex aqua modica, quae inter coquendum absumatur. Alius iterum subducatur ex aloe uel polypodio, uel scammonia, uel ex pulte diacolocynthidos. unctioni uero aptissimum est, uetus oleum in quo scilla quadraginta diebus sub sole incubuerit. Si huius copia non est, duas scillas uncias coquito, illinitoque, uel cachry similiter praeparatum, miscenda uero & ceruae uncia, ne illita diffluat. At si galbani, castorei euphorbi, adarcæ & nitri, singulorum unciam semissem acciperit,

perit, multo erit medicacius. fouet exacte etiam ranunculus herba incocta oleo, in quo per insolatū concalu-
erit. Potiones erunt castorei circiter drachma, opopana-
cis succus fabae instar deglutitus. Mirifice facit etiam
5 sagapenon ad erui magnitudinem, ex mulsā, & castoreū
cum opopanace. Item liquoris cyrenaiici quantum mi-
lium pendet. Auxiliatur & antidotum ex triplici pipere.
Vtemur etiam acopis calefacientibus, & iis quæ pituitæ
per os educendæ sunt. Post diem quartumdecimū ple-
10 nioribus uti cibis expedit, & auxilio multum proficien-
te, in balneum deducere. A trigesimo dropacem adfer-
re conuenit, & lauacro committere, insequentibus die-
bus sinapi illinere, in quibus & motus & sensus perit.
Id hinc debet intelligi, quod uehementem uersionē non
15 percipiunt. In iis autem qui sensus compotes sunt, cutis
ruborem duntaxat oportet excitare, post tumorem fa-
ctum ad lauacrum mittere, & mollibus ceratis medica-
ri. Vomitus à cœna conueniet, & is qui radiculis assu-
ptis ciatur: item gestationes curru, aut lectica, aut uehicu-
20 lo: postea ducentur ad balnea naturalia. Victus siccior
utilis est, potio modica & frictio, cibos igitur siccos esse
debent, sitim quæ possunt maximam sustinentes.

DE IIS QUI LAXATIONE,
aut distentione resoluti sunt,

25 Quoniam resolutæ partes uel conuelluntur, uel laxantur:
idquæ; uel à repletionē uel inanitionē, attendendum rur-
sus quoque est, partim sanguinem detrahi debere, par-
tim non. Deinde in relaxatis quidem membris astring-
gentia, iis quæ laxant miscere, & frictionē intensam mo-
30 liriconuenit. In contrariis, laxantibus duntaxat utendū,
frictione simul molli adhibita: oleo in relaxatis nitri pau-
lum & foeculæ contritū adiiciatur. fotus erunt ex aqua
uehementer calida, & potissimum marina, in qua deco-
ctæ sint lauri, uel agni germina, uel sampucus, uel aliqd
35 huiusmodi. Si aut æstas fuerit, natationes in mari: rubor-
res in cute concitati his maxime conferunt. Itaque cedat

PAV. AGIN.

L

PAULI AEGINETAE

tur etiam particulae ferulis, uel urticae ramis. Quod si p-
seueret resolutio, carnem, quae intra articulos resoluta
est, attractam ferris oportet candentibus, exiguis, tenui-
busq; transmissis adurere. Commisssis autem membris
dropacem continue superiniicere commodum est.

DE RESOLUTIONE QVAE

unamquamq; particulam obsedit.

Quae à nerui diuisione oritur particularum resolutio,
insanabilis est: quae uero ab intemperie, uel humore quo-
dam contrahitur, commune quidem ex facultatibus co-
memoratis praesidium recipit. sunt autem peculiaris quae-
dam singulis ipsorum dicata, quae subiungemus. In iis
igitur quibus in utralibet partem deprauata est facies, af-
fectum Graeci *κυνικὸν πασμοῦ* dicunt, aequaliter in op-
positum capistro appellato deduces. Profuerit etiam
sanguinis detractio, ex uasis linguae subiectis. Item cu-
curbitulae priori uertebrae defixae, tum pituitae per os,
naresq; purgatio. Sciendum itaq; est non eam maxilla
quae peruersa esse apparet, sed oppositam resolutione
infestari. Guttore resoluta, cucurbitulas mento aggluti-
nabis, perungesq; medicamentis ex castoreo, sagape-
no, & liquore parthico. auxiliatur etiam gargarizatio
ex acribus. Vbi lingua resoluta fuerit, uenae ipsius inci-
dendae sunt, cucurbitulae mento ad mouendae, medica-
mentis ex sinapi pituitae per os eliciendae gratia utendu-
est, & linguae exercitiis. Si uocis instrumenta soluta sint,
thoraci praesidia adhibenda sunt, spiritus retentione, &
clamore utendum. In superciliis palpebrarum inunctio-
nes similiter prosunt. Item proficit futura. Vesica uero
resoluta, siue urina impediatur, siue ultro excernatur, pu-
bi & abdomini medicamenta applicanda sunt: sed im-
mittendum est oleum rutaceum, uel sycionium cum buty-
ro, castoreo galbano, uel opopanace, uel liquore sil-
phii: uesicae haec per colem transmissa ualde profeces-
sunt, uel sola etiam suffecerant. Iam clysteres ex centau-
reo, & colocynthide cum sycionio utiles sunt. Benefas

ciunt etiam medicamina urinam cientia, potui data, & castoreum cōsimiliter. In primis iis, qui nihil urinæ reddunt, per rectos siphones, quos catheteras dicunt, in uesicam medicamina infundentur. Præterea laxantibus insidebunt, & cataplasmata inde conficient. Qui præter uoluntatem urinam excernunt, corroborantibus auxiliis astringendi sunt, cibis siccis, potione frigida utentur: ubi se recolligunt, cutis exulceratione, & lauacris sponte prouenientibus frigidis utentur. Eos qui urinam sine uoluntate mittunt ob ceruicis uulnus, aut casum, aut uertebræ luxationem, superuenientibus, quæ mortem fatetur, notis, nulla medicina periculo subtrahit. Quod si coles resolutus fuerit, iis quæ in uesica dixi, utendum. In eisdem partibus & lūbis ea quæ intendendi uim habent, usurpabimus. Commendatur autem lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæ, aliaque olera. Longanone soluto, in quo nunquam citra uoluntatē stercus erūpit, nonnunquam cohibetur, iisdem uti par est: interim hæc ab inferioribus partibus clystere demitti: alias astringentia, ut cupressi decoctum, iunci, rubi: alias laxantia, ut adipem suillum, & anserinum uitulinumque, & oleū. Est cum rodentia, qualis est muria, uel cucurbitæ syluestris, uel similium decoctū. Neque enim sic motionem promouent, ueluti uaria agitatio. At si frigus prehenderit, etiam ex euphorbio acospon oleo dilutum inditur. Crura & brachia resolutionē experta, communi curatione flectantur, perfricentur, extendanturque in modum prædictum. Nam in frictione spei plurimum consistit.

DE RESOLUTIONE OB COLICUM

- 30 licum dolorem contracta.
- Nostra ætate colicus quidam dolor incruduit: ex quo præsertim superstitēs futuros cōsummata artuum motus priuatio comitabatur: tactus sensu, ut uidetur, incolumi, ceu Critica quadam ex alto oborta transmutatione, unde motus plerisque spatio temporis sponte rediit. Qui uero imbecilliores extitere, et simplicioribus ex prædictis inunctionibus

PAULI AEGINETAE

leuati sunt. præcipue efficacia sunt experti, acopon ex populo nigra confectum. Item quod abiete constat. Sed quæ roborandi uim obtinent, ac modice refrigerant, multis præclare opitulata sunt.

DE CONVULSIONIBVS.

Cap. XIX.

Postquam de resolutione tractatum est, deinceps conuulsiones exequemur: quoniam utraq; neruorum affectus est: quare etiam de tremoribus dehinc dicetur. Cum igitur statim ab initio, uel nō multo post morbi principia exorientes conuulsiones longius prorogantur, ex repletionē ducunt originem. Vbi uero sudores largos, aut uomitum, aut deiectiones, aut sanguinis profluvia, aut uigilias, aut famem, aut motus, tum multos, tum uehementes subsequuntur, inanitioni feruntur acceptæ. Et cum ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem eam fieri necesse est.

At si uniuersum corpus, neruiq; ex febribus perardentibus inaruerint, ac deinde ob siccitatem cōuellantur, maximum sane hoc malum est, & propemodum insanabile. Primum itaq; partes quæ contrahuntur, ualenter cōtinendæ sunt, & inordinatis resistendum motibus, oleo perfricare oportet rutaceo, aut sycionio, aut ueteri, aut quodam ex hoc genere: tum aquam mulsam assumere. Eos qui ex inanitione conuelluntur, oleo, uel hydrolæo calido fouere competit, si nihil prohibet etiam ad lauacrum deducere, temperatoq; solio uti, cum oleo et frictione lenissima. Nutriendi sunt sorbitionibus ex chōdro & alica, uinoq; tenui & aquoso, quod facile per omnia corporis membra distribuitur, nisi febris adfuerit: tunc enim ptisanæ cremor utilis erit, somnumq; accersemus. Iam uero ex plenitudine, aut inflammatione, cōtractas cōuulsiones curabis, si humores elicias, & inflammationis materiē propriis ipsi præsiidiis discutias. fit et conuulsio, cū uomentes grauius turbantur. Succurrit ipsis acanthii radix, spinæ albæ & Aegyptiæ semē epo-

tum, nonnulli centaurei tenuis succum potui exhibent, cum repletio conuulsionem parit. Atqui non modo bibitur castoreum, sed etiam à foris cuti una cum sycio nio illinitur. Si uero malum hoc modo non finiatur, curbitulas cum scarificatione ad mouere prodest: si crura contrahantur, coxis & postremæ uertebræ: si manus conuellantur, etiam dorso, et primæ ipsius uertebræ, tū ei quæ humeros superiacet. At toto uniuersim corpore ab affectu immuni, si labrum, aut palpebra, aut lingua contrahatur, graue symptoma existimandum est, quod maxima inuehat pericula, licet exiguæ partes affectæ uideantur. In his itaque sanguinis ex occipitio & primis uertebris detractio recte adhibetur.

DE CERVICIS MORBIS, NEM

pe tetano eiusq; differentiis. Cap. XX.

T Etanus, cum & ipse conuulsionem quandā pre se ferat procreatur musculis corporis, & præsertim spinæ, gelu modo concretis, frigido nimirū humore à foris et intus partes eas astringente: ideoq; hoc malo occupati, flectere sese nequeunt. Verum cū particulae corporis in anteriora tenduntur, affectus nominatur emprosthotonos: cum in posteriora, opisthotonos: cum in alterutram partem æquali robore intenduntur, tetanus appellatur. Pelops hæc uitia tensionem uocat, et cōtensionem musculorum ceruicis, neruorūq; per quos caput inclinatur, renuit, et circumuoluitur. At si circa posteriores ceruicis musculos malum consistat, opisthotonos ex accidente: si circa priores, emprosthotonos: si utrinq; tetanus nuncupatur. Originem tribuit musculis repletis spiritu, et aere crasso nebulosoq;: quæ impense frigidum et concretū, eoq; ad motum contumacē asserit, unde et non sicca potius sed humida fomēta malo prehensilis conuenire. Hæ qdē tetani differentiæ sunt. Oēs eadē ratione curantur. Optimū itaq; præsidium est febris, q̄ p̄ initia nō fuerit, superueniens. Notæ horū sunt, angusta respiratio, pulsus rarus et exiguus, nōnunq̄

PAULI ÆGINETÆ

& risus ipsis sardonius oboritur, rubet facies, oculi magis intumescunt, ad hæc aut non urinam reddunt, aut aquæ similem, aut cruentam, bullis quibusdā turgescen-
 tem: alius siccescit, uigiliæ magis urgent, crebroq; à cō-
 uulsionibus periculum est, ne lecto ægri excidant, quin
 etiam singultire incipiunt: indolentq; alii capite, alii clau-
 culis & lumbis, quidam ipsorum subtremuli quoq; eua-
 dunt. Porro facit affectum (quanuis raro) lassitudo hu-
 mi dormitio, pōderis eleuatio, casus, uulnus, ardor, ictus
 & alia quæ eandem neruis offensam inferre possunt.
 Curatur, quomodo conuulsionibus ob inanitionem ge-
 neratæ, solent.

CURATIO TETANORVM.

Quibus ceruix recta intenditur, initio sanguis detrahen-
 dus est, partes lanis oleo imbutis sicyonio, castoreoq;,
 cū ueteri cōtegendæ, aut uesicæ quoq; latæ calido oleo
 repletam, tendinibus sup. imponere oportet, & cucurbi-
 tulas admonere, sic ut cutis exasperetur. leues enī noxæ
 quoq; inferunt, itē ceruicibus nonnunq; cucurbitulæ de-
 figentur, & utriq; spinæ parti, adhæc pectori, qua est mu-
 sculosus & præcordiis: interim uesicæ loco, & renum.
 Porro liberaliter sanguinem auferre cōuenit, modo nō
 uniuersim id fiat sed plurib' uicibus. Sudores lanis oleo
 madentibus abstergere, ubi refruxerint, in memoria ha-
 beatur. Quid si tetanus in uetustatem inciderit, in oleū
 bis quotidie descendere confert, non tamen diutius im-
 morari: quippe in oleum descensus, maxime uires con-
 uellit. Potus erit hydromeli pingue ad dimidias deco-
 ctum. Qui robusti sunt, panacis liquoris drachmam bi-
 bent. Sin minus, tres obolos, uel minimum, obolum. At
 si quis ipsum ceu stomacho inimicū habeat suspectum,
 ammoniacū quoq; exhibebit, uel liquoris cyrenæici in-
 star erui incocto meli circumlitum deuoratur, & silphii
 radiceis duo cochlearia, tribus mulsæ cyathis inspersa,
 uel ipsius decocto exhibetur, uel myrrhæ drachma ex
 mulsæ, hyssopique decocto: sed omnium securissimū

ex peditissimumq; est duo, tria uel castorei cochlearia,
 particulatim præbere. Non enim obest ad ualeitudinem
 uel secundum cibum ex eo dari. Potus uero ipse præ-
 ter alia tum paulatim tum modice assumetur. Nam dū
 5 aggre portionem transmittunt, in nares ipsam propellunt
 unde uehementer turbati, ad conuulsionem prouocan-
 tur. Sedes oleo rutaceo cum opopanace perungi de-
 bet, quod ab inferioribus quoque partibus inferetur,
 frigida superfusionem, cum sit (quemadmodum ait
 10 Hippocrates) periculosissima, eoq; posteris, credo, uita
 perata, & nos damnamus deultamusq;. Vnguentum
 hoc conuenit, nardi sextarius, ceræ uncia duæ, foliorū
 amomi, styracis, mastiches, singulorum uncia: castorei,
 adarcæ, euphorbii, piperis * singulorum uncia: spicæ nar-
 15 di, opobalsami, singulorum tantundem.

POTIO OPISTHOTONICIS
 ACCOMMODATA.

Panacis radicis, piperis albi, costi, myrrhæ, papaueris
 lachrymæ, singulorum pares portiones, exhibentur ci-
 20 cerculæ modo somnum capturis: benefacit etiam or-
 thopticæcis, id est, qui recta ceruice spirant. Porro ui-
 ctus erit tenuis, qui expedite distribuatur, & recremen-
 tis omnino uacet.

DE TREMORIBVS. Cap. XXI.

35 **T** Remoris origo communiter ex neruorū imbe-
 cillitate est, qd ætas senilis palā testatur: priuatim
 uero plures & diuersæ aliæ: nēpe frigidius natu-
 ræ tēperamentū, frigida potio, & præsertim in febribus
 intēpestiue assumpta: frigidi glutinosiq; humoris redun-
 30 dantia, & uini usus liberalior. Qui igitur ex erroribus cō-
 missis manifesto tremunt, à noxiis abstineant. At si rema-
 net diu in febribus tremor, primū corpus totū oleo sa-
 bino pfundatur: ubi aut accessiones remittūt, ueteri, aut
 scyonio. Sūma corporis mēbra lanis mollibus pūcta
 35 cōtegantur. Deinde cucurbitulæ à priori uertebra usq;
 ad spinā lumbosq; agglutinentur, sic particulæ prius cū

* Manus
 scriptura
 drachmæ
 exēplar
 hēt ubiq;

PAULI AEGINETÆ

præcordiis hordei farina delinantur. Iam hæ quoque partes lanis ex ueteri aut sicyonio oleo respersis operiantur. Quod si febres inueterauerint, die uno interposito, in oleum aut hydrelæum tremuli descendant, utenturque frictionibus teneris. Si longius prorogatur dispositio febris suspicione, mulsa castoreumque potui dabitur, et calidis locis gestatio proderit. Cibus diductu facilis offeretur, primum sorbilis, mox uolatilium et piscium quæ molli carne sunt præditi: febribus solutis in balneas eundem est, sed uitari debet frigidum solium, uinique potio. Porro si crassiorum uiscosorumque succorum copia fuerit, uti conuenit iis quæ incidunt extenuantque, uerbi gratia, rutæ ramusculo spondylii quantum tribus digitis comprehendendi possit, castorei et nitri, singulorum obolis duobus. Quotidie cochleare unum cum oxymelite ad tres usque dies ieiuno porrigitur, uel panacis et piperis grana quinque ex mulsæ cyatho. Simplicia præsumpta tremantes adiuuant castoreum, leporis cerebrum comestum, althææ radicis decoctum, damassonii foliorum drachmæ quatuor in mulsa, eupatorium ex aqua. Superante autem frigore etiam zodymi unguine, non modo acopis ad resolutionem conscriptis, unctionibusque et cutis rubrificatione, phænigmon Græci uocant, utemur: præterea exercitiis perfricationibusque, iis uero qui ex uini potu tremunt, uinum circuncidendum est, quo ad in totum morbo fuerint liberati.

OSCULARIA, ET PRIMUM

de dolore ex galeni commentariis. Cap. XXII.

Cum oculi grauisimos sentiunt dolores, considerato, quoniam ex statu corporis hi ipsis in inflammationibus accidunt. Vel enim, dum ab influentium acrimonia uehementius eroduntur, uel quia tunicae succis repletæ tenduntur, uel per aliquam crassorum succorum, aut spirituum flatulentorum, intensionem dolores in ipsis graues excitantur. Rosiones igitur purgantibus tolluntur.

præfidiis, quæ noxiū humorē uacuent, itē cādido oui liquo-
re in oculos infuso. Vbi uero concocta iam fuerit inflā-
tio, corpusq; superfluis uacuum, balneis uti commo-
disimum est. Ex repletionē contractas inflammationes
5 sanguinis detractio, alius subducta, & partium inferiorū
frictio commodē perfanat. Tunicarum intensiōes
soluuntur, toto prius corpore uacuato: item humorib;
qui sursum tendunt, ad inferiora reuulsis, deinde loco in-
iectis remediis, quæ digerendi facultatem habeant. fo-
10 menta itaque adhibenda ipsis sunt, & fenugræci deco-
ctum infundendum. In quibus autem sanguis crassus o-
culorum uenulas intendit, uerum ut corpus non ex ar-
quo succis abundet, uini usus est, quod possit ex calface-
re, uacuare, & meatus aperire,

15 DE PERTVRBATIONE,

& lippitudine quam proprie oph-
thalmiam Græci uocant,

Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore
naturæ alieno, nō ex corpore, sed à foris aduentēte cau-
20 sa aliqua, (uerbi gratia) sole, fumo, puluere, aut oleo:
quare etiam occasiōe ipsius cognita, promptissime sol-
uitur. In genere huius perturbationis, lippitudo est: uerū
non extrinsecus tantum, sed ex interiore etiam causa cæ-
ca ingruit, perq; tres quatuorue, aut quinque dies plerūq;
25 que durat, facillime discutitur, si obseruentur omnia quæ
foris accedentia turbare lumen possint, item parciore
cibo, aquæ potu, aut in ambulatione, & aluo ex facili re-
spondente.

DE INFLAMMATIONE.

30 Cum inflammatio ipsos oculos occupauerit, post totū
corporis uacuationem, perungendi sunt iis quæ im-
petus humorum possunt repellere & uehementiam le-
nire, quale est, quod ad Neilum authorem refertur, itē
diarrhodum, uel etiam mediacum, nardinumq;. Vbi
35 membrana adhærescens inflammatione tentatur, medi-
camentis utemur, quæ Græci ab uno die monemera

uocant, cum oui candido infusus. Die insecuto nisi inflammatio crescat, nardino delinentur, fofus ex meliloti decocto utiles sunt. ubi crassus humor est, qui lippitudinē facit, medicamenta accommodantur, quæ neq; obstruant, neq; humores incrassent, sed quæ diffundere, humectare, & excernere idonea sint, quale est, chiacum. At si humores in capite fuerint obstruati, cucurbitulam occipiti admoouere oportet, uel scarificare, uel hyrundines fronti quæ oculus dolet, adhibere: tum panem purum aqua madentem cum modico rosaceo, aut polentis capitum papaueris decocto, superdare. Similiter etiam efficaciore utendum est cataplasmate, ex croco, melilotis palmularum carnibus, teneris coriani foliis, ouis, tritico tosto, micis panis in decoctum intinctis, rosacei momento, & papaueris contriti diluto. Interdum semen quodque ipsius ad leniendum dolorem miscetur. Si magna doloris necessitas est, etiam opii paxillum adicitur. Vbi dolor abest, stupefacientia uitari debent. Quod si mediocris inflammatio infestet, aloen per se, uel aqua, uel oui albo dilutam illinito. ut autem expeditius sit auxilium, croci pondo libram semissem, aloes pondo drachmas sedecim, gummi pondo dodrantem, simul coniecta aqua pluuiali excipito, singitoq; collyria. Iam quæ uocantur diacroco lippitudinum initiis sunt idonea, in quibus tumor mollis cedensq; & exalbidus habetur. In palpebris autem earumq; commercio sine tunicarum offensa benefaciunt itidem liquida collyria (Græci hygrocolluria uocant) ex croco, atramēto sutorio & melle preparata. Inter quæ hoc est laudatissimum.

HYGROCOLVRIVM

quod dolorem leuet, anodynon appellatum.

Cretæ sutoriæ, mellis attici, succi foenugraci, singulorum pares potiones incoquito, donec mellis spissitudinem habeant, deinde specillo duos angulos attingito.

AD DEFLVXIONIS IMPETVM,

qui epiphora Græcis dicitur.

Si pituitæ cursus in oculis sentiatur, per initia quidem
conuenit nihil assumere, aquam bibere, & multo magis
uenerere abstinere. Alius subduci, facies posca diluta col
lui debet, præsertim si feruens fuerit pituitæ cursus. sin
minus, atramento sutorio cum melle frons & palpebræ
delinentur. Nonnulli atramentum sutorium aqua dilu
tum ad abluionem exhibent. Porro in iis qui defluxu
citra inflammationem uexantur, uel etiam cum inflam
matione quidem, sed ita ut supra os caluariæ emanet,
agglutinamentis utendum est in fronte. Ex simplicibus
sanè, uiridia uitis folia efficaciter prosunt, uel rubi succus
uel portulacæ, uel cydoniorum cum polenta tenui, uel
galla cum uino & pollentæ polline contrito, uel cicutæ
succus, uel psyllii cum aqua, uel solano, uel cochleis cū
testis suis in puluerem redactis, à tempore ad alterum
tempus illita. In uniuersum q̄ adstringunt refrigeratq̄.
Inter composita hæc, pollen frumentaceus, & myrrha,
uel thus cum oui aquato illitum, uel samia terra cum
myrrha, & manna similiter oui albore inuncta. In frigido
re autem humorum cursu sulfuris uiui, bituminis,
pice, colophonie, singulorum drachmæ duæ: item
Musq̄ pastillus, et aster, similiaque probe repellunt.
Iam uero theriace uino astringente diluta, fronti q̄ illita
frigidus humorum influxus sistit. Quinetiam eas
dem pota uehementer his succurrit. Ipsi uero oculi
lo, lana aut panniculis tenuis, oui albo madens impo
nitur, item caseus recens similiter oculo applicatus,
acres maxime influxus cohibet, tum collyria à reprim
mendo dicta statim, si illinantur, instillanturque diluta
idem efficiunt. At si in imo, & sub osse hærescens hu
mor longiore spatio emanet, post generales corporis
uacuationes, medicamentoꝝ usus est q̄ p̄ nares atq̄ os
pituitā eliciūt, errhina & apophlegmatismos appellante
caput attōdetur, & incisa cuta exasperabit. Porro in his

PAULI ÆGINETÆ

etiam curandi rationes conueniunt, quas in capite, manu administramus, nempe angiologia, arteriorotomia, hypospatismos, & periscyphismus, uti Græci appellant. Item capitis uertex usque ad os aduritur. Et cucurbitula occipitio incisa cute admotæ, impetum floris possunt reuellere. Fluxiones extra caluariam notant, uasa in fronte & temporibus distenta, & caput ueluti reuinctum, tum quod exagglutinamētis sicca præsidio sunt. Si hæc defint, & floris impetus prorogetur, & sternutamenta nonnunquam moleste elidantur, humorem sub calua teneri censendum est.

DE CHEMOSI.

Chemosis appellatur, cum utraq; palpebræ ex uehementi inflammatione inuersæ fuerint, ut uix oculi ab ipsis cõtegantur, & album oculi nigro sublimius euaserit, rubrumq; etiam magna ex parte nigrum occupet. Curatur uenæ sectione, medicamine purgante, collyrio diarodon albo, & quod à cinereo colore uocatur *σποδιᾶκος*, cum lacte, uel oui aquato. Eodem uero palpebras tempora & frontem illinere oportet, tum fomentis & cataplasmatibus lenibus uti. Cum remittit inflammatio, acrioribus quale est etiam uiride diarodon.

DE HYPOSPHAGMATIS,

& emphisematis.

Hyposphagma uenarum commercii diuortium dicitur ex ictu potissimum factum. Instillatur itaque ipsis sanguis palumbi, uel columbæ, uel calidum lac muliebre, cui thuris paululum sit adiectum, uel muria, & præsertim ex sale cappadocico: fots recte adhibetur ex hyssopi decocto. Porro tumor mollis, oedema uocant, oculis ex ictu obortus, fomentis ex posca continuis, & spongia ex eadem superdata discutitur. Recte huic specularium combustum, & stercus columbæ æquis portionibus, uino aut aceto contrita illinunt. Iam caseus recens, uel radiculæ cortex, uel uua passa sine acinis, singulatim ex posca, uel mulla applicantur. Eadem faciunt ad

LIBER TERTIVS.

87

emphysemata.

AD EMPHYSEMATA, ET pforophthalmias.

Emphysema palpebræ tumor est, œdemati similis: pforophthalmia autem pruriginosa eiusdem scabies, ex salso & nitroso humore cōtracta. Cōuenit ipsis posca, lētīculæ decoctum, ex rosacq; fomentum. Hygrocollyrium autem hoc, æris drachmæ sex, misyos tosti, myrrhæ, singulorum drachmæ tres, croci drachma una semis, piperis drachma, ulni Chii & passi cretici singulorum cyathus unus, semissis: incoquantur quoad mellis spissitudinem habuerint. Hæc est Erasistrati compositio, quam à multiplici usu panchreston appellat: facit etiam ad anginam, ulcera oris, pudendorumq; & aurium dolores. Inungant & oleo palpebras, somnum inituri. Ab acidis salis, & acribus abstineant.

DE SCLEROPHTHALMIA, & xerophthalmia.

Sclerophthalmia, durities oculi, & difficilis motus est cum labore ruboreq; citra humiditatem. fovere ipsos crebro, spongiis aqua calida imbutis ex usu est. Item osium palpebris in lecto imponitur, cum rosaceo, uel asdeps anserinus. Frigida, & quæ indurāt, uitanda: caput uelandum ungendumq; aluus ducenda. Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculorum est sine fluore dispositio. Curatur balneis, inunctionibus & uictu probi succi: utrisq; uero communiter conueniunt medicamenta acria, ut uel lachrymas prouocent, per quæ & durities emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistrati quoq; panchrestus, & quod dicitur diceteton, item cui nomen est stratiotico.

DE ECTROPIIS.

Hic affectus palpebræ inuersio est, aut propter cicatricē aut excrescentiam carnis nascens. In quibus igitur excrescentia inueterauerit, æruginem rasam torrefactam conterito & admovento, uel plumbo usto cum sulfure uiuo

PAULI AEGINETAE

& loro utitor, uel utrisque paribus & ærugine & plumbo. Nam ex cicatrice proficiscens ectropion, si in totū curare studeris, id manu faciendum est.

DE AEGILOPE ET

anchilope.

Ægilops abscessus est, qui inter maiorem oculi angulū & nares fit: qui ruptus, si negligatur, usq; ad os fistulam aperit. Idem, priusquā disruptus exulceretur, anchilops uocatur. Probe igitur faciunt glaucium & crocus una cum perdicii herbæ succo imposita. crebro autem uariare oportet, etenim statim immutata uim suam perdunt. A L I V D. Alica cocta in aceto & probe trita, nō solum incipientes, sed etiam in uomicam mutatos per sanat, rumpitq; & usque ad os penetrat. Hoc usus non solum ægilopas, sed etiā anchilopas curabit. A L I V D. Ruta satiuā unā cum cinere lixiuio, qui primus distillauerit, contrita coctaq; & imposita, pulchre admodum ægilopas emendat, & adusq; os permeat initio erodēs postea non ita: ac mirum est, quod ne cicatricem quidē inde coram hoc præsidium relinquat. A L I V D. Cochleas cum testis suis tritas imposito. Interdum aloe, uel myrrha admista præsidium hoc antequam ægilops in pus uertatur, & postquam ruptus fuerit abscessus, cū desiccet. A L I V D. Cum manus opera ægilopa & anchilopa aduris, hoc utere cataplasmate: Lenticulas decoquito, & cum melle utitor: ubi crusta exciderit, uuam excipiens, liquida terebinthina utitor in modum emplastri. Hoc enim & purgat, & carne replet, & cicatricem inducit.

DE TRACOMATE.

Trachoma asperitudo palpebrarum interiorum est: harum intensio, ut ueluti incisuras habeat, sycofis à fici similitudine appellatur. Cum inueterauerit uitium callosq; contraxerit, tylosis uocatur. Collyriis igitur utendum est, tum eo quod ex uino, tum quod ex duobus constat lapidibus, ipsoque hematite lapide, ex aqua lo

to uehementer palpebræ abstergentur: harmatioq; cū
cygnarii modico. Ad hæc diacrocu collyrium pariter
psorophthalmiis efficax est, palpebræ citra exulceratio
nem inuersæ illitum. At si durior callus his non cesserit
remediis, palpebra inuersa pumice raditur, aut sepiæ te
sta, aut foliis fici, aut etiam instrumento, quod à palpe
brarum rasura blepharoxiston Græci appellant.

DE CHALAZIIS.

Cbalezion, otiosi humoris in palpebra colluies est, in
qua ammoniacum aceto detritum simul cum galbano
inungitur, facit etiam terebinthina pariter cum cerato
excepta.

DE CRITHE TVBERCVLO.

Crithe, paruulum abscessus tuberculum, oblongum,
palpebræ cilio obueniens. Id cera alba foueri oportet:
reliquum corpus, uel muscæ capite amputato infricari,
uel hordei diluto perfundi.

AD PALPEBRARVM PEDICVLOS.

Expurgatis prius pediculis, marina egelida palpebras
colluere oportet. Deinde medicamento subscripto ci
lium attingere: aluminis scissi partibus duabus, herbæ
pediculariæ parte una, tritis utitor.

DE MADAROSI, VEL MILPHOSI.

Hic affectus palpebræ pilorū defluuium est. Ad quod
cura prius uniuersi corporis habita, smegmatis utere, quib
us ab honestandis palpebris nomē est calliblephara.
Terræ ampelitidis, croci gallicæ, ladani, singulorū pari
portiōe cōtrita utitor. ALIUD, Stymmeos tosti lotiq;
drachma, plūbi cōbusti & eloti drachmis quatuor, cro
ci totidem, nardi indicæ drachmis tribus, in puluerem
reductis utitor. ALIUD. Palmarum, osium combus
torum singulis tribus drachmis, nardi gallicæ drach
mis duabus: leuigatis utere hoc etiam scabiosis oculis
medetur. ALIUD. Neapolitæ ad palpebrarū defluuia,
μαλφῶτες appellāt, λόγοςq; palpebrarū affectus. Stym
meos, cadmiæ, chalcitidis, misyos, xenici, singulorum

PAULI AEGINETAE

pares portiones. minutim cōtudentur, & melle resper-
sa torrefiunt: leuigata usui sunt.

DE PTILLOSI.

Ptillosis palpebrarum crassities est, callosa, rubicunda,
quibus accidit sæpe pilorum defluuium. Præter prædi-
cta igitur etiam hoc summe facit, Muscerdæ combustæ
& melle contritæ, inunguntur.

AD SUPERCILIORVM

defluuia seu madarosim,

Plumbum digitis oleo uel adipe anserino unctis detri-
tum, illinitur. A L I V D. Hoc etiam subnigros reddit:
nuces auellanae exustæ simul cum adipe caprillo, uel ur-
sino infricantur. A L I V D. Hoc efficax est etiam bar-
bæ alopecii: Alterci drachmæ duæ, muscerdæ drach-
ma, polytrichi drachma, irini unguenti cochlearia qua-
tuor. Tritis perbelle unguentum admiscetur, fotuq; pri-
us adhibito illinitur, quod si attonsa pars ante fuerit,
magis proficit.

DE PALPEBRARVM PI-

lis oculum irritantibus *τριχίασις*

appellant,

Pilis qui oculum pungūt prius euulsis, locus statim san-
guine ranæ per se inungitur, uel cum cinere chamæle-
ontis albi, uel sanguis cimicū, uel fumarie quæ in hor-
deo nascitur succus, cum gummi, uel tellinarum salsæ
cum cinis cum cedria, uel loti cinis, uel alumen liquidū
quod phorimon appellant, uel muscæ caninae sanguis
admodum in id efficax est.

PILORVM GLVTINANS

medicamentum.

Conglutinant pilos infractos bitumen, mastiche, colo-
phonia, gummi cochleæ pars glutinosa.

DE ENCANTHIDE

& rhyade,

Enchanthis naturalis in maiore angulo carunculæ ex-
crescentia est. Rhyas autem huius imminutio, Encanthi-
das

das igitur iis quæ aduersus ectropion dicta sunt, simili-
busq; causticis uel septicis absumes, sed non totas, ne
eius loco rhyas subnascatur, uerum ad naturalem usq;
magnitudinem. Rhyadas, carnosæ parte in totum, uel
5 rudi manus opera, uel medicamentis absumpta, insana-
biles existimato. Quod si pars ipsarum imminuta fue-
rit, iis quæ mediocriter astringunt, carnemq; creantibus
reficitur, qualia sunt medicamenta ex croco, glaucio &
aloe confecta, item collyria diacerocu inscripta, nec non
10 alter cum prodest in uino coctum impositumq; & alu-
minis ex uino pauxillum.

DE VLGERIBVS.

Vlcerum in oculis genus quidem unum est, differentiæ
uero speciales diuersæ. Etenim in cornea membrana q;
15 Græcis ceratoides appellatur, ulcus cauum, angustum
& purum, ob uix similitudinem botryon dicitur, quod
autem latius botryo est, sed minus altum, coeloma nun-
cupatur. Argemon in pupillæ circulo nascens, ambien-
tia comprehendit, ut etiam in exteriori pupillæ parte
20 rubicundum, in interiore cæcidum appareat. Epicauma
ulcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurgato
humores oculi sæpe effluunt. Iam uero aliæ plures ul-
cerum sunt differentiæ, de quibus dicemus communius.
Si igitur ulcus simul cum inflammatione obortum fue-
rit, curationem ex iis quæ inflammationem lenire possunt
25 sunt & concoquere, moliemur, non neglectis iis quæ ad
ulcus proprie pertinent. Talia uero sunt collyria, libaniū,
cygnus & pelaria uocata, item alter & similia: insuper q;
ex malo, terra samia & cetusa constant: omnibus autem
30 magis leniendo dolori esse ilamonem nouimus, uerum
diu ei insistendum non est, eo quod admodum stupefac-
faciat. Laudatissimum uero & quod diazematōn dicitur,
tur, quod ne sensum quidem stuporis habet. At si cum
fluxione ulcus infestari, collyrium aliquod illi admisceo-
35 bimus, quale est diahydras, & chiacum, præterea cy-
gnus fuluus, & quæ repellendi sine rosione facultatem

PAV. ÆGIN.

M

PAULI AEGINETAE

obtinere. Sin autem ulcera sordida fuerint, mulsa medio-
criter aquata, & foenu graeci decocto utemur per se, &
cum aliis ad id dicatis collyriis. Si acriora sint, seberiano
& foenu graeci diluto. Si non acria, diasmyrnes, & nar-
dino unguento medebimur. Purgata uero ulcera pro-
be potest medicamentū cleo dicarice obducere, eamq;
praeterea concolorem reddere.

DE OCULI PROCIDENTIA

quae προήπτωσις dicitur.
Proptosis tuniculae quae graecis ab uuae acino *πρόσθον*
dicitur, procidentia est: quae erosa ruptave cornea tuni-
cula accidit. Ea cum nondum creuit quod muscae ca-
piti similis sit, myocephalon nominatur. Cum uero amo-
lius & eo usque succreuerit, ut acinum uuae reprae-
sentet, staphiloma, quasi uuatio dicitur: ubi plurima
facta est accessio, ut palpebras malae transilient, obcal-
lueritq;, clauus tunc dicitur. Si igitur ad myocephalon
fere oculi procidentia degenerauerit, repellentibus den-
tantibusq; ipsum medicinis utendum est: Chio nimi-
rum Phazo, Nardino, & Theodocio, item eo quod
oliuae furculis, & quod cornu praeparatur, iam uero
spongiam leniter ipsis posca, aut uino astringente, aut
rosarum decocto imbutam superdare commodum
est, aut splenium. Principatum uero obtinet ad proci-
dentias omniaq; ulcera, medicamentum cui nomen
est Olympiacum, uel Olympus, cum succo oliuae,
uel polygoni, uel polii. Eadem haec etiam clauis con-
ueniunt & staphilomatis, priusquam inalbescant.
Vbi uero alborem, aut callum contraxerint, nullus
remediis locus est.

DE OCULIS PURULENTIS.

Aliquando pus sub oculi tunica, cui nomen est ceras-
toides, nunc altius, nunc in summa superficie colligitur,
humani unguis spece: quae causa est ut hoc etiam
malum unguis oculi nominetur. Huc ergo spectat cu-
rationis ratio ut uel pus digeratur, medicamentis me-

LIBER TERTIVS.

90

diocritet in id efficacibus, quale est aqua mulsa, & fœ-
nugraci succus, ex eoq; collyria, similiter libanium, &
quæ ex thure confunt: uel rumpatur uomica, & uehe-
mentioribus repurgetur, quod genus sunt diasmines,
& hygidion. At si pus in oculis citra exulcerationem
colerit, etiam hoc liquido collyrio utendum est. Atras-
menti sutorii, croci, singulorum drachmis octo, myrrhæ
drachmis quatuor, mellis pondo libra. Cæterum phly-
ctena cum sit ceratoidis membranæ excreſcentia, ex hu-
more quodam commercium compagemq; ipsius ex-
coriante, purulentorum curationi subiicitur Hygra, hoc
est, liquidum medicamentum ad suppurantes oculos
quos hypopios uocant, Bassi: croci, aloes, myrrhæ, sin-
gulæ uncia, uini quadrans, mellis optimi ſelibra. Cro-
cus ex uino modico teritur, deinde aloë & myrrha.
Vbi crassitudinem acceperint, mel additur. Vnita in ui-
treo uase reponuntur: uti licet bis quotidie, aut si neces-
ſitas urgeat, ter. Deligatum oculo carnem tollit, & cicat-
ricem inducit.

DE CICATRICIBVS ET ALBVGINIBVS.

Quæ per ſumma oculorum cicatrices fiunt, aliqui hoc
nomine cicatrices dicunt, alii uero nubeculas. Altiores
autem albugines, medicamentis quæ astringunt, pur-
gantq; discutuntur. Nebulas igitur anemonæ succus
abstergit, & minoris centaurii succus cum melle. Vetus-
tiores cedria extenuat, item æs ſolum aqua tritum mo-
do collyrii, ad hæc quæ detergent collyria: quale est
quod cornu ceruino conſtat, dia ceratos elaphiu dictū.
adde Rhinarium, Hecatomben, ſimiliaq;. Albugines
uero nitrum cum oleo ueteri detritum diligenter, & in-
unctum probe, abstergit. Item ſepiæ teſta combuſta, &
cum melle in pollinem redacta. Inter collyria hoc bene
& leniter abstergit. Collyrium diamamira. Marnire, gut-
tæ ammoniaci, myrrhæ troglodytidis, crocodilorum
ſimi, ſingulorum æqualia pondera. in collyrium co-

M ii

PAULI AEGINETAE

actis utere: uel crocodili terrestris limo collyri modo
do ex aqua utitor. Recte autem sal cappadocum aqua
soluitur, quo collyria albuginibus exterendis dicata
instillantur.

QVOMODO CICATRICES TINGANTVR.

Gallæ, acaciæ, singulorum drachmæ quatuor, atramenti
sutorii drachmæ duæ illinentur. Collyrium autem hoc
proficit, floris mali Punici, cytinorum, atramenti sutorii,
acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quatuor, stygnos
mios, gallæ, singulorum drachmæ duæ. A qua teruntur
si flos mali Granati desideretur, interior ipsorum in gra
nis membrana miscenda.

DE VNGVI OCVLORVM,

quod pterygion Græcis uocatur.
Vnguis quod pterygion Græci uocant, membratula
est quædam neruosa, oculis sese obtendens, quæ ab an
gulo quidem oritur, sed ad usque pupillam peruenit: eamque
ubi fuerit adacta, obtegit. Magni igitur & inueterati un
gues solam manum expostulant. Recentiores uero &
magnitudine mediocres, præsidii eliduntur abstergen
tibus, qualia aspretudini idonea sunt, & albuginibus in
ter simplicia igitur æs combustum, uel atramentum su
torium simul cum porcino felle pulchre faciunt. Efficac
ius autem hoc est quod sequitur: atramenti sutorii pars
una, gummi pars semis: uino leuigata illinuntur, uel
etiam collyria formantur, nonnulli uero caprinum fel
melle mistum inungunt.

AD VNGVES OCVLORVM,

suppurationem, & hebetudinem.
Lapidis magnetis, æruginis rasæ, minii sinopici, suffimi
nis ammoniaci, singulorum drachmæ quatuor, croci
drachmæ duæ, mellis Attici cochlearium. Idem ualet
aduersus albugines.

DE CARBUNCULO ET
CARCINOMATE.

- Carcinoma affectus est tunica quæ cornus imaginem
 repræsentat, ob id ceratoides dicta: dolor huic superue-
 nit, rubor tunicarum, cruciatus pulsatis ad usq; tempo-
 ra si inqueantur, cibi torquet fastidium, acrimonia iritant, of-
 fenduntq; Hoc malo nulla medicina subtrahit. Nihil o-
 minus dolor leniri lactis potione debet, item cibis fru-
 mentariis & alioquin probi succi, omni acrimonia uan-
 cuis. Collyria lenia infundantur, ut spodiaceum febernæ
 num & consimilia. Cæterum bonæ totius corporis tem-
 peraturæ prospiciendum est. Carbunculus autem & ipse
 malignum ac contumax ulcus est, crustatum, alias bul-
 bo, alias palpebræ, quemadmodum reliquis pariter cor-
 poris particulis accidit. Itaque in bulbi carbunculis per
 initia quidem clystere primum, mox lacte coctionem
 non experto, mediocriter purgare convenit. deinde spo-
 dia fotum erui farina, uel triticea ex aquæ mulsæ deco-
 cto delinere, nonnunquam & pupillæ pollinem eius ac-
 commodare, & lacte oculum eluere. Si ulcera serpedon
 depascant lenticula cum melle, uel malis cydoniis inco-
 ctis superapplicatur. Si latius depascendo penetrent, for-
 liis oleæ decoctis, uel malicorio in uino cocto leuiga-
 toq; ex melle oblinitur oculus. At si cessent proserpe-
 re, crustaq; medicamento quod subiungetur imposito,
 exciderit, & ulcera sint pura, lutea ouorum tosta leuiga-
 taq; cum croco & melle illinentur, quousq; ad cicatricem
 perueniant. Medicamentum autem recipit spodii dra-
 chmas quatuor, myrrhæ non nimis torrefactæ dracho-
 mas tres, rotidemq; obolos. Detritis in uino amineo
 quousque inaruerint, passum creticum uetus miscetur.
 Vbi unitas facta fuerit, si quida pyxide fictili excipiuntur,
 oblinunturq;. Ad palpebrarum uero carbunculos ma-
 lum Granatum acidum, o. f. i. v. Græci dicunt, totum, fru-
 stratim concisum aceto incoquito. Vbi tabuerit probe,
 leuigatumq; fuerit ad illitionem utitur, bis terve quoti-
 die immutans, noctu semel.

DE MIDRYASI.

M iii

Cum pupilla colore quidem nihil euarfat, sed multo q̄
consuevit est latior, & interim ex toto orbat lumine, in
terim permultum cernendi potentiam impedit, aciesq̄
hebescit, ut omnia minora q̄ sint uideantur esse, Mydria
sis quidem affectus est, causa autem ipsius humor quid
dam excrementitius. Itaque curationem ipsius sangui
nis emissionē à cubito, uel purgatione tentabimus: sin
minus, uenas in angulis oculorum diuidere oportet, de
inde cucurbitulam occipitio admouere, & marina fron
tem, & oculos perfundere. Si marina desideretur, mus
ria, uel posca. Medicamentis autem iis utēdum est, quae
ad postulas simul conducunt.

DE PHTHISI ET ATROPHIA

Phthisis affectus oculi est, quo pupilla fit angustior, ob
scurior, rugosiorq̄. Res luminis obiectae, in his maiores
apparent. causa uero est densatio, quae siccitati potius fer
tur accepta. Sed phthisis ab atrophia hoc dignoscitur
discrimine, quod illa angustiores pupillam, haec totum
oculi bulbum minorem, humilioremq̄ reddat. Medes
ri his cōuenit exercitio, & studiosa capitis, faciei & ocul
lorum fricatione. Ad haec frons aqua perfunditur, cap
put unguine quodam calfaciente, oculus medicamēto,
quod rarefaciat acriore oblinitur, quale est infra scriptū.
Ammoniāci drachma, crocomagnatis drachmae quae
tuor, croci drachmae duae, æruginis drachma. Tritis in
aqua, subactisq̄; utitor.

DE NOCTURNA CECITATE

Nocturna cecitudo, qui Græcis Nyctalops dicitur, uis
tum est quo per diem homo cernit, sole dein occiduo
obscurus, noctu omnino nihil. Curati debet sanguine
ex cubito, & oculorum angulis uacuato, mox purgas
tione, uel per clysterem inanitione adhibitia. Deinde
apophlegmatismi indicentur, & quae sternutamentis
eiendis sunt medicamina. Ante cibum hyssopus pos

tu, uel ruta dabitur. Si his remediis morbus non aboletur, iterum purgationem moliemur ex scammonia, & castoreo: oculi melle despumato illinentur, claudunturq; premendo humores, continendoq;. Aluminis scissilis partes duæ, salis fossitii pars una. Trita cum melle sublinuntur. A L I V D. Iecur hircinum assatur, aquoq; sals inde humor collectus inungitur. Quin & ipsam iecur comedendum exhibetur, coctiq; uapor oculis excipi apertis præcipitur.

DE GLAUCOMATE ET SVF

fusione quod hypochyma dicitur, ex Rufo.

Glaucoma, & hypochyma ueteres unum idemq; magis genus esse existimauerunt. Posteriores autem glaucomata humoris, qui ob similitudinem crystalli

κρυσταλλος appellatur, uisita, ex humiditate in glaucum colorem transeuntis iudicarunt. Hypochymata humorum effusionem, qui inter tunicam ceratoidem, et crystalloidem concrecentes, uisum impediunt. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt: hypochymata autem curantur, sed non omnia. proinde suffusione tentatis succurremus, antequam malum radices egerit, consistatq; sanguinis ex cubito detractio, & purgatione, item uacuationibus acrioribus, ueluti excentaurii, aut cucumeris amaræ decocto petitis, alui solutione continenti, cucurbitulis occipitio cute incisa admotis.

Aquæ potus toto uictus curriculo competit, cibi qui extenuant assumpti. Proderit autem temporis spatium, et pituitam per os diebus aliquot educere. Quibus uero ceu culices, oculis obuersari perperam uidentur, ex quadam humotum, prauitate, uel biliosioribus uaporibus sursum distributis, medicamentum dialoes amarum exhibetur subinde, uel etiam inde sumetur purgatio. In oculis autem medicaminibus utendum est, primum simplicibus, puta melle, cum oleo &

marathri succo. postea compositis, quale est hoc. Sagapeni drachmæ duæ, liquoris cyrenaici, ueratri albi,

M lili

PAULI AEGINETAE

singulorum drachmae sex. Alii in mellis heminis octo
assumunt. Nos autem, tradit Oribasius, subscripto ute-
mur, caucalidis succi, chamedryos, sanguinaria, singulo-
rum æquis portionibus contritis. Benefaciunt item col-
lyria, & quod succo marathri constat, & Protheus &
Thalasserus, et diaopobalsamu, & quæ ex his præparan-
tur, præsidio esse solent. Insuper marathri decoctum p-
initia superfusum adiuuat. ite ex liquoribus confectum,
opobalsamo, melle, oleo ueteri & similibus.

DE GLAV COMATE VETUS VISA

fusione ex commentariis Demosthenis.

Floris aris oboli quinq, myrrhæ drachmae tres, nardi
indicæ drachma, lapidis hæmatitidis drachma: aphro-
nitri drachma, salis floris drachmae duæ opopalsami
drachmae nouem. melle Attico excepta offeruntur.

DE OBSCURITATE ET

BETVDINE.

Obscuritas, quam amaurosim Græci uocant, est totius
cernendi uisus plerunque absq; manifesto oculi affectu
impedimentum. Hebetudo (quæ amblyopia Græcorum
lingua uocatur) obscuritas uisus est, ab occulta quadam
causa proueniens. Curatio cõmunis est ei quam in sus-
fuis diximus. Priuatim uero ab angulis sanguinem mit-
tere prodest. hirudines ad mouere temporibus, inferiori-
res partes perficere. Procedente tempore etiam iis, q-
sternutamenta prouocant, utendū est, tñ uomitu ante pi-
hum, & inunctionibus, primum ex mellis & olei æqua
portione, deinde cõposito qd subiūgitur. Croci obolis
duobus, fellis hyenæ drachma, piperis cõmunis granis
octoginta quinq, marathri succi drachmis sedecim, gut-
tæ ammoniaci drachma. Contritis aridis cum succo,
mellis cochlearia quatuor adiciuntur. Præparata, exce-
ptaq; erea pyxide in usum conducuntur. priusq; uero illi
nāntur oculi in marinam calidam demersi fouentur.

DE STRABISMO.

Oculi infantium ab origine distorti sanescunt rebus faciei

LIBER TERTIVS 93

circumpositis, ut in rectum uideant. Nam strabismus conuulsoria musculorum qui bulbum mouent, dispositio est: ergo lucerna in conspectu ponitur, quæ non ex obliquo appareat. Præterea cum ad nares conuient oculis, stipulas palmeas agglutinare uincit & angulis qui tempora respiciunt: ut uisu ad has inconiuenienter directo oculos emendent. LXX.

DE OCULORVM EXPRES-

sione qui *ἐκπρῆξις* appellatur.

- 16 Exprimuntur oculi nonnunquam, ut exerti perseveret, quibus strangulatus, mali causa est, ex cubito uenam incidere oportet: sin alio modo id acciderit, medicamentis purgare ueratro nigro, uel scammonia. Si à doloribus origo est, frequenter sanè in puerperio superuenientes uteri purgationes soluunt: unde his opitulari conuenit, in uiris autem post sanguinis detractionem, si non remiserit uitium, cucurbitulam occipitis defigere commodum est. Lanam melle imbutam imponere, aut parui floccos cum aqua superq; duplicatum linteam illis 16 gare leniter. His prodest & marina frigida fronti superfusa, item sereos & polygoni succus cum meconio illitus, tum alia quæ reprimere possunt, & contrahere.

DE CONFUSIONE.

- 15 Confusiones exitu, curamus sanguinis detractione à cubito: totum oculum sanguine, potissimum quidem palumbi recens occisi, sin minus, etiam columbæ replemus: deinde lanam mollem in ouum cum uino rosaceoq; contusum demersam imponimus illigamusq;: sequenti die idem facimus, & tertio fomenta exhibemus lac instillamus, applicamusq; idonea, deinde sublinimus medicamentis quæ ad ueteres affectus inscribuntur: quale est Chiacuni.

DE MYOPIASI.

- 11 Myopiæ dicuntur Græce, lusciosi nostris, qui à prima natali die propinqua sanè uident, remota uero non item.

PAULI AEGINETAE

insanabilis est huiusmodi dispositio, ut quæ ab imbecillitate spiritus uisorii pueniat. Cōtrario his modo senes afficiuntur. Cum enim propinqua non uideant, procul disita assequuntur.

AVRICVLARIA. ET PRIMUM de aurium dolore.

Cap. XXIII.

Aurium dolor qui frigiditati fertur acceptus, ex anni tempore, præcedente uictu uel ægrotantis quoque temperatura, ubi ob exteriorem ne causam acciderit didicerimus, inde quod dolor alte citra grauitatem, uel distentionem, uel ardorem fixus sit, calfaciētibz curabitur præfidiis, nempe oleo rutaceo, uel lau-rino calido, uel amaracino, uel phuliato, uel spicato, uel communi cum euphorbio, uel piperi, uel castoreo, uel commageno dicto unguine, uel liquore balsami. Iam uero oleum in quo allium decoctum sit, uel cepa, instil-larum auxiliatur. At ex calida conceptum intemperie, dolorem in quo feruoris cuiusdam sine grauitate seu te-sione sensus est, contraria discutunt: oui aquatum in au-rem demissum, quemadmodum oculis adhibemus, lac muliebre cū quodā collyrio, quod dolorem lenit, uel succo p-dicii herbe cū modico rosaceo: ipsum quoque rosaceum, oleum, uel acetum, uel succus solani, uel coriani, uel hastu-læ regię, uel oleum in quo lumbrici, uel aselli qui in a-quosis & humidis agunt, Græci δ' ὕδωρ καὶ τὰ κινεῖ δ' ἰσὺ ἀπέ-pellant, incocti, uel oleum amygdalinum per se, uel buc-cina uiua numero tria, in eo decocta mirifice proficiunt. Quod si glutinosi crassique succi dolores fecerint, capis-tis, ipsiusque auditus grauitas & præcedentis uictus ratio restatur. Sola uero citra grauitatem distensio, spiritum au-rium flatulentum, cui exitus non patescit, indicat. Itaque in ambobus uitis utere medicamentis, quæ aperiunt inciduntque, cuiusmodi est aphronitru cum aceto & mel-le. Item fel ouillum cum oleo communi, uel amygdalis no: præterea porri & cepæ succus tepidus cum melle,

LIBER TERTIVS. 40

aut origanum cum melle & lacte muliebri instillatur.

Ad uehementiores aurium obstructions, fel caprillum

cum succo porri inditur. Verum quos amplius labor

longusq; urget, & grauis simul auditus existit, hæc quo

que commodè usurpantur, cuiusmodi dracunculi succo

cus est, ari, bryonia, & similia. priuatim uero q ob flatuo

sum indolescent spiritum, cucumis ex aqua calida fota,

auriq; demissa strenue auxiliatur. Si grauitas, distensio, si

mulq; calor & dolor pulsatis, aut etiam febricula obo

ritur, inflammatione aurem laborare censeto. Atq; sta

tim hic sanguis emittendus est, deinde fots ex oleo dul

ci & calente per specillum lana intolutu continuo adhi

bendi, meatui uero adeps anserinus uulpinusue, aut me

dicamen basilicum cum rosaceo, uel cyprino, uel irino

debet instillari: extrinsecus ea quæ dolorem leniunt, ma

teriamq; impactam concoquunt, superaccommodare.

Si dolor uiolentus est, iis utere, quæ leuiter sensum flus

pefaciunt: non enim mediocre periculum est, ne cerea

brum neruo per quem facultas audiendi erogatur, uici

num, consortii lege efficiatur. Probe igitur dolorem les

uit, opii pars nna, castorei partes duæ, cum lacte mulies

bri, uel oui albumine, aut uino dulci tepido instillantur.

Iam pastillus crocodes, aster, Philonis antidotum freo

quenter his profuerunt. Cæterum ex communi cerea

bro fouere, siue ex oleo, siue ex quodam calido fomen

to oportet, lanâq; hoc ipso imbutâ in aurê cõicere, sed

ita, ut partes inflammatione tentatæ, q fieri põt, minime at

tingantur. Veru si dolor in uetustate incidit, ac in pus de

generaturus est, medicamento utitor, qd ex lini seminis

succo conficitur, quod unâ cum rosaceo, aut chamame

lino solutum instillabis. Cum autem aqua medicata ex

balnei usu meatu recepta, auditorio dolorem parit, si

quidem copiosa fuerit, ore, uel et calamo ipsam euoca

re ratio est, ubi paulatim specillo lana inuoluto fuerit p

tracta, oleu quoddâ instillatur quod sit partium tenuiur,

aut rosaceum, aut oui album, aut lac muliebre. Calida

PAULI AEGINETAE I

uero omnia mediocriter esse conuenit, quæ auribus
adhibentur.

AD VLCERA QVÆ SIMVL

cum inflammatione affligunt.
Lycium & meconium æquali portione trita cum melle
iniiciuntur.

AD DOLORES MAXIMOS,

pus & grauem auditum.

Amygdalarum quibus corticem detraxeris & aphro
nitri singulorum drachmæ tres, opii drachmæ tres, thu
ris drachmæ tres, croci drachmæ quatuor, galbani dra
chmæ duæ, myrrhæ drachma: aceto leuigata instillan
tur. Si dolor exercet, rosaceo diluta: si pus obsedit, mul
so, uel oxymelite: si grauiter audiunt, aceto: recentia ul
cera glaucium solum per sanat, aceto subactum: item ex
eo collyria, tum quæ appellantur diarodon, diacro
cu, & diasmyrnes: quemadmodum rursus suppuran
tes citra dolorem ferri stercus cum aceto diutius con
tritum.

AD SORDIVM DVRTIEM.

Nitro aceto diluto cum aqua auris illuitur, cumque
sordes deterse sunt, nitrum aceto solutum cum rosa
ceo instillatur.

ALIVD AD SORDES.

Cardamomi & nitri exiguum, cum ficis pinguibus ex
ceptum sine seminibus, & in collyrii formam redactum
auriculæ committitur. Tertio quoque die educitur. Co
piosas enim sordes extrahit, & abunde leuat. Proficit
hoc etiam aduersus carnis excrescentias, dolores, exul
cerationes. recipit aloes, thuris, myrrhæ, singulorum
drachmam, myseos drachmas quatuor. Ex aceto in pas
tillos digeruntur, cum usus requirit, aceto & rosaceo so
luta instillantur. Idem Andronis pastillus & Hera &
Musa faciunt.

AD DIVTIRNA VLCERA.

Cedria melli admista illinitur. ALIVD, Ad eos quibus

pus profuit, Myſi uſum & in puluerem redactum inſpiratur. Per clyſterem uero oricularium eluuntur aures poſca, uel oxymelite, uel mulſo, uel decocto quorunda repellentiũ (uerbi cauſa) lenticulae uel roſarũ.

SI IN CRVORE EX VL ceribus apparuit.

Iunci rotundi decocto auris illuitur, polygoni uero ſuccus cum pauciſſimo aceto inſtillatur, uel lycium, uel amurca, uel acacia, uel porri ſuccus.

SI IN SVPER VLCERA CA ro excreuerit.

Nitro ex aqua tepida ſquama quoq; aris cum ſandara cha pari modo auriculam illinito. Vbi cruſtam acceperint, melle repurgato.

AD VERSVS AVRIVM
VERMES.

Absinthii decocto, uel centaurei, uel marrubi eluuntur capparidis foliorum uiridium aut fructus eiſdem inſtillatur, uel cedrinus liquor, uel urina humana, uetus uel album ueratrum cum melle, uel calaminthæ ſuccus, uel ſcammonia cum aceto, uel ſuccus abſinthii, oleũ uero, meatui inditum ſurſum uerſus remeare ipſos compellit potus autem eſt oxelæum. Eodem ad ea quæ auribus incidunt animalcula utitor.

AD CALCULOS ET SI milia quæ in aurem, inciderunt, extrahenda.

Specillum lana inuolutum in reſinam, aut gummi, aut aliud quoddam glutinans medicamentum demittendum, idq; in aurem iniiciendum, ibiq; uertendum eſt: utique enim ſic protrahes. Si hoc modo nihil efficitur, oleum feruens meatui continue inſtillato. At ſi ne ſic quidem exciderit, aut comprehenſum fuerit, aliis quoque utitor modis, ut in parte chirurgica docebimus.

PAULI AEGINETAE

AD SONITVM AVRI
um intra seipsas.

Si in febribus aut harum crisi- bus sonitus aurium eue-
rit, nullum ei negocium facessere oportet, quippe sta-
tim magna ex parte finiuntur. Sin autem post morbum
perseuerauerit, absinthii decocto foueri aures debent, as-
cetum rosaceum q; infundi, uel radiculæ succus cum ro-
saceo, aut ueratri nigri cum aceto. Ad ueteres autem so-
nitus, qui ex crassis glutinosisq; humoribus creantur: in-
de uero illos cognosces quod non uniuersim, sed pau-
latim crescunt nascunturq; aceto, nitro, & melle aurem
illinito. ALIUD. Veratri albi drachmæ duæ, castorei
cotidem, croci drachmæ tres, nitri drachmæ sedecim.
In aceto contrita, ut in pastillos coalescant, in usum con-
duntur.

AD VETERES SONITVS

& tinnitus.
Euphorbium cum cyprino oleo leuigatum calefactum
q; in usum capitur. in quibus autem ex amplo consen-
su uaporum spirituumque summa petentium excitantur,
castoreum & cicuræ semen tritum cum aceto instil-
latur.

AD GRAVEM AUDITVM,
& surditatem.

Quæ ab origine quidem, uel etiam prima natali die
sed longissimæ & absolutæ surditates constituuntur
nullo remedio eliduntur. Quæ uero non absolutæ qui-
dem, sed diuturnæ tamen, & ipsæ curationem non reci-
piunt, aut certe difficilissimam. Quæ ob biliosum humo-
rem sursum uergentem nascuntur, uacuationibus per
medicamenta bilem ducentia ex facili abolentur. quidã
etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descen-
dente. At ex crudis crassisq; humoribus prognatas sur-
ditates, uel grauem auditum, uenæ incisione curato, aut
omnino purgatione ex hiera, tum medicamentis quæ
per os & nares pituitam eliciunt, Græci apophlegmas

tiſſimos & errhina dicunt. item balneis ſua ſponte ſcatu-
 rientibus, uel ex aqua marina. Porro in meatum ubi ſas-
 cultas audiendi eſt, conuenit inſtillare, quæ ad ſonitus tra-
 pita ſunt. Priuatim uero hæc: Vrina & fel caprillum, aut
 ſeoriſim fel, aut rutę ſuccus cum melle, aut caſtoreum cū
 oleo anethino, & ex hyſſopo medicamentum cum nar-
 dino unguine, uel caprillum fel cum galbano: uel quod
 recipit caſtorei drachmas duas, nitri ueratri albi, ſingulo-
 rum drachmam.

AD COMPRESSA AVRIVM

foramina, quæ θαλασσις dicitur.

Hippocrates quidem nihil ipsis adhibendum præcipit.
 Cum uero sæpe ab ægrotis cogamur, utendum eſt his:
 Myrrha, aloes, thuris, acaciæ, pari ſingulorum modo, ac-
 ceto uel oui candido illinuntur: uel panis calidi mica cū
 melle in pila tuſa admouetur: uel bituminis, thuris, alo-
 es, cochlearum carnis, bulborum ſpumæ, paria ponde-
 ra aceto contrita imponito. Si inflammatio oborta eſt,
 ſeſamo leuigata applicantur, uel chondro, cum aceto
 cocto. laxiora autem ſunto cataplaſmata, & lana oleo
 imbuta auris anfractui demittatur.

DE PAROTIDIBVS.

Parotis glandularū ſub ipsis auribus affectus eſt, mate-
 ria morbi illic emanante modo à capite humoribus ui-
 delicet in eo obſtructis, modo à reliquo corpe in febris
 b^o criſim expertis orię. Si igitur alte adhuc deliteſcēs paro-
 tis in tumorē nō attollię, natura debet adiutari ꝑſidiis, q̃
 coactas ſordes extrahāt, uel ēt cucurbitula agglutinata,
 uel crebro ſotuū uſu. Nā ſi in altū recurrat colluies, ꝑi-
 culū haud mediocre ſubſecuturū eſt. Sin aut inflammatio
 ne tētata in tumorē erūpat, ecōtrario iis q̃ leniunt, & cō-
 coquūt utemur cataplaſmatis, quale eſt ex farina hor-
 deacea, aut triticea, aut ſemine lini cū mulſa, aut foenuſ
 græci, aut althææ aut chamæmelorū diluto incoctū. itē
 qđ ex lapatho & axungia inſulſa cōſtat. at ſi exuperare
 ſanguis tibi uideat, prius ipſum uenæ ſectiōe uacuabis:

PAULI AEGINETAE

modo vires permittant. Tumore autem non discusso,
medicamentis utere quæ puri mouendo sunt, nempe fa-
rina triticea cum pinguium ficorum decocto, uel oleo,
tum medicamento quod ex polline, & quod fermento
confectum est. Vbi iam abscessus ad suppurationem
spectarit, uel cute ferro discissa pus excernetur, uel acri
medicamento rumpeatur, cuiusmodi existit similion ap-
pellatum, & dialscordon. Cæterum mitiores parotidas
etiam fots ex muria discutit, item medicamentum dia-
peranu. Hoc sanè etiam pus iam maturatū digerit, præ-
ter quod dolori leniendo sit efficacissimum. Ad inuete-
ratas parotidas buccinorum, aut purpurarum combus-
tarum cinerem cum melle, uel axungia imponemus,
aut ficus marina incoctas, uel marrubium cum sale. In-
duratas autem iam emollit & medicamen Mnasei, &
Ariobarbanios, optimum etiam quod ex succo lini ses-
minis præparatur. ante hæc autem illinere ammonias
cum conuenit, mista cum cataplasmatibus pice liqui-
da, uel seuo taurino, uel bdellio, uel styrace, uel me-
dulla ceruina.

DE NARIVM ET OLFA- ctus uitis. Cap. XXXIII.

OLfaciendi facultate oblata, si uox seruetur inco-
lumis, ad priores cerebri uentriculos morbus re-
feretur, qui aut ex intemperie sola noxam con-
ceperunt, aut etiam ex humorum copia. sin autem uox
quoque mali contagium senserit, laboriosior quodam-
modo reddita propter meatus (qui à colando ethmoi-
des græce uocantur) obstruatos, affectum rursus malis
quibusdam succis contrahi censeo. Itaque cerebri in-
temperies, ubi ex notis sæpius à me dictis deprehensa
fuerit, contrariis curatur remediis: caput marina calida
superfunditur: humores apophlegmatis eliciendi. Ma-
xime uero utitor medicamentis quæ per nares ualide
educunt, & quæ odore mouent ex tenuibus facta parti-
culis, quemadmodum in defluxionibus, adhibeto. Cū
totius

totius corporis humorum copia suspicio subest, hæc prius, aut sanguinis dimissione, aut purgatione ex hiera uacuatur. Ita quoque in polypode & ozæna faciundū est deinde loco inducuntur remedia, qñ & theriace posita sæpe magno fuit præsidio. Ceterum polypus, tumor præter naturam in naribus oritur, substantia respondens polypodis carunculæ: eiusdem uero naturæ est, & sarcoma. Ozæna ulcus est, putridum ex humorum acrium illuue creatum.

AD POLYPODAS ET SARCOMATA.

Squamæ æris drachmæ octo, atramēti sutorii drachmæ sex, sandarachæ drachmæ quatuor, ueratri nigri drachmæ duæ: naribus inspirantur. In usu hoc est laudatissimum, nam tredecim diebus insigne affert præsidium. benefacit & atramentum sutorium cū aceto. ALIVD. Malicorii drachmæ duodecim, atramenti sutorii drachmæ decem, chalcitidis drachmæ octo, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubii, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, ueratri albi drachmæ quatuor. sicco utitor. ALIVD. Diphygitrito nares, linamētoq; funiculari atringūtur dilatāturq;.

AD OZÆNAS.

Misyos, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drachmæ septem, atramenti sutorii drachmæ sex, aluminis scisilis, gallæ, squamæ æris, singulorum drachmæ quatuor, aluminis rotundi drachmæ duæ, thuris drachma una, aceti sextarius. Vbi ad mellis spissitudinem uenerit, totum in uase æreo cogtur, ex carptis linamētis utitor. ALIVD. Aeruginem & æris squamam pari portione aridum medicamentum facito.

AD FOEDVM NARIVM ODOREM.

Myrrhæ, acaciæ, amomi, singulorum pondo drachma melle cocto excepta summo narium intersepto iubeto agglutinari. ALIVD. Amomi, myrrhæ, rosarum PAV. ÆGIN. N

PAULI AEGINETAE

ficcarum partes æquales, nardino unguento exceptas il-
linito. Item bene facit aduersus foeditatem odoris, &
malagma ex menta cum uino admotum.

AD NARIVM VLCERA.

Cerux libra, argenti spumæ quadrans, recrementi plu-
bi tantundem, uel plumbi combusti omnia uero lota
sunto, excipianturq; uino myrteoq; oleo.

AD VLCERA QVAE VO-

cantur glycea.

Argenti spumæ drachmæ quatuor, rutæ nouellæ toti-
dem, aluminis scissilis drachmæ duæ, Myrteo oleo ace-
toq; excipiuntur.

QVAE STERNUTAMENTA
CITENT.

Veratrum album, uel castoreum, uel piper, uel struthiū
uel simul omnia: non autem oportet inspirare, sed pin-
na uel digito penitissime in nasum demittere, ubi sternu-
tamentum frequentius est, medicamento sedari debet.
Infunditur nardinum, uel rosaceum, uel glycelæum. Iā
quæ odorem mouent, sternutamēta sedant, anisum, oci-
mum, stipulæ contusæ: sed ante hæc omnia caput desic-
candum est. smegmatis ex nitro & pumice factis, uel et
asclepio uocato utendum, & Constantini sapone, & sa-
le cappadocico, similibusq;.

AD SANGVINIS ERUPTIO-

nem, è naribus.

Sanguinis è naribus pfluuiū, quod febribus supuenit, se-
cundo uolumine inter illas sum executus. De eo autem
quæ alia quacūq; de causa accidit, nulloq; fisti potest re-
medio, in præsentia tractabimus. Chalcitidem contritā
linamento funiculari, aqua imbuto, uel eo quod à geni-
talis humani forma priapiscō appellant exceptam, na-
rium foraminibus demittes. Vel testā oui exustam ad-
miscbis, & dimidiatam gallæ partem, uel lycio indico
attinges. Vel aselli domestici combusti cinerem inspira-
bis, Vel aselli expressi succum instillato, uel molaris las-

pidis aceto extincti, uaporē naribus obliçito. Vel hoc quoq; medicamēto obstruēti utitor, Māñ, thuris, partem unam, aloes partē dimidiā. Candido oui llquore excipito: ac utitor, p linamentum funiculare, extrinsecus leporis pilis unctiōni adactis. Vel linteū intortum in nares cōiçito. Vel cucurbitulā leuē directē, qua sanguis pfluit, affigito: præcordiis autē magnā, & constanter ad moueto. Vel aures ualide obstruantur, frons spōgiis ex aqua frigida foueatur. Vel cucurbitula occipitio agglutinetur, cum sanguinis detractiōe: interim ēt sanguinē emittere cōuenit, si nihil phibet, & summas partes uinç culis excipere, præsertim brachia & femora, sicut in uenæ sectione fieri solet. Eadē motu cōcuti iubeto, manus uero fricatione, pedes autem obambulatione. Nam uenis indidem sanguine repletis narium uasa depleuntur. Item spongia in poscam frigidam demersa: naribusq; profluentibus à foris strictim admota: id quod requiritur, subinde perfectit: melius autem proficit longo pennis nicillo naribus prius subiecto.

AD FACIEI VITIA.

QVOMODO FACIES A RVgis asseratur. Cap. XXV.

T Huris denarii quatuor fuci drachmæ tres, argēti spumæ, piperis, singulorū drachmæ octo, oia ex ichthyocollæ tunsæ diluto soluuntur, in pastillos redacta usui sunt. ALIVD. Eburnei scobis drachmæ octo, thuris masculi, ichthyocollæ pares portiones. Utitor, quemadmodum est prædictum.

AD FACIEI NIGRITIAS.

Iridis, uel ptisanæ, lomenti singulorum sextarius unus semis, salis ammoniaci, cornu ceruini cōbusti, thymiamatis, ammoniaci, singulorum uncia duæ. Aqua dissoluta in pastillos coguntur, ac iterū aqua trita ante balneū illi nuntur. ALIVD. Ptisanæ, erui, thuris, illyricæ, aphronis tri, singulorum choenices quatuor, costi, amygdalorum amarorum singulorum drachmæ uiginti. Ouorum albumine, lacteq; asinino subigito, ac utitor ueluti

PAULI AEGINETAE

prædiximus. Benefacit etiam pastillus Peponatos: sibiq

AD EPHELIDEM ET LEN

TICVLA S.

Terræ cimoliæ torrefactæ, congius semius, aphronitri

tofti drachmæ octo, erui siliquæ drachmæ quatuor, fel

lis taurini, eburnei scobis singulorum drachmæ octo.

Leuigatis facies defricatur. ALIVD. Facis com

bustæ denarii decem, *erui farinæ denarii quindecim,

ueatri albi denarii quinç, aphronitri denarii decem, al

cyonii denarii decem, trita infricantur.

AD SVGGILLATA.

Per initia decocto fœnugræci, postea & meliloti oculi

fouentur. Nilei collyrium diarodon aqua solutum illi

nitur: deinde diasmyrnu. Et si nihil profecerit, id quod

diasandicos inscribitur, combustum perungitur, uel hyf

sopum aqua maceratum applicatur. Vel hyssopo in pā

niculum illigato, & calida aqua respersa foueri debent,

uel acri muria, item radiculæ corticem cum melle detri

tum impones, hoc etiam ueteribus efficax est. Porro ad

uetusta faciei sugillata & luores, tordili partes duas, ter

ræ samia partem unam cū melle admovento, cura adhi

bita ne exulceretur.

ALIVD DETERSORIVM.

Hyssopi, thapsiæ, casia, singulorum drachmas duas, ce

ræ tantundem, terebinthinæ drachmā iniicito, cauens ne

exulcerationem excites, eoq; frequenter tolles.

DE VARIS.

Exigui sunt & duri in facie tumores. Oxymelite illito, uel

argenti spuma cum terebinthina, aut olei candidi mo

mento trita infricando perunguntur: uel alumen fissile

cum terebinthina, uel amygdala amara aceto macerata

infricantur. In callum uero cōcretos uaros, saponis gal

lici drachmis quatuor, thuris, ammoniaci, singulis dra

chmis aqua dissolutis perungito, & post horam eluito.

AD VAROS, PILOS, ET

aspre dinem faciei.

*Editu...
exēplar
græcum
erui, sed
ē po si & p
ē po si & di
stinctim
habet de
marios de
cē, lomē
ti totidē
sed uetus
sequor

5

19

15

20

25

30

35

LIBER TERTIVS

99

Cera denarii decem, terebinthinae denarius, uisci denarii duo. Liquantur, superq; oleum infunditur, facies hoc medicamento eluitur, tollit enim radicitus. **ALIVD.**

Papaver detritum, uel pulegiū cum sale acetoq; illinito.

5 CERATVM THAIDIS QVO

facies rubescat.

Croci erythrodani radices, fuci, thuris, myrrhae, singulorum drachmae duae. Adipe uitulino oleoq; mastichino excipiuntur: deinde illinuntur. Interposito tempore, spō

10 gia ex calente aqua facies abstergitur. Cæterum faciei remedia, etiam reliquo corpori conuenient.

DE ORIS AFFECTIBVS: ET

primum de dentiū dolore. Cap. XXVI.

15 **D**Entium dolorem sine gingiuarū inflammatione interim in proprio ipsorū corpore, interim in neruo, qui ad ipsos pertinet, oriri contingit.

quapropter ualentissimorum in hoc medicaminū usus est. Atq; inde plurima ipsorum q̄ acerrimo aceto præ-

20 parantur. At gingiuis propter inflammationem dolentibus, præsentissimum est remedium, oleum lentiscinū, calore temperatum, si in ore retineatur, esto autem id recens: nā uetus tanto recenti deterius, quanto calidius. Huc autē omnia dirigi debent, ut humor qui toto cor-

25 pore superat, prius euacuetur.

AD DENTIVM INFLAM

MATIONEM.

Os colluitur aceto, in quo decocta sit galla, uel halicacabi radix, alterci semen foliave, uel pulegium, uel solani

30 succus, uel capparis radix, uel myrti folia, uel polium, uel cucumis syluestris radix, uel rutæ folia, cum oxymelite, uel cornu ceruinum, uel acetum scillites, uel pyrethrum, cum hyssopo. At erosionem experto denti, styracem cum opio imponito: uel sulfur uiuum cum lycio:

35 uel alterci seminis uaporem excipiat per infundibulū.

Item Philonis antidotū denti circūlitum, dolorē sedat.

M iii

PAULI AEGINETÆ

Quodd si defluxione laborent dentes, myrti, lentisci, & gallæ diluto colluentur. Vel rhus syriaci, balaustii, uel mali corii, salis autem partes duæ adiguntur: aluminis usti, & aceto extincti tritiq; pars una: deinde uino perlusuntur. porro gingiuis cruentis alumen tenue inspergitur uel aloë cum uino eluuntur. uel rubi radice uino made facta, uel rhu syriaco. cruentis autem & defluxione tentatis gingiuis crudum salsamentum in olla combustum, quoad cinere in carbones redigatur, attingito. At mobiles stabilit aloë inspersa, uel rhus syriacus, uel alumen scisfile, uel galla, uel rubi radix per se, aut cum uino incocta.

ALIVD AD DENTES.

Ficus pinguis uiridis corticem terito, eiusq; ius, cū habes, in dentem conicito. Myrrham ueram, & alumen scisfile, ubi omnia in unitatem coegeris, ad usum recōdito. Ac in aurem qua dens indolet, demittito & p̄sana bis. ALIVD. Ad dentes mobiles, & gingiuas fluxione pressas: omniaq; oris ulcera depascentia, chalcitidis tota drachmæ duodecim, cadmiæ drachmæ octo. In usu siccum, cum aceto sine dolore dentes tollit, farina cū liquore tithymalli imponitur, & super hederæ foliū accommodatur, ac per horam finitur, sua enim sponte dens conteretur. Dentifricium, quod & parulidibus bene facit. Aluminis latercularii, salis ammoniaci, myrrhæ, costi, pyrethri, singulorum pondo triens, piperis grana octoginta.

AD PARVLIDAS.

Sulfuris uiui, piperis, aluminis scissi, æquales portiones. Ac parulis inflāmatio quædā est in aliqua gingiuaron parte suscitata, q̄ nisi discussa fuerit, in suppurationē uertitur. & cū suppurauerit, scalpello inciditur, luna mentisq; insertis aperitur. Epulis autē carnis excrecētia est, quæ ab inflāmatione contracta ad intimos molares dentes pertinet: nonnunq̄ cum febris & dolore. Quoniam igitur reprimi debet, utendū est æruginē rala priuatim:

LIBER TERTIVS. 100

uel cum pari galla, uel fori combusto, uel alumine quo libet cremato, uel galla per se, uel squama æris cū aceto diebus sat multis leuigata deficcataq;.

DENTIFRICIVM.

- 15 Aristolochiæ radix combusta, cerui cornu combustum cum mastiches momento, salis candidi melle respersi & fici foliis inuoluti exusti q; donec in carbones mutantur. ALIVD. Euccina sale respersa, usta q;, cochleæ terrestres cum melle combustæ, lanæ succidæ cum paululo sale usta. Singulis ipsorum grati odoris gratia misceatur iunci rotundi flos, uel nardi spicæ, uel folium malabathri, uel iuncus odoratus angulosus, uel iris.

DENTIVM CANDOR QVO

- modo fiat, & oris suauitas, gingiuaq; reprimantur. Pumicis, salis tosti, iridis, singulorum drachmæ quatuor iunci odorati angulosi drachmæ quinq;, spicæ nardi drachma, piperis drachmæ sex. Tritis utitor.

AD STUPOREM DENTIVM.

- 20 Stupori benefacit portulaca cōmanducata, uel oleū qd immaturæ oliuæ fuderūt infricatū, uel amurca in æreo uase cocta, donec mellis spissitudinem habeat. atq; ueusta si perungatur, magnum affert momentum.

AD DENTES ATTRITOS.

- 25 Dentibus attritis, baccarum lauri, aluminis scissi, aristolochiæ sarmentaciæ, singulorum pares portiones iniiciuntur.

AD GINGIVAS EXESAS.

- 30 Rosarum floris drachmis octo, gallarū drachmis quatuor, myrrhæ drachmis duabus, si gingiua exesæ & flaccidæ, cum q; infirmitate humentes colluantur, consanescunt. Idem præstat lac asininum, oliuæ foliorum decoctū, acetū scillites. Arida uero admota, ærugo ferri, cythini. Tumidas excrecentesq; gingiuas portulacæ succus in ore retentus, muria, oleum ex colymbadibus oliuis, uel immaturis expressum, uel lentiscinum, uel melinum

* Vtrūq; exēplar habet, Et uetusta illa. sed Galenus in libro πρὶ ἐν πρὶ πρὶ, pater superiora re media, et hanc sententiam quo potius modo legit.

N IIII

PAULI ÆGINE TÆ

amurcāq; discutit, sicca autem ærugo ferri, uel æris, aristolochiæ radix, arnoglossi semen, dyphryges, atramentum sutorium tostum, cytini.

AD DISR VPTA LABRA.

Amurca cocta illinatur: uel adeps anserinus cum melle, terebinthina æquali portione, rosarum floris, hyssopi, rosacei, singulorum momentum.

AD VERSVS LINGVÆ MOR-

bum qui batrachus appellatur.

Batrachus tumor est, ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maxime in pueris: itaq; locus mi syos, æruginis rasæ, pari pondere sicco perfricatur. Mentum autem adhiberi debet medicamentum Anthera, uel spherion, uel ex ouis parygrum. postremum remediū est uenas sub lingua diuidere. A L I V D. Valet etiam ad oris ulcera, quas Greci aphthas uocant, æruginis rasæ, gallæ, chalcitidis, singulorum equale pondus cū passo, os etiam his colluitur. A L I V D. Erui farina cum melle prius absterfis, delinitur. Gallæ leuis cum melle, uel rosarum flores similiter. Vel oliuæ foliorum decocto pars affecta eluitur.

AD TONSILLARVM INFLAMMATIONEM.

Si in febris tonsillæ, & columella inflammationem senserint, gargarizare conuenit decocto fursurū, aut rosarū, aut palmarum, aut myxæ, aut lenticulæ. Cū uero inflammatio remittit, consistitve, mel ipsis adiciendum est, qd̄ per initia facere nō oportet, nec in augmento, ne acrimonia fluxionē quādam concitet. Vbi in suppurationē conuersa fuerit, gargarizandum est ex mulla uel lenticulæ decocto, uel rosarum: idq; faciendum est, donec in totum soluatur. Aut stomatica compositio ad gargarizandum etiam exhibebitur. At si serpentina tonsillis ulcerata oboriantur, utendum qd̄ & præscriptis, sed priuatim exhiberi debet medicamē diamoron, ex aqua calida, uel aqua mulla, quæ rosarū inspersarum florē obtineat,

uel costum, uel rhus siccum, uel decoctum, uel glauci
 foliorum aridorum decoctum, quod amarum est, opti-
 me aufacit si succus, ut ad collyria utimur, leuigatis in
 mulsa additur. ipsius autē fruticis sicci, si inspiretur, usus
 5 est laudatissimus, aut si digito admoueat, cura uero
 habenda est ne prorsus attingatur, aut certe leniter ad-
 admodum. Profuit & pastillus Andronius. Post hæc
 acria irritantiaue gargarizatur ex medicamento, quod
 radice quam dulcem appellant: constat, aut eo quod
 10 croco, uino scybelite, terra chia, & myrrha componitur,
 deinde amylo, & tragachanto. Vbi iam constiterit ulce-
 rum depastio, gargarizandum medicamento ex lacte,
 & samia terra confecto. A L I V D. Ex malo puniceo
 dulci cum cortice tuso succus exprimitur, & eius par-
 15 tes sex, mellis uni mistæ coquantur, donec eis mellis spi-
 situdo sit & perunguntur. A L I V D. Gallæ imaturæ
 uncia duæ, aluminis scissilis uncia, salis ammoniaci 10
 sili tantundem. Aridum apprimitur. A L I V D. Gallæ
 drachmæ octo, misyos drachmæ duæ, salis tostæ drach-
 20 mæ quinque in usum adhibentur. est autem An-
 thias tonsillarum tumor duritiem præferens,

DE VVA

Vva si inflammationem experitur, gargarizandum ex
 iisdem, quæ tonsillæ inflammante postulant, & medio-
 15 criter astringentibus, qualis est mali Punici succus per
 cochlear, uel instrumentum, quod ab una attollenda sta-
 phileparton appellant, subiectus, tum per se, tum cum
 melle affatim costo: uel dulcis radix, mali Punici succo
 20 mista, proficit etiam succus dulcis radicis cum melle il-
 litus. iam hæmatites lapis uuam reprimat, & phrygius
 combustus, & ageratus, item ex lapide phrygio medica-
 men ad pudenda inscriptum. His adduntur terra samia,
 erethrias, sinopis, lemnia, omphacium, per se & cū ho-
 25 rum aliquo. Item spinæ Egyptiæ fructus: alumen scissi-
 le, rosæ uero, & semen, & folia leniorem effectum præ-
 stant, præterea gummi, tragacantha, sarcocolla, amy-

PAULI AEGIN ET A

lum: quibus utendum dum magis una prematur ab astringentibus constricta ubi crassior in rotunditatem creuerit, quod uitium iam uiani proprie dicunt, gargarizationibus eluenda, & ex myrrha, & croco, & iunco odorato anguloso. Contusiones autem cauendæ sunt. ob quod pinna potius perungere conuenit. compositum uero hoc utile est, thus syriaci drachmæ octo, croci drachmæ quatuor, costi drachmæ octo, rosarum seminis drachmæ quatuor. Præterea gingiuis benefacit, linum ex purpura murina, quod uiperæ collo circumdatum ipsam strangulauerit, deinde circumadigatur tonsillis, & colli uitis, mirabili quodam modo opitulatur, ut Galenus author est.

AD SANGVINIS EX ORE

PROFLUVIUM

Marrubii folia tinsa imponuntur, uel sponsula recens in picem crudam mersa comburitur, in puluerem coacta admodum utile est remedium. Item os, perluere rosis siccis, aut uiridibus. Ad hæc decocto frigido, uel pampinorum uitis, uel lentisci foliorum, uel rutæ, uel malorum cydoniorum, uel rosarum, uel uuæ acinorum, uel lenticularum.

DE ANGINA EIVSQUE

speciebus, ubi etiam de strangula

tis, uel alio modo suffocatis

tis agitur. Cap. XXVII.

Angina, quæ musculis faucium interioribus inflammatis accidit, synanche Græcis appellatur: quæ exterioribus, parasynanche. Eodem modo & in gutture habet: cuius si interiores musculi inflammatione confluentur, cynanche: si exteriores, paracynanche. Hæ enim comites notæ sunt, spiritus rectæ ceruice uix trahitur, nonnullis febricula oritur, faciei rubor, ceruicisq; Ad hæc tumor etiam in quibusdam superuenit. Aeger ore conuiuet, cibum non deuorare, non potum potest. Cynanchicos uero strangulatus quos

que interdum secutus est. Pueris raro talis affectus oboritur, nisi cum ceruicis uertebra affecta loco excidunt. Verum illis ceu curationem non recipientibus, ac deploratis, manum admoliri non oportet. Reliquis autem sanguis protinus è cubito mittendus est, sed non uniuersim, uerum pluribus interpositis uicibus euacuabitur. quippe cumulata, uniuersimque facta uacuatione, anima ipsis deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum materia in affectam partem collectim prorumpit. Si per hæc parum proficitur, eas quoque uenas incidere conuenit, quæ sub lingua sunt, uel ipsa quoque lingua scarificanda, si turgens magis exeritur. Alius acriore clystere subduci debet, pedes, aqua calida foueri, extremæ partes ualide deligari, collum lanis succidis, uel etiam oleo imbutis contegi. crudaque polenta, quæ Græcis *ωμηνλυσ* dicitur, gargarizandum per initia ex iis, quæ in tonsillarum inflammatione dicta sunt, uel eo medicamento simplici quod ex moris est, cum rhus decocto. Potius autem est quod syluestribus moris conficitur. Deinde & composito, quod mora recipit, uel eo quod ex nucibus pinguibus perungitur. Cum morbus uiget, consistitque, & nitri momentum admiscendum est aut sulfuris uini, nisi a crimonia quædam prohibeat, item sterus caninum aridum contusum, & cum melle peruictum, præstantissimum est remedium. Atque huius generis album maxime, tum syluestrium hirundinum similiter cinis efficax est. Si malum longius prorogatur, etiam perunctione diabesasa, utemur, nunc uires ipsius remittentes, aliorum mistura, nunc iterum intendentes. Cucurbitula quoque, uel hirudo sub mento, & circa ceruicem admouetur. tum commodum gargarizare, ex ualentioribus, iride, hyssopo, melanthio, abrotano, dulci radice, ficis pinguibus in mulla decoctis, uel rutæ succo cum lacte, uel sinapi cum oxymelite. Sin autem hæc quodammodo acriter percipiantur, oleum ipsis quam optimum calens exhibetur, aut rosaceum per se, aut cum cremore pisanæ, aut

foenugraeci gargarizandū. Cibus sit triduo aqua mulsa,
inde pūsanæ cremor cum dulci quadam potione, dein
de & ouorum lutea perliquida, ac sorbitiones ex chon
dro, ubi deuorare melius cœperint. In summa, cibi egri
uiribus respondebunt. Cum morbus cœperit inclinare,
egri deambulationibus & balneo credentur: pars affec
ta cerato ex oleo rutaceo operietur, reliquaq; uirium
recollegendarum ratio, ut par est, adhibebitur. Porro ex
strangulatis, quibus spuma iam circa os emanat, manus
admoueri non debet: si Hippocratis consilio acquiesce
mus. Alii uero uitæ restituantur, aceti infusione & pipe
ris, uel urticæ fructus in aceto triti acerrimo. Verum ga
agre magnoq; negotio assumunt, compellere eos ra
tio est. Simulataq; uero colli impedimenta dissoluatur,
statim sursum respiciunt & anguntur. simili modo in his
qui naufragium passi sunt. Summatim in omnibus
qui suffocantur. Nam ita horum calor recreatur res
focillaturq;.

DE GRAVEDINE, DE

stillatione, raucitate, & tussi.

Cap. XXVIII.

Communis est omnibus uitiis, excrementitii hu
moris ex capite in subiectas partes descensus:
si in nares decumbit, & per eas defluit, *καρπυ*
& Græcis, grauedo Latinis malum appellatur: si per pa
latum in fauces, simplici uocabulo *κατάρπος*, nobis de
stillatio: si in guttur & asperam arteriam destillet, ut mē
branam interiorē quæ hanc integit, exasperauerit, rati
citas tunc sequitur, uocaturq; malum græce *βρογχος* &
κατάρπος. In quibus non solum ex capite, sed etiam
uehementi clamoris conatu, & spiritus inspiratu frigidi,
asperitas contrahitur, inflammationem repræsentans. Si
morbus non finitur, fluxioq; in pectus pulmonesq; in
gruit, tussis oboritur ipsis maligna ac contumax. Quæ
& propter intemperiem subinde accidit, interim calidā
ut in febribus: interim frigidā, ut aquiloniis diebus, eaq;

magis sicca est. Iam uero aliis quoque morbis tussis nō
 nunquam superuenit: uerbi gratia, pleuriticis, iecorariis,
 phthificis, pulmonariis quare Galenus in diuturna tussi
 grandines quasdam ex pectore educi memoriae manda
 5 uit. Alexander autem calculum quendam grauem, qua
 lis in meatibus urinariis nascitur, post longam tussim ex
 pulsum, ac inde illam quoque cessasse prodidit. Porro
 nos in sanguinis eruptione calculos excerni uidimus,
 quemadmodum cum illuc peruentum erit, exactius cō
 10 memorabimus. Qui igitur ex aestu grauedinem, uel de
 stillationem concipiunt, his particulae incalescunt, acris,
 tenuisq; humor destillat, tum per nares, tum per os, tum
 facies rubescit, & nasus. Qui ex frigore, iis caput undiq;
 & frons distenditur: meatusq; quos à colo ethmoides
 15 uocant, clauduntur, ne uox deorsum per nares transme
 et: si longius malum trahatur, tussicula quoq; affligit,
 pituita educitur, nunc cruda & liquida, nunc uiridis.
 Quibusdam & febris superuenit, quae ob aestum la
 borantes nihil iuuat: frigore pressis, etiam concoctio
 20 nem efficit.

CVRATIO DESTILLA tionis & grauedinis.

Vbi calida praepollet intemperies, iis pugnandum est
 praesidiis, quae dolori capitis ex tali causa contracto con
 25 ueniunt: balneo utendum est, caput aqua copiosiore ca
 lida perfundendum. Cibi uero his proderunt ad sorbi
 tionem aptati, quae sorbilia, amygdala, sumenalia, quae itria
 dicuntur, sesama necnon amygdala. item fructus conii:
 & quae ex lacte fiunt bellaria: uina dulcia, non uetera: me
 30 dicamentum diacodion linctu assumptum, & quae his
 congruunt composita auxilia. Quod si frigida intem
 peries afficiat, & morbus contumax sit, modico uten
 dum cibo est, caput calefacientibus subtilibusq; nardis
 no, rutaceoq; debet perungi. Irinum uero non solum
 35 illinitur, sed etiam naribus instillatur: quae intus thure, &
 myrrha cum oleo perunguntur, praesertim si perfrictio

PAVLI AEGIN ETAE

gravedinem erearit. Alios lacinae panniculorum cornu
busta, uel melanthium, uel cuminum ustum demissum
q; panniculo reficit. Iam cyphi selenaicum, id est lunare,
olfactum prodest, frōtiq; illitum, cui simul unum ex em
plastris, quæ inflammationem arcent agglutinabitur. Ex
empli gratia, Icesium, uel Oxera, uel Barbarus, uel Athe
na ad destillationem ex frigore ortam & cyphi potus
utilis est. Thorax autem balsami liquore per lanas succi
das superillinitur, idem styrace & irino, uel anethino cir
cunfouetur. Cibis calidioribus & ad concoctionem
promptis uti commodum est, ubi iam materia conco
quitur, medicamen quod pituitam per os educat, idon
neum erit, tum capitis smegmata, nempe Constantini sa
po, atque eius generis consimilia.

RAVCITATIS CURATIO.

Raucitati, quam arteriacum & branchū appellauimus,
competent quidem superius comprehensa, uerum pri
uatim ubi arteria & guttur inflammationem experitur,
emplasticis, id est, obstruendi meatus facultate præditis
per initia utemur, donec inflammatio remissior euase
rit: illiusmodi uero sunt quæ ex passo cretensi, tragacan
tha, gummi & amylo constant. Item pinguium palmarum
decoctum, & dulcis radicis cum sapa, donec mel
lis spissitudinem conquirat. Item compositionū, quas,
quod sub lingua teneantur, ὁ πρὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ appellant, u
sus est. Ante omnia uinum hoc tempore circuncidendū
postquam inflammatio moderatior fuerit reddita, uinū
dulce assumetur, tum confecta ex melle, lacte cum amy
lo, uel pane siligineo. Ad hæc sorbitiones ex amygdal
lis, butyrumq; utile. At si humor in particulas se recepe
rit, transeundum est ad ea quæ ualentius abstergunt, cui
usmodi est faba cum corticibus suis elixa, & quæ ex
melle præparantur. His adde brasicam & porra probe
cocta: medicamenta uero calidiora & ad tussim accō
modata profunt, quæ constant sapa ficis pingnibus, thu
se, tride, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinamo

LIBER TERTIVS.

104

mo, casia & his similibus.

DE TVSSI.

Tussis quoque eadem ratione curanda: hoc solum inspicitur, num & alia particulae condoleant: uerbi gratia, an gurgulio destillet, uel caput, aliis ne morbis conficietur. His ubi quam fieri potest optime erit prospectum, curationem molire, quemadmodum à me comprehensum est, diceturque in posterum. Compositorum uero remediorum scriptura, deinceps subiecta est.

CATAPOTIA AD DE

stillationem in fauces

& tussim.

Styracis, myrrhae, opii, galbani singulorum pares portiones passio excipiuntur, uel priuatim in pila contunduntur, & ad magnitudinem erui terna, quaternave aut quina, noctu dormituro dantur: passumque supbibitur. Haec ad acrem tenuemque, fluxilem ualent.

ALIUD. Alterci seminis drachmae duodecim, nucleorum pineorum drachmae sex, croci drachmae duae, sapa, uel passio in usu excipiuntur.

ECLEGMATA.

Mellis pondo uncia, butyri pondo semuncia, simul in cocta exhibentur: item ex hyssopo, ficibus, nucleis pineis, & iride decoctum sorbetur.

CATAPOTIA AD VETEREM

tussim accommodata.

Styracis drachmae sex, myrrhae drachmae duae semis, rebinthinæ, galbani, opopanacis, iridis, singulorum drachmae duae piperis atbi, nitri, seminis alterci, lachrymae papaueris, singulorum pondo drachma, sine ullo liquore in pila tunduntur, & catapotia formantur: utitur prae dictum est.

AD ASPREDINEM GVTTVRIS,

tussim & sputum cruentum.

35 Amygdala amara, quibus cortex sit detractus uiginti quibus, seminis lini torrefacti drachmae quatuor, tragacathæ

PAULI AEGINETAE

drachmæ duæ, pini nuclei triginta, oui in adipe costi luteum. Tragacanthum, aqua maceratur. Totum uero passo excipitur: si uero & sonus uocis fuerit oblatum, mel miscetur in passi uicem, & præsertim in quibus educi ex gutture aliquid oportet.

ARTERIACE QVÆ QVOD

sub lingua teneatur hypoglossis appellata, facit ad abscissionem uocis, raucitatem. item ad eos qui ægre reiciunt, anaphoricos Græci noiant.

Tragacanthæ drachmæ sex, gummi tantundem, myrrhæ drachma, thuris drachma una semis, piperis alba grana uiginti, croci drachma una, dulcis radice succi drachmæ sex, phœnicobalanorum trium caro, passi cretici, quantum sufficit. Atque succus tragacanthæ solus ipse se sub lingua loco dulcis radice succi retentus. Eiusdem decoctum dum spissitudinem habeat quadruplum inditur.

ARTERIACE AD ABSCIS-

sum uocis sonum conuenit, & eius claritatem.

Porra sex coquito, dum tabuerint, atque ipsa proiicito, iuri ipsorum succum alicæ admisceto, mel & ouorum prius decoctorum lutea tria simul incoquito, circumagi-

COMPOSITIO AD TVSSIM,

Græce bechicon appellatur.

vide an
fescuncia
legendū
sit.

Pulegii pondo sextans, nucleorum pineorum, cnici seminis, lini seminis, singulorum pondo uncia, piperis costi et pondo triens, melle cocto excipiuntur. ALIVD. Hyssopi, pulegii, piperis costi singulorum uncia, petroselinii semuncia, mellis hemina.

MEDICAMENTVM TVSSIM

ueterem concoquens.

Mellis denarii sedecim, terebinthinæ denarii duo, galbani

LIBER TERTIVS 105

hani denarij quatuordecim. Vbi simul fuerint incocta, orbiculi finguntur, circa fabę magnitudinis, nucisve auelanę atq; ex his delingitur. A L I V D. Aridam tusfim curant tum arteriaca medicamenta, tum aquę nonnunq; feruentis sorbitio, nam dum propter pituitę crassitiem non excreant reiciuntq; , humectantibus aliquantulum iuuantur. Cęterum conuenit ipsis etiam hyssopi, iridis & pinei nuclei decoctum.

PASTILLVS A FVMO DICO

10 tus capnistos, ad tusfim continuam.

Styracis, piperis, mastiches, petroselini, singulorum unciam, sandarachę scrupulos sex, baccas lauri duas. Melle excepta in carbones proiecto fumumq; excitato, ut tusfiens hunc per infundibulum aspiret, conuenit & qualem cunq; perfrictionem expertis.

DE ORTHOPNOEA, SVSPICIO

rio, & spirandi difficultate. Cap. XXIX.

20 **Q**ui febris expertes, crebro ueluti à citatione cursu respirant, ab accidenti quod superuenit, nostris suspiriosi, Gręcis ἀσθματικοί appellantur, iidemq; quod strangulari metuentes, sub recto pectore toto respirationi incubant, orthopnoęci dicuntur. Creatur hoc mali dum fistulosę pulmonum cauernę crassis glutinosisque humoribus fuerint infarctę: spirandi autę 25 difficultas communiter & his & aliis compluribus affectibus superuenit. In curandis suspiriosis huc omnis cura dirigenda est, ut per extenuantia abstergentiaq; medicamina, glutinosus humor & crassus absumatur. Acetum igitur ipsis conueniet scillites, & oxymelitis ex ipso præparati potio, ipsaq; scilla tosta tritaq; cum melle. Ex an- 30 tidotis hiera, & purgatio continens ex ualidissimis medicamentis petita, à radícula uomitus, aristolochia rotunda pota, centaurii magni radix, spodylii fructus radixq; calaminthę fructus, hyssopus, iris, melanthium: asellorū 35 q in aquosis & humidis agunt, sextarius in uas fictile cōiectus, carbonibus subditis frigitur: ubi candorē acquis

PAV. AGIN.

PAULI AEGINETAE

erint, teruntur, & melle excepta mystri mensura ante cibum secundumq; ipsum dantur. Quod si necessitas urgeat, etiam uena ante haec omnia inciditur, & quantum uires patiuntur, sanguis detrahatur, alius clysteris irritatur. Thorax à foris ficibus & lolii farina adiuuandus est, cui adiecta sit resina, cera & mel. Iam iris & manna inspunguntur. Non inutilis est & polenta cruda, cum resina, cera, iride & manna. Postea super imponuntur unguenta, quæ magis excalfaciunt, irinum, anethinum, rutaceum. Sed quod subscribitur medicamentum, huic uitio propriè dicatum est: Pumicis pars una, fæculæ quæ est uini fax combusta, partes quatuor, auripigmenti pars una, iunci rotundi floris partes duæ, alcyonii pars una, aphronitri partes duæ. Contusa percolantur: unguentisq; excepta, thoraci infricantur. Malagmatis utendum est quæ saniem possunt extrahere.

POTIO SVSPIRIOSIS APTA.

Polii, abrotani, castorei, chamæpyteos, guttæ ammoniaci, singulorum par modus. Melle conspersa exhibetur.

ALITER. Nonnulli dederunt, aphronitri cochlearium cum tribus mulsæ cyathis. **ALIVD.** Aphronitri dodrans, piperis drachma, silphii drachma semis. Cochlearium ex aqua datur. **ALIVD.** Castorei, suffiminis ammoniaci singulorum drachmæ sex, piperis grana uiginti passo excipiuntur. Instar fabæ cum mulsâ exhibetur. **ALIVD.** Sinapi drachma, nitri spumæ tres oboli, elaterii semiobolus. Totum in pastillos octo digeritur: bini duobus diebus offeruntur, nam sine molestia supra purgant. His qui præfocantur, aphronitri drachmæ tres, cum tribus hydromelitis cyathis assumetur, ac cum cardamomo nonnunquam subito auxiliantur. benefacit etiam coxendicibus.

DE PERIPNEUMONIA. Ca. XXX.

P Eripneumonia pulmonis est inflammatio, quæ plurimum ex ualentibus in eam partem distillat

tionibus, aut angina, aut suspitio, aut pleuritide aliisve morbis contrahitur. Aliquādo etiam ipsa inflammatio affectus origo est. Hunc casum subsequitur spiritus difficultas, febris acuta & ardens, grauitas distensioq; pectoris, uultus turgidus magnam repletionem materiae sursum ignis instar impetu uergentis, fatetur. Malae in his rubent, oculi intumescunt, supercilia deorsum feruntur, tunica oculi ceratoides ob cornus imaginem dicta in pinguedinem languescit. Cum haec signa æstus flagrantio-
 10 rem referre uidentur, inflammatio erysipelatis naturam respiciens, subesse existimabitur. In iis igitur qui ex aliis morbis in hunc decidunt, sanguinis detractio uitanda est, maxime si diu hoc in statu fuerint, uel si per initia sanguinem dimiserint. Verum alius in morbi remissione clystere ducenda est, si ægre respondet: aut cucurbitulae, ubi nihil obstat, pectori, & lateribus admo-
 15 dæ sunt eaq; per grandes, & multas, cute incisa. Sin autem peripneumoniae affectus statim ab initio inuasit, sanguinem mittere, si uires id permittant, ex usu est: sin minus, cucurbitulas certe desigere: quibus tantum elicietur sanguinis, quantum uirtus patitur. Quod ad cibum uero attinet, danda est sorbitio ex ptisanæ cremore & chondri cum melle, uel ex amaris amygdalis cum simillagine, aut chondro dulci quadam portione admixta, hydro-
 20 melite, uel apomelite, uel hydrosolato. Recte sumitur & recens butyrum, cochlearibus circa tribus. Propinatur autem ipsis ficuum cum hyssopo decoctum, uel iridis in mulla coctæ, uel leuigatæ instar duum cochlearium mullæ insperforum. Hoc itidem, ab inferioribus parti-
 25 bus expurgat. At uirtutis tuendæ gratia crebrius potui assumetur mulla per se & cum nucleis pineis, ac cucurbitulae uniuerso thoraci lateribusq; agglutinabuntur. Ceratum uero cyprinum quod contineat iridem ada-
 30 dam, imponetur, uel ceratum ex rutaceo oleo, & iride sicca, uel medicamentum ex cera, resina, medulla, butyro, hyssopo, iride sicca, & nardino unguento.

PAULI AEGINETAE
DE CRUENTIS SPVTIS.

Cap. XXXI.

CRuentum sputum si uiolenter disrupta uenarū
commercia excitant, magna sanguinis profusio
comitatur. Et quidem rumpuntur illa. mo-
do manifestiore ex causa, ut alto delapsu, clamore &
consimilibus, modo ex occulta, ueluti plenitudine, aut
frigore immodico, nam id uenis rumpendis esse habi-
le scribit Hippocrates. Si uero ex esa parte, aliqua sputū
cruentum editur, non confertim sed paulatim sanguis
reiiicitur, sic ut acres quidam prauiq; cibi, uel inedia, uel
acris ex capite in pulmonem destillatio præcesserit. At
si os alicuius uenæ ad apertum sanguinem emittat, nul-
lum quidem ex prædictis, præterq; plenitudo interdum
præcedit, sed uictus humidior calidiorq;, balnei immo-
derati usus, calidi nimis loci inhabitatio morbum face-
re uidebitur, ut neq; inflammationes, neq; febres labo-
resue torserint: sicut in iis euenit qui ex eso uenarū cor-
pore διασπορῶν appellant, sanguinem expuunt. Imo cō-
tra leuius faciliusq; agent (ut uerisimile est) euacuati. At
si hæmorrhoides, aut mulierum menstrua, non respon-
derint: etiam periculis erumpens sanguis subtrahet. Idē
uero hic pariter iis qui plenitudinis causa per rupturam
uacuantur, satis ad ualitudinem proderit, nisi ex ulcere,
aut immodica uacuatione noxam senserint. Quæ ues-
ro ex esis uasorum tunicis sanguinis sit euacuatio, nunq;
commode cadit, facitq; ualitudini. Quod si per uomiti-
um excreetur, clarum est eum ex stomachi aut uentris
culi regionibus procedere. In quibus & per anum pro-
ritatus nonnunquam uacuatur. Tussis sanguinem extun-
dit ab instrumentis respirationi dicatis. Iam uero si spu-
mans & subalbidus ex interualloq; reiiicitur, ut dolor
absit & pressio, ex pulmone ferri notum est. In quibus
temporis spatio, febris sequetur continens, partibusq;
quibusdam potissimum corrosis, non nihil etiam pulmo-
nis substantiæ, aut guttur, aut uena egeretur. Notus cer-

te quidam mihi est ex iis qui sanguinem è pulmone reiciunt, temporis processu maxima cum tusi & sanguinis copia, calculos quatuor aut quinque expuisse asperos tribulorum modo, ad magnitudinem * cicerum

- 5 trium aut quatuor, ac deinde dolore leuatus est: paulo post tabe consumptus interiit. Porro si pituitosa cum tusi si leuiore, uel sputo quoque edantur, eaque spumosa leuiaque, ex aspera arteria prodire scito: si ater sanguis & in grumum concretus fuerit, doloremque in loco intensat, ex thorace educi significatur, per pulmonem arteriamve translatus: qui uero cum sputo, ex faucibus per palatum educitur. Caterum si quando à capite destillet, cum irritatione quadam & tusi editur, ut qui ad guttur defluat, iterumque sursum feratur, horum causa primaria est, acris plurima ex parte destillatio, uel capitis dolor, uel grauitas. Accidit autem nonnunquam per palatum sanguinem uacuari, & propter hirudinem deuoratum, & alicui indidem particulæ adhærescentem. Verum de hac in libro de uenenis pertractabitur.

20 CVRATIO.

- Quibus destillatio cruentum sputum concitat, uena protinus debet incidi, nisi uehementer acris humor destillauerit, ac pro uirum modo sanguis detrahi. Extrema deligari, oleoque ueteri calido, uel sicyonio præter caput perfricari. cibis adhiberi frumentaceus, cui succus alicuius austeri adiectus sit, Verbi gratia, Mali granati, pistorum, pomorum, uel illa eadem simul incoquantur. Dormituro ex pastillo dia electri datur, tertio die mellis cocti momentum delingitur. Quod si morbus 30 longior hoc uicerit, capiti detonso medicamentum, quod ex fimo syluestrium columbarum constat, imponis, & tribus horis interpositis, balneo agrum committis, sic ut caput nequaquam inungatur. Deinde ubi sorbitionibus alueris, somnum capturo, theriace antidotum datur iterumque die insequenti. Similiter totum corpus, præter caput perfricatur, huic autem ceratum.

O iii

* Hoc uerbi gratie non est sed conicio tale quid deesse

PAULI AEGINETAE

ex tapfia, aut aliud quoddam iniicitur. Et rursus utendū
 sorbitionibus. Quod si malum in uetustatem incidit,
 cucurbitula occipitio defigenda est. At si acris admodū
 fuerit destillatio, sanguinis detractio cauēri debet. alimē-
 tis autem & præsidiis iis tum quæ supra, ubi de destilla-
 tione egimus, comprehensa sunt, tum quæ mox dicen-
 tur, utendum. Qui ob frigoris iniurias sanguinem spu-
 unt, thorax illis fouendus est remediis, quæ calfaciunt
 ipsum & desiccant: quod præstat medicamentum dia-
 dyo pepereon, id est, quod duplici pipere constat, una
 cum pastillo diaelectru exhibitum. At qui disruptis spi-
 ritus officinis, aut oris uenarum patefactis, sanguinem
 reiciunt, uenam iis secare conuenit, nisi sanguinis copia
 prorumpat. omnes autem quos hoc uitii premit, locis
 aeri expositis decumbent, lecto immobili figura subli-
 mi, cauētes ne uehementer respirent sonumq; edant,
 imponendaq; extrinsecus supra id quod dolet, spōgia
 ex tepente posca. A septimo die lana succida cum rosa-
 ceo, uel myrteo, uel lentiscino, cui interim acetum, inte-
 rim uinum austerum sit additum: si copiose effertur, fa-
 rinæ pollinem, & mannam cum aceto super accomo-
 damus, uel alumē, uel acaciam, uel malicorium, uel gal-
 lam cum aceto, uel palmulas cum polentis & malis cy-
 doniis in uino austero decoctis. post hæc autem & em-
 plastrum ex salicibus iniiciendum, præsertim ubi mode-
 ratior sanguis fertur. Per os autem hæc sumpta profi-
 ciunt: portulaca commanducata, benefacit, efficacior
 autem, succus ipsius epotus balaustium, rubi fructus &
 flos, roboris fibrosum, & quod sub glandis cortice est.
 maxime uero cocto ipso utuntur, fagi & ilicis. præstan-
 tiora sunt, rheum, samia terra ad omnem sanguinis reie-
 ctionem. Item lemnia sphragis, lapis hæmatites in tenui-
 ssimum pollinem detritus cum succo mali punici, uel
 polygonii. pondus autem lapidis erit scrupulus unus.
 Composita medicamenta hæc prosunt: pastilli diaeles-
 tru, dia coralliu, & qui ex spina ægyptia conficitur.

LIBER TERTIVS. 108

Item aridum compositum ex terra samia, lenia sphragide, corallio, symphyto, amylo omnibus pari modo. In his autem qui corrosis partibus expuunt sanguinem idq; potissimum, ut destillatio præcesserit, & opii partē semissem adilicimus. Insuper medicamentum his facit, quod samiaæ terræ, agerati lapidis, lemniaæ sphragidis, æquas portiones capit: duobus cochleariis potum ex duobus arnogiolla succi cyathis. A L I V D. Lemniaæ sphragidis drachmas sedecim, samiaæ terræ drachmas octodecim, amyli drachmas octo, sarcocolla drachmas quatuor, gummi drachmas duas, aridi, quod xerion medicamentum dicitur, cochlearia * undecim, *Vulgatū cum decocti palmularum cyathis duobus. Sorbeant exēplar autem poscam frigidam uel palmularum, uel pomorum, uel pirorum, uel pampinorum uitis, uel eiusmodi cuiusdam decoctum. Cibum sument, si uires requirant, ad secundam tertiamve horam: sin minus, circiter quartam. Panis sit lotus ex aqua frigida, uel alica, uel chondrus cum quodam succo refrigerante, puta mali grati, uel myrti uel omphacomelitis, uel oua sorbilia, uel aliquod ex lacte bellarium, cum quodam astringente. Inter olera seris, cichorion, arnogiolla cum oleo immaturo acetoq; incocta. Ex fructibus fugacibus poma, pira, mespila, malum granatum, corni fructus: potus erit, si febris careant uinum aquosum, modicum: si febris adest, ex prædictis quædam potio uel hydromelum citrullum. Porro qui uomunt sanguinem, iisdem sustentandi sunt, sola hac cura adhibita, ne crebro cibum sumant: quippe ex facili curantur, quatenus auxilia etiam quæ bibuntur particulis ipsis sanguinem fundentibus ex aduerso applicentur. At sanguine in uentriculo grumi instar concreto, coagulum potandum est, maxime leporinum, aut lixiuum ex ficu cū aqua, uel thymū, uel thymbra cū aceto, uel etiā ex lacte scisili uacuari debent, aut ex aloe. Rursus qui per palatū sanguine excreant, gargarizabūt ex astringentibus, frontiq; & capiti adinuenda

O fili

PAULI AEGINETAE

sunt quæ ex naribus sanguinem fundentibus accom-
modatur. Hæc eorum qui sanguinem expuunt cura-
tio est, quam summa obire cura conuenit propter im-
minens ex immodica uacuatione periculum: siquidem
copiose uacuatus sanguis, quemadmodum in his qui
ingulantur, mortem infert præsentaneam: si affectus res
manet, in tabem transire minatur. Postquam igitur
omnia, ut postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis
fluor substituerit, uires ipsis nutriendæ sunt roburq; adhi-
bendum, ac pisces & recentium porculorum petun-
culi ac cerebella huc faciunt: corpus perfricari de-
bet. inimica sunt balnei frequens usus, & uini pos-
sio, ira & uenus.

DE PURULENTIS ET TABE

quæ phthisis dicitur. Cap. XXXII.

Purulenta excreatio quam Græci empyema nos-
minant, in uacuis thoracis regionibus, uel mem-
brana quæ costas succingit, colligitur: interim
propter sanguinis eruptionem, ulcere ad cicatricem nõ
perducto, quod etiam tabes statim comitatur, si ex pul-
mone fiat reiectio: interim ex inflammatione, ubi ab-
scesserit, ruptaq; fuerit: quemadmodum & in laterum
doloribus, quam pleuritidem uocant: uel propter con-
fluxum & capite manantem. Hæ notæ pus collectum
testantur grauitas pectoris, tussis ualida, siccaq; cum do-
lore, aliquando etiam cum humiditate ob quam rele-
uari quoque uidentur, febriculæ per initia affligunt, lan-
guidæ, inordinatæ, & ad iudicandum difficiles. postquã
uero abscessus ad uomicam inclinauerit, uehementius
cum quodam horrore febricitant, ac in sermonis pro-
prietate conturbantur, offendunturq; spiritu. Rupto ab-
scessu, pus educitur, nunc purum, nunc fœculentum, nõ
nunq; sursum abscessus erumpit: quãdo et periculosior
est: nonnunquã infra. Atq; ea quæ inferius tendunt, par-
tim in uentrem & intestinum transsumuntur, partim
in uesicam traductione per uasa quædam administrata,

semper autem febris hectica laborant, quoad sursum omnia fuerint educta. In quibus nisi summa adhibeatur diligentia, protinus saniosa illa collectio, tabem accersit, dum pulmo exulcerationem sustinet. Simulatque uero
 5 phthisis confirmata fuerit, genae liuescunt, sudores in fronte, ac ceruice defluunt, carnes consumuntur, ungues curuantur, pinguesque exalbidi, uel pallidi apparent. Malo iam uincente, uenter turbatur, praecordia sursum conuoluntur, fitis ipsos magis conficit, cibi que fastidium urget,
 10 & id quod sursum uergit uehementer, foedi odoris est.

CVRATIO.

Primum igitur puris concoctio adiuuanda est, fomentis per spongas, & cataplasmatibus, ex hordei farinis cum ficiis pinguibus incoctis, resina modica, columbarum fimo, nitro, & hebisco. Rupturam uomicae promouet etiam sani lateris incubitus, mulsa autem sorbitio interposito tempore, & ptisanae cremoris cum melle. Valentiores, bibant decoctum quoque hyssopi, & thymi cum melle, opitulatur rupturæ, & salforum esus, & cataplas
 15 tia hierae diacolocynthidos dormituro data. At ubi purus excerni coeperit, iterum dabitur hyssopi, iridis, & dulcis radices, decoctorum in mulsa dilutum, uel dulcis radicula cum sisamo detrita. Item pollen, mulsa & oleo incoctus superaccommodatur. Quod si ulcus curatio
 25 ni sit rebelle, composito utendum est, puta medicamento ex marrubio, simplici & composito. item eo quod eruis constat, necnon dodecatheo & phyloxeno appellatis. Verum in tabem quae phthisis dicitur decidentibus, porra capitata, quae chondri & ptisanæ iure contabuerint, exhibentur: quae simul per se bis cocta offeruntur.
 30 Potus, aqua coelestis erit, atque mulsa inde confecta. Extrinsecus applicantur per initia, ubi conquiritur malum, cataplasma ex semine lini: & pollinis decocto, foenugraeci, uel maluae, olei, mellis & foliorum althaeae. Inde tempore quodam intermissio, ad cerata ex butyro, cyprino, laurino, & iride transitus est, quin & emplastri

Mnafei usus conducit. Verum si thorax fluxione infectetur, medicamentum ex salicibus confectum recte imponitur, atq; superius in purulentis simplicia dicta, nonnulla q; composita ipsis propinquantur. Tussi uero grauius ter affligente, thymum, hyssopum cum succo radiculae dulcis melle discosto excepta, formataq; , sub lingua tenenda dantur. Cæterum conueniet ipsis & antidotum Mythridatis, diebus intercedentibus: sic quod uiperis constat. Optimum uero auxilium est, & boli armeni portio. Item Esdre antidotum, nihilo prædictis minus proficit.

DE LATERALI DOLORE,
qui pleuritis dicitur. Cap. XXXIII.

Pleuritis qui nobis lateralis dolor appellatur, proprie inflammatio est membranae, quæ costas succingit. Huic accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua, dolor à summa humerorum compage, ad extremas costarum cartilagines perinens. Sed pleuriticus morbus à iocinoris inflammatione, in qua etiã omnia modo comprehensa apparent, his notis discernetur. Illi nanque dolor punctilis adest, tussis allas sicca, cum & crudus morbus significatur, allas cum sputo, quæ humoris qui morbum facit, index est. Rubrum siquidẽ & cruentum editur, cum sanguis superat. Flauum uero & suppalidum, cum flaua bilis: quemadmodum rursus cibum, & leuiter spumofum, cum pituita. ob melancholicum succum nigrius: pulsumq; durum & serræ modo asperum obtinent. Iocinoris autem inflammationi, neque punctilis dolor, neque pulsus adeo durus superuenit, uerum tussis perpetuo sicca & quæ nihil emoluitur, male habet: facies colorem, decoremq; amittit. At quibus laterum morbi ex musculorum exteriorum inflammatione creantur qui proprie pleuritici non sunt, iis sine tussi, sine sputo, ac pulsus duritie, tactu leniter locus affectus indolescit: atque si tumor purulentus non fuerit discussus, ad exteriora post sectionem pro-

rumpit, cum pleuritis quæ inflammationi membranæ costas integrentis fertur accepta, eo non euadat. Illa namque, nisi uel extra, uel intus, purulenta colluies, empyema dicunt expurgetur, multo citius in peripneumonia degenerat.

C V R A T I O.

Itaque si dolor ad iugulum usque peruenit, remedium est sanguis dimissus, sin autem ad præcordia descendat purgatio. Recentiores autem omnibus uenam incidunt, ueriti, ut opinor, turbationem, quam purgatio solet accersire. Quod si uires non patiantur, neutrum facere oportet. Clysteribus acerbis utendum: post illos, si dolor fuerit tolerabilis, aqua muſa, & ptisanæ, uel chondri cremor propinari debet. Vbi morbus inclinauerit, porrû cremoribus recte iniicitur, uel calamynthæ, uel pulegii, uel cnidi semen, cum melle delingitur. Porro uehementiores dolores à corporis uacuatione leniendi sunt lana calente, aut sulphurata imposita, aut etiam fomentis ex milio, aut furfure per sacculos adhibitis aut ex aqua calida aut oleo in uesicula. Lanasq; succidas imponere utile est cum oleo & uino ex marina præparato. Vel sal iniicere uel cataplasma quod seminibus constat ex discocaro chamæmeli, althææ, uel ficorum pinguium, iridis, absinthii, mellis modico cum oleo nardino. Quarto die cibi erunt sorbitiones cum mellis momento, à septimo autem linctus ex amygdalis, & cnidi semine, melle contritis dabitur, uel eclegma quod ex butyro & melle coctum est, utendumq; medicamento ex melle cocto, quod quia sub lingua tenetur, Græci uocant hypoglottida. Epithemata conuenient tum quod à graui odore dysodes nuncupant, tum quod constat sampsiicho. Item emplastrum pereganera dictum, locis dolentibus utiliter accommodatur. Præterea ad curationem bulbi cum axungia cocti frequenter fuerunt abunde. Alio iniici debet ab inferioribus partibus medicamen, ex butyro & terebinthina. At

PAULI ÆGINETÆ

efficacius elegendma est ex fructu piceæ, amygdalis amaris, lini semine, nucleo pineo, & amylo æquali portione cum melle. Quos torquent uigiliæ, medicamen ex papauere salubriter delingunt. Ex antidotis & Athanasia, & alijs ad hoc compositis utemur. Post quartumdecimum diem, si malum remanet, cucurbitulæ ipsis admodum ueri, tenuiorq; seruari uictus debet. Deinde morbo inclinante galneo æger credetur, frigus uitabit, firmiore recreabitur cibo. At si inflammatio membranæ costas integrentis non discussa, in pus transire uideatur, supra commemoratis utendum.

AD LATERV M DOLORES

SINE FEBRI.

Laterum doloribus sine febre, bdellium medetur, & coctus, & brassicæ caulium combustarum cineri adipsq; mixta. Nam id medicamenti assatim digerit.

DE CORDIS AFFECTIBUS.

Cap. XXXIII.

Cordis affectus si quidem primario accidit, omnino destitutus medicorum auxilio, in maturam mortem præcipitat, nempe cum inflammationem, erysipelata, & intemperies calidas in acutissimis febribus ipsum experitur, item sanguinis profluuium ex sinistri uentriculi uulnere. At si consortii lege afficiatur, cerebro iocinore, ore uentriculi laborante, tum si ob tristitiam, metumq; & alias plerasque causas, syncopen appellatam sustinebit in qua subito uires uniuersæ collabuntur. Notæ ipsius sunt, resolutio, animæ defectus, pulsuum paruitas, extrema frigida, & in sudorem prorumpentia. Quæ inquam, syncope si ualida est, medicinæ locus non est. Si ulres adhuc tantillum constant, aliquando ad sanitatem recursus est. Idem ualentes cordis palpitaciones sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. Idem uero cor si incaluerit, magnam crebratq; edit respirationem: sit refrixerit, exiguam & raram. Sed quomodo cordis syncope possit emendari, secundo

LIBER TERTIVS. III

do uolumine, inter ea quæ febris superueniunt, sumus
executi. Tantum uero hic adiiciendum est, si casus euin-
cit ubi extrema perfricata fuerint, inunctaq; , puluerem
est uia: pauimento aliave refrigeria particulis sudore dif-
flatis inficere prodest. tū myrtus detrita, uel cimolia cre-
ta, uel electrum, uel malicorium cum manna, uel terra
samia cum gummi recte inducetur. Extremis autem
frigentibus ad usq; inguina & alas sinapi, uel pyrethrū,
uel adarce imponitur. Cibus erit panis ex aqua, aut uis-
no frigido temperato, suum ungulæ, articuli, rostra, alæ,
omniaq; frigida. Capiti fronti q; omphacinū, aut astrin-
gens aliquod cum gummi imponitur, uel rosarum deco-
cto. Præcordiis & stomacho cataplasma admoveo-
bitur ex palmulis, rosis, cenanthe, acacia, hypocystide &
alumine.

DE PALPITATIONE CORDIS.

Novi, Galenus inquit, qui annis singulis uerno tempo-
re, cordis palpitatione affligeretur. Aduersus quam ue-
næ sectionem triennium expertus commodam quarto
anno sanguinem prius misit quàm morbo corripere-
tur, atque ita securus fuit: eo q; modo multis subsequen-
tibus annis fecitauit, & conuenienti uictus ratione usus
est, attamen & hic ante senectutem, fato functus est, quē
admodum alii quoque omnes, nonnulli in febribus ac-
cutis subita syncope oppressi similiter interierunt, alii ip-
forum etiam citra syncopen, uelut apoplexia tentati.
Complures repente diem obierunt, annos nati minus
L, magis uero XL.

DE MAMILLARVM AFFE-

ctibus. Cap. XXXV.

LAc à partu sæpe casei modo coactum mamillis
inflammationes parit. Utendum igitur per initia
est hisce rebus spongia mollis posca egelida im-
buta, expressaq; loco fasciis superaccommodatur: uel
palmulæ cum pane ex posca contritæ, uel ouo toto uti-
tendū est cum rosaceo, & cerati momento, uel alumine

PAULI AEGINETAE

psyllioq; cum coriano, uel portulaca delinitur. Vel lapis
pyrites tritus cum cerato impositus illigatur. At disten-
tione oborta, uel lacte in grumos concreto, panis ex hy-
drelæo, aut mulso iniicitur. Aut panis cum perdicii her-
ba uiridi simul & cerato bis quotidie, aut lomentum
cum hydromelite, uel sapa applicatur. Quod si uero
grauitatem non tolerauerint, superfusione utendum est
ex dulci oleo calente, per lanas deliciores. Eotus au-
tem adhibendi ex fauore calidæ aquæ, uel decocto foe-
nugræci, uel althææ, uel apii seminis. Delinere uero ma-
millas conuenit polline farinaceo cum semine lini, aut
foenugræco cum hydromelite, aut sesamo quod cum
melle aut butyro sit leuigatum. Cæterum lactare cautio
est, nam maior per exuctionem materies illic citabitur.
Inclinante autem inflammatione, cerata hæc recte indu-
cuntur, beta oleo incocta quoad intabuerit, ipsa quidem
proiicitur, oleo autem ceræ modicum iungitur, usuiq;
est. **ALIVD.** Quorum crudorum lutea decem, ceras
to miscentur, cui uncia duæ & semis ceræ, rosacei un-
cia quatuor sint adiectæ. Postquam rudicula agitaueris,
muræ quantum recipere potest inditur, & rursus ubi
permoueris, utitor. Porro ad mamillarum duritias, facit
& medicamentum ex melle: tum omnia molliendi fa-
cultate donata. Cum tumor in abscessum uertitur, iis u-
tendum est, quæ in parotidibus comprehensa sunt,
item illis, quæ, ubi de abscessibus tractandum erit enu-
merabimus.

ARCHIGENIS DE EROSIONE

mamillarum cum malignitate.
Vini Adriani boni sextarii uiginti, rhus, quo coriarii utu-
tur pondo libra, cupressi pilularum tantundum, gallæ
immaturæ nigræ pondo selibra, cassiæ tantundem. Con-
tusa uino diebus decem commadescant, deinde mota
cupressi rudicula, ad dimidias fere coquuntur, atque
tum herbæ proiiciuntur, succus coquitur dum mellis
spissitudo fiat, deinde uitreo uase reconditur. In ulces

ribus depascenibus mero utitor. Si autem crassius fuerit medicamen, uino liquandum est: ut applicetur maxillis depastis, auribus suppuratis, gingiuis cum infirmitate humentibus, intestinorum torminibus. Idem uero dolores etiam lenit, lacte dilutum. Aliæ mammarum exulcerationes communem reliquis ulceribus, curationem recipient.

QVOMODO MAMILLÆ

conferuentur.

10 Cuminum cum aqua tritum mamillis illinitur, deinde spongia extrinsecus imposita, ex posca pectus cinctura stringito, à tribus diebus cumino deposito, mamillis florem bulborum cum melle superaccommodato. Et deligatum rursus triduum finito, idq; ter mense facito.

15 ALIVD. Cicuta in pollinem detrita ad nouem dies imponitur: spongiaq; extrinsecus, sicut comprehensum est pauculis diebus interpositis idē facito. Quin & Naxiæ cotis detrimentū uirginū mamillas conseruat, tueturq;.

AD FOEDVM AXILLARVM

20 odorem, sudationesq; . Cap. XXXVI.

A Luminis liquidi partes duæ, myrrhæ pars una.

Vino dissolutis utitor. ALIVD. Molybdenam combustam, uinoq; odorato extinctam, ex uino terito, myrrhæ momentum iniiciens quo ad sordium fiat spissitudo, ac utitor. ALIVD. Argenti spumæ pondod denariorū sedecim, myrrhæ pōdo denariorū duū, amomi pōdo denarii unius. uino excipiātur. ALIVD. Aluminis liquidi drachme octo, amomi, myrrhæ, spice nardi, singulorū drachmæ quatuor uino leuigatis utitor.

30 DE STOMACHI, PRÆCORDIORVM & uentriculi affectibus. Cap. XXXVII.

D E cibi fastidio & febrib' supuenit, grādi fame, q̄ græci bulimō uocāt, canino appetitu, stomachi ibecillitate, ai defectu, insup siti, singultu, nausea, et syncope, libro superiore ubi de febrib' tractatū ē, abūde discernim'. q̄re de eisdē rursū dicere oportunū nō ē. At

PAULI AEGINETAE

Inflammationes oris uentriculi, & iecinoris, astringen-
 tia misceri desiderant. Nam si solo relaxante praesidio
 curationem tentes, uitae periculum intuleris. Ob quam
 causam, siue oleum fuerit quod superfunditur, siue cata-
 plasma, recte adiicitur astringens aliquod, uerbi causa,
 absinthium, uel nardinum unguetum, uel melinum, uel
 cydonium incoctum. Ceratum uero eius notae est quo
 subinde utimur ceræ candidæ uncia, per aestatem drach-
 mis septem, aloes, mastichæ, singulis denariis, olei om-
 phacini uel melini, & nardini in usu quantum ad spissitu-
 dinem satis est. Sin maiorem requirat astringentem tan-
 ta stomachi imbecillitas, ut ne cibus quidem sit retinen-
 dis, recte miscetur et omphacini drachma, aut absinthii
 succi æqualis mensura, & tertio ad hæc hypocistidis, æ-
 nanthæ, & rhus succi. Deinde ceratæ modus adiungen-
 dus est, qui aliorum medicaminum numero proportio-
 ne respondeat. Quod si inueterascit inflammatio, indu-
 rescitq; tunc uaria magis applicare oportet, tum ea quæ
 ex aromatis non nihil, & emollientibus digerentibusq; con-
 tinent, cuiusmodi est quæ philagrianum, & quæ ab odore gra-
 to & odoris dicitur. Item quod ex meliloto præparatur,
 & uiridis iaspidis torques à collo suspensus, ut stom-
 achum contingat magno est præsidio. In calida autem
 stomachi ac ardente intemperie sic ut eius resolutio si-
 mul inuaserit, uel anima deficiat, uel quoddam cibi fa-
 stidium urgeat ex quacunque tandem occasione præ-
 terquam febri, aqua frigida cum acoris succo propina-
 tur, uel malorum cydoniorum decoctum, uel pampini
 uitis, uel seminis cucumis: uel puluis cum frigida. Verum
 stomacho uesicam aqua frigida repletam, uel cucurbi-
 tæ semina imposito. Catapotia quæ siti restinguendæ
 sunt, danda, ut supra desiti à nobis dictum est. Porro me-
 dicamen quod stomachum cum infirmitate humentem
 refrigeret confirmetq; istud est: Rosarum uiridium fo-
 liorum drachmæ sex, dulcis radiculae succi drachmæ
 quinque: uino dulci excipiuntur, & ut sub lingua teneri
 possint,

LIBER TERTIVS

possint, formantur. Cæterum in quibus crassior pituita
calefieri incidiq; desiderat, hoc medicamentum profi-
cit: Marathri radicis corticis uncia duæ, aceti sextarius
unus & dimidius, aloes quadrans, mellis pondo qua-
tuor. Radices cum aceto coctæ exprimuntur abiciunturq;
Mel autem inditum ad spissitudinem usq; coquitur,
& tunc aloë trita inspergitur. Tria huius cochlearia
cum aqua sumuntur: quidam uero sine aloë ipsum præ-
parant, iam uero medicamentum dia calaminthes his
idoneum est. Quibus autem cibus accessit, coriani semi-
nis, drachma polentæ modo formata commode bibi-
tur, uel mastichæ cochlear, uel lactucæ albæ seminis co-
chlearia duo. Compositum autem hoc est. Piperis pōdo
drachma, anethi seminis pondo drachmæ tres, cumini
pōdo drachmæ quatuor: trita cochleari uno noctu sub
somnium uino temperato præbentur. Porro in quibus
atra bile uitiosus est stomachus & inflatione laborat,
spongiæ in accessionibus aceto acerrimo imbutæ ap-
plicentur. Deinde si dolor remanserit, alumen cum ære
trito, melle exceptum admouetur, sereos succus bibitur
uel menta potui inspergitur. Si flatibus turget stomachus,
& distenditur, calaminthes decocto, mediocris mellis
piperisq; mensura mixta exhibetur. Ad stomachi
peruersiones conueniunt mali granati acidi nucleos
rum succi partes tres, mentæ succi pars una. Vbi
coxis quoad in unitatem coierint, ante cibum mye-
strum unum dato.

AD STOMACHI SALIVAM.

Acetum scillites, aut halmadarum oliuarum cremor,
aut summiratis oleæ decoctum per clysterem ab infe-
rioribus immittitur, aut etiam minimum ex ipso deuor-
ratur. Inter omnia præsentissimum est, aloë aqua diluta.
Ad eos autem qui cibum non continent, quos ueteres
proprie stomachicos nominant, scœnugræci farina mel-
li mixta, & malue semen tritum aridum illinitur: ceratum
uero ex cera, irini olei fece & castoreo.

PAV. AEGIN.

P

PAULI AEGINETAE
DE CIBI FASTIDIO QVOD

græci *ἀνορεξία* uocant.

Fastidium, quod anorexia dicitur, est, cum stomachus
intemperie uitiosus, aut humorum redundantia cibos
auersatur. Calidam intemperiem testantur, sitis, nidorosi
oletosiq; ructus, si cibus præter uoluntatem sit assum-
ptus, item si frigidiora potius & elaboratu peruiacia,
hac detenti queant concoquere. Frigidam contraria in-
dicant: neq; enim in hac ægri sitiunt: neq; frigida susti-
nent, & acida nonnunquam eructant. Qui humorum
uitio cibum respuunt, partim ob tenuitatem ac rosi-
onem illorum ita laborantes, uentriculi demorsu torquentur,
nausea q; magis & siti conficiuntur. Quibus autem hu-
mores computruerint, interdum si etiam febricitant. At
quos crassi uiscosi q; succi male habent, ii nec rosi-
onem uentriculi, nec sitim experiuntur omnino communiter
autem omnibus superuenit nausea. Porro si in uentri-
culi sinus humores se receperint, etiam ex his ipsi uomi-
tus erumpit, si infarcti tunicis adhærescunt, etiam eo
quod ingesserant, sursum educto, nausea solum, non uo-
mitu premuntur, præterquam cum cibos assumpserint.
Calida intemperie adfecti, refrigerante uictu curantur,
præcipue qui ex aceto assumitur. Panis igitur posca
imbutus esui ipsa q; posca potui datur. Item oxyga-
la & quam Romani melcam appellant, obsonium ex
lacte intybi & lactuca, interim etiam aqua frigida, om-
nia q; mediocriter iuxta præsentis intemperiei contrarie-
tatem. Nam immoderatus horum usus, non modo nõ
iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit. Fri-
gida intemperie laborantes, contrariis medicari oportet,
uino ueteri & condito, hydrogaro cum anisi, rutæ &
petroselini decocto, iam pipere ex aqua calida com-
muni, uel etiam ipso medicamine, quod inscribitur
diatrion pepereon, uel cui nomen est dia calamin-
thes. Dabis etiam nonnihil theriacæ ex uiperis con-
fectæ, quæ nec ipsa, fastidio ob humorum copiam

laborantibus inidonea est, insuper alia his & alimen-
ti & medicaminis nomine conueniunt. Sin autem hu-
morum abundantia fastidium excitarit, tenues, morda-
cesq; aut uomitu, aut per aluum euacuabis. facilem
itaque uomitum reddit aqua temperata, uel mulla dilu-
tissima praeibita. Satius fuerit, si ante haec, humectan-
tia exhibeas alimenta, ueluti ptisanæ cremorem, uel
ouorum lutea. Cæterum quomodo ex facili uomas,
priori libro est expositum. At si difficilius æger uomat,
præstat materiam ad aluum elicere copiosiore tempe-
ratoq; alimento prius humectatam. Purgans uero me-
dicamentum esto, uel ex aloe amarum, uel ex malis cy-
doniis præparatum, cui adiectum sit aliquid scammo-
niæ, uel quod constat rhodomelite. Si uero citra scam-
moniæ fieri possit, melius feceris, eo quod illa stomas-
chum offendat, aloe potius copiosiore ipsos euacuans.
Quibus crassi humores uiscosiq; fastidii authores sūt,
medeberis extenuando ipsos incidendoq; tum oxyme-
lite, tum iis quæ ex hoc & ex muria componuntur, ut
cappari, oliuis, sinapi & similibus. Non inepta sunt his,
& quæ ex frigida intemperie laborantibus cōsulimus,
maxime post uacuationem, quæ nimirum fiet oxymeli-
te Iuliano. Extrinsecus utendum quæ fouere stomas-
chum & corroborare queant, itē unguentis & malago-
matis, qualia sunt potissimum quod dicitur dia ompha-
cus, & Marciatum aliaq; consueta unguina: insuper epis-
themata, Baïum & euodes huiusq; notæ reliqua. His
addentur exercitia & frictiones ualētissimæ. Ad eos q
frigidi humidiq; humoris, uel talis intemperiei uitio dif-
ficulter cōcoquunt, cibūq; respuunt, ea q ex malis cydo-
niis consunt, ptinent. Dico aut quod uocant meloplas-
cuntium, item qd ex malorū succo præparatur, tum qd
ex carne eorū cōstat, præterea ex citrio confectum. Ma-
lagnata uero Marciatum ex immaturæ uuæ succo, itē
Baion, Polyarchion atq; his finitima. Sin ulcus fuerit
in stomacho, aut uentriculo, omnibus acribus & cibis

PAULI AEGINETAE

& potionibus abstinere oportet, uti uero medicamentis
quæ leniunt, puta sorbitionibus absq; oleo, tum iis quæ
ex amylo, terra samia, lemnia sphragide & lacte, uel quæ
melle paucissimo conficiuntur, ut quæ purgent citra ro-
sionem Epithema facies ex palmulis & cydoniorum
carne & polenla. Ceratum ex melino, uel rosaceo cum
ammoniaco & thuræ. Ad hæc Nelei epithema con-
ducit, & emplastra ex salicibus, & icesion. Notæ ul-
ceris sunt, uomitus sanguinis, uel puris, uel etiam
ramentorum.

AD SOLVTVM IMBECILLEM
que stomachū, ut cibum non modo non concoquat,
sed etiam euomat, ualet hoc: Aloes, masuchæ, masti-
ches, styracis singuli sextantes, absinthii triēs cenanthæ
quadrans, gleucini selibra, zaelini quadrans, uini quod
satis est. Nonnulli etiam cypheos & rosarum singu-
los sextantes miscent. Hæc in leuiorem redacta, purpu-
ra uel lana excipiuntur, ac stomacho imponuntur.
Quidam ceræ se libram adiungentes, epithema ip-
sum faciunt.

AD STOMACHI AFFECTVS,
qui ileon repræsentant, hoc est uehementes
& conuulsorios dolores.

Optime facit pastillus Amazonum: inuenies autem hus-
ius scripturam, tum aliorum ad stomachum composi-
torum materiam ad calcem libri de medicamentis cō-
positis explicatam.

DE FLATV VENTRICVLI.

Cap. XXXVIII.

Flatus in uentriculo generantur, humoribus uel
cibis languida caliditate in uapores dissolutis:
nam refrigeratio hoc nomine quod extenuare
ac dissoluere non sit idonea, nullos flatus procreat. Ve-
hemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam
discutiat, flatus generationem impedit: minor uero cali-
ditas diffundit quidem & transmutat alimētum, uerum

minus quàm opus sit, unde flatus excitantur: quare calidis eos medicamentis extenuare conuenit, cumini semine, & apii, & spodylii, & dauci, in oleo decocto. Vbi uero adfectui adest frigiditas, ruta, bacca lauri nigella & marathrum oleo incoquantur, misceturq; bitumen & oleum laurinum. At si inflammatio dolores comitetur, in uicem calefacientium laxantibus uteris, anethum decoquens, cui gallinæ anserisq; adipem adicias. iam uero polii fasciculus, uel calamithæ decoctum cui mellis pauxillum cum piperis drachma sit iunctum, flatibus infestatis auxiliatur. Hæc itaq; dum uehemens dolor inciderit, adhibenda consulo: dum mediocris, etiam fomenta ex millo sufficiunt. Cæterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum undiq; comprehendens toto symptomate frequenter uniuersim liberat, castoreumq; ipsis prodest, tum ex posca potum, tum extrinsecus cū oleo sicyonto appositum, uel si cum tormine flatus incidant, medetur. Item talus suis combustus potusq; tormina & flatus tollit. Idem facit aristolochia rotunda. Iam uero aduersus dolores flatuosos ex uentris obstructione, uel crassitie, uel perfrictione obortos, uinum meracius à cibo sumptum proficit. Vbi somnus accesserit, etiam ex toto leuat affectos.

DE CHOLERA. Cap. XXXIX.

Cholera est immodica uentriculi perturbatio supra infraq; erumpens. Ciborum cruditas apparet, quæ nonnunq; ex magna alimentorum prauitate, interim ex uitiosorum humorum superfluo trahit originem. Si igitur nauseabundus æger est, & turbatur, cibis etiã crudis in uentriculo manentibus aqua egelida propinari debet, deinde uomere oportet, digito, uel pinna ori indita: item alui ductione adiuuandus est stomachus. Vbi uero hæc exinanita est, conuiuiescere, & præcordia oleo dulci cum uini modico, uel mastichino uel et nardino si hyems fuerit, fouere conueniet, somnumq; accersere. Vbi iam exacta apparuerit conco-

PAULI AEGINETAE

etio, balineis & probi succi cibo utendum est. At si inas-
 nitio fiat immodica, sufficient quidem initio uel ea quæ
 secundo libro de uentris perturbatione comprehensa
 sunt. Sin autem perseueret corruptio, uenter concidat,
 pulsus minor densusq; euadat, cataplasma adhibendū
 ex palmulis cum cenanthe & acacia, item hypocistidis
 & malicorii succo. Adhæc offerendus est potui aquæ
 mediocriter frigida cyathus. Præstiterit rosarum, uel
 cenanthe, uel rhus, uel ex uite capreolorum decoctum,
 uel mali granati acido dulcis succus, cui mentæ pauxilo
 lum sit adiectum. Porro si excrementa fuerint acriora,
 uexetq; ardor & sitis, cucumeris semen cum aquæ cya-
 this tribus, tum intybi, & lactucæ in posca coctæ exhi-
 beantur. Verū si fluxio sisti neqat, uinū quoddā austerū,
 potui dandū est: si febris absit, palmatianū, uel aminaxū,
 uel spathites, uel omphacomelites: sin adsit, rethinū, uel
 myrtinū, uel cibyrici hydromeli potus cū mica panis,
 uel chondro, uel alica. At si respuant cibū frumentaciū,
 fugaces fructus mandent, mespila scilicet, uel pirā, uel
 mala cydonia, uel punica: qđ carnosum est & durū ex-
 puant. Si ne his qđ auxiliis cibū retinet, extrinsecus cō-
 tra uētriculū ipsum, cucurbita leuis quā maxima admo-
 uenda est, mox cibo aliquo ex prædictis recreatio uiriū
 tentanda. Ad conuulsorias contractiones calida linimē-
 ta, oleo modico imbuta musculis circumponere opor-
 tet, tum cerata liquida, qbus adiectū sit aliquid castorei
 & sicyonii. Ante hæc extremæ partes aquæ calidæ fo-
 mēris nutriendæ. At si uigiliæ torquent, somnus iis quæ
 aduersus illas prodidimus conciliabitur. Si uires autem
 non prohibent, etiam medicamentum dia codion ipsis
 propinabitur: ubi morbus inclinauerit, ad balneum de-
 ducitur, cibus ad refectiōem pulli gallinacei erunt, co-
 lumbæ, uel suum petunculi, similiave. Alui profluuium,
 quod ciborum corruptela est, plerunq; sua sponte ces-
 sat. Non autem citius alimentum ægri sentiunt q̄ abso-
 luta fiat concoctio, & corrupta euacuentur: sin autem re

LIBER TERTIVS. 116

manent, iis quæ in cholera dicta sunt, utendum.

DE LEVITATE INTESTINORUM

quæ lienteria dicitur, & coeliaco

affectu. Cap. XL.

- L** Euitas intestinorum quæ Græcis λειτερία dicitur, duplici continetur discrimine: hæc ex summa intestinorum exulceratione contrahitur: quorundam uero lienteria ex cicatricibus quas excitauit dysenteria parte plurima, uel aliis oboritur fluxionibus. Altera uero ex infirmitate & languore uirium, alimenta in uentriculo continentium creatur: eademq; cum coeliaca dispositione confunditur, misceturq;. Etenim in hac languente & imbecilla uentriculi facultate, nec coquuntur, nec digeruntur alimenta, sed cruda, humentia imperfectaq; redduntur, aluo continenter fluida. Verum in utroq; leuitatis genere celerius q̃ in coeliacis, quæ assumpta sunt, egeruntur, tamq; intensa est cruditas, ut alimentum assumpti genus aperte cognoscatur: atque hac nota potissimum à coeliacis discernuntur. Itaque semen lini cum palmulis ipsis illinetur. Summe aut facit lentiscus, rubus oxymelite incoctus, cum adest inflatio cuminum miscabitur, anethumq; & ruta: augescente uero pfluuiio adiungemus mala cydonia, alumen liquidum, acaciam, hypocistidem, gallā, uel quædā, uel oīa. Cerata ex myrto cum uino quodā astringente. Epithemata calidiora quidem ex baccis lauri, & quod ex seminibus constat. Astringunt autē magis dia cœnanthes & dia gigarton, id est ex acinis malorum puniceorum. Itē quod ad Antyllum authorem refertur, et erethrii mirificum: si morbus in uetustatem incidat, etiam uentri recte applicatur dropax et ceratū ex sinapi, ipsumq; sinapi. Potiones conueniūt, simplices quædam, arnoglossæ semē, uel lapathi, uel mali granati cortices, uel sorba arida, uel immatura, uel acor ficcus ex uua aminæa, tribus obolis potus. Qui febriles carent cū uini austeri cyathis sex: febricitantes aut cū aqua pluuiali sumūt. Porro aluus arida gallinarū potui

P. lili

PAULI AEGINETAE

spersa, stomachū minus accendit, tū ea q̄ urinam citant
 exēpli gratia, apiū, adiantū, similiaq; epota deriuatōnē
 moluntur. Cōposita uero sunt polyidæ sphragis, pastil
 lus ex electro, itē ex spina ægyptia confectus, insup̄ clis
 diū appellatus, & dia spermaton. Itē hoc est præstantis
 simū qd̄ sequitur: lapathi syluestris seminis fescuncia, arno
 glossæ seminis uncia, hypocistidis succi drachmæ sex,
 gūmi uel acaciæ drachmæ tres: excipiuntur cydoneorū
 ad tertias decoctorū liquore. ALIVD. Cumini, piperis,
 rhus syriaci balauſtii singulorum fescuncia, malicorii un
 cia, silphii fescuncia, aut xeris drachma potui inspigitur,
 uel oxymelite inacerata dātur mane & uespi. ALIVD.
 Myrtinigræ cochleare, eiusq; dimidiū, anisi, rosarū sicca
 rū, cenanthes, singulorū cochlearis dimidiū, phœnico
 balanos uiginti, in pastillos cogito, & drachmā unam
 cū aqua aut diluta uini potione porrigito, iā theriace ex
 uiperis optimū his est præsidū. Cibis aut, si acris & bis
 liosa sit deiectio, ex chōdro, oryza, alica & similibus erit
 qbus cū astringens aliquod decoquetur, pirum, malum
 cydoniū, mespilū & id genus alia, itē lac discoctū his p
 dent. Potus erit, aut uinū aquosum, tenue, aut quoddā
 dulciariū. Sin aut pituitosiora excernunt, contrarius ipsis
 cibis adhibetur, nōnulla stomacho, gratia admiscētur,
 anisum, cuminū, uel apii semē. Ad hæc lenticula bis co
 cta plerūq; ipsis profuit, cū aceto modico uel oxymeli
 te cōmanducata. Præterea brassicæ & ipsæ bis coctio
 nē expertæ. Præstat autē secundam ipsorum coctionē
 in posca fieri. Vinum assumetur uetustius calidiusq;.

DE TENESMO. Cap. XLI.

Tenesmus interdum dysenteriam præcedit: sæpe
 uero & ipse solus paulatim generatus, desinit.
 Est autem affectus hic, continua & implacabilis
 desidendi cupiditas, qua nihil præter modica cruenta,
 uel muccosa egeritur, quæ totius prope mali causa est:
 factaq; in longanone inflammatio, mollem cedētemq;
 tumorem, quod œdema uocant, referens, hærentium

Illic excrementorum opinionem, & deliciendi ea deside-
 rium, mouet. Galenus memoriae prodit etiam calculū
 quendam in tenesmi constitutione per anum fuisse exo-
 cretum. Subinde uero obstructionem stercoris in tenui
 5 intestino coacti, tenesmus secutus est, qui astringentibus
 quidem obturantibusq; remediis magis increuerit. Cly-
 steribus autem acribus, nempe mulla cum sale, uel stero-
 core excreto medicamine quod emolliat, per os assum-
 pto, ut damasceno, uel pinguibus ficis, mercuriali, sero-
 10 laeis, confestim finitus est. Quod si igitur citra talem
 causam, tenesmus obortus sit, conuenit inflammationē,
 calida ordeī polenta & fotu ex uino, oleo myrteo, uel
 rosaceo, uel omphacino lumbis & pubi adhibito lenire
 ad ea quæ longanoni muscosa inhaerescunt, mulla indio-
 15 ta aluo, muriaq; saepe demissa auxilii fuit abunde. Suffi-
 ciunt autem salis drachmæ sex in aquæ calentis hemi-
 na. Porro dolores intentionesq; leniuntur in fessu foeni
 græci, uel maluæ, uel seminis lini. Alii autem & horum
 in fessu frequenter usi sunt, rubi, myrti, cytini, lauri, cupres-
 20 si, æqua singulorum uiridium portulo in aqua coquitur:
 est autem Marcellium. Vbi alte affligit inflammatio ir-
 ritationesq; in illic debent ab inferioribus partibus cre-
 mores frumentacei cum quodam astringente decoctos
 oleum uero dulce inditum retentumq; pluribus horis,
 25 dolorem soluit. Cum autem crebra delidendi est cupi-
 ditas, etiam agathidem spissamentis calidis sedi appo-
 nunt, aut furfures calidas in fascia, aut spongiam, aut
 aliquid huiusmodi.

DE TORMINIBVS QVÆ

30 dicitur dysenteria. Cap. XLII.

C Vm intestina intus exulcerantur, latini tormina,
 Græci dysenteria appellant, q̄ nunc ex tenesmo,
 uel quadā ex prædictis alui turbatione puenit,
 nunc p se incipit. Excernuntur primū biliosa, uaria: deins
 35 de subcruēta, postremo saniei similia, cuiusmodi à mōs-
 tuorū cadaueribus solēt pfluere. At q̄ à bile nigra orit̄,

exitialis est: ut quæ cancerū cum exulceratione testetur.
 Si igitur ab exulceratione, cruenta stercori cōmixta deli-
 ci cum labore & torminibus cernantur, ulcus tenuia in-
 testina obsidere nota est, quod per os potissimum re-
 media desideret. Sin autem syncerum stercus descendat,
 crassa: quod enematibus magis cedit. Porro cum multū
 sanguinis priuatim excernitur, affectum, cruentam
 dysenteriam appellant: quanquam interim sanguis etiā
 nigrior, q̄ naturaliter esse debet & splendescens delicia-
 tur. Cum uero iecur alimentum distributum non pro-
 be conficit, & retentrix ipsius facultas, uel alteratrix imo
 becillis est, sæpe eiusmodi descendunt ut recens in eis
 caro lota esse uideatur: atque hanc iecorariam uocant
 dysenteriam, de qua in iocinoris affectu agemus. Itaq̄
 utendum est communiter iis quæ in coeliacis & aliis p-
 ter naturam excretionibus comprehensa sunt. Priuatim
 conueniunt lemnia sphragis, quæ etiam depascentem
 modo dysenteriam per sanat, & pota & in alium data,
 si intestinum mulsa prius fuerit abstersum. Deinde mu-
 ria & portulacæ succus potus conuenit dysentericis: ip-
 saque portulaca in posca cocta esui idonea est, item ar-
 noglossum, rubi tum fructus, tum folia, & althææ radio-
 cis decoctum, hippuris ex aqua, nel uino bibita, eiusq̄
 succus prodest. Mori succus immaturus exiccatus, atq̄
 hoc magis batina mora similiter reficcata. Siccant etiam
 uentris fluorem oua ex aceto cocta comesta q̄. Sati-
 us fuerit, si commista quibusdam ex iis quæ ad dysenteriam
 faciunt, frixaq̄; esui exhibeas. Vtilissimum his est om-
 phacium, rhus rubens, eiusq̄; succus, malicorium, galla,
 acini uuæ, mespila, myrta, corni, cochlearum integro co-
 ctarum cinis. Compositum hoc bene facit: Cochlearū
 cinis partes quatuor, gallæ partes duas, piperis partem
 unam, in puluerem redacta obsoniis inspergito, uel ex
 aqua. uel ex uino albo diluto potui dato. Generose iu-
 uat dysentericos quos nondum ulcus putre occupaue-
 rit, & canum ossa uorantium stercus aridum, cum lacte
 caseato, harundine demissa assumptum. Mirifice pro-

sunt composita: nonnunquam ex ægyptia spina pastillus, interim Philippi, tum ex cornu ceruino, necnon ex seminibus pastilli: ad hæc qui ad Trigonem refertur.

Iam catapotia ex macere admiranda. maxime autem commendatur & hoc: Opii, croci, lycii indicii, acaciæ, rhus, thuris, gallæ, hypocistidis, malicorii, myrti, aloes, æquales singulorum portiones, nempe sesquialterus scrupulus ex aqua propinatur.

ALIVD. Rhus drachmæ octo, gallæ, malicorii, singulorum drachmæ quatuor: cochlearium unum ex uino datur.

ALIVD. Rhus denarii octo, gallæ, acaciæ, gummi, singulorum denarii duo, opii denarius, Exhibetur pondo denarii ex uino temperato. Hoc autem eclegma ipsis conueniet: Myrti nigra, rhus syriaci singuli sextarii, palmæ thebaicæ duo pondo, malorum

cyddniorum carnum pondo unum, mala granata acerbata cum ipsis corticibus decem, uini astringentis sextarii duodecim, ad tertias decoquuntur. Percolatis libræ sex mellis iniiciuntur: ad spissitudinem incocta delinguntur.

Notum uero est cataplasmata quoque ex astringentibus componenda, quorum materiam explicitam habes. Porro enæmata propter tenesmos infestates, dysenteris ex usu fuerint. Cremor oryza, uel chondri, uel huiusmodi alterius adipe caprillo uel hircino, tum ea quæ capite de tenesmo diximus. Si autem pus uel sanguis profluit, ex

inferioribus partibus infundere oportet succum polygoni, uel arnoglossæ cum acacia, uel hypocistide, uel id genus aliquo. Sin urgeat fluxus, etiam impedimentum quoddam iniiciendum est: cinis lanæ succidæ, uel spogiæ recentis, picea liquida, uel sanguine bgbulo imbutæ, uel

cum alumine liquido coëbuste, uel onidis succo. Huic et Andronis pastillus præstans est remedium, tum quæ Muscæ ascribitur, ac persimiles. Insup subiecta collyria multo sunt in id efficacissima, in quibus dolor deiectionem committatur: ubi uero ulcera intestina depascantur, quæ foedo

excrementorum odore, tum putredine, tum quod non statim per initia fiat, sed temporis interuallo agnoscimus,

PAULI ÆGINETÆ

enæmatibus, quæ crustam inducunt utemur, cuiusmodi
sunt pastilli nomine Faustiani, item ex charta inscriptus,
ac Bithynius, Throniusq;. Præterea qui ex suberibus co-
stat, ex lenticulæ decocto, uel cuiusdam astringentis, inie-
ctus. Atq; enæma est ex iis quæ admodum expertus
sum, acerba uua combusta. Est autem hoc concuum,
unde querna glans prodiit, qua coriarii utuntur. Auripig-
menti, consolidæ, rhus syriaci, æquales partes, his contu-
sis, duo cochlearia excipito cremore oryzae & succo an-
chusæ, quæ folium habet spinale, amplum nigrumq;, 5
quod chærospileton appellant. Item ouorum candidi
liquoris similiter ad uncias duas ternasve immittito. Epi-
themata uero in coeliacis enumerata sunt. Item uentris
inunctiones, quæ astrictiori ac siccante constant materia
cum glutinatorio quodam adhibito, gummi, thure, tau- 10
rocolla, polline, in similibus cataplasmatibus locum habeo-
ant. Alimentum his erit per initia, oua ex lacte. deinde
sorbtiones frumentaceæ per se, & cum lacte, item lac
mediocriter coctum maxime commendatur. holerum
usus non est necessarius, attamen gustandas exhibebis 20
endiuiam coctam, intybum, amoglossam, brasficam bis
coctam, poma astringentia, carnibus ipsorum reiectis,
uel aliis quæ aspirare intestina possunt. Verum si multa
sit caloris intemperies, etiam intybus cruda esui danda
est, & aqua potionis frigida. Alia uero potabilis aqua coe- 25
lestis esto: si laborauerit stomachus, uinum quoque pro-
pinandum est. Postea ex aucupio sicciore & concoctio-
ni morigera sumuntur, balineis dulcibus utentur, à quib;
bus si fluxionem experiantur, spongiam magnam, uel
panis filiginei micas uino ascalonitæ, uel quodam a- 30
stringente calido imbutas, toti uentri imponere oportet
contra quem cum deligaueris, sic lauare iubeto.

DE MORBO INTESTINI

plenioris, quem Græci colicon
appellant, Cap. XLIII.

Colon, cum pars sit intestini laxioris, à dextra illius
 regione procedens, ad sinistriorē cinditur: & mo-
 do pertinet. Huic dolores grauisissimi plures ob-
 causas oboriuntur, uel enim cum intra eius membranas
 5 crassus pituitosusq; humor subsidet, uel etiam cum
 spiritus crassior, flatulentusq; cessat, nec illinc transmitti-
 tur, uel cum inflammatio male habet intestinum, uel a-
 cres mordacesq; succi infestant. Qui ergo humore cras-
 so, ac pituitoso dolorem concipiunt, hi per totum ab-
 10 domen in alto excruciantur, præsertim autem cum per-
 tundi colon putant. Tormina quoque affligunt, ructus,
 nausea, uomitio cuiuslibet humoris, potissimum pitui-
 tæ. Aluus grauitè impedita nihil reddit, ac ne spiritum
 quidem transmittit. Stercus autem quandoque excretum,
 15 bouino simile uidetur, leue & flatus plenum. Præcedēs
 horum causa est, continuus ciborum quàm maxime frig-
 gidorum, crassiq; succi usus, satietas, cruditas, otium &
 his finitima. Qui autem ex spiritu flatulento indolescunt
 20 tentionem magis experiuntur, & internum inflammatio-
 nis feruorem: febris non ignaua urget, urinæ retentio si-
 mul & stercoris: pulsus in uentriculo exercet, sitis, ardor,
 nausea, bilis potius uomitiones, quæ nihil leuant malum,
 summam inter colicas affectiones, hæc est grauisima,
 25 quæ in ileum transitionem minatur. Quibus acres ro-
 dentesq; sacci dolorem mouent, sicut etiam qui inflam-
 mationem experiuntur, hos ardor, sitis & uigilia torquet,
 imo & febriculæ, sed minus ac illos, urina redditur acris
 & biliosa descendunt. Sæpe alui defectio maiorem ex-
 30 citat cruciatum, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq;
 assumpti. Itaque doloribus quos frigidi & glutinosi ac
 crassi humores contraxerunt, medebimur sic ut non ue-
 hementer calfaciamus, quippe huiusmodi humores iis
 quæ nimis exalfaciunt, præsidis funduntur, ac in spiri-
 35 talem potius substantiam rediguntur. Quapropter in-
 cidi, aut concoqui medicamentis debent, quæ non in-
 flent, sed extenuent desiccantq; modice per morbi initia

PAULI AEGINETAE

calefaciant. Prius itaque aluo stercore leuata, congrui
 clysteres ex oleo iniiciuntur, in quo decoctum sit cumi-
 num, uel ruta cum adipe anserino, uel gallinae, aut cucu-
 mis syluestris radicum decocto, aut myrrhae drachma,
 melle & oleo sicyonio. Iam uero commune oleum in-
 lectum, saepe uitream simul pituitam expulit, ac dolorē
 subito finiuit. At si ob doloris uehementiam etiam ena-
 ma non retinuerint, glans aluo demittenda est, ex mel-
 le cumino, nitro, ruta, semine sicco brassicae, caule probe
 derafo & muria madefacto, uel cinere brassicae melle
 consperso, cucurbita trita cum melle, nitro & cumino.
 Glandes autem digitorum sex erunt, ut fibulam ani exu-
 perent, sedemque ungere oportet, ciclamini succo cum
 melle & nitro, uel centaureo cum melle & nitro. Si do-
 lor non remittitur, enama quoddam superioribus addi-
 tur. Resinae terebinthinae uncia, uel opopanax drach-
 ma, uel galbani drachmae quatuor, bituminis tantundem,
 cum nitri drachma & aquae uncia, olei rutacii uncia quae
 que, aut amplius: fatus autem partibus indolentibus su-
 peraccommodandi sunt ex cumino, uel anethino, uel si-
 cyonio oleo. Cataplasma ad mouendum, trispermum
 appellatum, cum cumino, baccis lauri, apii semine. Epi-
 themata uero conuenient, primum diaspermation, id est
 quod seminibus constat. Deinde diadaphnidon, quod
 est ex baccis lauri, adde diameliloton, quod melilotis
 constat, & Polyarchion. In fessu autem utilis ex decoc-
 to foenu graeci, althae, chamaemeli, arthemisiae, anethi,
 lauri, & similia. Item in oleum calidum, aut hydrelae-
 um descendere alienum non est. potui offertur absinthi-
 um, & cuminum aequa portione, uel panax cum aqua,
 uel castorei, anisi, piperis, singuli denarii cum oxymelite.
 Quod si dolor non conquirit, propinatur ipsis medi-
 camentum diatrion pipereon, uel theriaca. Iam sinapis-
 mo & dropace in remissione doloris utendum est, ac
 balneis naturalibus. Caeterum a balneis aquae potabilis
 abstineant, nisi doloris circumstantia compellat, ubi iam

prædictorum aliquo medicamento facta prius fuerit euacuatio, ut lauent, iubebis, foueanturq; ignitis marmoribus, quibus adicientur nitrosa quædam sinigmata. Cum dolor est uehemens, mediocriter lenientibus uti conuenit, qualis est pastillus ex castoreo, tum alio ab inferioribus partibus inditus, tum potus finitimaq; his medicamina. Nam quæ ualenter stuporem inducunt, uitare oportet, quippe paulisper quidē leniunt, sed longiorem affectum reddunt, dū materiam incrassant, meatusq; intestini condensant. Porro ubi pituita fuerit extenuata, purgabitur hiera amarescente, uel his catapotis. Aloes, euphorbii, cocci gnidii puri, scammonia æquali singulorum modo, dantur duobus scrupulis. Victus uti lis erit calidior sicciorq; per initia morbi à cibo abstinebitur. deinde acria assumentur. Porro igitur ipsi exhiberi cocta cum cōdito debent, apium, asparagus syluestris, cruda allia, & maxime illi qui talibus non offenduntur, ipsumq; uero conditum portione panisq; cum ipso assumetur. Insecutis diebus et reliqua boni succi alimēta concoctaq; facilia dantur, ut satietas cruditasq; uitetur. At si flatulentus spiritus doloris author fuerit, secundū clysteres q; flatus discutiant, potionesq; etiam cucurbite q; maximæ cum flamma ac leues toti abdomini defixe frequenter abunde auxilli præstiterunt. Porro cum inflammatio intestinum exercet, uena in cubito aperienda est. Sin urinæ difficultas distorqueat, etiam ex malleolo sanguis detrahi debet, & prædicta admoueri præsidia, præterquam quæ acria sunt & ualenter purgant, enēmata uero quæ magis leniunt, item cataplasmata & superfusiones. Ad hæc in oleum descendere conuenit, cucurbitulasq; ipsis desigere, & ceratum abdomini applicare quod habeat ceræ quincuncē, chamæmeli sextantē, rosacei tantundem, lomenti semunciam, uitella ouorū quæque. Hæc succo lini seminis soluuntur. Victus tenuis ac febricitantium proprius ipsis cōuenit, quousque inflammatio discutiat. Atqui si propter acreis rodentesque

PAULI AEGINETAE

succos dolitant, oleum ipsis ab inferioribus partibus in-
 iicietur, in quo foenugraecum decoctum sit, uel althea
 cum molli adipe recenti anseris, uel gallinae, uel etiam
 cremore ptisanæ cum rosaceo, uel succo quoque lini se-
 minis propinatur. Antidotum ex aloe amarum, & bal-
 neis utendum ex dulci aqua, cibo sorbili ex chondro,
 uel ptisana, piscibus saxatilibus. In summa uniuersus uis-
 ctus humidior erit & frigidior. Abstinendum acribus
 omnibus, cum cibis, tum medicamentis, foruq; ex aspi-
 ginibus, item cataplasmatibus, uini potione & potissimum
 ueteris. Cum autem dolor excruciat, etiam iis utendum
 est quæ sensum obtufofaciunt, nam offendunt minus
 aliis huiusmodi dispositiones medicamēta quæ tenuēs
 mordacesq; humores incrassant, & mediocriter refrig-
 erant. Puto autem colicum affectum, qui etiamnum
 in crudefcit ex huiusmodi contrahi humoribus, ut qui
 ab Italiae regionibus inceperit, in aliis autem multis Ro-
 manorum reipublicæ locis pestiferæ cuiusdam luis cō-
 tagio simul grassetur. Quamobrem plerisque in morbo
 comitiale, aliis in artuum resolutionem sensu in-
 columi, nonnullis in utraque transit, ac eorum qui in co-
 mitiale morbum inciderunt, plures interiire. Ex illis
 uero qui in paralyfim, non pauci euaserunt, tanquam
 causa, quæ ipsum tentauerit, per crisim finita. Sic igitur
 laborantes, medicus quidam in Italia curauit uictus qua-
 dam ratione parum fida, sed multum audaci, nempe q̄
 refrigeraret. lactucas enim non coctas refrigeratasq;
 ipsis porrigebat, intybumq; similiter supra satietatem co-
 medendum. Item uuas, poma, pisces dura carne prædi-
 tos, omniaq; crustacea quæ uocāt Græce ὀστέα & ῥέμματα
 pedes bubulos, bulbos & similia, non solum uirtute,
 sed & tactu frigida, uinum raro præbebat, idq; frigida
 temperatum, ipsamq; frigidam uel etiam poscam frigi-
 dam exhibebat, ab omni alio calido & mediocri cibo
 abstinens. Atque plurimos sic præter omnium opinio-
 nem persanauit, imò nonnullos qui iam in morbum
 comitiale

LIBER TERTIVS

comitalem uel resolutionem prolapsi erant, propemodum sanitati restituit.

DE TENVIORIS INTESTINI

morbo, qui ileos dicitur. Cap. XLIII.

Ileos morbus est peracutus, & grauissimos moueat dolores. At quæ ei superueniunt, etiam periculo sunt grauiora. Qui enim hoc malo sunt oppressi, miserabili tandem morte pereunt, stercus per os reddentes. Contrahitur id uicil cruditatibus & obstructo recrementorum itinere, iis nimirum retentis, quæ iam corruptionem experta sunt. Item lethalium medicamentorum potu, cumq; in scrotum descendunt intestina ac inflammationem sentiunt, coli dolore plerumq; præcedente, causamq; adferente. Pueros itaq; superfusionibus, cataplasmatibus, clysteris, glandibus & fomentis, sicut in capite de colicis comprehensum est, curare oportet. Adolescentes autem & ætate floridos modica sanguinis detractio: sin minus, uincit multas ac leues cucurbitulas toti abdomini admouere. qua autem dolent, et cute incisa: item perfricare & deligare, tum efficacioribus clysteris & iniectionibus uti. Ad hæc in oleum calidum descendere, antidota purgationesq; assumere, breuiter oia quæ ad colicos scripta sunt, præter eos qui ex acribus rodentibusq; succis indolescent. Mirifice ipsis facit, uel si uouerint, anethum coctum potumq; mox panem in calidam demersum statim esse, dū incalescit. Ad eos autem qui cibos non retinent, rhus & cuminum in eadem tritum potui datur in senis oxymelitis cyathis. Qui ex medicamento in ileon inciderunt, ut uomant compellendi aquæ calidæ potu. Noxiorum autem medicamentorum notas, quinto libro habes expressas. Deinde oleum calens propinari debet, aut iura pingua ut denuo uomant. Diebus aliquot interpositis, theriace datur. At si obstructio non discutitur, lacte scisso cum scammonia, uel aloes, uel cuiusdam purgantis momento, aluum inanire confert. Si ex intestini prolapsu in scrotum affectus processit.

PAV. ÆGIN.

Q

PAULI AEGINETAE
ferit, figuratis statim ipsis sublimibus in inguina compellatur delapsum intestinum, fasciaq; deligabitur.

DE RENVM ET VESICÆ
affectibus, & primum de calculo.

Cap. XLV.

MOrborum uicinitas cognatioq; ordinem disciplinæ transgredi nos compellit. nam communis est Colicis, & lapidem in rene habentibus aluus initio astricta, uehemens dolor, fastidium, cruditas & tormina. Propria uero colici habent omnia hæc magis intensa, nephritici minus. At colicis quidem in dexteriore ileum parte dolor excrucians usq; ad stomachū, iecur, & lienem peruenit, nec aluus, imo nec spiritus infra transmittitur. Cum uero necessitas stercus expellit, flatulentum bouilli modo est. Interim etiam uitrea pituita excernitur, urina copiosior pituitosaq; redditur. uerum nephritici grauem in ipsis renibus dolorem, aculei infixi instar sentiunt, rectusq; testiculus indolet, femur obstupescit, directe excernunt, & sponte quidem raro, uerum clysteriis aluo citata, flatu, stercusq; biliosius egerit. urinæ autem pauca & arenosa magis prodeunt: meatu, per quos urina ex renibus in uesicam distillat, & πρηνὲς Græci uocant, astringuntur. hæc indicia calculos in renibus esse fatentur, quæ adultis potius oboriuntur. in uesica autem pueris magis calculus solet con crescere, quod testatur cruda & subalbida urina cui subsideat arenosum. Pruriunt laborantes crebro, & contrectant pudenda, intenduntq;, & continue in urinam propellunt, ac stillicidio uexantur. Materiam calculi creandis suppeditat crassus terreusq; humor. Effectrix ipsorum causa est ignea renum, aut uesicæ caliditas. At in renibus quidem medicamentis uti conuenit, quæ calculos confringunt diffecantq;, non autem manifesto calefaciunt. Talia habentur basilicorum, asparagorum radix, rubiq;, uitrum combustum graminis radix, adiantum, bdellium, lauri radices

LIBER TERTIVS.

128

cortex, altheæ semen, cicer nigrum, arietinum, spon-
 giarum calculi, acetum scillites, phu, meon, asaron, car-
 pesion, saxifraga, Sion uero, & esu, & potu prodest, sco-
 limi radix, erysimon, & prionitris. balneis autem uti cre-
 15 bro licebit, & postea statim quædam ex prædictis bibe-
 re. Cæterum resperisiones, cataplasmata, fotus, infusus,
 relaxantia & quæ leniunt, ex colicis huc transferre con-
 uenit. Compositæ potiones sunt, rutæ syluestris, maluæ
 syluestris, apii radices, incoquantur uino, & liquor inde
 20 expressus temperatusq; aqua, duobus cochleariis por-
 rigitur. ALIA POTIO. Balsami fructus, lapidis
 spongiarum, pulegii sicci, maluæ syluestris singulorum
 pares portiones. ubi trita fuerint, cochlear inde cum
 uini temperati cochleariis duobus exhibetur. Item san-
 25 guis hircinus inarefactus, cicadæ siccæ sine pennis pedi-
 busq; lapis iudaicus, qui tecolithos dicitur, ex mulso
 in calido balnei solio offertur, tum medicamenta com-
 posita, quæ ex ipsis præparantur. Insuper, Fusca nephri-
 tice, & ad hoc composita, condita. His accedit laudatis-
 30 simum remedium, passer, qui omnium auium mini-
 mus, solo basilisco appellato maior existit, eiq; similis
 colore inter cinerium & uiride, tenui rostro in parietis
 bus maxime & sepibus degens. Hic, inquam, totus sale
 conditus crudusq; frequenter commanducatus, calculi
 35 los iam creatos per urinam expellit, in posterumq;
 generari prohibet. Combusti integro cum pennis
 uniuersus per se & cum pipere, phylliq; momens-
 to ex aqua mulsa potus, idem potest efficere. At
 dolorum uero acrimoniam & uigilias bona sunt res
 40 media Sotira, & Philonis medicamen. iam sanguinis
 missio adhibita dolorem sæpe leuauit, celeriter calculi
 lum emolita. Tuetur à calculis, ne fiant, cibus boni suc-
 ci, & moderatus, dein exercitia, rarusq; leguminum
 omnis generis, frumentaceorumq; usus, item ca-
 45 sei, lactis & quæ ex ipsa præparantur, obsoniorum,
 uini nigri, carniū coplæ, & omnium summam

Q ii

PAULI AEGINETÆ

crassi succi, ac nimis calidorum acriumq; hydrogarorū
 dico, & conditorum similitum. Hæc enim si obseruen-
 tur, non solum lapides nondum creatos prohibent con-
 crescere, sed etiam iam factos, confringere, uel excerne-
 re idonea sunt, bibetur autem oxymel cum quodā sim-
 pliciore urinam citante, ueluti adianto, apio, graminis
 decocto. A balneo ieiunus ante uinum aquam tempe-
 ratam potet, ac inter prandendum frigidam superbibat,
 si nihil prohibet, ubi prauī humoris copiam perſentis-
 ſcunt, sanguine detracto, aut purgatione uacuentur. Om-
 nium uero præſentiſſimum eſt ad calculos arcendos
 ſecundum balneum, aquam temperatam prius bibere,
 quàm uinum, aut aliud alimentum aſſumas: ac ueſicæ
 calculos in pueris, ualentioribus emolire præſidiis, de-
 lectu, ex ſupra comprehenſis habito. Quod ſi impene-
 dio excreuerint, aut ceruici ueſicæ impegerint, recti ſy-
 phonis, cathetera uocant, quaſſatu uſus erit, aut etiam
 calculi incifio adhibenda, ut in parte chirurgica dicitur.

DE INFLAMMATIONE.

At ſi inflammatio renes, aut ueſicam exerceat, quam hæ-
 notæ teſtantur, loci affecti ardor, dolorq; cum grauitate,
 febricula, mentis alienatio, uomitio bilis ſynceræ, urinæ
 reddendæ impotentia, & præſertim ubi ueſica inflam-
 mationem experitur: ſanguis ſtatim detrahendus eſt,
 utendumq; ſuperfuſionibus, quibus leniendi poteſtas
 eſt, & cataplaſmatis ex ruta, anetho, fœnugræco, altheæ
 radice, clyſteriisq; mollibus, & iniectionibus ex oleo, pa-
 pauere, adipe anſerino. In ueſicæ affectu etiam, opii ſes-
 miobulum cum myrrha, croco, & oleo, in aluum demit-
 ti, muſſaq; potui ſumi debet, ab iſis abſtineri quæ ualde
 urinam citant, ac multa potio uitanda, niſi acris bilioſusq;
 humor ſuperet, tunc enim potui quoq; liberaliori in-
 dulgendum eſt ac cumulato, qui ex aliquo citra roſio-
 nem, urinam mouente, ſumetur. Seminis lini partes duæ
 amyli pars una, cochleare ex aqua datur, item cucu-
 meris & peponis ſemen. Cum ardorem igneum reo-

LIBER TERTIVS

123

nes sentiunt, linimenta ex uino rosaceo, uel aqua rosacea, uel melino superaccommodantur, aut ceratum ex cera & rosaceo, chamæmelinoq; uel melino & luteis ouorum confectum cum aceti paululo, uel polygoni succo imponitur. Postea etiam medicamentum quod à succis diachylon dicitur, cum chamæmelino adhibetur, calida nimium uitanda, quod uomicam suscitent, item quæ impendio refrigerant, quippe ab his renes facile in duriciem occalescunt. Ad hæc balneis, cum inflammatio instat, abstinendum: uictus qui in febribus dari solet, & ab inflammatione arcenda nomen sortitur, utilis est.

DE ABSCESSV ET EXVLCE

ratione partium per quas urina descendit,

15 ὀφθαλμοὶ Græci uocant.

Dolores circa ilia oborti, horror inæqualis, & febris inordinata, abscessum in renibus fatentur. In uesica aut præter commemorata, loci cruciatus testatur. Cæterum affectus renum, hac nota deprehenditur, si homo in sanum recumbens latus, in opposito percipiat dolorem, ceu quodam ex rene suspenso in quibus utendum est in sessu ex hydrelæo, item cataplasmatibus ex polline, oleo & resina uel erui farina, cum melle, uel cardamomo uel columbæ stercore, cum ficis pinguibus. Pus autem per urinas confarctum excretum, abscessum esse ruptum, & ulcus in particula ostendit. Quoniam uero etiam sine abscessu, instrumenta per quæ urina fertur exulcerationi patent, uase, aut rupto, aut exeso, materia acris uel lapide perrodente, distinguenda est renum exulceratio, ab ea quæ uesicam exercet, uel meatus quos ὀφθαλμοὶ uocant hoc pacto. Renibus quidem exulceratis in lumbis dolorem cum grauitate & sine impedimento urina redditur, cui pus mixtum reperitur, carnosius particulis innatis, uesica autem exulcerationem experta, tormētum uehemens in pube imoq; uentre mouet, urinae difficultas urget, pus ubi redditum est, subsidet, squamulæ foedi

Q. iii

PAULI AEGINETAE

† Græcū
exēplar
uide tur
depraua
tū. Gale
nus unde
hic aduer
bum sum
psit, hēt
ut hic
scrip tum
est. Item
Alexāder
* Hæc in
exēplari
utroq; de
sideraban
tur ex Ga
leno &
Alexādro
instauratione.

odoris, uel laminis similes insunt. Porro furfuracea sub
sidentia uescicam scabie laborare notant, si meatus urina
rii sint exulcerati, etiam puris mixtura medio quodam
modo habet, & pilis similia potius in lotio feruntur, la
borq; mediam inter renem & uescicam, regionem oc
cupat. Si autem pus aut sanguis excernatur, idq; citra
urinam, nullius particulæ ex prædictis, sed pudendorum
exulceratio significatur. Itaque cum uasa urinæ dicata
exulcerationem sentiunt, aqua mulsa bibitur, aut foenu
græci decoctum cum melle, aut cucumeris semen cum
passo. Pus reddentibus per urinam, bolus armenus da
tur, aut ferularum combustarum cinis, quantum tribus
digitis comprehendi potest, ex passo, item lactis potio
uehementer his auxiliatur. Composita autem hæc, se
minis lini, seminis cucumeris, tragacanthæ, singulorum
drachmæ duæ: pastilli finguntur. A L I V D Nuclei
pinel numero uiginti, cucumeris domestici seminis
grana quadraginta, amyli, thuris, nardi, singulorum dra
chma, seminis apii drachmæ quinq;. Nardus, apium, in
aquæ sextario coquuntur, mox horum iuri reliqua mis
centur, postea cyathi duo potui dantur. Archigenes in
epistola ad Atticum iubet, cum urinæ difficultas urget,
papaueris albi torridi seminis detriti drachmam unam
capi, quæ decocto iunci rotundi, aut calami, aut dulcis
radicis inspergatur. Dolores autem ex ulceribus contra
stos hoc lenit: cucumeris domestici purgati seminis
grana numero triginta, nuclei pinel duodecim, amygda
la amara corticibus exuta triginta quinq; * lapathi semi
nis, apii, alterci seminis, singulorum drachmæ tres, cicu
tæ seminis, drachmæ quatuor croci quantum ad colo
rem satis est. Ieiunus quotidie assumet cū lacte, aut pas
so, Mitius erit si pro nucleis pineis malug seminis aqua
leni modum iniicias, Elidere autem potest, inquit, uesci
cæ exulcerationes etiam cyphi & antidota inde confes
ta. Ego uero in uetustioribus hoc usus, nunquam aliud
desideraui: chamædryos, chamæpyteos singulorum

drachmæ uigintiquatuor, asari, piperis albi singulorum
 drachmæ septem, cinnamomi drachma, optime detriti
 cochlearia duo ex passo cretico, porrigo, si febris adsit,
 ex aquæ cyathis tribus, ubi uero mordax est exulceras-
 tio, etiam amyli duabus heminis & cucumeris semini-
 bus quindecim adiectis, uoti compos euasi. Hæc qui-
 dem ex Archigenis scriptis sunt. Item medicamenta
 diaphysalidon, id est, ex uesticariis, & antidotum ex sylue-
 stris maluæ semine, nec non ex tragematis confectum
 10 benefacit. Pubi pectiniq; cerata imponuntur ex hyssop-
 o tota, butyro, adipe anserino, styrace. In uesticam au-
 tem infunditur clysterio mulsa dilutissima, uel lac cum
 paululo mellis, uel cum cucumeris semine, uel candido
 oui liquore cum pompholige uel dictorum medica-
 15 minum aliquo. Si ulcus pascendo serpit, pastillus ex car-
 ta immittendus est, aut Bithynius: cataplasma ex palmu-
 lis & uuis passis cum galla, acacia, hypocistide, & alumini
 ne debet imponi.

20 DE SANGVINIS RENVM PROFLUVIO.

Renes infirmi lotium subinde retinere nequeunt, sed
 patientiores redditæ sanguinis nonnihil ex uenæ ore la-
 xant, aliasq; crassificies remittunt. Sæpe renes etiam iux-
 25 ta circuitum quemadmodum ora uenarum in ano ex-
 tantium *αἱμορροΐδες* dicunt, sanguinis profluvio labo-
 rant. Inaniti subleuantur, in quibus nihil subito tentandū
 est, si sanguinis cursus sistatur. At si fluxus eius perseue-
 ret, uena in cubito aperitur, ac medicamentis quæ ad
 30 sanguinis sputum, aliaq; ipsius profluvia inscribuntur,
 in renibus ac uestica sanguinem fundentibus, utendum
 est. Præclare facit symphyti radix, & tragacanthum uis-
 no maceratum. Ad hæc polygoni & plantaginis succus,
 cū posca, aut amygdalana amara cū passo. Vel hoc alu-
 35 minis scissi drachma, tragacanthi drachmæ duæ, gummi
 oboli qnq; ex passo: crudaq; polenta illinitur ex posca,

Q. iiii

PAULI AEGINETAE

& rosaceo, aut cataplasma ex palmulis & pane filigineo cum acacia, uel hypocistide, in uino astringenti, uel posca decoctis. Cum uesica cruorem edit, etiam cucurbitulas in illis & coxēdicibus defigemus. Caterum particula quæ sanguinem fundit, hisce notis agnoscitur, lo-
ci dolore, & quod sanguis urinæ miscetur, aut econtra-
rio, ueluti in pure comprehensum est. Concretus in uesi-
ca sanguis inde adeo deprehenditur, quod post illum
urina subito cohibeatur, & fibræ quædam (ut uerissimis
le est) aut humiditates cruentæ emanent. Datur autem
potui artemisiæ dilutum, heliochrysiq; , uel cunilæ, uel
radiculæ semē, uel liquor silphii, uel cyrenaicus, uel apil-
succus, singula in aceto temperata: aut leporis coagulū,
aut hinnuli aut hœdi in oxymelite, aut myrrha stillatis-
cia cum oleo, spōgiaq; à foris ex muria, uel myrrhastil-
laticia calida accommodatur. Quod si uittium his non
abigitur, secatur pubes, quemadmodum in calculosis,
ablatisq; grummis commode curantur.

DE RENVM DURITIA.

Quæ durities in renibus contrahuntur, nullum sane do-
lorem mouent, sed uidentur renes ipsi tanquam ab
illis suspendi, coxæ stupent, crura uacillant, urina
modica egeritur. Totus deniq; habitus iis potissimū q
aqua subter cutē laborant, similis est. hi emolliuntur ce-
ratis, malagmatis frictionibus et fomentis. Ad hæc quæ
urinam cient, assumuntur, aliusq; subduci debet.

DE DIABETE.

Cum potio, protinus qualis assumpta est transmittitur,
diabetes uitium appellatur. Qui igitur eo sunt occupa-
ti, immodica siti conficiuntur, unde quoque dipsacon,
Græci idē mali nominant. Origo ipsius ex retētriciis re-
nū faculratis impotentia contrahitur, attractricis autem
tanto robore, ut totum corpus ob immodicum calo-
rem exhauriat. Itaque aduersus hunc pugnantes, ci-
bum pleniorē, quiq; difficulter confici queat, nec
liquidus sit, offeremus, ueluti alicam cum rosato,

uel rhodomelo, uel aqua mulsa uel uino non uetusto,
uel alioqui calido. Ex oleribus autem intybum, serm, la-
ctucas, inter pisces erunt saxatiles: suum petunculi, uulue-
pira, poma mala punica, & frigida potio. Item polygo-
5 ni succus, heleniumq; recte ipsis propinatur ex uino ni-
gro, palmularumq; & myrti dilutum, præcordiis & reni-
bus illinitur polenta ex aceto rosaceo, folia uitis, cotyle-
donis, parietariæ, portulacæ. sudores excitandi, uomis-
tusq; a potu frigido, omnibus quæ urinam mouent, ab-
10 stinendum. At sanguinem per initia mittere non fuerit
alienum.

DE STILLICIDIO VRINÆ

& eius difficultate.

Cum neq; inflammatio, neq; calculus, neq; aliud quip-
15 piam ex prædictis infestat, urina autem acris, totusq; ha-
bitus apparet, uel etiam reliqua signa bilem testantur,
ex hac uel urinæ difficultas, uel stillicidium contrahitur.
Quare ex usu sunt quæ hanc inalterant contemperantq;
pisanæ cremor, pisces balnea uictusq; idoneus: acris ui-
20 tæda sunt, uinum, exercitia, ira & tarda comestio. Quod
si urinæ tenuitas, alborq; & reliqua signa frigidam fates-
antur intemperiem, conueniet uinum calidum, condita,
tum quæ urinam cient & medicamina & cibi, ad hæc in-
fessus calidiores. At si præter alborem, etiam crassities
25 in urina appareat, pituitosus humor censendus est, qui
cervicem uesicæ obstruxerit, ubi utendum est oxymeli-
te, tum decoctis hyssopi pulegii, uel origani, uel thymi
uel sulphuris cum aqua mulsa, item superfusionibus calidio-
ribus. siue autem humor crassus, siue calculus, siue grus-
30 mus, uel eius generis aliquid obstruens, urinæ transitum
impediat, siphonem rectum indere ex usu est, nisi partis
culæ inflammatio prohibeat. Porro in febribus urinæ
difficultati medemur, superfuso rutaceo; uel anethino,
uel ueteri oleo. Si aluus astricta est, iniicietur ab inferiori
35 ri parte decoctum foenugræci, uel maluæ, uincitq; insi-
dere ægrotantes in hydreleum, uel aliquod distillarum

PAULI AEGINETAE

Specierum decoctum cum oleo. Ceratum hoc magnifice proficit, syluestris maluae radices in sicyonio cum aqua modica decoctae donec frigrant, ipsae quidem proliciuntur, succus autem oleo miscetur, rutae quarta pars, cerae & castorii quantum sufficit.

DE VESICA RESOLUTA.

Vesicae resolutionem nunc urinae difficultas, nunc spontanea ipsius remissio comitatur, ut in ipso capite de resolutione supra expositum est.

DE VRINAE INCONTINENTIA.

Musculus, qui ceruicem vesicae mouet, relaxatus, hoc mali generat. Quare pueris etiam maxima ex parte solet accidere. Itaque roborantibus potissimum uti conuenit. exempli gratia, cernelae o calido & similibus, ob sunt etiam quae ualide refrigerant: calidis fouendi potius aegri, quatenus fieri potest. Etenim refrigeratio ueluti resolutionis uim molitur. naturaliter autem haec uitio huic opitulantur. Gallinae guttur combustum ieiuno bibendum in aqua tepida praebetur, uel leucanthemi flores similiter, uel leporis testiculus tostus ex uino odorato contra haec uitia bibitur. Et calaminthae myrrhaeque ante coenam potio salutaris est, uel rutae syluestris semen torrefactum per triduum exhibetur. Caeterum pudenda eius quae hoc detinetur uitio, cimolia cum succo herbae perdicis perunguntur.

DE IOCINORIS AFFE-

bus:

Cap. XLVI.

Iecur pluribus uitis opportunum est. nam modo imbecillitas, modo inflammatio, modo erysipelas, modo scirrus, modo abscessus afficit. Interdum exulceratio, interdum obstructio exercet. Primum de infirmitate ipsius dicendum est, a qua proprie iocinorosos nominare aegrotantes consueuerunt. Si ergo alius in cremorem conuersa uerum liquidiora deiciat alimento minus probe, aut neutiquam in iecur digesto, sic tamen ut uentriculus a noxa sit immunis, attractricem uisceris

facultatem infirmari suspicio est. Si uero in eis recens ca-
ro lota esse uideatur, alteratricem, tum eam quæ sangui-
ni creando est dicata. At si calida male habet intempe-
ries, recrementum alui temporis spatio foeculentius ap-
paret, adeoq; foetidū, bilis colore suo insignis, crassaq;
descendit, quando etiam iocinoris substantia, totumq;
ipsius corpus absumitur, urget febris, cibi fastidium, &
biliosus uomitus. Cum autem frigida affligit intempe-
ries, neque frequens, neque copiosa aluus est: quippe as-
fectus longius prorogatur, & certis diebus ueter cumu-
latus deiciet, sed minus foetida ceu sanguinis crassi foe-
cem, ut prope atra bilis uideatur. Item uaria delectio ac
figuratio, frigidam notat intemperiem, in qua febris lan-
guida apparet, facies non collabatur, maior ciborum ap-
petentia inest. Horum uitiorum alterutri si accedat siccitas,
recrementa erunt sicciora, magisq; agri sitient. si hu-
miditas, liquidiora & copiosiora, tum sitis minus excru-
ciat. At si inflammatio iecur infestat, omnibus quidem
ex æquo dextra darte sub præcordiis dolor est: idemq;
ad iugulum supra, ad costas spurias infra peruenit. Huic
dolori accedit febris acuta, tussis sicca, sitis, cibi fastidiū,
spiritus difficultas, lingua primo rubra apparet, mox nigra,
interdum bilis euomitur, & aluus non respondet.
Quoniam autem similia pleuriticis signa existunt, quo-
modo hos ab illis discernas, capite de pleuritide com-
prehensum est. Si uero Erysipelate iecur conficitur, in-
flammatiō ardorq; gliscit, tabes comitatur. Quando
caua iecoris pars priuatam sentit inflammationem,
nausea adest, uomitus, cibi fastidium, & ardor in-
tenditur, anima deficit, & sæpe eadem uisceris re-
gio refrigescit, ut aqua subter cutem transfundi inde
incipiat. Rursus si gibbam ipsius regionem inflam-
matio exerceat, præter alia superius commemorata,
tumor quoque manifestus in superficie oculis & tactui
conspicius est, hæc quidem ualidam grandemque in-
flammationem testantur, sin obscura quædam fuerit,

PAULI AEGINETAE

iubebimus ægro, magnam edat respirationem. Et si de
 xtra parte præcordia dolere asserat, moderata iecoris
 inflammatio censebitur. Quod si oblongus inflammatio
 nis tumor, qua muscoli abdominis recti porriguntur
 appareat, sed ita ut nullum ex prædictis adsit, illos ipsos
 eadem occupari agnosceamus. Verum si grauitas, disten
 tio, dolorq; dextra parte sub præcordiis sentiatur, nullo
 substante tumore, nulla febris urgente, uenarum signatur
 obstructio, quæ uenæ portas & concaua iocinoris perre
 ptantes iis quæ per gybba ipsius excurrunt, committun
 tur. Itaque si in abscessum erumpit inflammatio, dolor
 & distentio ipsis increfcit, rigores sine ratione accedunt,
 dolentesq; iocinore, in sinistrum magis latus decumbe
 re nequeunt, rupto autem abscessu, uel per urinas, uel p
 aluum cumalata puris subluuies prorumpit. At si tumor
 in duritiem quam σκίρρο^s dicunt Græci, deciderit, dolo
 res quidem remittunt, sed tumor cum duritie est conspi
 cuus, quæ ambiunt partes extenuantur, & tempore pro
 cedente difficulter poterunt discerni. Quippe aqua in
 ter cutem protinus comitatur, & tota præcordia humi
 ditate conteguntur. Itaque aduersus calidam iecoris in
 temperiem, refrigerantibus, tum iis quæ uiscus medio
 criter confirment, uti consilium est. id autem præstat ses
 ris & cichorium, interim crudum, interim coctum, cum
 coriano assumptum, item decoctum ipsius, succusq; e
 potus, denique mulsæ iniectus & calidis, & frigidis ioci
 noris uitis opitulatur. Eiusdem generis sunt, intybus es
 culenta, & cicerbita quæ sonchos Græce dicitur. Bene
 facit etiam mali medici cyathus in aquam mulsam de
 missus, similiterq; filicis succus. At si cum obstructione
 mediocris affligat intemperies, ea ex uino quodam tes
 nui, & quod urinæ mouende est, porriguntur. Catapo
 tium uero quod recipiet cichorii drachmas quatuor,
 chamepyteos radicis drachmas quatuor trita cū melle
 cocto dantur ad nucis auellanae magnitudinem, quibus
 aquæ calide cyathos tres superbibere conuenit, iam ex

Galenus
 habet oc
 to. Alexā
 der addit
 intybi
 drach
 mas tres.

opio & semine alterci confecta propinantur, ipsumque Philonis antidotum. In quibus calor intenditur, etiam rosaceum primi meriti ipsis, uel melinum potui datur.

- Esui, prisanæ cremor, uel chondrum cum hydrosas
5 to, similiter panis ex aqua, cum quadam id genus dulci
potione. Et summam cibi erunt, qui mediocriter refri-
gerant, non obstruunt: uinum omnino circunciditur, nisi
alteram ob causam, nempe stomachi imbecillitatem,
hoc requirant: tum enim tenue & qd Græci ολίγον ποσὶ πο-
10 uocant, & dilutum aliquod exhibetur. Ac Erysipelas
quoque in eum modum curabitur. At ubi iecur perfri-
xerit, contrariis pugnandum est. panis igitur recte cum
uino assumitur, item brassica bis terve incocta, castaneæ
asq; esse confert & uuas passas, tum ex gallinis quod
15 satis est. Vinum ab eupatorio, uel asaro, uel medicamē-
to diapedeone assumpto bibitur. Iam ex iis quæ prius
ad coeliacos & dysentericos inscripta sunt, idonea deli-
gi debent: cyphoides autem appellate compositiones,
ad calidas intemperies neutiquam conueniunt, nisi mo-
20 dica quædam caliditas cum humiditate copiosiore ob-
orta fuerit. Cæterum ad frigidas optima sunt remedia,
magisq; si cum humiditate, aut iecoris obstructione eue-
nerint. Si uero obstructio ex crassis glutinosissq; contra-
cta humoribus fuerit, myocantha & præsertim huius fru-
25 ctus datur, item lauri radice cortex. eupatoriumq; ex
oxymelite, uel lupinorum amarorum decocto cum ru-
ra & pipere. Ad hæc farina lupinorum pota, & capparis
radicis partes duæ, costi pars una cum uino, & medica-
mentum diabacanu ad obstructiones quas crassi uisco-
30 siq; humores excitarunt salutariter sumitur: præterea iris
& pistaciorum fructus cortexq; marrubium insuper a-
mygdale amare, & ex ipsis pastilli, dracunculi, ariq; ra-
dix, agaricum, acetum scillites, oxymel, iecur lupi, aridū
tritum & cochleario datum, omnibus iecoris affectibus
35 ex uino dulci succurrit, item antidotum Theodoretum
efficacissimum est iecori obstructo, indurato, inflamma-

PAULI AEGINETÆ

toq; diu. Idem colicis & iſtericis auxiliatur. Similiter et
 tiam picra ex oxymelite. Cibi his dandi sunt calidiores
 & qui aperiundi facultatem habent: nempe porra ex ox
 ymelite, plauſtris aſparagus, & capparis, reliquaq; ob
 ſonia ex condimento aliquo calefaciente, quodq; mea
 tus diſtendat, incocta. Vinum tenue ac uetus utile eſt, ui
 tanda ſunt alimenta craſſi ſucci, balnea crebra, eaq; po
 tiſſimum à cibo. Si morbus in uetuſtatem incidit, etiam
 uenæ ſectio purgatioq; adhibenda, ſi nihil prohibet.
 Cum autem iecur inflammationem experitur, ſanguis
 ex cubito dextro intrepide mittendus eſt, & copioſus ſi
 uires ſufficient. Extrinſecus farina hordeacea, & fœnu
 græci, & ſemine lini cum palmulis uiſcus illinetur, uel
 malis cotoniis, meliloti flore, abſiuthio, chamæmelino.
 Illud autem in ſumma præcipiendum eſt, ut aſtringen
 tia emollientibus ſemper admiſceantur. Epithemata ue
 ro iniici debent, tum quod ad Nileum authorem refer
 tur, tum quod à grato odore euodes dicitur: item Phio
 lagrianum & Apollophanis, necnon ex melilotis con
 ſectum. denique quod coptum appellatur. Porro ad
 maximas inflammationes hoc ualde experientia com
 probatum eſt: abſynthii comæ, nardi gallicæ, aſari, cro
 ci, ſingulorum uncia, iridis, myrrhæ, ſtyracis bdellii, amo
 moniaci ſuffiminis quod thymiama appellant, ſingulo
 rum uncia duæ, medullæ uitulinæ uncia quatuor, cera
 ti, lentiſcini libræ quatuor. Ad hæc oxymel iſtis dandū
 eſt, ſimpliciaq; auxilia, nempe, aſarum, nardus gallica,
 uel indica, iuncusq; odoratus, rotundus, petroſelinum.
 Alius irritanda eſt, urtica, uel mercurialis, coctorum es
 ſu. In declinatione morbi, epithimum & polypodium
 ex mulſa porriguntur, aliusq; inaniri poſtulat per clyſte
 rem, initio quidem ex aqua mulſa cum ſale, uel nitro,
 facta autem inclinatione, miſcetur hyſſopum, uel origa
 num, uel chicum, uel centaureum & cucurbita ſylueſ
 tris. Caua iecoris pars per aluum: gibba per urinas ex
 purgatur. Alimentum his dabitur, cremor ptiſanæ, in

quo apium decoctum sit. At inflammationis quæ Erysi-
pelatis naturam referat, curationem superius sumus exe-
cuti. Abscessu autem facto ruptura adiuuanda cataplas-
mate trispermio, cum resina, manna, pice, radicibus alo-
thee, columbe fimo, caprillo stercore: præbitorum autem
ius polii & fumarie, item ius thlipsis ad tertias decocti
uel cichorii, & chamedryos radicis, uonicaq; facta, mul-
sa conuenit, & quæ in renibus exulceratis commemora-
ta sunt. Extrinsecus imponitur medicamentum Mnasei,
reliquaq; emollientia. Item Icesion, uel quod salicibus
constat. Si uero iecur induratum fuerit, parum in medi-
cina spei est, affectu in aquam subter cutem decidente.
Attamen emollientibus admiscenda sunt, ammoniacum,
bdellium, medullæ, adipēs, & quæ his similem poten-
tiam obtinent. Potiones expediunt, quæ angustias uis-
ceris recludunt, absterguntq;. Huiusmodi sunt quæ urinā
citant, & calculos confringunt. Ad hæc quæ nuper ad ieco-
ris obstructionem dicta nobis sunt, & cibus nimirum con-
uenienter adoptatus.

20 DE MALO CORPORIS HABITU,
qui cachexia dicitur. Cap. XLVII.

P Rincipia aquarum cutem subeuntium, uocare no-
stri malū corporis habitum, Græci καχεξία con-
suerunt. Auxilium est, nisi aliquid impedit in san-
guinis detractio, quæ paulatim ad tertium quartūve
diem producit. Sed uacuandi sunt potissimū, qui hæ-
morrhoidibus, aut menstruis non respondentibus in
morbum inciderunt, quemadmodum iis qui copia uis-
tiosorum humorum laborant, uacuatio sanguinis per
uenam noxia est: purgatio autem ex hiera, quæ sylues-
træ cucurbitæ recipit, per multū utilis, uictus erit tenuis, &
siccus. Aquarū naturalium usus adhibebitur, primū alumi-
nosarū nitrosarūq;, mox sulfurosarū: pluribus diebus in-
terpositis aliud balneum accommodatur, uarioq; exerci-
tationis generi creduntur ægrotantes, maxime autē ei, quæ
per medicos aliptas, id est, reuinctores administratur,

PAULI AEGINETAE

postea autem ueratrum assument: mirifice quoque iuuat ipsos & absinthii potio, & cottabismi, & dropaces. Si affectus in hydropem deciderit, aqua subter cutem curationi sublietetur, quemadmodum exponemus.

DE AQUA INTER CV

tem.

Cap. XLVIII.

Cum iecur interim primario, aut uehementer perfrixerit, aut inflammatioe, aut duritia, aut alio implicitum affectu fuerit, interim lege consortii quod cum aliis partibus habet, sanguinis elaboratio non succedit, ac uitium aquae intercutis quod hydrops Graece dicitur, inde contrahitur: a quo nonnunquam sanguinis copia cum humidi momento intra membranam, quae peritonaeos appellatur, & intestina colligitur, ut abdomen percussum tympani modo crepitum elidat: quae ratione etiam tympanias nuncupatur, qui stomachi, alui, & longanoni inflationi, febribusque longis superuenit. Est cum peritonaei, aut uuluae in mulieribus duritie, aut scirro confletur. Aliquando rursus humorum cum paucissimo spiritu abundantia, in eisdem regionibus tanquam in utre quodam conseruatur, unde malum, ascites nominatur hydrops, & ipse ex causis quas comprehendimus, contractus. Plurima uero ex parte, tum liene, tum iocinore indurato, occallescenteque, item ex longis intestinorum profluuiis oritur, in quibus uenter intumescit, reliquum corpus quod alimentum non sentiat, consumitur. Nonnunquam etiam in tota corporis mole frigidiore pituitosiorque sanguis continetur, qualis partim a iecore descendit, partim ex tota carne corporis ueluti in aquam resoluta emanat, ut corpus albidum, & pituitosum emortui instar appareat, uocaturque hydrops leucophlegmatias hypofarcidios, uel anasarca. Quae uero lentae febres, malus stomachi habitus, haemorrhoides diu suppressae, fluxus muliebris, spiritus difficultas, uigiliae insolitae, & sine ratione oborientes, causaeque his consimiles mouerunt. Curatio igitur communis ab euacuatione incipit.

LIBER TERTIVS 129

incipit. Verum ascites & tympanias appellatus medica-
mentum requirit, quod aquam educat. Cui autem ana-
sarca nomen est sanguinis detractione succurrimus, ma-
xime si affectus origo ex hæmorrhoides est, aut mēstruis
neutiquam respōdentibus, nisi malo habitu præditi san-
guinem emiserint. Et hic igitur in iis qui malam corpo-
ris habitudinem sortiti sunt, per uices tentanda est uacua-
tio. Deinde stercus bouis gregarii aridum exacte tritum
coctumq; in posca, uel oxymelite, sulfurisq; pars quare-
ta superinspersa, toti uentris capacitati iniiciatur, uel ster-
cora caprilla in pueri urina, uel capræ luti crasitie ap-
plicata, per uentrem summe ipsos purgat. Item cataplas-
matis utendum ex fermento, ficis pinguibus, calce, ni-
tro, iride, cardamomo, sulfure uiuo, ammoniaco, baccis
lauri, agresti uua, columbarum ruralium finio, uel omni-
bus, uel quibusdam ex his cum oxymelite. Post quæ
epithema spongium appellatum ex caprillo stercore
mirifice humiditatem uacuat, tum per latentes meatus,
tum per aluum. Insequentibus diebus emplastra pers-
siccantia imponuntur, tum quod ex salicibus est, tum
quod icesium dicitur, uel quod Cureo ascribitur, uel qd
ex baccis lauri factum est, uel polyarchium, uel epithe-
ma ex seminibus præparatum. Atque hoc indubie mi-
rificos præstat effectus, quod sequitur, quippe humores
ex alto eripit: lapidis pyritis, sulfuris uiui, guttæ ammo-
niaci, singulorū drachmæ duodecim, cumini drachmæ
sedecim, nitri drachmæ duodecim. Excipiuntur cera
modica, & terebinthina, pelliq; illita, toti uentri impo-
nuntur. Ius radicis astæ decoctæ in uino potui da-
tur, uel cucumer syluestris uino austero maceratus per
triduum, cyatho uno propinatur. Accessio autem fit
quotidie usque ad cyathos tres. Hoc quod subiungit-
ur, uaria constat mistura: balsami, nardi, cassiæ, cumini,
dulcis radiculæ, hyperici, iunci rotundi, asari, dauci, amo-
mi, myrrhæ, petroselini, calami aromatici, piperis, seseo-
lis, spondilii pares portiones, faciunt autem bene etiam

PAV. ÆGIN.

R

PA VLI AEGINETAE

singula per se & omnia quæ urinæ ciendæ similem faci-
 cultatem obtinent. Cæterum scilla tosta, cum melle
 trita & linctus modo exhibita, sine gravitate urinâ mo-
 uet: coquetur autem ex aqua potabili, id quod subiun-
 gam præcipue bonum est: interioris scillæ pondo duo
 in uini austeri sextariis tribus adusque tertias. incocta
 porrigito ex uino quotidie, orsus à mystro usque ad un-
 ciam. Istud urinam optime prouocat, quod recipit alu-
 minis liquidis circa fabæ magnitudinem: ubi aqua dis-
 lueris, linteoque percolaueris, ad tres dies propinato, uel
 ad unum. Conuenit etiam his picra ex oxymelite. Ad
 hæc Theodoretus, & ex amaris amygdalis pastillus.
 Plura uero aquam educunt, sed hæc usus comproba-
 uit. gnidia grana quadraginta, aut quinquaginta, uel las-
 thyrides uiginti, aut triginta, uel euphorbii filiquæ quinq-
 ue, aut septem, uel squamæ æris drachmæ duæ, aut
 tres cum nucis panis exceptæ, ac in orbiculos digestæ,
 uel sambuci radicis corticis succus epotus cum condi-
 mento, uel chamelææ foliorum æris combusti, anisi sin-
 gulorum par modus datur in aqua, per initia quidem
 drachma una, diebus aliquot interpositis etiam duæ, aut
 plures. Atque insequentia, mirifica sunt catapotia: aloes,
 euphorbii, cocci gnidii, singulorum uncia, rhei semuna-
 cia, excipiuntur succo brassicæ, singunturq; catapotia,
 dantur filiquæ septem, aut nouem. Antidotum ex gas-
 triophylo, aquam mirabiliter elicit, iam uinum quod
 aquæ educendæ est, dare tentabimus. Est autem infra
 scriptum medicamentum ad id efficacissimum, scillæ
 unciæ tres, seminis apii, capparis radicis corticis, pipe-
 ris, singulorum drachmæ quatuor, cocci gnidii decorti-
 cati drachma, phylli drachma, malabathri galbuli duo,
 uini optimi hemina duodecim, mellis crudi libræ sex.
 Contusa colataq; uino perfunduntur, scilla simul leuis-
 gatur, dantur cyathi tres: post humoris euacuationem,
 etiam theriaca utendum est, & stercoris buboli uisti co-
 chlear ex uino potum quotidie strenue auxiliatur.

LIBER TERTIVS. 130

item clysteres adhibendi acres, nisi uenter sua sponte humescat: tunc enim exiccare ipsum magis conuenit. Porro in mulieribus quas aqua subter cutem male habet, etiam pessus hic utilis est. Anisi, cardamomi, cumini, nitri, aristolochiæ, foenugræci, pulegii, ficuum interioris pares portiones susino excepta imponantur. Secundum hæc aquis naturalibus, uti continenter expedit, ad hæc ut exerceantur, sabuloq; & arena saburrentur, reliquis balneis abstineant. Quod si uero interim lauent etiam, utentur in lauacro nitro, sale, sinapi, calce & persimilibus inspersis. Hæc sane uel citra lauationem utilia sunt, aridaq; cum oleo uentri adfricata. At si id uitium est, cui anasarca nomen est, reliquas partes exerceri, quatenus licet, oportet, & sic cas ad solem perfricari. Reliqua uictus ratio siccior assumetur. Cibus itaque erit fassamentum, sinapi, & allia: ex auibz syluestres, & sicca magis. Inter olera asparagus, bis acutū, porrum, sinapi, caucalis, reliquaq; syluestria. Obsoniis miscebitur saltheriacus, uel ammoniacus: uinum uetus, tenue, ad urinam mouendam efficax recte bibitur. Sin autem facultas datur, ex marina aqua confectum, deinde potio liberalis uitanda est, aqua in totum. Quod si cum febris aqua subter cutem inuadat, calidioribus acrioribusq; cibis & auxiliis abstinetur, ubi permixta sunt uitia, uehementiori succurrendum est, si uero id morbi genus est, quo uenter sonitum edit, Tympanias uocatur, purgantia, & quæ uniuersum corpus emaciant, eligenda sunt, item ad urinam efficacia. His autem quæ extenuare & digerere spiritus possunt, tum intrinsecus, tum à foris utendum est. Cucurbitulæ leues crebro toti uentri suffiguntur, si id uitii male habet, in quo in uterum aqua contrahitur, nisi prædictis cesserit remediis, cute compuncta perniciosus humor elici debet, quod nulli alii aquæ subter cutem generi conuenit.

Res. ii.

Lien atræ bilis excrementum, ceu limum sanguinis ab iecinore elicit naturaliter: Eius facultas attractrix, si infirma fuerit, meatusve obstructus per quem illud prius euadebat, sanguine impuro per totū se corpus spargente, atrum morbum regium constituit. At si lienem grauitas & distentio, uel etiam dolor exerceat, meatus obstructio ostenditur: si nihil horum euenerit, attrahendi potentia imbecillitas. Quinetiam si atræ bilis uomitus sine febre aliave malignitate oboritur, retinendi potestatem laborare indicium est. Sin contra, nō attractrix naturæ uis, sed expultrix ægrotet, cibi fastidiū accidit. Haud enim amplius atræ bilis excrementum, quod appetentia excitanda est, ab liene ad uentriculi ostium deferretur, eoq; in liene obstructo obseptoq; , inflammatione primum, cuius notæ sunt, feruor, dolor & distentio, excitatur. quæ paulo post in duritiem tumidā, scirrhus dicitur, occallescit, sic ut feruor quidem dolorq; finierit, tumor autem cum duritia maneat. Hoc pressis uitio, os foetet, gingiua exeduntur, ulcera in cruribus catricem non recipiunt, ob quæ simul affecto iecinore, cutem subeunt aquæ colliguntur, sicut comprehensum est. Itaq; intemperies ipsius eandem cum iecinore curationem postulat. si adest inflammatio, sanguis à cubito sinistro, uel ab extrema manu dimittendus est, eo quod reuulsio longioribus interuallis fieri debeat, uel etiam propter naturæ quandam confinitatem: deinde quæ citra euidentem calorem extenuant, illinentur, admixtis quibusdam etiam nunc astringentibus: uis detur autem hanc facultatem habere suapte natura, qui uocatur flos salis. Porro est & hoc cataplasma mirificum, foenugræci triens, farinae hordeaceæ, cardami, singulorum uncia, sicuum pinguium libra, uerbenacæ herbæ aridæ uncia. ficus, aceto quàm acerrimo maceorantur. Deinde cum aliis iam prius tunsis incoquantur, postea iterum coquantur, Vel stercus caprillum

- tum cruda polenta coctum ex posca illinitur. Adhibeo
to autem, si placet, salis florem: ad fouendum cyprino
cum aceti momento, & malagmatis tititor, primum
simplicioribus, quale est hoc: Cerae sesquilibra, centau-
5 rii libra, nitri triquadrans, terebinthinae, seminis agni, cap-
paris radicis, singulorum quincunx. Quae liquari pos-
sunt, cocta aridis superfunduntur, iam quod ad Nileu
autorem refertur praestantissimum est. Verum ubi in-
flammatiō in scirrum degenerat, ualentioribus uti con-
10 uenit, ut etiam cutis summa exulceretur, quale est quod
ex fimo caprillo constat, & citrinum. huc accedunt Ma-
cherionis, Curei, item ex baccis lauri confectum, & ex
salicibus. Quod subsequetur, etiam ipse expertus sum,
auripigmenti unciae duae, sandarachae unciae duae, fauo-
15 rum terebinthinae libra, picis aridae tantundem, galbani
uncia, opopanax uncia, capparis radicis corticis, glan-
dis unguentariae, singulorum unciae quatuor, lachrymae
ammoniaci scrupula sex, nardini, uel cyprini scrupula
quatuor. Ammoniacum etiam cum aceto applicatū,
20 lienis saepe profuit, item potum scrupulis tribus quater-
nisve cum uno castorei, si priusquam in lauacrum descen-
dant, sicum pinguen comederint, sputoq; eam reddide-
rint, uel ammoniaci pars una, castorei tantundem: datur
drachma. haec etiam ad induratos cum tumore, pro-
25 ficiunt, quemadmodum capparis quoque cortex ex
aceto contritus illitusq;. Idem bibitus aceto, uel oxy-
melite, crassos glutinososq; humores uacuat, interim
sanguinem. Iam salicis cortex, consimiliter inungitur,
& cinis fabrorum cum cruda polenta ex oxymelite illi-
30 tus, item centaurei succus à foris impositus, epotusq;,
& lupinorum amarorum decoctum cum ruta & pi-
pere assumptum, nec non farina ipsorum illita, &
aqua in qua candens ferrum subinde extinctum est,
febricitantibus per se data cyathis tribus, febris carens
35 tibus autem cum uini & aceti cyatho uno, uel iapathi
syluestris radicis cum scilla tres oboli, uel chamaedrys,

R iii

PAULI ÆGINETÆ

uel serpilli acetabulum totum. Vel oxymelitis, anagallidis, quæ coeruleum florem obtinet, duo oboli, cum posca bibuntur, uel acetum scillites, uel oxymel. Composita autem hæc, panacis radicis, guttæ ammoniaci, capparis radicis corticis, struthi, scillæ tostæ inferioris æquales portiones exhibentur denari unius pondere: benefacit etiam suspiriosis, & hydropicis.

ALIVD. Myricæ fructus drachmæ quatuor, piperis tantundem, spicæ nardi drachmæ, duæ suffiminis ammoniaci totidem. Teruntur aceto scillino, instar denarii unius dantur ex oxymelite.

AD LIENEM INDVRATVM.

Cyclamini drachmæ uiginti, brionia drachmæ tres, distamni drachmæ duæ, scillæ tostæ drachmæ octo, struthi drachmæ sex, capparis radicis drachmæ sex. pastil-
lustrilobolaris ex oxymelite porrigitur: & qui ex erica præparatur, non inidoneus est: cibus competit tenuis, acris, siccus: potio paucissima: adhibendæ exercitationes frictionesque, & sinapismi, interim etiam cucurbitulæ cum scarificatu defigendæ.

DE MORBO REGIO, QVI

icteros Græce dicitur. :Cap. L.

Regius morbus, quem Græci icteron appellant, bilis est per totum corpus suffusio, modo atræ, de qua in lienosis à me dictum est, modo flavæ. Differentiis constat numerosis: quarum causæ & notæ hæc sunt. Siquidem hoc uitii febricitante ægro repente ac cumulatim superueniens febrim finierit, crissim testatur, materia ex alto foras prorumpente, contra tractum. Medicina non indiget, ut quod balneis & moderata frictione subito discutiatur. Si autem cum febre & biliosis deiectionibus inuadat, & præcordiorum dextra parte dolor adsit, feruens iecinoris inflammatio significatur, cuius ui sanguis in bilem mutatus, per uniuersum corpus deferatur. Sin autem feruor citra gra-

uitatem in ipso substat, ex sola iecoris calida intemperie, uitium gignitur. Si absque febris alba delicias
 tur, uesicæ fellis malum ostenditur, uel ipsius meatuum, si grauitate præcordiorum dextram partem
 5 premente, obstrusi conseptique sint, aut citra illam uires ipsorum infirmantur, uel huius attractrix, quæ humorem atrum ex iecinore eliciat, uel illius expul
 trix, quæ ad intestina eundem protrudat. Quippe sanguis biliosus non expurgatus, in totum corpus dif
 10 funditur, quemadmodum in nigro arquato fieri dicebamus, statim uero his etiam urinæ biliosissimæ affatim excernuntur. Cæterum fit etiam arquarus cum solidæ partes calore nimis intemperato, in bilem degenerant, ratione alimenti, quod ipsis offertur,
 15 quemadmodum in aquæ subter cutem genere, cui nomen anasarca in pituitosam humiditatem est mutatio, uerum hæc talis arquati discriminis nota est, nimirum quod non uniuersus, sed paulatim procreatur, sic ut nullum ex commemoratis adsit. Iam uero
 20 pro noxiæ medicamenti potus, tum uirus extrinsecus à uenenato animali illatum, regium morbum parit. Cum itaque calida iecoris intemperie, & inflammatione uiriumque robore destituitur, curationem supra comprehensam, ubi de ipso agebatur admovebimus,
 25 eamque integram in hoc transferre caput oportet, ne eadem mihi sint repetenda. At si meatus conceptaculi fellis utrique sint obstipati, uel alter duntaxat, uenam in cubito dextro ipsis diuidi consilium est. Nonnulli uero, tum his, tum illis qui ex iecore in
 30 flammato, arquatum contraxerunt, uenam propter minimum dextræ manus digitum, soluunt. Cataplasmata quæ inflammationem arcent, hic utilia sunt, & purgatio ex hiera, nec non clysteres, potui recte datur arquaticis, apii, uel adianthi, uel lapathi, uel serpilli deco
 35 ctorum ad tertias succus, uel absinthium potioni in

R iiii

PAULI AEGINETAE

spargitur. Præclare faciunt radiculæ succi cyathi duo,
 cum uini cyatho uno. Et cichorei succi cyathi bini, uel
 terni per se, aut cum uino poti. Sed qui iecoris inflam-
 mationi arquatum ferunt acceptum, mullum bibent,
 uel decoctum tenuis aristolochiæ, uel hyperici, uel adia-
 thi, uel struthii, uel erythrodani similiter, uel cornus cer-
 uini scobis drachma, cum uino, uel pastinaci syluestris
 decoctum in uino, ut tertia pars superfit, uel sulfuris ui-
 ui drachma in ouls sorbetur. Hæc etiam propter ob-
 structionem arquato laborantibus ualde auxiliantur, se-
 minis autem atriplicis scrupuli octo, cum chrysanthem-
 o, uel alio dulci à balnei ingressu poti, uacuationem
 magnam præstant. Recte etiam picra datur, & sicca, &
 ex oxymelite, & Theodoretus. Iam ex amaris amyg-
 dalis pastillus commode porrigitur, & cinamomi quã-
 tum tribus digitis comprehendi potest, in mulli cyatho
 uno, uel aqua temperata, uel myrrhæ ad fabæ magni-
 tudinem cum piperis granis quinque, tantum semq; ci-
 namomi. Qui uero ex calore solidarum partium intes-
 perato in arquatum inciderunt, simplici frictione, exer-
 citiis moderatis, unctione & balneis ad sanitatem redu-
 centur, cibo humido & mediocriter refrigerante cum
 ptisana, intybo, seri, cichoreo, piscibusq; uino tenui aquo-
 so. Qui ex lethali potione, aut ex uirulentorum anima-
 lium moribus affectu sunt impliciti, de iis quinto uolun-
 mine tractabitur. Porro si bilis oculos faciemq; deho-
 nestet, elaterii instar erui cum lacte muliebri naribus in
 balneo instillatur, et statim in solium descenditur, sed ita
 ne caput immergatur. Post balneum uictu recreatis, rur-
 sus unguentum in sole, naribus infundito. Benefacit etiã
 cyclamini succus, porri, et nigellæ. Acetum uero acerri-
 mum naribus attrahat in solio desidens, contineatq; et
 pressis naribus paulisper, & mirifice uacuabitur.

DE VMBILICO PROCI

dente.

Cap.

LI.

35

LIBER TERTIVS 133

- C** Ausam umbilici prominentis, & quomodo id uitii manu curetur, in parte chirurgica docebitur. Quoniam uero nonnulli etiam medicamentis in naturalem statum redierunt, ipsa hos loco dicemus. **9** Aluminis scissilis drachmæ quinque, flocium uini drachmæ octo, rosacei decem, gallæ immaturæ drachmæ due, Vino diluta, & in mellis spissitudinem redacta loco affecto resperguntur. Extrinsecus spongia posca madens superiniicitur, & fasciola deligatur. **ALIVD.**
- 10** Lomenti, gallæ, balaustii pares portiones, coquantur in aqua: ubi dissoluta fuerint, tritaq; diligenter, spongia, ut prædictum est imponuntur. **ALIVD.** Plûbi scobis drachmæ sedecim, cicutæ, manne, cerussæ, hypocistidis succi, singulorum drachma, uino dissolutis in modum prædictum utitor.

QVOMODO IMPVBERES IM

- berbesq; diu maneant, & particulæ naturales testesq; ita conseruentur, piliq; asboleantur. **Cap. LII.**
- 10** **C** Imoliæ cretæ, & cerussæ æquales partes, alterci succo excipiuntur ut sordium spissitudo fiat, deinde oleo lentiscino quantum sufficit adiecto contundito, ac utitor. **ALIVD.** Cicutæ succum, solani, alterci, lupini foliorum tenerimorum, psillii æqualem modum, ubi contriueris, utitor, sed locum prius abstergito abluitoq;. Oportet autem pridie quàm usurpare uelis, aquam bibere. Medicamentum pilis abolendis dicatû psilotrum appellatum. Asellorum domesticorum, qui tacti conduplicant sese in orbem, pilulæ rotundissime similem, Græci κατὰ κῆρυδι καὶ ὀνίσκῳ uocant, pondo denarii duo, sandarachæ pondo denarii quatuor, calcis pondo denarii octo, aceti ueteris cyathus. Lixiua è sicu tantundem: coquito in fictili, ac in balneo utitor. **ALIVD.** Calcis, ceneris lixiuique partibus duabus, auripigmenti tantidem, terræ cimoliæ parte una, in aqua coctis quemadmodum explicitum est, utitor. **ALIVD.** Simplex

PAULI ÆGINETÆ

• dorisq; expers: cineris lixiui, calcis, utriusque sextariū,
sandarachæ unciam. Coquito, ut dictum est, & uti
tor. Porro quæ pilos adimant, in oculariis exposi
ta sunt.

DE RAMICVM GENERIO

bus.

Cap. LIII.

Cum intestina peritonæo rupto diuoluuntur, o
perosa est curatio. cum raritatis texturæ uitio de
scendunt, faciliior sanandi ratio est. Ac huic
malo pueri potius, utpote humidioris naturæ, sunt op
portuni, multiq; adeo citra manus operam medicamis
nibus impositis, & cōuenienti deligatura perfanati sunt.
Utendum uero est facultatibus infra comprehensis, ubi
hoc solum addiderimus, affectus solo loci situ uariare.
Quando intestinum etiam tantum supra in inguinibus
iacet, nostri inguinis ramicem, Græci βιβρονικήν uo
cant. Cum in scrotum infra delapsum est, intestinorum
ramex, Græce ἐν περονικήν dicitur. Malicorii igitur drach
mæ decem, gallæ immaturæ drachmæ quinque in uini
austeri cyathis tribus incoctæ, & in pollinem coactæ, in
testino prius perfricato imponuntur: quæ aqua frigida
superfusa decimo die soluuntur, sed ita, ut æger in lecto
maneant diebus triginta bibatq; cupressi decoctum cū
uino, uel eius globulorum tres obolos, ex diluta uini po
tione, hoc medicamentum auxiliatur pueris.

ALIVD GLVTINAT

TORIVM.

Symphyti radice, marrubii succi, amygdalarum amara
rum, gummi pares portiones. ALIVD. Terebinthini
pondo sescuncia, ceræ, thuris, myrrhæ, ichthyocollæ, co
chlearum cum suis testis, singulorum pondo uncia, ich
thyocolla in aceto diebus tribus maceratur. ALIVD.
Cupressi, galbulorum uncia, gallæ tantundem, malicorii
semuncia, taurocollæ uncia tres, mannæ, thuris semun
cia, symphyti tantundem, cochlearum cum testis uncia.
Galbuli & malicorium uino astringenti diu incoquunt

tur. Et cum reliquis probe in puluerem detritis excepta in usum accommodantur. **A L I V D.** Aloes, malis corii, thuris, hypocistidis succi, glutini fabrilis, picis, bituminis, singulorum sescuncia, uini dulcis quod sufficit.

- 5 **A L I V D.** Magis uarium, facit etiam adultis, cum morbus uetustatem nondum senserit: chrysocollæ, taurocollæ, sarcocollæ, ichthyocollæ, lapidis iagatis, lapidis hæmatitis, rhus syriaci, & coriarii, acaciæ, singulorum sescuncia, lapidis pyritis ignem non experti, maris netis coerulei coloris, aluminis scissi, mannæ, thuris, singulorum uncia picis brustæ uncia quinque, cochlearum cum testis uncia plumbi retosti quod helcisma dicitur, uncie quatuor gallæ, squamæ stomomatis, æris singulorum uncia, bituminis uncia sex, myrsinati quod satis est. Vino astringente arida excipiuntur. Medicamento tam spisso ut digitos non coinquinet, utitor. Quod si iacere non sustineant, triangula ipsos fascia crassiore, quæq; intestina possit constringere, tuto deligabis. A cibis infantibus abstinendum, uino copiosiore, crebris balneis, uehementi motu, nempe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis.
- 15
- 20

AD AQUOSVM RAMICEM

qui hydrocele dicitur, ut humor collectus discutiat ur.

- 25 **Piperis** grana centum, lauri baccae octoginta, nitri drachmæ viginti, ceræ drachmæ quadraginta, olei hemina dimidio exceptis utitor.

- 30 **A L I V D.** Præstantissimum. Lapidis asiii floris drachmæ sex, uinæ passæ acinis uacua drachmæ duæ, cumini æthiopici drachmæ octo, nitri rubri tantundem. Trita imposito, fouens uesperis & mane: quidam uero adiiciunt etiam sulfuris drachmas octo.

- 35 **A L I V D.** Calcem balnei sordibus exceptam cum cerato impones, & paululum nitri calci miscebis. **A L I V D.** Radicis brassicæ crematæ cinis

PAULI AEGINETAE

adipe suillo ueteri liquefacto exceptus inducitur: per tri-
duum soluitur. Ne autem humoris magna fiat colluui-
es, hoc utere malagmate. Cerae libris duabus & semis-
se, picis triente, guttae ammoniaci triente, aluminis liqui-
di fescuncia. Proficit etiam medicamentum ex populo
& reliqua extrahentia.

DE INFLAMMATIONE TESTICULI SCROTICQUE & ALIIS IPSORUM

affectionibus. Cap. LIIII.

SCroti inflammatio hisce agnoscetur notis, is locus
leui contactu quamprimum indolescit, feruor, du-
ritiesq; intensa apparent. Testiculo autem inflam-
mationem sentiente non ex leui tactu dolent affecti, sed
impactis ualidius digitis rubor & durities ipsius per su-
ma minor extare uidetur, altius autem impresfis illis, du-
rities occurrit, & febris nonnunquam oritur. Itaque tes-
ticulorum inflammationibus proprie euenit sanguis
ex talo dimissus: communiter autem omnibus cataplas-
mata & cerata. Imponi igitur debent ex lomento diluta
nini mixtione cocto cum uuis pinguibus acinorum ex-
pertibus & cumino, uel hastulae regie radix: incocta con-
tritaq; miscetur polentae aequali, illiniturq;, uel lini semine
ex diluto uino, uel foenugraecum ex mulla, uel lilii ra-
dix ex uulsa recentibusve uini floribus cum polentae
polline. Vel senecion, & corianum uiride cum uuis qui-
bus acini sunt exempti. Sin multus infestat ardor, foliis
alterci cum triticea farina, aut ciceris delinuntur: uel cala-
mi foliis, uel cucurbita syluestri cruda. Si uetustior est
morbus cum duritie, cucumeris syluestris radix in mulla
cocta, leuigataq; cum lolii farina admouetur. Item
hoc efficax est auxilium, uuarum quibus acini sint exem-
pti, unciae quinq;, cicerum subseruefactorum fescuncia,
cumini uncia, sulfuris uncie nouem, nitri uncia, resinae un-
ciae tres & semis. contrita omnia cum melle in cata-
plasmatis formam digerens, utitor. cerata haec sunt, olei
cyathus, colophoniae selibra, molybdenae, cumini, uuae

PAULI AEGINETAE

tractauimus. Vbi etiam illorum qui uenerem exercere nequeunt, scripta est curatio, item quæ ad ueneris insomnia proficiant. porro iuuabit genituræ profluuius laborantes, & cubile frigidum, & dextri lateris, uel sinistri incubitus, item medicamenta frigida lumbis substrata, quæ sunt corianum, cicuta, cerussa, portulaca, omnia uero ex aceto.

DE SATYRIASI. Cap. LVI.

Satyriasis est naturalium palpitatio quæ nonnulli seminis uasculorum inflammationi cum intensione superuenit: hæc nisi finiat, eadem genituræ conceptacula in languorem resolutionemque, aut conuulsionem ex hoc uitio solet præcipitare. Moriunturque in conuulsione ista celeriter homines, cum tumore alui & frigido sudore, at mulieribus raro hoc mali accidit. sanguinem igitur protinus demittere conuenit, uictu uti tenui, & abstemio, eumque assumere quotidie, ualenter nunquam, sed paulatim. Laudatissimum igitur est remedium, beta, malua & mercurialis momentum, & ius esculentum cochlearum: nil mali fuerit etiam ex simplicibus clysterem ab inferiore parte iniicere. Quæ uero utinam mouent potestates cauendæ sunt: lumbis refrigerantia quoque ad mouere oportet, ut solani succum, aut portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Necesse uero est colem pubemque frigidorum, quibus leniendi uis inest, aliquo delinere, nempe argenti spuma, cimolia, creta, cerussa, aceto dilutis, aut aqua, aut uino dulci, aut sapa, supino cubitu, conuiescere nocuum est. Rursus confert bibere nymphææ radicem, iridem & adianthum. Rute uero succi potus profuerit & seminis profluuii laboranti, & cui naturalia sunt arrecta. Cibus datur frumentaceus modicus, sitis indicitur. At si prorogatur uitium, cucurbitule cute ferro incisa defigende sunt. Si plenitudo adsit, etiam hirudinibus uacuare, & uentrem cruda polenta oblinere, alienum non est.

DE PRIAPISMO. Cap. LVII.

Priapismus est firmum genitalis incrementum, quod in longum latumq; intumescit, citra ueneris appetentiam. flatulentus nimirum est spiritus qui

particulam in tumorem attollit, humorum uiscosorum crassorumq; soboles, modici caloris beneficio. Notum uero est cuilibet, particulas non esse calefaciendas, sed leniter refrigerandas, cerato rosaceo cum aqua contuso item chamemelino in genitali & lumbis imposito, uictus & medicamēta exhibentur, quæ extenuare citra manifestum calorem possunt. Applicabūtur etiam quæ naturali modo operantur, experimentis ac usu probata.

Nymphæa his quoque potui dabitur, agni semen, rutaq; uiridis, obsonis mixtum. Sed per initia id non assumi debet, ut quod uehementer calefaciat: uerum post aliorum extenuantium usum. Id faciundum uenit, cum uacuationem per uomitum moliris. Nam uicinæ partes sæpe per aluum inferiorem profluunt. Exercitium fricatioq; spiritibus discutiendis recte adhibentur. Nulli prædictorum uenus prodest, nisi quibus ex huius abstinentia semen abundare conicimus.

DE PARTICVLIS INEF-

ficacibus.

Cap. LVIII.

Qui hoc uitio laborant, non ruunt in uenerem, eoq; animum perdunt. Causa horum est, particularum resolutio, uel seminis inopia. Cum igitur ea quæ semini generando sunt, libro primo inter præcepta salubria exposuerim, tum quæ simplici uirtute ad uenerem incitant, nunc ualentiora adicere oportet.

Communiter igitur medicamentis quæ à lassitudinis bus reficiendis, acopa dicuntur, ad resolutionem inscriptis, hic quoque utendum est. Priuatim stellio concrematus, in pollinemq; redactus magno dextri pedis digito, oleo adiecto illinitur, & uenus exercetur: ubi cessare uoles, digirus abluitur. Iam medicamentum

PAULI AEGINETAE

ex stellionibus efficax est. Potui uero dantur quæ incio-
tant, quale hoc primum est, piperis, baccarum pini, pe-
troselini, ceruini genitalis rathenti, terebinthinę pares
portiones. melle excipiuntur.

ALIVD. Cicerum crudorum, baccarum pini, singu-
lorum uncia due seminis erucę, piperis, singulorum un-
cia, mellis datur quod drachmas duas impleat cum uis-
no. Item satyriace dicta ex multis composita congruet,
atq; id genus alia. Inspicere præterea oportet reliquas
morbi causas, & convenientem ipsis curationem ac-
commodare.

PVDENDORVM ET ANI

remedia.

Cap. LIX.

Naturalium aniq; ulcera citra inflammationem
oborta, medicamentis indigent, quæ uehemen-
ter resiccant: cuiusmodi sunt ex charta combus-
ta, anethum ustum aridum, cucurbita concremata. At
siccis recentibusque ulceribus, etiam aloę præsens est re-
medium, si arida in puluerem redacta applicetur. Porro
omnium leni simum est, & nihilominus efficax pō-
pholyx. At si humidiora euenerint ulcera, piceę cortex
per se, & lapis hæmatites. sin alte descenderint, manna
miscbitur. Si pascendo serpant, lenticula cum malico-
riis illinetur, utendumque est Coraco ea oxymelite ap-
pellato, & bithyno, ad hæc eo quod ex charta compo-
nitur. Rimas autem naturalium sedisque, Græci uocant
rhagadas, leuat resina fricta cum rosaceo contrita, ut sor-
dium fiat spissitudo, adiecto etiam luteooui, opioq; uel
hederę foliorum combustorum cinis cum rosaceo in-
plembea pila tritus admouetur. Iam pastillus ex cene-
leo, & lithophrigium admodum probata sunt remedia
ad rimas, tum sordida ani ulcera, præsertim quæ elidi
nequeunt, ALIVD simplex, quod etiam ac imoniam
obtundit. Cadmię, piperis singulorum uncia duę, ros-
sarum ungue ex foliis desecto, uncia sex. Aridum insp-
gitur parū, apio quam nostri radicem syluestrem uocāt,
prius

5 prius absterſa. Ad condylomata uero faciunt chalcitidis hyſſopi, medullæ ceruinæ, rubi foliorum æquales por-
 tiones cum cerato, idem præſtant paſtilli ex cœnæleo ſi-
 militer. Quod ſi in cole intra genitalis foramen ulcus
 10 delituerit, pus, uel ſanguis citra urinam redditus fatebitur. Curatur primum dilutiore muſſa collutum, mox la-
 cte, poſtea collyrio aſteri lacti mixto, aut albo paſtillo,
 aut is qui uocatur dialotarion in plumbea piſa ſubactus
 demittitur, uel etiam penna tincta perlinitur, inde tenue
 15 linamentum tortile unctum imponitur. Præſtantiffimū
 uero eſt etiam quod capit gallæ, pompholygis, amyli,
 & aloes pares modos, roſaceo & plantaginis ſucco
 maceratos.

AD NATVRALIVM DOLORES.

15 Butyri, reſinæ, paribus portionibus pulchre liquatis per
 ungito uel ſeminis lini ſucco, æquum myrrhæ & reſinæ
 frictæ pondus leuigatum imponito.

AD INTVMESCENTIA

PVDENDA.

20 Vitis foliorum tenerorum pondo denarii, ceruſſæ pon-
 do denarium, quinque, trita applicantur. Caterum fotur
 ex aqua marina frigida coles recreatur, deligaturque. Car-
 nosas naturalium excreſcentias, quas Græci thymos uo-
 cant, compescit, nec ſinit rursus augere cinis palmitū
 25 cum aceto illitus, item ſalicis corticis combuſti cinis, In
 uniuerſum & thymus, & myrmecia, & uerruca penſilis
 quæ dicitur acrochordon per medicamenta ualenter
 exulcerantia eliduntur: his autem quæ exedunt, emoriū-
 tur. Proprie contra hæc uitia proficit, elaterium cū ſale
 30 impositum, groſſi cum aceto, nitro & farina. Liquor fi-
 ci illitus, ſimaridis caput ſalſum crematum in cinerem,
 ærugo cum ſulfure uiuo combuſta, tithymalli liquor il-
 litus, ocymi folia cum atramento ſutorio, uel heliotro-
 pii maioris fructus cum uino iniectus.

35 AD ANI INFLAMMA-
 TIONEM.

PAV. ÆGIN.

S

PAULI ÆGINETÆ

Cerussæ pondo uncia quatuor, pompholygis pondo uncia, uel cadmia tenera, thuris pōdo uncia: sereos succi hemina diluuntur, succus autem paulatim affunditur, donec absumatur. Deinde ceratum ex unciis duabus cera, & rosacei libra confectum: ubi deraferis, miscetur ualidaq; emollitur. Demittitur aut instrumento quod πύσκαλον Græci nominant, & superdeligatur, facit autem ad ani fissam cum inflammatione sentiunt, ite aduersus sedis exulcerationes, cum ardore, aut rosione infestantes.

AD SEDIS ERYSIPELATA.

Medicamenti, quod ab herbarum succis diachylon appellatur, pondo libra, rosacei quantum satis est, panis puri pondo libra, croci pondo uncia, opii pondo uncia. crocus & opium passo macerantur, panis aqua. Deinde leuigatis ipsis, medicamen diachylon, & rosaceum admiscetur, emolliturq;. Vtile est etiam ad podagras calidissimas. ALIVD. Arcetani inflammationem cerussa cum uino, rosaceoq; in pila plumbea, & cochleari simili trita inunctaq; uel cerussam & oui candidum rosaceumq; in eadem pila leuigata, dum sortidum spissitudinem habeant, perungito.

HEDRICVM AD ANI DOLORES.

Alterci folia tenera, portulacæ folia tenera, micas panis in uino tinctas, ouorum tostorum lutea pari pondere, rosacei quod satis est, ubi locum rosarum & meliloti decocto foueris, cataplasma imposito.

HEDRICVM OPTIMVM AD ANI INFLAMMATIONES, EIVSDEMq; EXCRESCENTIAS.

Cerussæ, spumæ argenti, suffiminis ammoniaci, bdellii, singulorum scrupula sex, terebinthinæ uncia, ceræ semicla. Arida succo solani, alterci, uel portulacæ conteruntur. Quæ liquantur, ubi illis adiuncta fuerint, excipito. Et solutis rosaceo, utitor. Iam medicamen phicotiche, & ex plumbagine præparatū. Ad hæc quod Græce dialotariō dicē. Præterea pastillus ex halicacabo & ex ros

his ad ani inflammationes genitaliūq. laudata sūt remedia

AD EXCRESCENTIAS ANI.

Excrefcentiis si inflammatio adest, opitulantur generas-
tim iam commemorata, & proprie hic pastillus: Cerus-
sa quadrans, pompholygis uncia, argenti spumæ sex-
tans, mastichæ scrupula sex, alterci succo excipiuntur. Si
careant inflammatione, cupressi galbulorum combus-
torum cinis loco dolenti, uino prius absterfo inspargit-
tur, uel cucurbitæ aridæ corticis combusti, uel palmu-
larum ossium cinis similiter, uel testarum quorum, &
foeniculi cinis, uel succi mali Punici foliorū, æq̃lis mo-
dus. Vino albo deterfa pars diebus septem eluitur. cal-
losa autem tubercula calce et auripigmento cum aceto
acri trito recte etiam in sole perungis.

DE HÆMORRHOIDIBVS.

Venulis, quæ in ano extant, iusto largius inanitis, habitū
in aquam subter cutem resolui contingit, & affectos in-
feliciter cibum sentire, ac contabescere: periculum uero
est, ne largum quoque sanguinis profluuium accidat,
quemadmodum ne idem in totum supprimatur: unde
laboriosa est curatio. Quare cum plura uenarum ora
in ano patefiant, unū non suppressum purgationis gra-
tia relinquere oportet. Quædam superius cæcæ delites-
cunt, eoq; uix curantur, quæ quidem nihil excernūt, sed
dolorem mouent acriorem. hæ succo cyclamini illito
adaperiuntur. Contra eas uero quæ immodice fundunt
sanguinem, spinæ Aegyptiæ, foliorum sambuci, artemis-
iæ, singulorum uncia quinque, sideritidis uncia quatuor,
coquuntur in aquæ heminis octo ad dimidias, inde her-
bæ proliciuntur. Aquæ uero miscetur aridum hoc, cres-
tæ sutoriæ, μελαντυριαν Græci uocant, aristolochiæ
rotundæ singulorum drachmæ octo, argenti spumæ
drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, misyos drach-
mæ duæ, sereos tantundem. ubi aridum decocto sol-
ueris, septies quotidie irrorato, insecuto die pati mo-
do aliam confectionem mensura æqualem indito: sic

PAULI AEGINETAE

tertio. Et si reliquæ aliquæ remaneant, quarto die acicu-
la compunges: si sentiat æger, aut cruor emanet, deco-
ctum similiter facit, aridi uero partem dimidiam misce-
bis. Cum foueris, arido attingito, ut exacte adurantur.
panis ob inflammationem illinitur. A L I V D. Panis
purus in garum primæ notæ tinctus, ustusq; in nouo fi-
ctili, & pertritum illinitur, ano prius uino abluta. Facit et
ad tubercula. A L I V D. Sereos denarii duo, chalo-
citidis denarius, misyos tantundem, atramenti sutorii, qd
chalcanthum dicitur, denarii tres, aluminis scisfili dena-
rii nouē, æris combusti denarius, cretæ sutoriæ denarius
sicco utitor. Cibi erunt, iis qui supra modum inaniantur
pauci sanguinis, efficaces, & minime recrementitii, quiq;
siccant, & astringunt, cuiusmodi est chondrus ex posca
lotus: oryza & alica. Ex oleribus conueniunt intybus, ci-
choreum, portulaca: inter uina, quæ astringunt. In hæ-
morrhoidibus autem cæcis, his contrarius uictus pro-
derit: potissimum uero lolliginū, sepiarum, multipeda-
rum, torpedinis, selachiorūq; esus probe cōueniet, hæc
enim sanguinem commouent, item quæ mensibus cien-
dis sunt, hisce congruunt.

AD PROCIDENTEM ANVM.

Ericæ fructus, gallarum, cerussæ, acaciæ, hypocistidis suc-
ci, picæ corticis, thuris, myrrhæ minyæ, paria pondera.
Sicca admovento, ano uino prius austero deterfa.

A L I V D. Recrementi plumbi, rhus syriaci, singulo-
rum *uncia octo, rosarum floris drachmæ quatuor,
myrrhæ minyæ drachmæ duæ. Utitor sicut priore.

* Melius
drachmæ
octo, ut
habet Ga-
lenus in
eodē me-
dicamēto

A L I V D. Picæ corticis, manna, spumæ argenti, sin-
gulorum drachmæ octo, cupressi orbiculorum sicco-
rum, plumbaginis singulorum drachmæ duæ: utitor
quemadmodum præceptum est: item urina ipsius ægri
calens adhuc superfusa adiuvat.

DE VTERI AFFECTIBVS ET

primum de mensium purgatione.

Cap. LX.

Mulierum plurimis, menses quartodecimo anno fluere incipiunt: paucis, ante tertiumdecimū, aut duodecimum, plerisque autem post quartū decimū erumpunt. Tempus cuique purgationi statū non est, ordinatumq; multis ad duos tresve dies, haud paucis usque ad quintum profluit, aliis etiam ad usque septimum: raro ad duodecimum purgatæ sunt. Porro desinunt menstrua aliis anno quinquagesimo, paucis autem usque ad sexagesimum durant. Nonnullis à triginta
 10 quinque annis, præsertim obesis, menses cessare incipiūt. Strangulata igitur purgatione, lauandum est circiter statum menstruale tempus, ac præsumetur potui, aut sesamum, aut capita porri cum pipere, & ruta simul incocta. Potio autem ex passo cretico erit, cuius heminae mensura
 15 fura pota ambulationibus menstrua dimoueantur. Cibus sit, lolligines, sepiæ, polypodes, & quæ eiusdem sunt generis: quippe sanguinem proprie commouent.

DE MENSIVM SVPPRESS

sione. Cap. LXI.

Supprimitur mēstrualis purgatio, interim toto corpore male affecto, nonnunquam uero locis peculiari uitio conflictantibus ex frigidityate insita, aut
 20 ictu, aut intemperie abortum, seu acquisita malignitates magna uero ex parte ob hebetudinem: uel principalior
 25 re quadam parte primario affecta, nempe iecinore, aut uentriculo, aut thorace, aut id genus aliqua, longo morbo uitata. At suppressio complures affectus longos solet procreare. Cum igitur propter aliquod interaneorū
 30 uitium primarium purgatio circunciditur, aut stranguletur, ex usu maxime fuerit, id quod primario afficitur curare, inde uteri habere rationem. Notæ quibus hæc deprehenduntur, in superioribus sunt expositæ. Cum uero nihil illorum adfuerit, constat liquido primario affectu occupari. Itaque si ætas non prohibet, aut habitus, aut
 35 aliud quippiam, uenam oportet incidere, idq; non ante

S iii

PAULI AEGINETAE

statum mensium tempus: sed ubi iam accesserit, decem
dies superadijciantur. Detrahetur autem sanguinis, neq;
plus duabus libris & semisse, neq; minus una, si quidem
uenam diuiserimus. Sin autem nō, hiera diacolocynthis
dos purgari debent, duarum drachmarum pondere, in
sex mulsæ cyathis. Si febris adsit, hiera quidem uti non
expedit, uerum sanguinem mittere in primis febriculæ
diebus est opportunum. A purgatione reficiendæ sunt
mulieres diebus pauculis insecutis, exercendæ obambu
lationibus, inferiorum frictionibus, & balneo. Cibi con
gruunt distribui faciles, et liquidi, olera dulcia omnia, pi
scis saxatiles, ex auibus teneriores, lactis potio, ex melle
cōfectiones, *μελιπρωματα* uocant, uinum tenue, album,
non adeo uetustum. carnes inidoneæ his sunt, & legu
mina, præter ptisanam. Vbi statum mensium tempus
propinquum est, dantur ex marinis selachia, & mala
chia, ut dictum est, item ostracoderma, hoc est, testaceā
cutem sortita, capitata porra, cum ruta & pipere cocta,
eorumq; ius potui datur, infernæ partes uinculis, tribus
quatuorve diebus constringuntur. Cum instat tempus
purgationis, tollitur deligatura, myrrhæ obolus bibitur,
aut fabæ instar, uel castorium ex passo, aut mulla, uel de
coctum artemisiæ, aut saluiæ post balneum ex passo ab
sinthioq;. Absinthites autem uinum per totius curatio
nis decursum potatur. Vbi accesserit iam menstruale
tempus, si nihil, aut nulla mentione dignum fuerit excre
tum, ex talo sanguis detrahendus est. Post septimum, aut
octauum diem, purgatione ex hiera utendum est, secun
dum quartum diem, dropax pubi, lumbis & feminibus
applicetur, atque aquæ potu triduum usa, sinapi cum
aqua panis macerati portione adusq; æquinoctium ad
moueat, deinde lauet, insecuto mense ficus siccatæ in
uicem panis misceantur decocto fœnugræci, maluæ,
pulegii, rutæ & artemisiæ. In sinum uero dimittetur, sus
sinum, aut amaricinum, pessusq; enneapharmacus, aut
libanius. Est autem pessus lana pectita, siue quodcuncq;

- aliud teres, digiti humani formam præferens, quo me-
dicamenta sustententur. Hæc igitur curatio plerisq; ad
purgationem abunde fuit. sin autem uehementioribus
indiguerit medicamentis, hæc sunt, iris illyrica cum ui-
no pota, iunci angulosi, ariq; radix, casia, iunci rotundi
flos, & nardus, helenii radice decoctū, myrrhæ ad fabæ
Græcæ magnitudinem cum passo ex dimidio mulsæ
cyatho pota, atque dictamni decocti cyathi duo, itē am-
moniacum & sagapenum. Quæ minus stomachi uitis
sunt opportuna, etiam opopanacis paululum in globu-
los redactum percocto melli intinctum, assument. Iam
uero consueta nobis semina menses mouere possunt,
sed minus: foeniculum, cuminum, apium, daucum creti-
cum, seseli, ami, sinon, cicer, fructus cedri, ac omnia quæ
urinam prouocant. Accedunt huc myrrha, absinthii, aut
lupinorum decocto trita aut rutæ succo leuigata, bdelo-
liumq; similiter, styrax, syluestris oleæ gummi, aut rutæ
succo itidem, aut longa aristolochia, in collyrii formam
concinata. Persimiliter etiam magni centaurei radix,
aut ueratri, aut liquor scammonia, & cucurbitæ medu-
lla per se, & artemisia applicata cum ruta, insuper & galo-
banum suffumigatum. Eadem uero & foetus solent
educere.

DE IMMODERATA PURGATIONE

- 25 tione uteri & sanguinis profluuii.

Cap. LXII.

- I**mmodica purgationes mulieribus oboriuntur,
interim mensibus confarctim ac concitatius erum-
pentibus, interim ob partus grandiores, quæ plerum-
que etiam sponte sua cessant. Crebro autem abortio
30 ui foetus causa, uehementi laborant profluuii, ut subin-
de periculum accedat. Imprimis igitur extremi artus
ab alis et inguinibus, uinculis excipiuntur: Posca non
frigida potui datur, eademque fouetur, iniiciunturq; lo-
35 co multæ lanæ, ex uino, oleo, uel rosaceo, uel meo-
lino, uel myrteo expressæ. Cibus dabitur chondrus

S iiii

PAULI AEGINETAE

lotus ex posca: uel oryza, uel alica: uino abstinetur. Eius
 loco hydromeli austerum, aut omphacomeli, aut huius
 modi quippiam ipsis exhibetur. Balauſtium in posca
 propinatur, uel hypocistidis, uel acaciae succus, uel lycii,
 uel samius aster, uel immatura uua sicca, uel rheon, uel
 lenticulae ex Italico fictili combustae cinis. Aut sesamum
 editur in posca madefactum, quoad molle delicatumque
 euaserit: insinuata uero per naturalia, sanguinis fluorem
 sistunt, hypocistidis succus, aut acaciae cum manna in ace
 to contritae. Mirifice auxiliatur spongia in uino, aut li
 quida pice demersa, appositaque, uel combustae ipsius cin
 nis cum aceto, uel posca admotus. Similiter etiam illis
 cinis italico fictili concrematae cinis. A foris autem impos
 sita iuuant astringentia epithemata, & confecta ex pal
 mulis, & cotoneis: cataplasmata, quae melicoria receper
 rint, aut ilicis glandis, aut rubi surculos, aut lentiscifolia,
 balauſtium, acaciam, hypocistidem, gallam, brathi, alu
 men. Maxime uero hoc, taurocolla madescit posca,
 quousque soluatur. deinde in linteolum ualidum illinis
 tur, lumbisque agglutinatur. Efficacia ad hoc sunt, & glu
 tinantia emplastra, ueluti Armonia, Icesios, Atheng,
 Neling, Indicia, & similia. Pessuli quoque ad sangui
 nis profluuium sunt utiles. Gallae interius leuigatum, &
 thuris lachryma aqua diluta apponitur, uel cytini, uel
 mala Punica dulcia similiter, uel polygonum tritum.
 Componuntur autem, aluminis scissi, gallarum inter
 rioris, acaciae succi, mannae, singulorum drachmae
 quatuor, ouorum tostorum lutea quatuor: arida
 leuigantur succo plantaginis, miscenturque. Cum
 usus exigit excipiuntur in pessum lana, & in rosa
 ceum intinguntur, applicanturque. Iam cucurbitulae
 leues magnae frequenter subter mamillas affixae ab uno
 de retrahunt. Inseſsus autem profluuium sanguinis
 laborantibus conuenit, ex marino iunco, Graeci
 uocant oxyſchœnum, capitibus myrti, roſis, rham
 ni foliis, rubi surculis, aequali pondere in aqua

costis. ALIVD. Mali Punici dulcis radicis corti-
cis, myrti, cupressi corticis, singulorum tres partes, gallæ
pars una, aquæ quod satis est. Infundito autem per oria-
cularium clysterem succum plantaginis, aut sereos, aut
5 polygoni, aut solani, aut perdicii herbæ, aut psylli, aut hy-
pocistidis, aut acaciæ, eaq; lana aut digito, aut specillo,
aut pinna in longitudinem figurata, adusque orificio
um imponatur. Insuper pastillus Andronis per oricu-
larium infusus cum quodam ex succis commemoratis,
10 aut uino astringente efficax est remedium.

DE FLVORE MVLIE

bri.

Cap. LXIII.

Vlva fluor, totius corporis recrementi est deo
stillatio. Talem uero speciem id quod euacua-
tur, repræsentat, qualem humor in corpore supe-
15 rans, aliud rubrum, ueluti sanguinis sanies, aliud candi-
dum, pituitæ soboles est, pallidum aliud, aliud biliosum
interim aquosum, at si sanguis purus, sicut in uenarum se-
ctione, efferatur, attendendum est accurate, ne quædam
20 in uulua erosio sit excitata, his notis fluor deprehendi-
tur, loci continue madent humoribus, colore uarianti-
bus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumq; fasti-
dit, in obambulatione difficulter spirat, oculos habet p-
tumidos, nunc cum dolore, nunc citra illum, aut cum ex-
25 ulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut
pura. Toti igitur corpori auxiliantur, quæ citra manife-
stum calorem exiccant, cum affectus sit humidus, frictio
totius corporis, & unctio ex melle abunde cocto, medi-
camina dantur urinam cientia, utpote aqua, cui asarum
30 & apium sit incoctum: uacuatur etiam totum corpus p-
alium: præterea portulaca commanducata, succusq; ip-
sius potus præsidio est. Item balauustum, rubi fructus &
flos, roboris pars quæ sub cortice habetur, trunci mem-
branosum, & quod glandis putamini subest. Equisetum
35 maxime sistit rubrum fluorem, potum ex aqua, aut ui-
no. Vel hypocistis, lentisci fructus torrefactus, cum uino

PAULI ÆGINETÆ

sumptus, famius asfer, lemnia sphragis, coagulum leporis, aut hoedi, aut ouis, aut uituli, aut cerui, uinaeea trita, myrti, uua immatura sicca, piceæ cortex. & quæ ad uulvæ sanguinis profluuium laborantem dicta sunt, non ad modum efficacia. Vbi uero cum labore fertur, per si phonem uteri, clysteremve alicui succum, aut ptisanæ, aut tragi, aut oryza demittes cum aliquo medicamentorum quæ dolorem sopiunt, αἰσ' ὀδυνῶν Græci uocant, & in accessionibus recte lenies. Cum remittit, circuitum enim nonnunquam habet, dimouere gestationibus, diuersisq; obambulationibus & uoce, inunctionibus, cucurbitulis, dropacibus ad partes supra positas, insolatu, frictionibus, psilothris, sinigmatibus, sinapismis, uomitibus à radícula uti consultum est. Recolliguntur uires, balneis, uino, uario ciborum genere.

DE INFLAMMATIONE UTERI, & declinatione. Cap. LXIII.

INflammatiō uulvæ, pluribus ex causis oboritur. nēpe ex ictu, mensium retentione, frigore, & inflatione adeoq; ex abortu, item ex foetu sinistre edito. Comes inflammationis uulvæ est febris acuta, dolor capitis, tendinum, basis oculorum, brachialis, digitorum, & colli conuulsio, inclinatio in aduersum, stomachi ex consortio dolor, oris uulvæ coniuuentia, pulsus exigui, crebriq; Et si languida fuerit inflammatio, haud ualido uteri dolore torquentur. Sin uehemens, & ipsa tota pulsatilem cruciatum percipit, unde quaque inflammatione obfessa, si pars ipsius illam sentit, in ea magis dolor intenditur. nā si posteriora ipsius solum laborent inflammatione, dolor lumbos inuadit, stercus in longanone compresso retinetur, si priora, dolor pubem occupat & stillicidium, aut urinæ difficultas uesica pressa excitatur, lateribus inflammationem expertis inguina tenduntur, et crura grauantur, posteriore uteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimum cum tumore infestat. Cum uero os uulvæ inflammatio affligit, in ab

- domine dolor est, digitoq; immisso os occurrit durum
 rigidumq;. Itaque in curatione primum usui uenit fo-
 tus ex œnelæo, uel uino rosaceo, super pubem & lum-
 bos adhibitus hapsis ex lana puriore citra deligaturam.
- 5 Cibo abstinetur triduum, secundum quod sanguis ex-
 cubito mittendus est, si nihil prohibet. Curatio absoluitur
 chondro ex aqua mulsâ, uel pane, uel ouis sorbilis
 bus, uno die interposito. Post quintum, cataplasma su-
 peraccommodatur, polline farinaceo, semine lini, fœ-
 10 nigræco, ex mulsâ, in qua papauerum capita decocta
 proliciantur & ex oleo. At si inflammatio erysipelatis
 naturam sortita excandescat, meliloto in passo cocto
 tritoq;, ouorum tostorum lutea adiecto cum rosaceo,
 uel melino, uel crocino, illinitoq; aut palmulas uino tē-
 15 perato feruefactas, cum polentarum polline, aut quos-
 dam ex enumeratis unguentis leuigato, perungitoq;, in
 morbi declinatione ceratum nardinum, aut cyprinum
 iniiciendum est. Per totum uero morbi decursum, etiā
 infessus utiles sunt ex decocto fœnugræci, seminis lini,
 20 maluæ, artemisiæ, & oleo. In iis autem quæ non susti-
 nent calorem, ex aqua calida rosaceo superfuso: pessos
 autem infusionesq; adhibere conuenit ex hyssopo, bus-
 tyro, medulla ceruinâ, adipe anserino, unguento susino,
 & cera thyrrénica, in quibus autem calorem ferunt, etiā
 25 pessus qui ab aureo colore chrysus nuncupatur, ipsis
 conueniet, item enneapharmacus: rursus in quibus non
 tolerant, ex ouo, rosaceo, adipe anserino, uel gallinaceo
 adaptabitur. Porro ad inflammationes magis furio-
 bundas ex herbarum succis pessus in uase fictili cum
 30 rosaceo liquefactus miscetur succo plantaginis, uel
 sereos, uel cichorii, uel intybi. Aut hoc utere: adipis an-
 serini, uel suilli recentis drachmis quatuor, cerati rosæ-
 cei, uel susini sextante, ouorum tostorum luteorum
 uncia, croci drachma, myrrhæ tribus obolis, opii
 35 obolis duobus, uel loco opii, papauerum capitum
 decocto; si dolor multus excruciat, lachrymę papaueris

PAULI AEGINETAE

instar lenticulae cum lacte muliebri, & succo foenugraeci apponendum exhibeto. At si inflammatio cum duritia infestat, medicamentum rosaceo solutum, applicatur, uel infunditur. Si à naturali sede in latus uulua declinauerit, per accessiones similem inflammationibus curationem recipiet, ubi remittitur dolor, leuioribus utendū. At ubi malum inueterauerit, roborantibus, quae metasyn critica dicunt. Extrinsecus autem duritie oborta, malagomatis pugnandum, nempe ex sertula campana confectio, item Mnasei, Icesio, nigro Serapionis, aut pyrino: uisus autem per initia tenuis adhibetur. Cum paulum releuati fuerint aegrotantes, ad balneum ducentur. Varius magis cibus & leuior utilis erit.

DE VVLVAE ABSCESSU

su. Cap. LXV.

INflammatione in abscessum transeunte, dictae quidem notae intensiores erunt. Præterea inordinatae cum horrore accessiones ipsis obueniunt. primis quidem temporibus intensae, cum doloribus ad ultimum, ubi suppurauerit aliquantulum remittunt. Postquam uero erumpit uomica, dolores acriores subinde uisi sunt, ceu lacinantes & punctus modo incidere, febriculæ, uehementiores infestant. Atque urina nonnunquam retinetur, aliquando stercus, impedimento in affecta uteri parte facto. Alias tumor in pube eminet, & ueluti exundationis sensus, cum abscessus maior fuerit. At quod in expositis locis est, etiam oriculario spicillo, aut digitorum tactu deprehenditur, propter quod dolores ob nervos sani oris uulvae membranam acriores urgent, sicut in fundo sinuq; minus doloris percipitur, & digitis quidem tumor non cedit, os autem gracilius ostenditur. Suppuratio celerius adiuuanda est cataplasmatibus ex foenugraeco, semine lini, farina hordeacea, aut frumentacca, cui fuscus coctæ adiciantur, interim & stercus columbinum. Incessus ad inflammationem scripti, frequentiores utiliter usurpantur. Item pessuli ex terebinthina, myrrha, hyss

5 fopo, butyro. Abscessu autem rupto, si ad uescam pus
 euaserit, lactis & cucumeris seminis potu utendum est:
 sin ad langanone[m], lenticuli & malicorii decoctum in-
 10 detur aluo. At si in sinum purum quidem pus eruperit,
 rosaceum infundetur, aut candidum oleum, aut tetra-
 pharmacum basilicum, aut butyrum recens. Quod si ef-
 feratur sanies tenuis foetida, ceu ab ulceribus depascen-
 15 tibus, magis astringens erit enema ex myrto, palmulis, &
 lenticula. Si uero humoribus etiam excretis, inflamma-
 tio diuexet, persistere in cataplasmatibus, & insesibus, ra-
 tio est. Cæterum si in uulvæ ostiolo, abscessus sit obor-
 tus, neque rumpatur, partibus, quæ puri incumbunt, ex-
 tenuatis, ad pus expellendum, quod manu administra-
 tur, diuertere. consilium est, ut in chirurgica pertracta-
 20 bimus.

DE VTERI EXVLCE

ratione. Cap. LXVI.

20 **E**Xulceratur subinde uulua ex infelici partu, aut fœ-
 tu excusso, aut corrupto, uel ex medicamentis a-
 crius, uel fluore, uel abscessibus disruptis. si igitur
 prompta in conspectum uenerit exulceratio, spicillo or-
 25 riculario, quod $\delta\iota\omicron\ \pi\epsilon\pi\tau\omicron\mu$ uocant,prehenditur, sin al-
 te defederit, excrementis. Humor enim diuersus exo-
 cernitur: inflammato quidem ulcere, paucus, cruentus,
 25 aut fœculentus cum magno dolore: sordido, copiosio-
 or, & sanies cum minore cruciatu: depascente, foetidus,
 niger cum doloribus uehementioribus, aliisq; inflamo-
 30 mationis signis, præterea quæ laxant medicamina, hoc
 irritant, contraria leniunt. Cum purum ulcus est, humor
 paucus, æqualis, odoris expers, crassus, candidus, ob ex-
 35 quisitum loci sensum excitatur. Si inflammationem exo-
 peritur ulcus, iis quæ ad illam scripta sunt, utendum est.
 In sordido ptisanæ cremor cum melle ano immittendo
 40 dus est, aut tetrpharmacum cum rusino, uel mulsa, in
 qua fœnugræcum sit decoctum, aut malua, aut furfures
 aut lenticula cui cortex sit, detractus. Porro quo magis

PAULI AEGINETAE

expurgetur, etiam marrubium, aut eruum, uel melli ad-
iuncta erui farina, uel iris, uel alumen rotundum, uel ali-
quid simile inliciat. Hæc ipsa etiã extrinsecus ex mul-
sa macerata illinuntur. Peculiaris prodest hoc medica-
mentum. Crocus primæ notæ leuigatur cum lacte mu-
liebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cum adipe anse-
rino inungitur lineteolo. uerum quod infra ponitur, isto
quoque efficacius dolores discutit. Capita papaueris in
passo temperato madesunt diebus tribus, deinde inco-
quuntur, donec emollescant, postea teruntur unã cum
rosæ foliorum drachmis quinq; croci drachmis tribus
iure capitum papaueris admisto, inde ceræ cum rosa-
ceo liquatæ denarii duo ipsis superfunduntur, ac pessu-
lo apponuntur in rosaceo tincto, Salutare est etiam me-
dicamen ex ouis, croco, rosaceo, adipe anserino, cerui
medulla præparatum. Item Egyptia citra æruginem
mirifice ad exulcerationes conducit. ubi pascendo ser-
punt ulcera cum inflammatione, illinitur panis egelida
maceratus, ex hydromelite, oleo, althea, foenugræco,
palmulis pinguibus. Cæterum plantaginis succus, sola-
ni, polygoni, sereos indetur, primum per se, mox cum
uino austero, aut aceto. At citra inflammationem serpẽ-
tibus, robustiora iniiciuntur, ueluti decoctum malicorii,
rosarum, summitatis oleæ, cupressi, malorum cotoneo-
rum, rubi, myrti, lentisci fruticis, rhamni, rhus coriarii ex
uino astringente, postea uero aluminis, acaciæ, lycii, hy-
pocistidis. ex eisdem uero decoctis parabitur etiam in-
cessus: si nihil proficitur non alienum fuerit medicamen
ex charta cum posca primum demittere, deinde cum
aceto aut Antheram, aut chalcitidẽ, aut atramentũ su-
riorum, eisdem liquoribus, & quæ dysentericis congru-
unt: cibus dandus boni succi modicus. purgato ulcere,
agrotans balneorum ciborumq; uarietate sollicitari, ui-
noq; refici debet, quo caro statim procreetur. Pessi lo-
co apponetur medicamentum, diamoron, hoc est ex
moris, dilutum cadmia, uel ladano, uel plumbagine. A

Foris autem emplastrum, quod cicatrici ducēdā est, ab domini coxisq; imponitur. Quemadmodum enim cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latētes meatus traducetur.

DE CANCRO. Cap. LXVII.

- C** Ancrorum uulua alii cum exulceratione, alii citra ulcus inuadunt. ubi igitur exulceratio non est tumor in uulua ostiolo reperitur durus, inaequalis, prætumidus, colore foeculentus, subruber, interim subliuidus ac uehemens dolor exercet inguina abdomen imum uentrem, & lumbos. Ad manus contactum uariamq; medicinam excandescunt. Exulcerato autem cancro, præter dolores, durities, tumoremq; ulcera erosa ac inaequalia conspiciuntur, plurima ex parte sordida labris prætumidis, albicantia, concreta colluue humorum ingrata. Quæ uero pura uidentur, foeculenta, liuida, subrubra, & cruenta apparent: sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, grauiter olens. Interdum uero & sanguis defertur, aliq; notæ in uulua inflammationem testantur. Itaque affectus nulla medicina sanatur, Quemadmodum etiam Hippocrates pronuntiavit, lenire tamē est infesibus ex foenugræco, malua, ac cataplasmatibus similibus. Insigniter autem leniunt, solanturq; in accessionibus malua, aut althea in mulsa liquefacta, & rosacei paululo leuigata, illitaq;. Ad hæc cataplasmata ex ficis siccatis, melilotis, ruta, rhure, bursa de herba diligenter cum oleo contusa. Item quod constat palmulis in passo coctis, cui adiecta sunt ouorum lutea, polentaq; uel ex papauere cum coriano factum, aut polygono, aut seri. Hæc in doloribus usui sunt. Postea ceratum iniiciatur cum rosaceo, aut myrteo, aut cœnanthino, aut melino, cū palmulis in passo coctis. pprie uero conuenit præparatum ex sedimento officinarum fabrilium, qđ tostū leuigatur, & rosaceo cerato, adusq; emplastri spissitudinem excipitur, hæc quidem extrinsecus conferunt, intus autem oleum quoq; lenit locos

PAULI ÆGINETÆ

ubi fuerint exulcerati, item lac muliebre infusum. Pari modo succus plantaginis tepidus. Sin cruentum sit, succus polygoni cum thuris modico dolorem sopit. Ad hæc pessuli ex croco, muliebri lacte, lachryma papaue-
ris, & hyssopi succo. Omnibus autem efficacius est etiã
ad sedis affectus medicamentum quod recipit: Argenti
spumæ Italicæ lote selibram, thuris masculi, hyssopi, adi-
pis suilli recentis, butyri recentis, cerę tyrrenicę, singulo-
rum sextantem, rosacei trientem. Argenti spuma ex ses-
reos succo trita, liquatis iniicitur. Cibus dabitur q̄ facile
in corporis membra queat distribui, boniq; succi, uinũ
paucissimum, aquosum: acrium esus, & repletio om-
nis uitanda est, ut quibus cibi prompte corrumpantur.

DE SCIRRO ET DVRI- TIE. Cap. LXVIII.

Scirrum contrahit uulua, alias repente, ut nulla cau-
sa euidentis præcesserit. plerunque uero eundem in-
flammatiõ mouet, quæ nec soluta, nec in abscessum
mutata fuerit. At scirrorum genere comprehendetur
etiam durities, quam σκλήρομα Græci uocant, circa uul-
uæ ceruicem potissimum obueniens. Æquali scirrus tu-
more concreuit, sed minus tactui repugnat, & cum me-
diocri dolore sentitur. Superuenit his, in aduersum de-
clinatio, & tumor qui retione depressionis uehementer
renitur, item granitas motusq; difficilis, non crurum
modo, sed totius etiam corporis, atque obeundis actio-
nibus pigritia, sequitur non probe curatas, malus corpo-
ris habitus, aquam inter cutem repræsentans. Per initia
igitur sanguis educi, aut putgatio ex hiera Archigenis
assumi debet. Deinde cataplasmata ex caricis hyssopo,
nitro, absinthio: & cucurbitulas cute ferramento incisa
ad mouere consilium est. Malagmata uero hæc, Polyar-
chion, & diaspermation hoc est ex seminibus confectũ,
& quod baccis lauri constat. Inseffus ex caricarum des-
cocto, artemisiæ, pulegii, altheæ: pessulos ex terebinthi-
na,

na, galbano, myrrha, iride, hyssopo, dropace, aquas naturales sulfurosas, bituminosasq; usurpare commodum fuerit: si vires constant, etiam ueratrum exhibetur.

5 PESSVLVS EMOLLIENS.

Cerae ponticae, nardint unguenti, singulorum quadrans, irini, gleucini, cyprini singulorum ꝑ unciae duae, adipis agnini anseriniq; butyri, hyssopi, medullae ceruinæ, terebinthinæ, singulorū uncia. A L I V D. Polii drachmae
 10 duae, myrrhae drachmae quatuor cum uino Mendefio tritum irinoq; tinctum applicatur. A L I V D. Cerae thyrrenicae, adipis uitulini, terebinthinæ, medullae ceruinæ, mellis attici, olei ueteris, pares modos. M E D I
 15 C A M E N T V M roborans seu recorporaticium Graeci dicunt metasyncreticō, & ad inflationes, uuae pal-
 sae candidae sine acinis, unciae tres, rutae uiridis foliorum unciae duae, aquae marinae sescuncia, cymini drachmae
 20 quatuor, mellis quod sufficit. Inundum uero pessulum cyprino oleo immergito, & apponito. Praeterea Chrysus ab auro sic dictus pessulus Libaniusq;, & Enneas
 25 pharmacus affectui sunt utiles. Verum Titianus his magis accommodatur.

DE MOLA. Cap. LXIX.

25 Mola quoq; induratus est tumor, interim in uul-
 ua ostiolo, interim in tota ipsa quoque promi-
 net, unde in tophaceam quoque duritiem occo-
 calescit, tum ea quae superiacent contrahuntur, corpus
 emaciatur, color prauus apparet, cibi fastidium urget,
 30 menses supprimuntur. Item mamillae inturgescunt, ut
 in quibusdam per initia de foetu concepto sit suspicio.
 Insecuto tempore discernuntur: nonnullae uero aquae
 inter cutem praebent opinionem, sed hoc intercedit dis-
 criminis, quod tumor in duritiem occaluerit, nec sonus
 cum digiti iniiciuntur, quemadmodum in morbo hy-
 35 dropico, edatur. Cum autem uere intenditur, in aquam
 subter cutem degenerat. Nonnunquam etiam insanabile

PAV. AEGIN.

T

† Exēplar
 manuscri
 ptū non
 habet.
 * Posset
 legi & ur
 fini. nam
 habetur
 α' p' x' o' r,
 ut α' p' s
 κ' r' e' i' o' r, sit
 p' α' p' r' e' i' o' r

PAULI AEGINETAE

lis magna ex parte affectus redditur, quibusdam & sanguis erumpit. Itaque decumbere in domuncula angustiore minus luci exposita, modice frigida, cubili immobili, omnibus ex æquo confert, sed ita ut pedes habeant elatiores quietosque. Nam motus quamlibet fluxionem concitat. Actumores duritiasque, iis remediis quæ in scirris & duritiis uulvæ dicta sunt per sanamus. Porro hydro-picas suffusiones, illis quæ in capite de aqua intercute comprehensa nobis sunt, sanguinisque exitum leuemque hæmorrhoids dicitur, sicut eiusdem cum impetu effusionem quam hæmorrhagiam nuncupant, fluoremque muliebrem curabimus. Cæterum sunt qui molam carnem afferant informem, ipsis uulvæ tunicis adhærescentem, foetus modo in lucem edi. Atque hæc morbi species uictus ratione laxante tractabitur, quo citius excutatur.

DE INFLATIONE VULVÆ.

Cap. LXX.

INflatur uulva ex frigore, uel humoribus in ea corruptis, uel ex ægro partu ostiolo coniuente, uel sanguine in grumum intus coacto. Alias spiritibus in concauo ipsius spatio conceptis, alias uteri corpore rarefacto tumor pubis & imi uentris comitatur cum dolore pulsatili, qui ad septum transversum usque & stomachum inguinaque pertingit, ac sonitus digitorum impulsu tympani modo redditur. Auxiliatur ergo primum sanguis demissus, si nihil obstat, mox in accessionibus inedia, fomentaque, ex oleo rutaceo adhibentur: infusus ex rutæ, pulegii, artemisiæ, cassiæ decocto, similibusque, cataplasmata ex semine apii, cumini, fœniculi, anisi, ameos, farinæ lolii. Ad hæc cucurbitulæ, tum leues, cum cute incisa affixæ. At si diutius uitium se prorogauerit, purgatio ex hiera picra utilis est: dropaces, sinapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incubentem si contingat, auferet, leniter ipsum dissipans, rursusque admouebit cataplasma ex ficu, nitro, & absinthio. At

epithemata mollientia erunt, Polyarchion, diaspermation, quod est ex seminibus & ex baccis lauri præparatum. Præterea pessi ex ruta, melle & nitro. Maxime uero hic conducet, ficuum siccatarum contusarum drachma, cum mini drachmæ duæ, aphronitri drachmia, at acrimoniæ causa, in lac prius immergantur. Iam emollientes pessuli sunt huic uicio accommodati.

DE VVLVAE STRANGVL

latu. Cap. LXXI.

- 10 **S**trangulatus uulvæ ad superiora recursus est, quæ principalissimas partes in doloris consortium perducit, utpote arterias, quas uocant carotidas, cor, cerebrumq; membranas. Comitatur affectus, cum accessio propinqua est, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. Cum iam instat strangulatus, grauis sopor premit, quæ cataphora dicitur, mens desipit, sensuum instrumenta deprehenduntur, impediunturq;, uox obmutescit, crura contrahuntur. deinde maxillæ ruberæ incipiunt, faciesq; repletur. Cum
- 20 remittet, humiditas quædam ad tactum ex locis muliebribus præcedit, sonus quidam exauditur ac aliquod ex intestinis progreditur, ipsaq; uulua paulatim laxatur, atque sic mens ipsis, & sensus redit. Cæterum morbus iuxta circuitum mouetur, sicuti comitialis, idq; nimirum
- 25 uulua repleta, aut seminali, aut alia materia, aut si hæc intus computruerit, ac multæ rursus à morbo sese recolligunt, nonnullæ uero in ipsis accessionibus perierunt subito, quibus pulsus quidem crebriores, et inordinati, * collabuntur. deinde etiam in totum abolentur.
- 30 Modicus uero humor superficiem irrorat, respiratio primum languida est, mox in totum abscinditur. Porro uitium hoc hyeme & per autumnum magis infestat iuueniculas ad uenerem procliuēs, steriles, & potissimum si ex medicina sumpta fuerint infœcundæ, ite alias
- 35 perfrictiones expertas. In accessionibus igitur summa deligare conuenit, crura tota, corpusq; totum

* Male
græca exē
plaria ha-
bent meo
iudicio
ὑποπτε-
ρῶν πρ
ὑποπτε-
ρῶν, quod
propriū
est pulsi-
bus inter-
oidētibus.

PAULI AEGINETAE

perfricare, ut animo destituta sese recipiant, item quæ
foedioris sunt odoris, naribus oportet admoovere: Exē
pli gratia, linamentum ex lucerna extinctum, castorium,
picem liquidam, cedriam, lanasq; laciniasq; cōbustas.
Quidam uero & matulam naribus admouerunt cum
urina ueteri, uel deiectione: cucurbitulas adglutinare uin
cti inguinibus & imo uentri cum multa flamma, & le
ues & cute incisa. Quòd si longius accessio se produ
xerit, etiam quæ flatibus educendis sunt, proficiunt, ut q
colica dicuntur, ano admota, nempe cuminum, nitrum
cum melle. Item sterus clystere subducere profuerit,
ne illorum appositu sedes prematur. In uulua uero
unguenta odoratissima infusa, ipsam solent detrahere, si
cut amaracinum, malabathrinum: ac sinapi, partim nari
bus offeratur, partim applicetur pedibus. Deinde incla
mabit aliquis ipsas uoce asperiuscula, excitabitq;, & ea
admouebit quæ per sternutamenta euocant, ex casto
rio, struthio, & pipere. ubi accessio conquierit, ad uomi
tum cogere, cibum nullum aut paucum præbere opor
tet. A septimo die, purgatio ex hiera diacolocynthidos
dabitur, post triduum cucurbitulæ defigentur lumbis
& illis. Mox castorei potione utemur, nunc artemisię de
costo, nunc ex mulla, in quibusdam enim hoc uel solū
ad integram morbi curationem abunde fuit. In sessus
porro & pessus mollentes his adiungentur. Atq; hæc
ad accessiones proficiunt, uerum ut totum corpus resis
cias, à sanguinis dimissione auspicatus, ad purgationē
ex hiera transgredieris. Inde picram ex aloë factam exhi
bes denarii pondere cum tribus aquæ mullæ cyathis,
diebus continuatis, uel interpositis mensura duorū de
nariorum, cum senis aquæ mullæ cyathis. Iam dropas
cismos, cucurbitulas, & sinapismos utiliter applicas, nec
non acopa ex euphorbio. Postea exercitiis uti, frictione
& clamore prodest, denique & aquis naturalibus.

DE VVLVÆ PROCIDEN

tia,

Cap. LXXII.

Vulua procidit raro quidem, sed multis occasio-
nibus, uel enim ab alto delapsa, & in coxas fir-
mata, membranis, quæ interaneum id cōtinent,
ruptis, aut in difficili puerperio secundis extractis, quas
5 uulua adhærescens sequitur: uel in diligentius imperio
tiusq; mortuo fœtu excusso, uel ex uulnere, uel aliqua
animi perturbatione, scilicet nuntiato filiorum interitu,
aut hostium accessu, aut periculosa nauigatione, aut eius
modi quadam causa. Accidit etiam hoc mali tota cor-
10 poris mole soluta collapsaq; partibus illis languidis &
resolutis, præsertim in iis, quæ ab integra ætate longius
iam senescentes dilabuntur. Ob tales causas procidunt
in fœminis ad naturalia, loci. Quidam uero & totam
uuluam pro labi memoriæ produnt, quod à uero lon-
15 ge abest. Quæ enim ratione sursum acta queat affirma-
ri? Conuenit igitur fœcibus clystere prius euacuatis, uris
naq; excreta, quo uulua undiquaque sit libera, laboran-
tem figurare supinam, ut coxas habeat sublimiores, po-
20 plitesq; flexos cruribus diuarcatis. Deinde hapsum ca-
pere ex lana, figura & crassitudine sinui muliebri pro-
portionalem, tenuiq; linteo circū dare, & in succum aca-
cia, uel hypocistidis uino dilutum demergere, tum uul-
uam inferere, & citra uiolentiam totum quod procidit
sursum agere, quoad totus tumor in sinu factus subles-
25 derit. Pubes spongia in posca expressa extrinsecus con-
tegenda est. Mulier iacebit extensis adaptatisq; inuicē
cruribus, ut alterum alteri incumbat. Inde cucurbitulæ
agglutinabuntur cum flamma copiosiore umbilico &
utrisque illis: naribus odorata admouebuntur olfactan-
30 da. Tertio die lana sinui iniecta, mulier insideat in uino
nigro austero modice tepido, uel in decocto myrti, len-
tisci * & malicorii. his probe peractis, lana ingesta tolli-
tur. Altera in uicem prioris eodē humecta medicamē-
to inferitur. Cataplasmata à foris imo uentri super inuis-
35 ciuntur ex palmulis, polenta, uel lenticula & malicorio
cum oxymelite, ac tribus diebus interpositis rursus hæc

* Aldus
χαιβ
male pro
χαιβ.

PAULI AEGINETAE

sent, quoad perfecte uitium discusseris. At si processu
temporis id quod prolapsum est, putredinem fuerit ex
pertū, id ipsum auferetur, nullius metu periculi. Etenim
uulua uniuersim ablata, ubi computruerat, mulierem
superuixisse commemorant.

DE MULIEBRIVM LOCO

rum clausura, quam phimon appel
lant. Cap. LXXIII.

LOci muliebres circa ipsorum os clauduntur, uel
ex præcedente exulceratione, uel durata illic inflā
matione. Curabuntur insesibus, qui emolliant, ex
hydrelæo & fœnugræci decocto, consimilibusq; cata
plasmatis & pessulis. Porro si malum inueterauerit, sus
fimentis uaporibusq; aromatum utendum erit. Iam ue
ro soluit etiam hoc uitii cum nihil aliud sit quàm uulua
ostiolī astrictio, pessulus ex hyssopo, nitro, resina, & tere
binthina.

VT STERILIS MULIER

concipiat. Cap. LXXIIII.

Communiter itaq; ambobus congruit, & uiro &
mulieri uniuersum corpus conseruare probe tē
peratum, laboris, cibi, balnei & reliquorum omo
nium mediocritate, & quod inter ea maximum est, cura
re ne habitu sint obesiore. Neq; enim pingues liberis p
creandis sunt idonei, eo quod genitalibus mutuo se cō
tingere haud possint cōmode, tum quod momentum
seminis emittant. Neque tamen nimis extenuati, liberis
operam dare feliciter queunt. Iuuabunt autem ipsos
omnia calefacientia & leniter inflantia, uinum calidum
modice sumptū. Et ex oleribus, eruca, horminium, erisy
mum & consimilia. Ruta uero & calamintha omnino
uitanda sunt. At si humorum quodā uitio fœmina non
concipiat, has expurgare, aut proba uictus ratione emē
dare expedit. Proprie uero mulieribus conueniet, curā
locorum genitalium q̄ fieri potest maximam habere, &

menses sine ullo impedimento emanare. Cum igitur
 propinqua est purgatio, cibi potusq; q̄ maxime licet,
 mediocritatem, curæ habebunt. & ex iis quæ purgatio
 ni irritandæ sunt aliquid assument, utpote odorata olera
 5 & acria, exempli gratia, scādicem, crethmon, fœniculū,
 apium, smyrnium. Porro uulvæ intemperiem corrige
 re oportet: frigidiores, notat menstruorum retentio, vi
 ctus frigidior, & crassi succi, stupor in pube, lumbis, &
 cruribus oboriens. Quæ uero penitus refrixerunt, ne
 10 uenerem quidem appetunt. Quare conuenit tum aliis
 remediis, tum fomentis omnibus etiam iis quæ cōstant
 suffitibus, calorem reuocare. Nec abs re fuerit, castoreū
 bibere, & ex seminibus odoratis, cuminum, anisum, pu
 legii comā, iuniperi fructum, pipere singulis adiecto: at
 15 fomenta ipsorum genitalium locorū, partim uapores
 erunt, qui inferius per fellam assumentur, partim aqua
 calida ad collutionem iniecta, in qua decoctus sit elelifo
 phacus, artemisia, ruta, iuncus odoratus angulosus, pule
 gium, acorum, seminaq; odorifera, hæc singulatim etiā
 20 pubi applicantur, Præsidio est, & Polyarchi epithema.
 Item pubis coxarumq; fricationes nihilominus conduc
 cunt. Insuper appositu utilia sunt, ex myrrha, ruta, galba
 no & castoreo, ubi prius aqua mulsa, aut marina uulvā
 foueris, proficit etiā ad hæc pessulus gone appellatus.
 25 Calidiores locos fatetur corpus totum calidius, menses
 pauci & laboriosi, genitaliaq; mulieris exulcerantis:
 corriguntur modice humetis & frigidis, cuiusmodi sunt
 olera quidem lactucæ, maluæ, blitum, cucurbita, cucu
 mis, pepon, attriplex, portulaca, aliiq; cibi consimiles, ue
 30 sicæ abdomini & lumbis frigida applicantur cataplas
 mata, succiq; illinuntur. At humiditatis locorum uitio,
 fœcunditatem frustrari indicat in coitu humor distillans
 ab inguine, tenuius & copiosum menstruum. His ui
 ctus utilis est sicciior, labores, superiorum perfricationes,
 35 uomitus, cibi sicci & mediocres. Profuerit & uul
 uam acerbis medicaminibus continere, quale est,

PAULI AEGIN ETAE

lentisci decoctum, myrtorum, rosarum, rhus coriarii, ite
 mali Granati floris, rubi ramusculorum, & gallæ, siccio
 rem uterū contrariis curare oportet, balineis dico, inun
 ctione, & alimento humido olerosoq; , mediocri uino
 & non nimis ueteri. Quod si à crassioribus succis con
 cipere impediuntur, siquidem rodentes fuerint, mulierē
 probe purgare conuenit medicamento quod cuilibet
 humori propriū est, maxime autem picra ex aloe: mox
 sero lactis aluum ducere, & uictum exquisitiore delige
 re. Pituitosos autem humores laboribus uacuare, sudo
 ribus, & uomitu: uel per inferiora. Cæterum ex medica
 mentis epithymum quoque, euphorbium, piper, dauci
 semen, petroselini semen, omnia contrita denarium duū
 pondere potui recte dantur. Hoc & uentrem probe iu
 uat, ac uulua calefacit, quemadmodum sæpe iam mē
 ses eruperunt iis quæ purgationem non sunt expertæ.
 Postquam uero medicamenta profecisse cōstitit, mē
 struis bene respondentibus, tunc uenus est ineunda, pur
 gatione desinente. Iam uero, quoniam spiritus similiter
 in uulua concepti fecunditatem impediunt, notas ipso
 rum ex capite de uulue inflatione sumemus. Medemur
 autem parciore primum uictu, mox cuminum, anethū,
 apii semen, rutæ, anisi & pleraq; esui idonea præstamus,
 partim potanda, partim applicanda. Conniuentes locos
 aperiemus iniectis clysteriis odoriferis, fomentisq; ex
 malua, semine lini, foenugræco, & oleo. Nonnunquam
 etiam mellē, ualidoribusq;, artemisia, cunila, calamintha,
 pulegio, & anthemide. Apponuntur autem utiliter tes
 rebinthina, nitrum, cucumer agrestis, elaterium, cassia, li
 quida pix. Quibus autem os hiat, uictus, fomenta, mē
 dicamina sicciora astringentiaq;, grana mali Punici, len
 tisci *radices, rubi, myrti & quæ humidiori uulua con
 grua sunt. Peruersiones autem fomentis instaurare ac
 dirigere oportet, item iis quæ molliunt, insertis, uenus
 autem à tergo exercita, ad concipiendum uidetur con
 ducere.

*Male Al
 dus xvi
 pro xvi

- I**N vulvæ ostio rimæ, quas Græci rhagadas uocant
ex enixu uiolento fiunt. Primum sanè latent, cum re-
centes adhuc ex partu sunt dolores, postea uero
paulatim percipiuntur, aliàs manu, aliàs in coitu, nam &
propter affricationem cruorem reddunt. deprehendun-
tur autem sinu adaperto. etenim diruptiones scissuræq;
in ostioli circuitu oculis patent. In quibus manum ro-
dentiaq; medicamina uitantes simplicioribus infesibus
pestulisq; utemur. prodest etiam tetrapharmacum dilu-
tum. At si callum contraxerit, medicamento, quod char-
ta constat, ex rosaceo utendum. Sin autem ipsius uim
non tulerint, iridem illyricam terebinthina exceptam im-
ponito, ulceribus iam cicatrice obductis, conueniet ex
cadmia confectum, aut aliquod ex iis quæ sedi conse-
crata sunt: uelut quod recipit argenti spumam. Cum
uero scissuras ueteres in condylomata degenerare conti-
gerit similibus excindi, adq; cicatricem duci debent.
Caterum hæmorrhoides uulvæ os & ceruicem infes-
tant, quæ in partibus instrumento ad perspiciendam
uuluum accommodato, quod dioptrismò uocauimus,
deprehenduntur, quia tuberculum in accessionibus ap-
paret euident, cruentum & subrubrum. At ubi remise-
rint, fluxio citatur citra dolorem subliuida & cõtumax.
In his igitur cum morbus dat inducias, scalpello modo
fieri queat, exceptas amputare oportet: sin minus, certe
medicamentis ipsas astringere, partim attingentes sicco
malicorio cum galla, aut huiusmodi aliquo, partim iis
quæ in uulua sanguinem fundente exposita sunt, utètes:
quæ etiam propter fluorem muliebrem sanguinem fun-
dentibus conducent, potissimum hoc notis discrimine,
quòd uulua continuo cruore manet per interualla, non
solum in menstrualis purgationis tempore,

PAULI ÆGINETÆ
DE PARTV DIFFICILI.

Cap. LXXVI.

Difficilis partus accidit, aut uitio parientis, aut fœtus, aut secundarum, aut foris adueniētium. par-
turientis quidem, si crassa obesaq; sit, aut uulua
tota exigua, aut dolorum imperita, aut timidiuscula, aut
inflammationem in locis genitalibus aliave particula
experta, aut alio quodam modo laborans, aut natura
imbecillis ut fœtum ne queat propellere, aut si ante tem-
pus pariat. At fœtus uitio, si uel inusitatae magnitudinis
existat, uel exiguus & modicæ grauitatis, uel magni ca-
pitis, uel monstruosus, uerbi causa, biceps. uel mortuus,
uel uiuus quidem, sed imbecillis, ut foras non possit pro-
cedere, uel si plures fœtus sint. Nam Herophilus, quin-
que edidisse mulierem, memoriæ prodidit. Vel si figu-
ram naturæ contrariam obtineat. Naturalis siquidem
figura est fœtui: prima quidem qua manus femoribus
porrectæ sunt, caput ad os uulvæ recta dirigitur. Proxi-
ma huic, ubi in pedes conuersus est. Aliæ omnes præ-
ter has à natura abhorrent. Ob secundas, quod uelamē-
tum intus est, partus redditur difficilis, si aut non auella-
tur ob crassitiem, aut prisquam opus est propter subtili-
tatem abrumpatur, humore siquidem euacuato, infans
præ siccitate ægre mouetur. Ab externis difficultas oris-
tur, aut frigore, quod uulvam densauerit, aut calore im-
modico, qui vires dissoluerit, aut ex quodam fortuito
accidente. Si igitur ex astrictione aut ueluti fœtus adars-
tatione pariendi oriatur difficultas, laxatione prius opi-
tulandum, infundendo largiter oleum dulce & calidum
item decoctum fœnugræci, aut malvæ, aut seminis lini,
aut etiam oua, quod leniendi facultate prædita sint. De-
inde & pubem cum abdomine & lumbis medicamen-
to illinere, quod semini lini constat: aut aqua mulsa, aut
hydrelæo, in sesibusq; similibus prodest. Insuper laxa-
tiones balineis moliri, nisi febris, aut alia quædam occa-
sio impedierit, mouereque patientem gestatione in aere

calido mediocriter . Nonnulli etiam conquassationes
 ualidas, sternutamentisque ciendis idonea adhibuerunt.
 Timidæ, mentis robur adiuuendum : imperita dolo-
 rum docebitur, ut ualidissime spiritum comprimat, &
 ad inguina depellat . Animo deficiens iis quæ stupori
 abigendo sunt, naribus admotis recreabitur . Alleuiata
 mediocriter, cibo modico refocillabitur . Obesam mu-
 lierem in lectulo resupinam figurare oportet, ut cum fe-
 minibus genua succlinent, quo uulua ad abdomen ten-
 dens, è directo ostioli habeatur, quod ceratis, aut pins-
 guedine delinire digito oportet, & sensim aperire. Atq[ue]
 si morbus aliquis particulas male habeat, etiam huic
 prospicere. Ad hæc stercus detentum molli clystere eo
 moliri, & secundas adaperas diuidere, aut digitis, aut
 15 ferramento quod πολυκώπας uocant, in ipsis occultas
 to sinistra manu præcedente . ac humorem quendam
 oleosum in uulvæ spatium interius clysterio indere. Ve-
 rum ubi infans præter naturam figuratus fuerit, natura-
 lem reddere figuram decet, partim pellendo, partim ad-
 20 ducendo, partim flectendo, partim in rectum agendo.
 Et si manum pedemve præmiserit, non attrahere mem-
 bro prehensum oportet, magis enim affirmatur, uel lus-
 xatur, uel etiam abrumpitur: uerum digitis humero in-
 fantis, uel coxæ affixis rursus in conuenientem locum
 25 id quod promissum eo, diducere . Porro si ore uulvæ
 compresso, totius infantis indecora fuerit figura, sur-
 sum prius ipsum ab uteri ore sublimem detrudere con-
 silium est . deinde prehensum rursus ad os dirigere .
 Postremo si plures uno infantes deferantur, ite-
 30 rum à superiore, infernaque parte referes . sic ut om-
 nia sensim & citra contusionem fiant, oleo locis pers-
 unctis . Tempus quo in sellam collocabitur partus
 riens, est, cum uulvæ os dehiscens, digito sublabitur,
 & quod præruptum est, procumbit . Verum si non
 35 procedat, quod infans mortuus sit, aut alia de caus-
 sa, ad extractionem quam Græci ἐμβρυοτμήσις

PAULI ÆGINETÆ

appellant, ueniendum est.

DE COXARVM MORBVS.

Cap.

LXXVII.

Coxendix ab articulari morbo nihil differt, nisi quod ipsius causa, nempe crassus pituitosusq; humor in sola coxarum compage, articuloq; concretus infideat. Dolor ipsis à natibus inguinibusq; ad genua usque, in plurimis autem ad summum usque pedem pertinet. Per initia igitur ægro nobis oblato, facibus clystere uacuatis, uena in cubito secanda: cum sanguinis detractione: si autem uetustas uitium occupauerit, ex malleolo partis affectæ imminutionem sanguinis moliemur. In accessionibus fotu hoc utendum, Cyprii cyathis octo, aceti cyathis quatuor, nitri cyathis duobus, cachrys cyatho uno. Succidis lanis calida admoventur. Deinde applicabitur ipsis farina lupinorum amarorum cum oxymelite, aut farina lolii, cum resina cucumeris syluestris radice, nitro, calamintha, cachry, baccis lauri. Iam calamintha sola uilliter ex oxymelite, aut aqua mulsa admouetur. Emplastri uero huius quod leniendi facultatem obtinet, usus est salutaris. Cerae pondus denarii centum, terebinthinæ pondus denarii uiginti quinque, aruginis pondus denarii sex, myrrhæ, galbani, iridis, singulorum pondus denarii sex, cedriæ pondus denarii quinque. Propinabitur ipsis liquoris cyrenaici quantum eruius implet, aut castorii drachma cum opopanax cis tribus obolis. Porro radice capparis cortex potui datus, & cataplasmatibus admixtus præsentaneo est remedio. Cum dolor multus excruciat, etiam medicamenta à dolore leniendo dicta locum habent, ut potest quod ad Philonem refertur, & quod duplici pipere constat. Hoc autem enema inferetur, mellis cyathus sesquiplus, olei tantundem: aquæ cyathi duo, nitri drachma octo, terebinthinæ drachma quatuor. His calidis iniectis, anus præterea fouetur, quod longiori tempore muccosa astricta inhæserint, uacuat nonnunquam san-

- guinem quando etiam magis opitulatur. At si malum
perseueret, quod raram est, iterum frequentius eo uten-
dum est, in uicem aquæ centaurii decoctum admiscen-
do, sanguinem trahit & thlaspi semen inditum, succus
elaterii, & medicamentum ex ipso factum, quodq; ip-
sius radicibus constat. Item oleum sicyonium, salforum
piscium muria, & osluarum colymbadum probe inge-
retur. Cucurbitulæ coxendici multa cum flamma, cute
prius incisa defigendæ, interim quoque hircudines .
- 10 Quid si his malum non finitur, ad purgationem eun-
dum est, aut ex hiera, aut colocynthidos partis interne
probe contritæ drachma offeretur in aquæ mulsæ cyas-
this duobus, aut paulo amplius, aut minus, pro laboran-
tis uirtute & alui facilitate dabitur. In aqua mulla ruta in-
costa, tum puls ex cucurbita syluestri confecta recte hos
expurgat. In quibusdam uero & uomitus à radiculis ci-
tatus per initia profuit, Cum morbus se remiserit, dro-
pæcæ ipsis applicantur, acopaq; ex euphorbio sunt uti-
lia, præsertim quod à uarietate uocatur pœcilon, mox
20 balineæ naturales accommodæ. Si desiderantur, in aliis
lauabunt balneis, commemoratisq; utendum est aco-
pis, & compositis nitris, medicamento. Asclepio, & qd
ex euphorbio, adarce, nigro, ueratro, castoreo, pyretro,
pipere, pedicularia, quam staphida agriam uocant, simi-
li pondere confit. Secundum balineas inspergentur picis
aridæ uncia tres, sulfuris ignem non experti uncia due,
cuti adhuc calidæ: quæ charta etiam contegetur. At si
ne hæc quidem profecerint, ut morbus infestare desie-
rit, congruum erit & sinapi cum caricis, uel etiam, per
30 se illitum. In totum uero hos restituit sanitati, iberidis
herbæ usus, quam lepidion quoque alii syluestre carda-
mum appellant. Quæ uero apud nos fruticosa nascitur
similibus lauri foliis, & multo amplioribus, respondere
multa experimenta testantur, non solum in coxarum,
35 sed in aliis quoque diuturnis affectibus. per æstatem ue-
ro longe sunt efficaciora: Atqui si folia tunc non produ-

PAULI ÆGINETÆ

xerit, cortex ipsius radicis contunditur cum adipe suillo,
 ut emplastri speciem repræsentet, indeo lindeolo densio-
 ri illitum locis maxime dolentibus imponitur, nempe
 acetabulorum confinio & femoribus, finesq; tam diu
 quoad cuticula superior nigrescat, aut ex toto liueat. Po-
 stea ipsum auferes, lotoq; ægrotandi ceratum impones
 opopanacis drachmas quatuor, quæ aceti cyathis duo-
 bus dissoluuntur, excipiunturq; cerato cyprino. Quod
 si talium adurentium usus abominentur, emplastris uti
 resectoriis oportet, è quorum numero hoc quoque est
 ceræ, resinæ pityinæ, singulorum drachmæ duodecim,
 terebinthinæ columbarum syluestrium stercoris, fociū
 uini recentium, singulorum drachmas sex, galbani, sesq;
 drachma. Atque ex resicientibus est qd leæna appella-
 tur, utilia uero sunt quæ ex myrrha stillaticia & nitro præ-
 parantur. Iam nonnulli iis usi sunt potionibus quæ ad
 annum continuantur, in quorum grege habetur medi-
 camentum diatefferon uocatum: chamædryos pondo
 gentianæ dodrans, aristolochiæ rotunde dodrans, rutæ
 seminis sicci sextarius. hæc tusa cretiq; dantur quotidie
 cochlearii mensura ieiuno & probe concoctione obita
 ex duobus aquæ frigidæ cyathis ad annū, donec mor-
 bus finiatur. Eadem promittit medicamentum dia hep-
 ta, id est ex septem confectum, & quod ad Proclum au-
 thorem refertur. Exercita absoluuntur, inambulatione,
 continuis flexionibus, saltatu, & cursu. Cibus mediocri-
 ter tenuis & concoctu facilis conuenit, porrò si malum
 nulli ex commemoratis cedit, aliàs in suppurationem
 conuertitur, aliàs neruis qui artus conuincunt, laxatis,
 membrum luxatur. Quare cum uitium longius se pro-
 rogat, articulum tribus, quatuor uelocis urere oportet,
 ut in chirurgica dicetur, ac complusculis diebus ulcera
 ad aperta, sine cicatrice seruare.

DE PODAGRA ET ARTICV

lariis morbis.

Cap. LXXVIII.

Non sola particularum corporis imbecillitas, podagricos articularesve cruciatus excitat. sic enim accessiones, sine ullo temporis intervallo urgerent, præcipue cum infirmitas imbecilibus articulis semper incumbat. item ne humor quidem solus hos dolores creat, quando quidem non solis vitium articulis infidet: sed utrunq; & humor à natura alienus, & particularum imbecillitas morbum adfert articulare. quoties enim altrix fecultas, imbecillior, solito ciborum grauiatur copia, tunc cruditates enascuntur. Itaque excrementitius humor superans, in quodcunque articulamentum, quod antea imbecillius euaserit, se confert: & artubus sese insinuans colligantes nervos sic distendit, ut dolorè pariat: neque enim nervos, per quos motus dispensatur arbitrarius, affectu primario, inflammatio infestat, quoniam artuum prius internodia, obsideat ea necesse est, ut quæ medias tibiae uel feminae, uel crura, cubitos, aut brachia intercedant. Sed afficiuntur iidem nervi tamen lege consortii, quod cum articulis ineunt. Quare si inferiores partes factus cursus pedum articulamenta repleat, podagra vitium nuncupatur. Si cæteros corporis artus intricet humor, ὁ ἁρτηρ Græci, nos articulares morbos appellare consueuimus. Quo uitii nomine, uertebras, humeros & maxillas comprehendimus, omnemque articulum, quicumque morbo implicatur. Nonnulli uero aures, dentes, fauces, & nonnunquam iecur, lienem articulariis doloribus confictari pronuntiant. A quibus nisi de subito vitium in artus sese recipiat eructetque, periculum breui tempore laborantes occupauerit. Sed humor superans, qui iuncturis sese inserit, uel biliosus est, uel sanguineus, aliàs atra bile uitiosus, plerumque etiam pituitosus, crudusque, copia alimenti, aut cruditate, aut otio congeffus, uerum uetustate in urticulis crassescit, & glutinosior enadit, sit ut in duritiem contumacissimam, quam Latini, tophum, Græci poron appellant, occallescat.

Interim uero diuersa humorum colluue, uictum con-
 trahitur, ob quod ægre dignosci, & difficulter medica-
 mentis elidi potest, uel etiam pene nullo remedio sanari
 scit. Ceterum hoc mali frequenter antecedit improbus
 labor, uehemens ambulatio, equitatus creber, usus uene-
 ris intempestiuus, insueta frigida potio, frigidorumq;
 uel multorum noxiorumve ciborum esus, multus uini
 usus. Iam aliqui prolapsu, uel de turbatione, uel propul-
 su, uel luxatione uel id genus aliis, prima morbi funda-
 menta iecerunt, sic quidem ut etiam tunc materia in cor-
 pore deses præcesserit, sed euident causa eam ueluti au-
 thor proripiarit. Moerore autem, curæ, per uigilia, & res-
 liquæ animi affectiones, non hanc modo suscitauerunt, sed
 ipsæ noxios quoque succos, siue primario, siue ex acci-
 denti procreauerunt. Variæ igitur, ut à me dictum est, af-
 fectus causæ habentur. interdum tamen cæca ipsius ori-
 go est. Sed deprehendi facile humorum noxam inferen-
 tium discrimina possunt, tum suis coloribus, tum iis q;
 superueniunt denotata. Siquidem biliosam defluxionem
 collor suppalidus, & subrubens testatur. Item caloris
 sensus, dolorisq; lancinantis modo acris, item humor
 in cutem subito, sine euidenti tumore erumpens. Infla-
 matio, ad motis rebus calidis, consensus incandescit, si-
 cut iis quæ refrigerant appositis sopitur. Hoc sanè cum
 aliis omnibus magna ex parte, tum maxime iis qui à bi-
 lioso humore originem habent euenire consueuit. Sub-
 inde febris in ipso accessionum statu accedit, ualidaq; si-
 ti conficit. Pari modo si atra bilis in articulis delituerit,
 color partis nigrior reddetur: si pituitosus incubuerit,
 exalbidus & aquæ subter cutem similis apparebit, ubi
 dolor quadantenus demulcetur, & tardius in tumorem
 materia sese attollit, quemadmodum si sanguineus hu-
 mor redundet, cruentus color emergit. Verum ut singu-
 la exactius dinoscas, superior uictus ratio reliquaq; con-
 sulenda tibi ueniunt.

Curatio

CURATIO BILIOSÆ DEFLV

xionis articulis conceptæ.

- Initium curationis si flaua bilis articulos exerceat, magisq; ipsius qualitas, uacuatione noxii humoris tentabitur per medicamenta, quæ flauâ bilem excernunt, quales est maxime quod ex rhodomelite temperatur, tum quod malis cotoniis constat, item antidotum ex hiera picra, & ex aloe catapotia, Per accessiones uero à foris utendum rosaceo cum oui luteo, & uini momento, quibus particula sensim infricata, manu demulceatur: herbe admoventur quæ refrigerant, ut solanum, portulaca, alitercum, semper uilium, palustris lenticula, seris, papauer, polygonium, rosarum folia, & consimilia. Et nunc hæc illinentur, nunc mica panis posca imbutæ adhibentur, uel hordeacea farina cum rosaceo superaccommodatur. At si inflammatio sic excandescat, ut erysipelatis naturam induat, manifesto lenietur cucurbitæ recentis cortice imposito, aut peponis, aut cucumeris carne, & perse, & ex pane, item perdicii folijs & hederæ frondibus cum pane uel polenta. Ad hæc psyllium farinæ hordeaceæ incoctum, flagrantes æstu inflammationes mirandum in modum solatur. simili modo & rosaceum cum quibusdam refrigerantibus succis illitum, confert etiam sequens medicamentum quod fabarum lomento componitur, habet autem hoc pacto: ceræ quincūx, chamemælini, rosacei, singuli sextantes & dimidijs, fabacei lomentij semuncia, ouorū lutea quinq; A L I V D. cataplasma, uirentes maluæ coctæ teruntur, psylliū priuatim in uiscum redactū, admiscetur: atq; cū ouorū luteis, oleoq; chamemælino subacta affectæ parti illinuntur. Si uero tantus urgeat dolor, ut laborās par esse ferēdo nequeat, medicamēto ex croco, glaucio & opio uti cōueniet, quæ in posca trita sublinentur, aut eisdem intincta panis mica superponitur, Galenus autem, ut ipse memorix prodidit, lachrymæ papaueris drachmas quatuor, croci drachmā cum bubulo lacte, uel caprillo, uel panis

PAV. AEGIN,

V

PAULI AEGINETAE

mica excipiebat, rosaceoq; subactis utebatur, aut opii
 crociq; pariter trita in lacte, cerato rosaceo excipiebat.
 Cōtulerit et in accessionibus ceratum ex turpene pisce
 confectum, itē oleum ex eodem expressum. Persimilis
 est efficaciaz, micam panis aqua maceratā, uel posca im-
 butam cum succo semperuiui, uel portulacae, uel solani
 uel palmularum carne & papaueris semine, pari portio-
 ne, adiectis ouorum tostorum luteis cum rosaceo deli-
 nere. Verū his quae membris torporem inducunt, nar-
 cotica Graeci uocant, diutius non erit insistendum, q̄ ut
 doloris uehementiam solum lenierint. siquidē largior
 ipsorum usus, sic insertum constringit humorem, ut in-
 tophaceam duritiem occalescat, ac diuturnas motus
 difficultates pariat. Ab eorum igitur usu quae dolorem
 arcent uel medicamento ē succis herbarum facto, dia-
 chylon uocant, ex chaniemalino resolutio utendū erit,
 uel eo quod dialtheas appellant, uel huius generis alio.
 Posteaq; uero partem affectam quae refrixerit recreaues-
 ris, roboranda erit palmulato medicamine quod dia-
 phanycinem dicunt, cum oxyrhodino, uel rosaceo uino
 subacto. At si emplastra detrectent grauenturq; concre-
 tum acaciae succū ex posca, uel lycii adiecto croco &
 glaucio, aut succo perditii cum posca, delinere cōuenit.
 uictus ratio refrigerans humidaq; erit, ut hordei crea-
 mor, ex chondro sorbitiones: ex oleribus, malua, lactus
 ca, intybus: anium cohortalium pulli, & earum quae in
 domibus oberrant: piscium saxatiles, erinacius pectines
 & eius notae reliq. Vitanda oīa calfacientia, & q̄ pallidā,
 aut flauā bilem generāt, uinum uetus, fuluū, uel nigellū,
 & cibi repletio, balineis utendū aqua potulenta factis, si
 nihil prohibet, cum defluxiones intenduntur, & cum ab-
 sunt, haec ad causam pertinent. Temperandum ab ira,
 furore, inedia, acrementorum esu, temulentia, immodio
 co labore, & ueneris usu.

CURATIO SI SANGVIS
 artus infestet.

In quibus sanguineus humor redundat, protinus sanguis
 mitti debet, qui tamen in pituitosis, aut atra bile infectis
 detrahendus non est. Siquidem in his succus uenis plas-
 rima parte conceptus residet, qui copia sua potius quam
 qualitate offendit. Verum statim cum quis morbum ex-
 periri coeperit, sanguinis missio erit tentanda. qui uero
 iam saepius huiusmodi defluxionibus sunt conflictati,
 plus noxae, quam auxilii ex sanguinis detractione sentiunt.
 praesertim qui corpore sunt imbecillo frigidoque. Post
 sanguinem detractum, nisi solus ille superauerit, mome-
 to temporis interposito, purgationem ex hiera antidos-
 to moliemur, aut Iuliani oxymelite, quippe haec magna
 commoditate purgant: qui uero ab huiusmodi medica-
 mentis uacuantibus abhorrent, catapotia quae sequun-
 tur deuorabunt: aloes, colocynthidis, id est, cucurbitae
 syluestris, ueratri nigri, scammoniae, singulorum unciam,
 euphorbii, nitri, singulorum semunciam, succi brassicae,
 quod ad ea capienda satis sit. Dantur singulis pro uiri-
 tatione: melius proficiet, si cotoniorum succo excipian-
 tur. Aliud genus catapotii quod & in accessionibus, &
 cum dolor inflatioque remiserint, integritasque facta est,
 exhibetur, qualiscunque etiam humor articulos affligat.
 Recipit aloes selibram, agarici, croci, singulorum semun-
 ciam, costi, spicae, nardi, iunci odorati rotundi, floris opo-
 balsami, cassiae singulorum unciam, scammoniae sextan-
 tem, epithymi quadrantem. Modus leuior instar duorum
 scrupulorum, summus quaterni scrupuli. Iam uero ex
 armeniaco lapide catapotia, mirifice uentrem subdu-
 cunt, ac proprie articulariis doloribus congruunt,
 tum inter fluxionum principia, tum in incremento,
 ubi dolor uehemens urget, tum in remissionibus, ubi
 in totum conquieuit, sed quoniam nonnulli scam-
 moniam ceu stomacho noxiam fugiunt, dabuntur ipsis,
 praesertim cum pituitosa subluuies torquet, haec ca-
 tapotia, colocynthidis medullae, ueratri nigri, bdelli-
 i, gummi, aloes, singulorum uncia, nitri Alexan-

PAULI AEGINETAE

drini, euphorbii, singulorum semuncia, dantur quatero
 nis scrupulis. Ego inuicem gummi epithymū adiciebā.
 Sunt qui in omnibus articulariorū uitiorum accessioni-
 bus, ipsis et exhibitis hermodactylis aluum purgatione
 sollicitauerint, sed attendendū est, quoniam hermodacty-
 lus stomacho facessit negotiū, cibi fastidium ex reple-
 tione, & uentriculi redundantiam mouet. Quapropter
 in his uti consilium est, qui obeundarū actionū neces-
 sariam habent, etenim post, unū, aut alterum diem pluri-
 ma ex parte defluxionem ex toto finiunt, sic ut cōsuetis
 muniis obeundis sint idonei. Notus mihi est q̄ non her-
 modactyli substantiam, sed herbæ ipsius decoctū citra
 quancuncq̄ mistionē, nō secus q̄ apii aut anisi decoctum
 potui præbuerit, ac mirum est q̄ resoluta sæpe aluo de-
 fluxionem sedaret, uerum quemadmodū nuper retuli,
 stomacho inimicum est. Quare his postea quæ stomas-
 chum confirmant, uiresq̄ eius recolligunt, mediocriter
 offensum os uentriculi corrigere licebit, ut à uitio quod
 hermodactylus intulit, stomachus sese uindictet. Multo
 laudatius esse medicamentum Alexander prodidit, qd̄
 ex coronopodio temperaretur, quod & eandem deie-
 ctionem, & dolores omnes discutiat, nullamq̄ stomas-
 cho noxam inferat. Ceterum pituitosis, si mediocris do-
 lor afficiat, ea debent à foris illiniri, uiridis brassica, apii,
 cunyla, uerbenaca recta: sin acris dolor affligat, farinæ
 foenugræci parteis treis, pollinis loliacei, farinæ cicerū,
 singulorum partem unam, ex aqua mulsā, aut uino teo-
 nui cum modico cyprino, uel nardino conuenit illinere,
 maxime per hyemen, item cinis crematæ radicis bras-
 sicæ, eiusq̄ colliculorum cum axungia illitus, multis
 fuit præsidio. Sed finiendis doloribus recens adhiben-
 da axungia, discutiendo autem humori uetus salsa au-
 xiliatur, bubulum stercus cū hordeacea farina in aqua
 mulsā coctum prodest: uel per se recens & liquidum,
 uel ex foliis brassicæ similiter caprillus simus per se, uel
 cum hordeacea farina coctus in posca. Quoniā uero

nonnulli quadam cōtrietatis lege remedium senserunt.
 (etenim diuerſorum humorum nonnullam medicina-
 rum distinctionem poſtulat) commemoranda iam ha-
 rum materia eſt promiſcua. Itaque ſylueſtris atriplex &
 5 ſatiua cum pane commode illinitur, aut uerbaſci folia
 cum bulbis, & pane trita, uel ex polenta, uel cataplaſma
 ex hordeaceo polline. At in quibus obſcura morbi eſt
 origo, hæc ſemel experiri abunde fuerit, modo ad con-
 ſimilia tranſgrediundum eſt, modo contrariis pugnand-
 10 dum. Neq; tamen eiſdem diutius immorari conſilium
 eſt, ſi nullum ex eis iuuamentum perceperint. Hæc quo-
 tidie in artis operibus fieri uidemus, ut idē medicamen-
 tum uni articulo profuerit, alteri in eodem ægrotanti in-
 flammationem excitarit, quin etiam non modo opitū-
 15 letur, ſed conſeſtim (quod maxime eſt mirum) offende-
 rit. Quippe unus idemq; ſæpe articulus ex eodem re-
 medio nunciuuabitur, paulo poſt eiſdem appoſitu, in
 inflammationem concipiet. Nunquam igitur aliquis cū
 20 glutinoſus craſſuſq; humor ſuperat, calidioribus leuabi-
 tur auxiliis. Verum cum acer, aut feruidus humor præ-
 cellit, tum refrigerantibus ſolatium inflammationis pa-
 ratur. Nec miraculum eſt ſi materies natura frigidior in
 inflammationis tempore, & feruore æſtuet & incādeſcat,
 ubi flauæ bilis miſcellam amiſerit. Porro tophos in
 25 artubus impedit coaleſcere lupinorum farina cum oxy-
 melite, uel poſca, uel laſerpitio, aut brionię radice cum
 pane. Iam hoc quod ſequitur citra noxam mitigat, &
 mediocriter diſcutit, lycii, ammoniaci, thymiamatis ſing-
 gulæ uncia cum uino ueterrimo & oleo acerbis oliuiſ
 30 expreſſo, trita coquuntur è lomento fabarum, quod ſuf-
 ficat, adſcitur, cocta mediocriter illinuntur. Poſt inflama-
 tionis ſtatum, reliquias tumoris diſcutiunt illiti bulbi
 per ſe, uel cum polline polentæ, ad uellicatum uſq; ſuf-
 frikti. hoc enim modo efficacem uſum exhibet. Quod
 35 ſi nihil hiſce cataplaſmatis leniuntur, fotibus & liquoris
 bus ab alto deturbatis erit certādum, maxime ſi tumor

extrema occupet. fiunt autem hæc, chamemæli & me-
 liloti, aut centaurei decoctis. Nonnullis etiam cappar-
 decoctum abunde fuit auxilii, hoc tamē quod infra scri-
 bitur, omnibus præstat efficacia. Thymus, origanum, sa-
 tureia, & calamintha, in aceto quā acerrimo cocta, 5
 eiusdem aceti imbre affectæ partes, non semel, aut iterū,
 sed frequenter in die fouentur. Hoc præsidio permulti
 pristinam ualeitudinem recuperarunt, quibus non pitui-
 ra solum, sed flaua etiam bilis fuit infesta. Non desunt
 qui & subsequens medicamentum salutare sint experti, 10
 ilicis glandes in farinam detritæ diutissime percoquun-
 tur, hoc diluto extremi artus per fluxionum initia lōgo
 tempore proluuntur. At quæ interioribus partibus habentur,
 spongiis foueri debent, hoc enim liquore materiæ im-
 petus aueritur. Idem & bile uitiosis artubus conuenit, 15
 quemadmodum calida sine aliquo decocto partibus
 superfusa. Porro doloribus qui intenso frigore, aut hū-
 moribus inter articulorum ossa demersis cōtrahuntur,
 ualens hoc est remedium. Olei ueteris, nitri alexandrini
 resinæ terebinthinæ singulorum pondo libra, euphor- 20
 bii pondo uncia, iris pondo sextans, foenugræci farinæ
 sextarius unus, his autem ea quoque quæ aduersus co-
 xendicum cruciatis scripta sunt, pulchre nimirum opo-
 tulantur, multi siquidem aduersus huiuscemodi perfri- 25
 ctiones cum morbus sese remiserit, sinapi cum pingui-
 bus fœcis usi sunt, tum aliis quæ extrinsecus ruborem pu-
 stulosum excitant. Alii uero medicamentum ex cantha-
 ridibus admovent, uerum hæc in posterum officiant, ni-
 si aliquo etiam molliente utantur, ut ē radícula compos- 30
 sito, diastrutheon uocant, & basilio, & arbore populo
 cōfecto, populeum dicunt, aut ex elate, aut ex nigra po-
 pulo, aut bromio, aut lysiponio aut ualentioribus aco-
 pis. Vbi autem neruio consensu, aut consortii iure ar- 35
 ticuli laborant, aut si humor intra ipsorum compaginē
 coaluerit, mulæ lotio in morbi statu potissimum, &
 in frigidis defluxionibus fouere commodum est.

Pariter conuenit etiam ex utroque ueratro pastillus cum mollis & fungosus tumor articulos implicat, & fomentum ex sale torrido, aut etiam aliter è marina calida per spongas artus perfudisse uincit, item
 25 emplastra ex sale præparata, uel ex myrrha stillaticia, staten dicunt, & nitro, hisq; consimilia cataplasmata, post uigorem morbi auxilio sunt, uictus ratio sicciior minimeq; excrementitia competit, item inedia, uel parciiores cibi: frequentibus balneis absti-
 10 nendum. At si lauent, nitrum aliaq; frictionibus adiciant. Vbi dolor incinauerit, exercitiis se credent, articulos maxime perfricabunt, in naturales, balneas descendunt, in sabulo, uel arena saburrabuntur. Vomitus à radícula cibisq; assumptis moue-
 25 bitur. Qui ad hoc se commode habent, etiam ueratro nigro uacuabuntur per uomitum, uel etiam per aluum inferiorem deiciant.

Q V O M O D O S A N G V I N E

infestati artus curentur.

20 Qui ex sanguine dolorem articularium conceperunt, post prima morbi rudimenta sanguis statim detrahendus est, mox remedia loco dolenti sunt inducenda, si biliosior acriorq; sanguis redundet, eisdem quæ in flaua bile diximus, certandum, si frigidior, pituitosiorq;
 25 aut atra bile deprauatus humor coaluerit, iis quæ postea subdidimus præter illa quæ maiore prædita sunt acrimonia, curationem tentabimus: at si uictum in uetus statem incidit, his quoque locus erit, iam hoc cataplasma in principio proficiet. Malicoria, et baccae rhois
 30 cum polenta ex uino detrita illinuntur. A L I V D. Brassicæ folia cocta accurate conteruntur, aceti flores cum duobus coctorum ouorum luteis, & rosacei momento, adiciuntur, leuigataque simul loco iniiciuntur. sed hoc medicamentum subinde
 35 de mutandum est. cibi assumentur qui extenuant & parum nutriunt: carne igitur & leguminibus,

V iiii

& uino copiosiore nigro: abstinendum. si autem fieri
 possit, etiam ex toto uinum circumcidendum. Plurimos
 siquidem noui, qui prorsus abstemii omnes sanitatem
 consecuti sint. Alii siquidem per morbi initia omnino
 liberati sunt. alii in posterum rarius & minori dolore ac
 cessiones perceperunt. Quia propter, nisi quid obstat,
 aut futurum inde aliquid metuant, perpetuo uitā agent
 abstemiam. A quibus per imbecillitatem, aut perfri-
 ctionem aliquid subsequitur opinentur, ad biennium
 usque abstemii, inde ad pristinam consuetudinem re-
 uersi, modicum dilutumq; continenter bibent. Opor-
 tet autem abstemios in uicem uini decocto anisi, aut ali-
 cuius cōsimilis seminis uti, fructibus fugacibus reliq;q;
 refrigeratoriis abstinere, tum ueneris usu. Qui uero
 per medicamenta, quæ per annum bibuntur, morbum
 prorsus tollere uoluerunt, multis sanè quibus pituitosus
 & excrementitius humor articulis incubuerit, opitulati
 sunt. uerum qui calidioribus siccioribusq; constarent na-
 turis, hos in subitam mortem præcipitauerunt, quod ma-
 teria ad interaneum, aut renes, aut costas, aut pulmonē,
 aut principem quandam partem se contulerit. Sati-
 us itaque est biliosiore præditis habitu, aut copioso san-
 guine refertis, uini usu interdiceret. Sic enim commemo-
 ratis uitæ periculis, minus erunt opportuni: frigidiores
 autem & recrementis pleni, facta ex uiperis theriaca uti
 debent, hyeme frequentius, per æstatem rarius. Sed cru-
 di minus eam assument, uel enim morbo liberabit, uel
 certe leuiorem reddet, nulli ex prædictis particulis offe-
 ciens, sed quoniam nonnulli etiam commemoratis uti
 antidotis cogunt, non te lateat id quod ad Agape-
 tum, uel Proclum authorem refertur, tum quod das-
 massonion dicitur, item quod atacton & octoidon,
 item quod ex scordio, aut corallio componi solitum
 est, alia plerumq; non mediocriter proficere, nec non om-
 nium tamen securissimū est longoq; usu probatissimū,
 diacorallion, siquidē cōcretas iam in tophum duritias

5 tumoresque callosos discutit, horum omnium vires &
 modum usus, volumine, quod compositis medicaminibus
 dicatum est, offendes, similiter aduersus articulos
 rios dolores, medicaminum quæ psilothra uocant, mis-
 10 sturam usumque in eodem habitu, semper pituitosiores
 re. Alii uero qui à toto se morbo uindicare uolunt,
 integras uulpes oleo tantisper incoquunt dum intabue-
 rint, quo articulariis morbis medentur. Non desunt
 qui tutas lebetibus immergunt. alii tantum emortuas
 15 coniciunt. Pari modo etiam hyenas percoquunt, oleum
 hic conficientes, quod discutiendi uim habeat. deinde
 eo balnei solia complent: in quæ postquam descende-
 runt, immorari ibidem diutius eoque articulos con-
 fricare præcipiunt, unde sæpe factum ut non modo
 20 artuum tumores, sed etiam uniuersum corpus euac-
 uaretur.

DE TOPHIS, QVOS GRÆ- ci poros uocant.

10 Quoniam & tophi subinde in articulis creantur modo
 ob humoris qui ad eos decubuit crassiciem, terrestrēque
 duritiam, modo propter immoderatos discutientium
 resiccantiumque medicinarum usus, sine earum mistu-
 ra quæ emolliendi uirtute pollet, sciendum tenet ea es-
 se conuenientiora, quæ mollientem simul & discus-
 15 tientem naturam sortiuntur. itaque emolliunt adipem
 uetusti, medullæ, ammoniacum, balellium, oleum be-
 ne uetustum & styrax. Digerunt autem & resiccant, nis-
 trum, sal, myrrha stillaticia, adarce, euphorbium & con-
 similia. uerum ad concretos in articulis tophos pro-
 20 prie facit uetustissimus acerrimusque caseus cum suillæ
 carnis præpinguis ac ueteris decocto contritus & su-
 perimpositus: siquidem sua sponte topho dehiscente
 quotidie humor qui intus coierat, eructatur. Valeat
 25 etiam medicamentum diapernes, probatumque, quod
 duplici modo præparatur. item quæ ex stillaticia
 myrrha conficitur, iam hoc peculiariter facit quod res

PAULI ÆGINETÆ

cipit spumæ nitri, resinæ terebinthinæ, myrrhæ quæ pri-
mum sua sponte stillauit, propolis singulorum pondo-
triens, ceræ pondo bes, colophonix libra, olei fescucia:
mixtis utitor, tū in tophis, tum in abscessibus: iam quod
ex cynabari temperatur, mirificum est ad tophaceos tu-
mores, aliaq; complura: sed ægre paratur. Quod uero
ex leptocaryis conficitur, præter quod salutare, etiam
facile conquiritur, non solum ualentioribus, sed tene-
ris quoque corporibus accommodatum, si assumat
medicamenti, ex melle, uel ex anemone confecti par-
tes duas ad illius partem unam: quæ si desiderentur, eti-
am eius quod cerussa constat, subinde æqualis modus
ipsi miscetur. A L I V D ad tophos, sandaracha contri-
ta querneio uisco excipitur, usuiq; est. A L I V D. Pro-
ficet etiam ad fistulas & ægilopas, olei sextarius, spumæ
argenti * dodrans, auripigmenti semuncia argenti spu-
ma oleumq; tantisper incoquitur dum manus non in-
quinet postea tritum auripigmentum aspergitur, & pri-
usquam ustionem senserit medicamentum ab igne tol-
lito, ac utitor. Ex asii lapidis flore confecta, ubi morbus
intermiserit, imponuntur, quæ ad omnium articulorum
nodos concretos accommodata toto morbo liberare
nonnulli ueterum testatum nobis reliquerunt. At ex sa-
lis flore præparatum medicamen si in morbi declinatio-
ne similiter imponatur, tumorum reliquias digerere ex-
perimenta fidem fecerunt.

Q V O M O D O Q V I S A P O

dagra se tueatur asseratq;.

Podagram quæ iam constiterit articulare uel dolo-
rem, sine prædicta medendi ratione aboleri longe dif-
ficilium est. At quæ nondum radices egerit propulsare
aut ea tentatos a recidua tueri, haud fuerit difficile, si
quis cibis demat, & eis utatur quæ prompte in memo-
ria digeruntur, excrementisq; uacant. item uino mode-
ratiore & exercitationibus satis se committant. Quod
ad præfidiis partem attinet, sal minutim in oleo tritus &

¶ Aldus
unciaz
octo & s.

LIBER TERTIVS.

158

articulis affrictus omnes qui se ab hoc uſtio uindicare uolunt, magnifice iuuat, niſi præter modum ſicca inteo-
perie ſint præditi, eoq; illitu, & mane & ueſperi per to-
tum uitæ curriculum, ſaltem ubi inflammationes incli-
nauerint, utendum eſt.

AD PERNIONES QVI

pedum plantas cum calces infe-
ſtant. Cap. LXXIX.

10 **P**erniones ulcera ſunt, quæ ex frigore hyberno in
digitis manuum pedumq; contrahuntur, Græci
chimethla nuncupant. Itaque egelidam aquam
marinum ſuperfundere oportet, uel betæ decoctum,
uel lenticulæ, uel erui, uel regiæ radicis. A ſuperfuſio-
ne, lenticulæ coctæ uinoque detritæ admouentur,
15 uel ficus ex oleo leuigata imponitur, uel alumen
cum farina pari modo, in uino pertrita applicatur,
aut floeces uini ſubaridæ, aut bulbus recens uino tri-
tus adglutinatur, aut alia in oleo fricta, tritaq; uel ce-
20 ra oleo mediocri liquefacta imponitur, aut malicoris
um incoctum uino, & in tenuem redactum puluerem,
cerato roſaceo exceptum inducito, prius locum deco-
cto lupinorum irrotans, aut mannam, ſulſurq; ignem
non expertum, cum melle cocto inuito, at alterci ſuc-
25 cus continenter illitus, ab inflammatione & dolori-
bus uindicat.

MARCELLIVM AD PERNIONES.

30 Rapæ ſatiuæ radice excauata, conſicitur in capacita-
tem ipſius ceræ ſextans, olei lentſcini quantum ſuffi-
cit: cocta in æneo lebeſe ex marina aqua, aut mu-
ria, aut lupinorum decocto, partim loco ſuperfun-
duntur, partim ceratum in rapa liquefactum frigi-
dum imponitur. At in exulceratis pernionibus,
35 thuris, aluminis ſciſſi, minii, reſinæ terebinthinæ ſin-
gulorum par modus: adipe ſuillo diluta inducuntur.

PAULI AEGINETAE

Verum si inflammatio exulceratos perniones male ha-
beat, medicamento utendum hexapharmaco quod re-
cipit olei, uncias nouem, taurini adipis & fellis, singulo-
rum libram, argenti spumæ, uncias sex, colophoniam, un-
cias quatuor, mellis uncias sex.

AD DIGITORVM RIMAS

totorumque pedum quæ rha-
gades dicuntur.

Pice liquida delinuntur, aut cancro fluuiatili, aut mari-
no super carbones cremato, testa abraditur, & cum o-
leo trita ut mellis spissitudo sit, absterfis prius scissuris in-
stillatur. Proficit etiam scillæ medulla oleo feruefacta,
item terebinthina contrita, ne non cornu caprillum ustu-
exceptumq; adipe caprillo, sed callos circumpurgare
oportet, & sic medicamentis uti.

AD SCISSVRAS CALCANEORVM

rum & planipedum anthera.

Calcis uiuidæ drachmæ decem, cerussæ drachmæ uir-
ginti, cere tantundem, aut triginta, porcina pinguedinis
recentis uncia septem, colophoniam uncia nouem, suc-
cilini seminis cyathus, olei dulcis uncia quadraginta:
teneram plantam efficit ut aliud nullum.

A L I V D. Adipis caprilli, ceræ, olei singulorum pa-
ri mensura utitor. A L I V D. Malicorium aceto in-
coctum diebus quinque applicatur, deinde loco undi-
quaque purgato calx uiua cum oleo aut sordibus im-
ponitur. A L I V D. Scilla cocta oleo, ipsa quidem
fricta proiicitur, oleo uero terebinthina liquefacta ad-
mouetur.

AD ATTRITVS CALCA-

nei ex longo decubitu.

Ceræ, olei, argenti spumæ, mellis, pares modi, proficiunt
in omni exulceratione, plani pedum, calcanei, supernæ
partis, & internæ digitorum, magisque si ulcus ungui
sit propinquum.

AD SORDIDA PLANTÆ

ulcera emmoton, facit etiam

genitali exulcerato.

- Amurcæ cyathus, aceti cyathus, cocta uase æreo doo
 5 nec melleam spissitudinem habeant, & trita separatim,
 profunt. Item squamæ æris drachmas duas, mannæ
 tantundem, lanarum, succidarum mollium, quantum
 manu comprehendi potest, contextarum teda uistarum
 10 que cinerem totum excipito & utitor, in uulneribus quo
 dem uino diluens, in naturalibus & pedum plantis pasto
 so. ALIVD. Amurcæ, mellis despumati, paria pond
 dera, hoc etiam cicatrices tollit.

AD INTERTRIGINES, EX
CALCEAMENTIS.

- 15 Pulmo agninus, suillus & caprillus benefacit, uenum co
 ria ex ueteribus calceamentis combusta, si inflammatio
 urget, nihil quidem adferunt præsidii, sed illa finita, mulo
 tum: uel cepa cum gallinæ adipe copiosior adicitur,
 uel galla combusta inspergitur, uel acacia aceto dis
 20 luta illinitur.

AD CLAVOS CALLOSQUE.

Cap.

LXXX.

- 25 **C**laui prius undiquaque purgatis, inducitur meo
 dicamentum quoddam ex edentibus, quæ sepo
 tica, Greci uocant, aut ærugo rasilis, aut sandarac
 cha, aut syringiacum aridum, aut collyrium syringiacum
 loco gummi, ammoniaco exceptum. Est autem
 clauus teres figura callus, colore candidus, clauorum
 capiti similis, toto corpore, sed pedum solo digitisque
 30 præcipue nascens, quem dolor sequitur & incessus imo
 pedimentum. Tollitur autem longiori tempore, etiam
 si quis excedentem clauum partem continue abradat scal
 pello, aut pumice affricet, similiter etiam callos. Profo
 cit lupinorum crudorum concrematorum cinis cum
 35 melle, aut misy, liquida pice exceptum, melanthion
 cum urina pueri impuberis, uel oui luteum, fabarum

lomento cum aceto incoctum. At hoc subinde expertum est, cantharidum, atramenti sutorii, castorii, par modus singulorum, excipitur terebinthina, ut emplastrum fiat spissitudo, clauoque prius circumciso imponitur. A L I V D. Fœculæ, calcis uiuæ, uisci, singulorum pares portiones, cum stillatitia lixiua, uel urina pueri impuberis.

AD VNGVIVM VITIA,

& primum de reduuiis.

Cap. LXXXI.

Reduuiæ, Græci paronychian appellant, abscessus est qui ad reduuia unguium coit, cum parua adhuc est & prima habet rudimenta, galla cum melle eam reprimat & confirmari prohibet, uel Musæ pastillus, uel iris ex aqua. At ubi caro iam præter naturam excreuerit, eo curatio dirigenda est, ut per rodentia medicamenta absumatur, rumpaturque; ualet autem ad reduuias, tum aurium sordes, tum lycium. Suppuratas autem reduuias, acu adacta humorem emittere, spongiamque aqua imbutam imponere oportet, uel lenticulam illinere cum aqua tritam, aut palmularum cum uino, uel rosis uiridibus, uel siccis, aqua respersis tritisque, uel polentam cum aqua, efficax est reduuiis etiam lupinorum farina melle, uel mulso macerata. Ex ulceratis reduuiis opitulatur hoc medicamentum.

Æruginis, argenti spumæ singulorum drachmæ quatuor, sarcocollæ tantundem, super linamentum ex uino & spongia imponitur. Conuenit autem carnem undique ab ungue diducere.

DE PTERYGIIS.

Pterygion carnis incrementum est, aliquam unguis partem operiens. fit autem in pedis & manus præcipue pollicibus. In pedibus quidem ex illorum offensione plerumque, in manibus autem ex neglecta reduuia, aut alia huiusmodi causa, aduersus quam iuripigmentum & manna pari pondere spargitur, super autem, linamen

tum ex uino spongiaque imponitur.

ALIVD. Chalcitidis, squamæ, maïcorii æquales partes. Excipiuntur fico tosta & melle, parte effecta, spissamentorum decocto prius delibuta. Quod autem sic cum est in ungue circuncidito.

AD DIGITORVM PTERYGIA

putrida item ad pudendorum ulcera.

Lachrymæ thuris drachma, squamæ drachma, ærginis rasæ drachmæ quatuor, mellis cyathus, teruntur in sole donec subflauescant. Et loco uino prius delibuto persplenium inducuntur.

MEDICAMENTVM QVOD

subito pterygia desiccet, persanatq;.

Soryos combusti drachmæ due, thuris tantundem, ærginis rasæ drachma, cum melle contrita, ipsi pterygio inducuntur. Valet etiam ad reliqua maligna horum locorum ulcera, nigritias & putredines.

ALIVD. Squama ærlis, palmularum carne excepta aut ficorum utitor. **ALIVD.** Columbæ sterus cum polenta ex passo coctum pertritumq; calens imponitur, item squama per se inspersa, pterygia desiccet. Oportet autem crebro, angulum unguis pterygion pungentem, ne ne increseat, scalpello superimmi sso, adimere

AD VNGVES CONTVSOS.

25 Myrti & mali Punici foliis teneris unguis illinito.

AD CRVENTOS VNGVES.

Farinapice mista imponitur.

VT VNGVES QVI LABORA

uerint abscedant.

30 Sulfur tritum adipe suillo exceptum iniicitur.

VT SCABRI VNGVES

abscedant.

Visci quercini, sandarachæ, foenugræci singulorum pōdo sextans, cantharidum, thapsiæ singulorum uncia, aceti quod satis est. **ALIVD.** Propolis

35 Atticæ, ceræ, bituminis, singulorum drachmæ duæ,

PAULI TÆGINETÆ

sulfuris ignem non experti drachma, oleo non in-
guinentur, in usu calefactum unguibus illinitur.

A L I V D. Picis liquidæ, ceræ, colophonix, tere-
binthinæ, guttæ ammoniaci, sulfuris uiui, aphronitri
pares portiones. ne manus inquinent.

A L I V D. quod separat scabros ungues sine ex-
ulceratione. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ,
sulfuris uiui, singulorum drachmas quatuor, resina
excipito & utitor, dissoluens per dies septenos.

A L I V D. Erui farina, felle ouillo, uel urina ouil-
la imbuta utitor, uel calce uiua cum oleo, uel chia cum
opobalsamo, uel uisco, atramentum sutorium, sul-
furque uiuum quod satis est, exceptum, pelli illitum
superinducito, uel herba pedicularia, cum aceto trita ut-
ritur, uel resinæ terebinthinæ drachma, sandarachæ du-
plicata portio simul radici unguis imponitur, diligētīq;
fascia illigatur, Cum autem unguis exciderit, ceratum
myrteum cui medicamenti ex resina paululum adiectū
sit, superaccommodatur.

Libri Tertii Finis,

Pauli

PAULI ÆGINETÆ
LIBER QVARTVS,

Ioanne Guinterio Andernaco medico interprete,

DE ELEPHANTIA. Cap. I.



10

15

20

25

30

35

ECTE MEA SENTEN
tia cappadox Aetius memoriae
prodidit, auxiliorum uim morbis
fortiorem esse oportere, eoq; ele
phantiam nunquam curari, ut qua
nulla superior medicina reperias
tur. Si enim cancer ueluti elephan
tiasis quaedam uni oborta particu

la inter morbos insanabiles uel ab ipso Hippocrate res
latus est, quanto magis elephantia ceu totius corporis
cancer aliquis, ab omni abhorrebit remedio? Cū enim
atrabilis, ex qua huic affectui origo est, duplici modo
generetur (uel enim ex melancholico sanguine, foeculē
tioreq; & ueluti eius limo; uel bile flaua, utrisq; nimium
ustis, nascitur) rubicundam quidem elephantiasim mitio
rem quodammodo, uerius dixeris minus malignam,
prima ipsius differentia procreat: reliquam uero, & ma
ligniores, quae totum corpus foedat ulceribus, & sum
ma squamis exasperat, altera flauae bilis supra naturae
modum adustae soboles, producit, Quapropter mor
bo iam uictis manus admouenda non est. At si recens
adhuc malum est, ut nihil ex summis deciderit, nulla in
festarit exulceratio, neq; tumores plurimum emineant:
sola uero facies quodammodo sit decoloratior, sed ita
ut non admodum deformis appareat, curationem ex
periemur. Nonnulli siquidem iiq; haud pauci, sola ca
pitis adustione plerosq; hoc uitio tentatos, ne uincerent
tur, inhibuerunt. Protinus ergo inter initia sanguis mitti
debet, & magis uere, in quo potissimum haec lues & na
scitur, & intenditur. paucis diebus interpositis, nouem

PAV. ÆGIN.

X

PAULI ÆGINETÆ

decemve, pulte diacolocynthidos ipsos purgabimus,
 non semel, uerum subinde, ex proportione quantitatem
 medicaminis adaucturi. Item ex hiera purgatio his est
 idonea. Rursus interpositis circiter decem diebus, lactis
 fissilis serum dabitur, neque minus tribus heminis, neq
 amplius quinq. Insequent tempore non fisso, sed res
 cens multo lacte nutrientur. Ob quæ si morbus remitte
 rat, eodem uti cibo debent: si remanet, lacte abstinebunt.
 Acremento autem uomitus cietur, à radícula assumpta,
 aut cibus. Proficit et ex albo ueratro post hæc purgatio:
 bis quidem, si fieri potest, uere, semel per autumnū adhi
 bita. Malo uictis neque sanguis mitti, neque ueratrum
 exhiberi debet, cum materia neq. ex cute in altum deri
 uari, neque hinc etiamnum minui possit, sed ad uentrē,
 & intestina deducenda est. Medicamentis recorporatis
 tiis utendum, metasyncritica dicunt, quæ summam cutē
 desiccant, astringantq. Leues igitur cucurbitulæ uentris
 ori & præcordiis agglutinabuntur, eadem membra
 etiam dropace delinentur. Modico temporis processu
 su rursus ad superiora reuertendum est, à purgatione
 quam præstat hiera, incipiendo, prætermissa sanguinis
 detractiōe, ut quæ plus noxæ, quàm præsidii esset allas
 tura. Atque hoc circuitu ad ternas uices quaternasue
 per annum uti expedit, uere potissimum & autumnō.
 potare his prodest aceti cyathum, cum cedrini liquoris
 cyatho, & brassicæ crudæ succi cyathis duobus, mista
 dantur mane & uesperī. Vel syderitidis herbæ folia tor
 rida denarii pondere in uini cyatho, uel cornus ceruini
 drachma, & scillitici aceti quantum cyathus implet, quo
 tidie post matutinam obambulationem potui exhibe
 tur. reliqua uero pro ratione temporis his offeruntur, uel
 scillæ lotæ denarii quinq. in mulsā, uel melle, eclegma
 tis modo: uel liquoris cyrenaici ad erui magnitudinem,
 melle & butyro subacti, uel eboris ramenti drachma se
 mis mis cum uini cyathis duobus, uel cumini Aethiopici
 drachmæ tres cū melle, instar eclegmatis. His amplius

5 suuat theriacorum pastillorum denarius in uini primæ
 notæ cyatho leuigatus epotusq;. Similiter etiam scilliti-
 corum pastillorum drachma bibitur. Et calaminthæ
 succum ceu efficacissimum potu auxilium commens-
 10 dant. incipiendum dicunt à cyathis ternis adusque ses-
 nos. Cæterum omnibus his efficacior est theriace ex
 uiperis, tum potui data, tum extrinsecus illita. Cum au-
 tem bestiarum copia datur, nihil æque proficit, ac uipe-
 rarum carnes comestæ, albo iure ex copiosiore aqua,
 15 sale, porro & anetho de coctæ, usque dum spinæ dissol-
 uantur, sed capitibus ipsorum caudisq; digitos quatuor
 prius amputatis, interaneisq; ipsorum cum cute exem-
 ptis. Item theriaci sales eadem per se promittunt, cum
 obsoniis assumpti. Tali enim ipsorum usu accidit, non-
 20 nunquam squamas, uel ceu scabiem quandam ex cute
 elephantorum decidere.

VICTVS RATIO TALIS ERIT.

A somno manu molliter permulceri debent, aluoq; de-
 iecta gestationibus cōmitti, & clamore exerceri. deinde
 25 frictionibus, & uario exercitationū genere uti, nūc sal-
 tu, nunc halteribus & coryco. Postea sudore, quē illinc
 contraxerunt, absterfo delinentur adipe ursina, aut uulpi-
 na, aut hyrcina, aut auis alicuius, aut butyro recenti. pau-
 xillo tēporis interposito in lauacro perungentur succo
 30 fœnugræci, aut ptisanæ cremore, aut ammoniaci momē-
 to, qd̄ aceto subegeris. A balneo deterfi implebuntur
 oleo lentisci, aut cœnanthæ, aut myrti. Vinoq; modico
 cū alumine, uel ammoniaco, ut sordium sit spissitudo.
 Rursus teneris panniculis deterfi dimidia hora cōquie-
 35 scent. Inde potu aquæ ad uomitū sollicitabuntur, digitis
 in os, aut pinnis demissis. post uomitum datur potui ui-
 num absinthites, aut ex origano confectum. Cibus erit
 panis hordeaceus, uel offa ex polentis. Inter olera, beta,
 lactuca, radícula, porrum, brassica aquis binis edulcata.
 adde his capparim. Ex marinis ostrea, sumuntur,
 40 pelorides, erinacei, pectines, tellinæ betis incoctæ

PAULI AEGINETAE

Salsamentum uetus ceu in medicamento uicem adhibe-
 tur. uino per totum morbi curriculum, & uenere absti-
 nendum. At cum uires recreantur, quod fit à purgatio-
 nibus, pauxillum duntaxat uini tenuis & diluti assumi-
 tur. quando & acria sine periculo ingeruntur. Recte q;
 25
 ipsis datur ptisana, oua, chondrus elotus, lac, mel cum
 pane, malua, lapathum, sisarum, piscis molli peditus car-
 ne. Ex iis quæ uolatu fidunt, probis donata succis. Inter
 fructus fugaces, ficus, uua & uue passe. In dulciariorum
 genere, quæ pini nucleis, aut amygdalis frictis constant,
 10
 & cnico, iis conferunt qui bis quotidie cibum capere
 solent. quibus graue est molestumq; semel duntaxat eū
 assumere. Interiorum cura habita, smegmatis in balneo
 utendum ex decocto betæ, aut foenugræci cum aphro-
 nitro, aut sapone, aut myrobalano: interim & psilothris.
 15
 Abstergit itidē portulaca cum aceto detrita, tenue sem-
 per uiuum, lapathi radices aceto incoctæ, alumen cum
 sale. Item sandarachæ par modus ex uino, & oleo leno-
 tisci. Huc spectat medicamentum, ad uutiliginis speciem
 quæ alphos dicitur, accommodatum, ex alcyonio, ni-
 20
 tro, *myrto, sulfure, fici agrestis foliis siccis, cum aceto
 tritum, si illinitur, idem præstat quod ex sepia testa con-
 cremata fit, pumice, nitro, terra cimolia extorrefacta, gū-
 mi, galla immatura pari pondere siccum inspersum, aut
 25
 ex aceto infricatum. Hoc aut mirabiles habet effectus:
 Lapathi radicum fasciculus qui manu cōprehendi pos-
 sit, nitri drachmæ quadraginta, thuris uiginti quinque, sulfu-
 ris tantundem, ex aceto Aegyptio illinitur. Similiter hoc
 efficax est, quod recipit auripigmēti drachmas decem,
 30
 sulfuris ignem non experti drachmas octo, costi drach-
 mas duodecim, calcis uiuæ drachmas quatuor, ceræ to-
 tidem, baccarum lauri aridarum drachmas duodecim.
 Hæc macerantur populi albæ foliorum succo, aut cras-
 so decocto. Vbi mellis spissitudo est facta, illinuntur.
 35
 A L I V D. Radicum lapathi fasciculi duo, aceto in-
 coquantur, & in pilam coniecti conteruntur, Deinde al-

* Aldinū
 exemplar
 habet
 myrrha

cyonii pondo libra, aphronitri pondo uncia octo, sulfur
 ris ignem non experti pondo libra, cochleæ testarum
 combustarum pondo triens, chamæleontis cum radice
 pondo triens. Omnia simul leuigantur, donec sordium
 fiat crassitudo. Deinde illinuntur per æstatem in sole fre
 quenter, hyeme in balneo usq; ad desudationem. Item
 Aesculapii aridum smegma pulchre his conueniet, ac
 omnia quæ communiter explicabimus smegmata, uel
 etiam dicata alphis proprie huc pertinent. quæadmodū
 10 & quæ nunc aduersus illa prodidimus. At turgida cor
 poris tubercula si inflammatione tententur, aut exulce
 rata sint, delinentur lycio Indico, uel glaucio, uel aloe,
 uel Andronii pastillo, aut polyidæ sphragide, Cataplas
 ma ipsis aptabitur chondro cum succo polygonii, uel
 15 arnoglossæ, uel parietaria trita. Insuper melissæ herbæ
 uiridis folia cum axungia tinsa illitaq; mirabiliter pro
 ficiunt. Etenim partes ruborem contrahunt, sed ex facili
 subsident pane applicato, aut cerato ex amygdalino, co
 loremq; naturalem recipiunt. Exulceratis recte accom
 20 modantur emplastra, tum ex diphryge præparatum, tum
 ex uino melinum. Adde supradictis Coracion, quodq;
 constat oxymelite & pastillum Andronii, pompholigē
 & cadmiam. indicium uero est totum morbum mite
 scere, si prima ulcera cicatricem recipiant. Ad spirandi
 25 uero difficultatem eorum qui elephantia laborant, asel
 li humetis in locis degentes, qnq; aut sex, ex aquæ mul
 sæ cyathis tribus potantur. Iam uero quædā ex iis quæ
 ad ægre spirantes inscribuntur, ipsis quoq; communiter
 competunt. Aquarum naturalium usus adhiberi debet,
 30 ceu maxime necessarius, præsertim aluminosarum, fer
 rumq; resipientium. & fieri potest, frigidarum. Confert
 & ipsarum potio, tum marinæ arenæ usus. Eandem ha
 bent efficaciam omnia quæ desudationes mouent. Quo
 niam uero affectus hic, non minus ac pestilentia contag
 35 giosus est, quā longissime ab urbibus ad loca mediter
 ranea & frigida ablegare ægrotos cōuenit: ubi pauci ho

mines uersentur. siq; fieri poterit, inde rursus ad cōfinia migrabunt, tum ipsoꝝ causa, tum illorum, qui, ut uero simile est, ipsis incident. Quippe sic aere fruuntur com-
modiore, & alios hac lue non inficiunt.

DE LEPRO, ET SCABIE, QVÆ
psora dicitur. Cap. II.

VTerq; affectus, cutis aspritudo est pruriens, in qua corpus paulatim absumitur. Originem ex atra bile ambo hæc uitia trahunt: sed lepra al-
tius, circularibusq; erosionibus cutem depascit, & pis-
cium modo squamulas ex se remittit. Psora uero sum-
mam illā corporis cutem exedit, uarias figuras habens,
furfurea magis quā squamosa ex superficie descen-
dunt: in quibus sanguinis dimissio adhibenda est, si cor-
pus succis redundare uideatur. sin minus purgatio cer-
te ex iis quæ atræ bili uacuandæ sunt. Extrinsecus autē
utere communiter utroq; ueratro, calcemq; elotam tor-
ridamq; in ipso usu, aqua diluens ad sordium spissitus-
dinem illinito. A L I V D. Saluæ, oleæ Aethiopicæ la-
chrimæ, singulorum denarii octo, capparis radice cora-
ticis, gummi, singulorum denarii quindecim. Inungun-
tur ex aceto ad solem, proprie uero lepras discit ane-
mona applicata, item uitis albæ radix. Composita uero
hæc, lolii farinæ chcenix, cardamomi albi denarii qua-
tuor, nitri spumæ drachma, attramenti sutorii drachma
octo, hastulæ regie radice mediæ drachmæ quatuor.
Aceto pertrita, & in cerati spissitudinem coacta illinun-
tur, parti prius nitro deteris: ubi solueris (solues autem
tertia die) & frigida aqua elueris, rursus inungentur.
A L I V D. Hastulæ regie radice succi uncia sex, sul-
furis ignem non experti, mannæ, singulorum drachmæ
decem, nitri drachmæ octo, aceto subacta illinuntur.
Ad psoram peculiariter facit ex simplicibus herba pes-
dicularia, staphis agria dicitur, lupini amari, cardamomū
cum aceto lilii radix cum melle, refina terebinthina sul-

LIBER QVARTVS. 164

fur, cicer, caprillū stercus. Inter composita, misy & chalcitis pari modo ex uino humidiores psoræ delinuntur.

ALIVD. Rhododaphnæ tenera folia in olei sextario simul incoquito, donec tabescant. Ac ubi proieceris oleo adiunge ceræ tractæ uncias tres. postquam soluta refrigerataq; fuerint, sulfuris uiui unciam inspergito, ad solem, uel in balneo perungito. nonnulli simul cum rhododaphne etiam scillam coquunt. **ALIVD.** Medicamenti $\delta\iota\omega\ \chi\upsilon'\lambda\omega\ \nu$, hoc est, ex succis herbarum confecti uncia duæ, ceræ tantundem, rosacei uncia, argēti spumæ uncia tres, cerussæ totidem, ligdæ picis uncia sex, helcysmatis uncia duæ, sirici tantundem, aceti quod sic cis leuigandis sufficit. **ALIVD.** Cerussæ uncia semis, amyli tantundem, plumbi uncia, lotariæ rubræ uel anchusæ, uncia duæ, ceræ uncia sex, rosacei uncia nouem. Anchusa probe cum rosaceo coquitur, deinde reliqua adficiuntur. **ALIVD.** Oua decem, uel quot ad usum opus est, aceto quam acerrimo macerantur, quousque putamen ipsorum tenerascat, lutea in eodem aceto coquuntur, leuiganturq; rosaceo, & reliquo aceto etiam argēti spumæ modicum ad sordium spissitudinem coactum illinitur. **ALIVD.** Ouorum quæ in aceto commaduerint, lutea tria, rosacei uncia sex, sulfuris uiui uncia tres, leuigatis prius cum aceto luteis & sulfure, ceratum adificio. Argēti spuma oxyrodino detrita, ut emplastri crassitudo fiat, acriores psoras exterit. Iam uero ex lapatho smeigmata, & ex iis quæ elephantosis faciunt, plura communiter tum ad lepras, tum ad psoras conueniunt.

DE IMPETIGINIBVS.

Cap. III.

Impetigenes ex tenui acrique sanie crassioribus aliis mista contrahuntur, celerrime in scabiem, & lepram transeunt, quapropter remedia ualde siccantia requirunt. Corpore igitur toto,

X iiii

PAULI AEGINETAE

si opus fuerit euacuato, simplicia quidem ipsis confes-
rent, cicer, ueratrum, erinaceus saxatilis, pix cerato, resio-
naq; mista, crocodili terrestres stercus, atque sturnorum
cum oryzam solam ederint. Plerique hoc solo impetig-
ines mentum infestantes aliamve particulam, aboleue-
runt. Tritici multum capitur, incudiq; ignitæ cuiuspiam im-
ponitur, & quicquid inde humoris defluit, calens adhuc
impetiginibus illinitur. Puerorum impetigines, hominis
saliua continue defricantur. His opitulatur pruni gum-
mi illitum. In uetustatem incidentibus uiticis folia cum
aceto detrita applicantur, uel capparis folia similiter.
Composita uero hæc sulfur cum thuris lachryma, aut
cum ammoniaco, subactum aceto illinitur.

PASTILLVS AD IMPETI- GINES.

*Manu
scriptū ha-
bet hemi-
na.

*Hic de
est aliqd
in Græcis

Glutinis figlini denarii quatuor, thuris denarii tres, acetū
*cyathi dimidium, aceto soluta illinuntur. A L I V D.
Chalcitidis, gummi, singulorum drachmæ octo, sulfu-
ris ignem non experti, misyos, singulorū drachmæ sex,
squammæ aris, acaciæ, singulorum drachmæ duæ, aceto
delinuntur. A L I V D. Sulfuris uiui, nitri spumæ, singu-
lorum drachmæ quatuor, cachrys grana sexaginta, les-
uigantur ex aceto. Sola uero pars uitiatā, inungitur, sed
ita, ut quæ integra est, non coingnetur: exarefacta, aqua
frigida eluitur. A L I V D. Veratri albi * singulorum
drachmæ octo, farinæ lupini, buccinorum combusto-
rum, nitri, singulorum chœnix. Arido detergentur. Por-
rò impetigines, quas αἴγες, id est, feras appellant, me-
diocriter siccantibus remediis non discutuntur, acro-
ribus autem irritantur. Adhibere igitur oportet me-
dicamenta abunde quidem efficacia, sed quæ non uas-
lenter erodunt, quale est istud: Glaucii, thuris, alcyo-
nii, bituminis, sulfuris, gummi, singulorum uncia, aceto
inungitur, A L I V D. Picem Africanam cum
aceto coctam liquatamq; illinito. A L I V D.
ad impetigines & pruritum: Atramenti sutorii, sul-

furis, uiui, nitri, thuris, pari modo, in impetignibus quidam, aceto adiecto, in pruritu autem uino utitor.

ALIVD Leichenion, ab impetignibus curandis nuncupatum. Guttæ ammoniaci, erui farinæ, lupini farinæ æquales portiones aceto iilununtur.

DE PRVRITV. Cap. IIII.

P Ruritus qui senibus accidit, ex toto nunquam cōsanescit, uerum lenitur infra positis remediis. in reliquis ætatibus, si ex prauo humore contrahitur, qui nimirum biliosus, aut pituitosus, putris falsusue est, per ipsius uacuationem tollitur. Porro agnoscitur ab ætate, temperamento, uictus ratione, anni tempore, regione, & reliquis his consimilibus. Si igitur in uenis simul cum sanguine redundare uideatur, à sanguinis dimissione auspicandum est: Sin autem qualitate magis uitiosus extiterit, similibus eo medicamentis uacuato, ad exteruam curationem diuertemur. Lauandum itaq; prorsus ieiuno est, nonnunquam & modico cibo sumpto, iterum lauandum: quippe uitium uix inhumescit, detergitur autem, foenugræci decocto, aut betarum, aut fursurum, aut maluæ agrestis & satiuæ, aut ptisanæ. Præter hæc, farinæ etiam fabaceæ, uel lupini, uel glanis unguentariæ, uel smegmatis ex pepone præparati, quod *πρωτόν* appellant, si inueterauerit, lauatio similiter quidem conuenit: fots autem ex saluiæ decocto, myricæ, herbe mercurialis, origani, pulegii, baccarum lauri, cucumis syluestris radice, capparis, cineris lixiui stillicij, muriæ acerosæ. Deinde resparguntur arido nitro, uel cum fœcula aceti, uel quod recipit nitri spumæ sextarium, thuris lachrymæ, sulphuris uiui, singulorum libram, cimolie libram semissem. Vel hoc, Aphronitri, sulfuris uiui, alcyonii combusti, pari modo. siccis utitor, uel cum quodam ex supra dictis decocto. Si autem placeat, etiam ueratrum siccum inspergito, sine pingui addito. Illinitur autem cum oxelæo herba pedicularia contrita, uel sulfur, uel sandaracha, uel omnia, uel sinapi, cū

PAULI AEGINETAE

myrobalani expresso, & oxelæo, uel utere cochleis cō-
bustis, leuigatisq; melle, uel lapathi radicibus, uel smeg-
matis inde confectis, ut in capite de elephantia compre-
hensum est, aut quibusdam ad scabiem efficacibus. Si
autem exulceratio partes exercuerit, parigro, uel diapō-
pholygos appellato medicamine utendum, uel ceræ
*Impres- uncia liquefacta in cyprini *hemina, cui sulfuris adiecta
sū cyatho sit uncia.

ALIUD AD PRURITVS.

Nucum magnarum cutis uncia, sulfuris tantūdem, apii
succo leuigatis utitor in balneo, membra affatim defric-
ans. Hoc solum multis tum scabiosis, tum alio pruritu
detentis, abunde fuit. Item apium per se uiride tusum
infricatumq; in balneo uehementer auxiliatur. Similis
effectus est perdicion & acerna resina cum rosaceo so-
luta, illitaq; ALIUD. Oryzæ puræ & nimis candide, un-
ciæ tres, rusæ cretæq; aceto quamacerrimo leuigantur,
donec sordium fiat spissitudo, adiiciaturq; priuatim sul-
furis uiui detriti uncia. mixtis perbelle in balneo utitor,
diutius defricans. At in iis qui superfluitatibus magis re-
dundant, pari portione illorum temperata, præstantius
remedium reddetur.

DE LEUCA. Cap. V.

Leuce, cutis quædam ad albidius muratio est, q̄ ui-
scosa glutinosaq; pituita contrahitur. Quoniam
uero non quælibet leuce curationem recipit, nos
tas ipsius tales habeto. Ac uer summa leucæ puncta,
sed cute non penitus, si sanguis emanauerit, sanabilis
est: sin lactea humiditas, desperata est. Vel panniculo la-
neo asperiore infricata cutis, si quidem rubicundior e-
uaserit, medicinæ locus est: sin idem color remanet,
non conulescit. Et quæ plura corporis loca obsidet,
leuce, difficiliter tollitur, q̄ quæ pauca deturbarit, item ue-
rustior, quàm recens minus in medicina spei habere cē-
senda est. Nonnulli igitur adustionem, quæ ferramento
candente administratur, in leuca probarūt, sed ita, ut hæc

uel sola ualetudini sufficeret. Alii uero dolorem inde cicatricemq; secuturam ueriti, ut quæ non minus ac leuice indecora sit, medicamentis crustam inducentibus, qualia & cicatricem ait concolorem efficere, usi sunt.

- 5 Alii & horum inefficaciam repudiantes, tincturis uti maluerunt, imposture potiusq; auxilii rationem habentes, quæ sanè omnium maxime uitari debet, quod affectus celeriter renascatur. Itaq; subiectis uti medicinis, consilium est. adarce, cachryos, sulfuris uiui, singulorum paria
10 pondera, tusa & incerniculo priuatim creta, deinde simul cum aceto in pollinem fat multis diebus detrita, in sole illinuntur, non uniuersa, ne cutis exulceretur. Procedente autem tempore, ueratri, & gallæ similiter momentum addilcitur. A L I V D Fici nigræ surculos, aceto
15 imbutos, contritosq; misceto, aphronitri, sulphuris igne non experti, myricæ fructus, pari singulorum modo, ubi nitro cutem defricaueris, in sole perungito, animum attendens ne exulceretur. Archigenes autem fici foliis, calcis uiuæ quod satis est, mixto, similiter usus est, uel in
20 fricatas, inquit, leucas, albo ueratro, donec sudore diffusæ entes reliquo corpori concolores fiant, illinito synopsis de, uel mediade, uel acu transfixa punctas quoad cruor emanet, illinito synopsis de, cum aceto, uel prius absterfis, ut est comprehensum, perungito, ficiliquore recenti, &
25 folio eiusdem affatim infricato.

DE ALPHO ALBO, ET
nigro. Cap. VI.

- 30 **A**lphi cognato leucis modo generantur, sed hæc alius cutem mutant ut pilos quoq; sibi similes procreent. Alphis summam cutem infestant, quā quam & ipsi cum uetustatem sentiunt, penitus recedunt in eisq; albi pili enascuntur idque humoris qui subest ratione. Etenim ex pituita albi ducunt originem, nigri ex atra bile. utrisque igitur commune prodest
35 auxilium, elota calx aqua soluta, aut draconis culi radix, cum aceto illita, simili modo, utrunque

PAULI AEGINETAE

ueratrum eisdem efficax est, item lupinorum amarorum decoctio superflua, eorumque farina, ex aceto, uel oxymelite inducta, iam capparis radice cortex cum aceto, liliique radix cum melle, cepa ex aceto in sole peruncta, crocodili terrestris simus idem praestat, pari efficacia & sturni excrementum, cum oryzam duntaxat ederit, sepiaque testa concremata. Compositum uero hoc praestans est, Alcyonii, nitri, singulorum pondo sextans, ueratri albi, sulfuris uiui, singulorum uncia. Nonnulli uero & floeces uini combustas adiciunt. ALIUD. Sulfuris ignem non experti, nitri spume, singulorum denarii quatuor, cachrys os grana septem, teruntur cum aceto. solum uero alphi perungito, sed ita ut integram partem non attingas. siccatum medicamen aqua frigida eluitur.

ALIUD farinae lupini, buccinorum, & nitri, singulorum chœnix, ueratri albi, drachma octo. Arido pars defricatur. ALIUD. Erui fariæ pondo duo, erucæ seminis, amygdalarum amararum, cucumis sylvestris radice singulorum pondo: mulso simul leuigata delinuntur, & hora interposita per spongiam abluuntur. facit etiam ad ephelidas, uaros, & clauos.

AD ALPHOS ALBOS EXPERTA.

Sulfuris ignem non experti, sextarii duo, calcis uiue candidæ, uncia quatuor, albumina ouorum, quinque olei nardini, & aceti momentum. sulfur primum in pollinem cogitur, mox oleum nardinum ei superinfunditur, rursusque leuigatur, deinde acetum instillatur, & iterum teritur, calcem uero priuatim lotam semel, bis, terve, sulfuri adiciamus, unâ cum ouorum aquato, & denuo conterimus. collectus humor effunditur. pauxillum uero relinquentes, ut unguen queat illini, in hunc modum utimur.

ALIUD Archigenis. Sulfure uiuo, fici foliis aridis, aphronitro, alcyonio, terra cimolia, myrto, ex aceto utitur. ALIUD Archigenis, fici foliorum quæ in umbra exaruerint, sulfuris, aluminis singulorum æqua portio

cum aceto inungitur, aut foliorum fici, denarii quatuor, nitri duo, alcyonii combnstitantundem, aceto in balneis illinitur. Priuatim nigros exterit efficaciter sandaracha cum sulfuris dimidio, sed cute nitro prius defricata, in sole perungitur. albos uero tollit atramenti sutorii, æruginis, æqualis modus, nitri duplicatus sine pingui infriocatur, perungiturq; , uel cachryos, sulfuris uiui, adarcæ æquæ portiones, ex aceto infricantur, illinunturq; , cum inaruerint abluito, locum perfricans. Idē facit & leucis.

AD STIGMATA, EX COM
uentariis archigenis. Cap. VII.

Stigmata curabis, si quod matulæ adhærescit, aceto quamacerimo illinas, uel calcis uiuæ partem unam, nitri tosti fului dimidiam, cum aqua in sole illinito. At ubi exulcerationem fuerint experta, cicatricē tanquam ulceri inducito. Criton uero iubet confricatæ nitro prius cuti terebinthinam illini resinā, linamentisq; colligatam sex diebus relinqui, septima deinde solui, & acu pungi stigmata, & sanguinem qui flueret spongia detergi, interiectoq; breui temporis spatio, tenui sale cōfricare locum. Tum imponi ad dies quinque medicamentum quod recipit, thuris, nitri, cineris lixiui, calcis, ceræ singulorum denarios quatuor, mellis octo. soluto enim medicamento, quod est nigrum, in eo deprehendes. **ALIVD** unguen. Piperis drachmæ due rutæ, singulorum drachme quatuor, sandarachæ, drachmæ quatuor, auripigmētī drachma, mellis qđ satis est, cuti prius nitro infricatæ illinitur, itē aliis priori consimiliter peractis, per triduum soluitur, & nigritie absterfa, rursus inungitur. Exerit enim (inquit) diebus uiginti, tam integre ut nec exulcerationem, nec cicatricem relinquat.

ALIVD quod Criticon dicitur. Thuris drachmæ quatuor, nitri drachmæ dug, atramētī sutorii drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, piperis drachmæ tres, calcis drachmæ tres, thapsiæ totidem, auripigmenti drachma una & semis, sandarachæ drachmæ tres mellis quod

PAULI AEGINETAE

sufficit, utere quemadmodum superiore. Oribasius tradit ranunculum illitum, uel capparis folia stigmata extere. At si altius fixa non discutiantur, leuiter autem ad cutem pertineant, crusta ferramento frigido excitata tolluntur.

DE PITUITÆ ERUPTIONIBVS, quæ exanthemata uocantur. Cap. VIII.

Pituitæ eruptiones, quas Græci exanthemata uocant, ex crassis in cute concretis humoribus, magisq; quum superior pellicula densior est procreantur. In quibus igitur, si altius humorum copia substiterit, primum purgatio tentanda est. Nam si hoc neglecto, prius discutere aggrediaris, obstrues ipsos potius quam per cutem euacuabis. Sin autem nullæ in alto deliteant, humorum colluuiæ, per cutem uacuare oportet, nec procul attrahere, si aluo, aut uomitu uacuationem moliri, sed humorum qui cuticulæ impacti sunt, curationem medicamentis experire, quæ exurunt calfaciuntq; maxime quum latæ sunt eruptiones, siquidem tam frigido, crassoq; humori, huiusmodi dedicata sunt. Lauri igitur tenerorum foliorum, rutæ & mannæ, æqualem, singulorum portionem detritam & lachrymam thuris oleo subactam delinito, uel betam teneram incoctam triamq; inducito, aut ceræ drachmas octo, sulfuris, tantundem, salis drachmas sex. Arida in pollinem coacta, & olei cyatho dimidio superfusa, omnia simul incoquito, factoque emplastro utitor. Sed coctioni sedulo assistendum est, quod uehementer efficax remedium sit.

*Manu scriptum ex emplar octo hæt.

AD EPINYCTIDAS. Cap. IX.

Epinyctides ulcuscula sunt, sua sponte erumpentia, pustularum specie & subrubra, quibus apertis, cruenta sanies defluit, per diemq; non magnopere ex cruciant: per noctem uero, graui magis quam pro ratione ulceris, dolore torquent. Itaque liquor silphii aqua solutus imponitur, nam citra rosionem desiccat, aut citra in leuorem detrita inducitur, aut brassica cruda cum

aqua; aut apium cum polenta trita applicatur, aut alterci folia cum melle pertrita admouentur, aut solanum per se, & cum coriandro uiridi, aut oliuæ foliis utitor cum aqua coctis: aut uuas acinis exēptis, leues, aut uuas pas-
 5 cas splenio illitas imposito, uel adianthum ex melle tritum. Vitari debet acrium, acidorum, & salforum esus, fomenta, balneum, & insolatus.

DE PVSTVLIS, QVÆ GRÆCE
 phlyctænæ dicuntur. Cap. X.

10 **P**ustulæ quæ non sua sponte rumpuntur, sed graui dolore excruciant, acuta perforari acu debent, qua parte humoris colluuiem subesse senseris.

Deinde humore leuiter expresso cutis obducta finitur, donec impleatur. At si uulnus connueat, denuo pustula
 15 perforanda est similiter & exprimenda, tum cutis præposita, seruanda quandiu id quod sub ea exulceratum est, ad cicatricem peruenerit. Priusquam igitur pustulæ erumpant, cocta lenticula, cum aqua leuigata inducitur, uel mali granati uirgulta, cinere calido tepesacta im-
 20 nuntur, & loci attinguntur. Quod si ruptæ fuerint, & ulcus excitatum, adeps suillus liquefactus & argenti spumæ detritæ mistus, in linteamq; illitus admouetur, uel lili radix in aqua cocta tritaque cum cerato imponitur.

AD EPINYCTIDAS ET
 PVSTVLAS.

35 Argenti spuma & sulfur ignem non expertum pari portione cum aceto applicantur, item myrtus in leuorem redacta, sordium illitione cum oleo & uino: benefacit, tum his, tum calidis feruoribus & pituitæ eruptionibus,
 40 gliscentibus capitis ulceribus, furunculis incipientibus & adustis medicamentum, & quod molybdæna, & quæ ouis præparatur.

AD AMBVSTA IGNI.

Cap. XI.

45 **A**mbusta igni medicamentis indigent quæ modice abstergant, non euidenter calefaciant, aut refrigerent.

PAULI AEGINETAE

Itaque terra chia, cimolia, cretica, omnisq; leuis illita cū
 aceto non admodum acris, uel aqua, præclare facit, pro
 hibetq; pustulas excitari, item ouum integrum crudum
 statim impositum, lana molli exceptum, etenim refrige
 rat leuiter & citra rosionem deficcat. idem efficit atra
 mentum scriptorium illitum, uel lachryma thuris aqua
 diluta, uel lenticula cocta tritaq; uel eruus iniicitur. At
 ex aqua calente uestiones priusquam pustule oriantur o
 liuarum halmadum aqua continue superfunduntur, ip
 seq; halmades cum polenta contrite inducuntur, aut a
 lumen scisile, pertritum cum aceto illinitur, aut fel tau
 num cum aqua copiosiore liquatum inungitur, aut lixi
 uium stillatitium superfunditur garo, aut muria fouetur,
 aut bulbi liliorum, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosa
 ceo triti & in sordium spsitudinem coacti delinuntur.
 Marcellus autem hoc compositum tradit. Panniculi
 melle imbuti & hordei succo irrigui combusti; cines
 eis mittuntur drachmę octo, ceruse drachmę quatuor,
 butyri drachmę octo, ceræ, seu caprilli, rosacei, singulo
 rum drachmę sedecim. At pustulis iam excitatis, rhus
 cum polenta tritum aceto applicatur, aut lixiuium cum
 calce uiua cerato mixtum illitumq; linteolo imponitur,
 iam quod spherion dicitur medicamentum, ambustis
 utile est, partes exulcerate porris contritis obducuntur,
 aut portulaca contrita cum polentis, aut columbæ fimi
 linteolo inuoluti combusti & oleo diluti cinere uti
 tor. Mirifice proficit & piceæ, aut rhedæ cortex, aut a
 dianthum aridum, leuigatumq;, aut myrti folia combu
 sta, pertritaq; insperguntur. efficax autem unumquod
 que horum est & si cū cerato componitur, item quod
 rubræ anchusæ radicis sicce & in leuiorem contusæ pō
 do trientem recipit, ceræ tractæ pondo dodrantem, ro
 saci uncias duodeulginti, iam quod cerusa constat cū
 modica cerui medulla, laudatum est remedium.

AD EOS QUI FLAGRIS

cæsi sunt.

Cap. XII.

Cerusa,

Cerusa, argenti spumæ æqualis portio, ceræ quadrupla cum susino, aut rosaceo, emplastri modo inducitur, primo die priuatim susino solo utitor, uel croci drachma, tragacanthi tantundem, ouum integrum, sine eruis unita cæsis imponuntur, item pellis ouis recens excoriata calens adhuc circumdata, quolibet efficacius die uno & nocte perfanat.

QVO MODO PILI ADVSTIS
renascantur. Cap. XIII.

Pili ambustis nascuntur, si fici folia in fictili tosta, cum cerato in emplastri modum imponas, aut fici pinguis drachmis octo, samplici drachma, tritis cum oleo donec cerati fiat spissitudo, utitor, uel de trimenti lapidis drachmas centum, æris squamæ drachmas decem cum aqua subactas in pastillos cogito, in usu partem unam cerati partibus octo diluito.

AD ABRASA, QVÆ APOSTR
mata Græci dicunt. Cap. XIII.

Abrasa & superficiem infestantia ulcera, primum aut uino aut aceto, aut muria acetosa astringes. Deinde medicamentis, ad cicatricem ducendam, utere, tum liparis, tum ex albis emplastris tripheris. Summe autem facit quod cerusæ partem unam recipit, ammoniaci, dimidtam, myrtei quod satis est. Ammoniaco ex aqua in leuorem trito cerusa miscetur, myrteumq; superfunditur: utitor lipara. Vel lapidis detrimento probe eloto, squamam æris admisceto, & myrteo in leuorem coactis utitor, aut cinolia, & argenti spuma, ex uino, cininoq; & myrteo tritis utitor.

AD ABRASA, INTER TRIGE
nes, inueterata ulcera, senilem tene-
neramq; cutem.

Argenti spumæ chrysitidis drachmæ quinquaginta, ceræ drachmæ uiginti, resinæ siccae ex teda drachmæ duo decim, olei sesquihemina. Argenti spumæ oleo incoctæ reliqua adiciuntur: rudicula agitatis, uel etiam in pio

PAV. AEGIN.

†

PAULI AEGINETAE

la emollitis utitur, sed cutem abrasam ab ulceribus non oportet amputare, sed medicamentum ei inducere: sic enim glutinabitur uel nigrescens. At ulceri, quod eroditur sordidumque est si carne nudum hiat, uix cicatrix obducitur. Cæterum abrasa tuetur ab inflammatione, rhu-
50 rubrum, si illinatur leuigatum, cum melle, aut iunci rotundi coma cremata, & cum melle imposita.

AD ABRASA, FLAGRIS CAE

sa, & articularum contusiones medicamen-

tum, quod dolorem leuet ano-

dynon appellatum.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorum uncia decem, ce-
ra uncia sex, olei puri, aut rosacei sesquilibra, amyli un-
cia duæ. Ad eadem ualet Pelarion quoque ex helo-
cysmate quod est stercus argenti, item medicamentum
15 quod ouis constat.

DE FORMICA, ET VER-

ruca.

Cap.

XV.

V Truncus uitium, cutis excresecientia est exigua, cal-
losa, & plerumque figura teres: sed formica, quæ
Græce myrmecion dicitur, latiore basi, & sessi-
lis est, similem mordentis formicæ sensum inducit. Ver-
ruca autem, quæ Græcis uocatur acrochordon, angustius
ore, & pensilis est, ut chordæ nexu suspensa pendere ui-
25 deatur. Hos igitur tumores, elaterium cum sale infrica-
tum tollit. thuris lachryma cum aceto, grossi cum aceto,
farina, & nitro, liquor fici illitus similiter facit, tithymalli,
smaridis caput salsum concrematum, ærugo cum sulfu-
re ignem non experto combusta, ocymi folia cum atra-
30 mento sutorio, sarmentorum adhuc uiridium ustorum
quod distillat simus ouillus cum aceto, hircinum fel illi-
tum, heliotropii magni fructus, cum uino applicatus, ru-
ta cum nitro & pipere, nitrum cum urina pueri uenerè
non experti, stercus bouis gregarii in aceto.

DE GANGLIO. Cap. XVI.

G Anglium neruorum concretio est, ex ictu, aut lassitudine oboriens, in pluribus quide corporis partibus, præcipue uero motui dicatis, nempe manu summa, & pedibus. Quo in uitio Archigenes calcem uiuam unâ cum adipe anserino, & terebinthina, imponendam censet, sæpe uero medicamine, quod lapidem achatem recipit, utitur. At Oribasius, eo quod subsequitur, cerusæ, resinæ piceæ, olei ueteris, singulorum uncia, ammoniaci suffiminis, galbani, singulorum tantundem, ceræ uncia quatuor, aut pilam pensilem plumbo conflata, inquit, crassiore uertebra modo, ganglio ampliorem imposito, deligatoq; pondere si quidem longiori temporis spatio ipsum dissoluit, atq; hoc nos utimur.

15 DE INFLAMMATIONE. Cap. XVII.

O Mnes ex æquo tumores calidos, quibus dolor, feruorq; adest, nostri inflammationes, Græci phlegmonas appellare consueuerunt. Verum pro diuersa quæ ipsos facit, materia, hi quoq; euariant. Cum enim sanguis probus & crassitie mediocris, in particulam aliquam uniuersim confluerit, ac propter copiam impactus inhaerit, inflammatio proprie appellata nascitur. Cum uero flaua bilis in parte aliqua substituerit, herpetem uocant, ubi uero & sanguis, & bilis flaua simul incubuerint, erysipelas excitatur. At cum sanguis, qui influit, calidus impese, & crassus fuerit, carbunculos ouere solet. Itaq; ab inflammatione quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper accidit, incipiendum esse iudico. Tumor rubens, doloris plenus, tangenti renitens, & calidus ex sanguine, ut à me dictum est, probo originem trahit: qui, sanguinem dico, nunc ex toto fertur corpore, nunc in aliquam particulam copiosus incumbit, sic ut à uasis nequeat contineri, exciditq; aliquid roris modo in ampla partium quæ intercedunt, spatia. Est cum uitium hoc uulneribus, fracturis, ulceribus, aliisque pluribus externis causis superuenit. Cum itaque inflammatio res

PAULI AEGINETAE

pente euestigio particulam quampiam sine manifesta
 causa praecedente obsederit, totum uero corpus, parti
 contagium transmittat, uniuersum quidem id, sanguinis
 dimissione, uacuari oportet. quod autem inflammatio-
 nem experitur, superfundere ac illinere medicamentis,
 quae non calefaciant, humectentque; sed illuuiem humo-
 ris repellere sint idonea. At quod iam in affectam parte
 se receperit, euacuatur. Itaque illinitur cataplasma quod
 constat semper uiuo, mali Punici cortice, uino incocto,
 cera, & polenta. hoc & similibus cum dolor uehemens
 non urget utendum est. Vbi uero particula fluxionem
 cum dolore ampliore senserit, ne sic quidem calens aqua
 oleumue adhiberi debet, aut ex farinis cataplasmata, ut
 quae fluxionum uitis omnia sint inimica, doloris tamen
 uehementia leniri eo quod constat passo rosaceo, ceraque
 modica, & lanis sordidis quae oesypi multum contine-
 ant. Per aestatem quidem frigida, hyeme egelida exci-
 piuntur, applicanturque; sed ita ut superiores quoque affe-
 ctis partibus locos, spongia uino austero imbuta, aut po-
 sca frigida comprehendant. caeterum miscentur cum ca-
 taplasmatibus utiliter etiam herbae. Parietaria igitur ad om-
 nem inflammationem accommodata est, tum per initia,
 tum in augmento, consimiliter glaucium, atriplex, mal-
 ua, lactuca, cucurbita, calidis illitae, benefaciunt & tribuli
 utrique inflammationibus ex influxu concitatis. braseica
 uero durescentibus ualet. At ubi immutatio his oboritur,
 nec pus subsidet, curationem tentabis emplastro,
 quod ex chalcitide conficitur, aut quodam persimili flu-
 xionibus dicato, lanam uero puram uino austero im-
 butam extrinsecus medicamento superaccommodabis.
 Atque hac ratione inflammationibus ex humoribus de-
 fluxu contractis medeberis. Eas autem quae occasione cuius-
 dam feruntur acceptae, si calefacias humectesque; non of-
 fenderis, ac si usus quandoque postulauerit, scarificare ip-
 las, conueniens erit. At si ob defluxionem ortas inflama-
 tiones scarificatione diuiseris, praesertim per initia, mala

quoddam haud mediocre ægrotanti accerses.

DE EXTERIORIBVS COR

poris abscesibus. Cap. XVIII.

- Q**Uod si fieri non posse tibi uideatur, ut puris eruptionem impedias, panem hydrelæ incoctum delines, aut farinam hordeaceam consimili præparatam modo. particulam iure radicis althææ incoctæ fouebis. At si tumor ad suppurationem contumax est, aut ægre discutitur, cataplasmate ex ficis siccatis utere: oportet autem ficus dulces pinguesq; incoctas aqua eliquescere, ac ius ipsarum in tenuis mellis speciem cogi, farinamq; hordeaceam adiici, & si quidem tumor subsidet minus ac conuenit, ficus incoques hyssopum, origanumve: si uoles magis intedere, salem decocto iniicies
- 15 diligenter animum aduertens, ne ex siccitate nimia pars in duritiem occallescat. Tale si quando uideris, cucumis syluestris radicem, aut althææ, aut bryoniæ aqua simul decoques, ualentior autem & discutiendo promptior, dracunculi radix est, ipsumq; medicamentum, quod dracunculo constat, ualide huiusmodi uitia disiccit. Non
- 20 nunquam igitur solum hunc decoques, nonnunquam & ficus siccatas admiscebis, farinamq; simul cum adipe. Iam anethinum oleum crudos humores, incoctosq; tumores, & concoquit, & discutit. Item pix duros ac
- 25 crudos tumores uniuersos cataplasmatibus indita concoquit, magisq; liquida. **MEDICAMENTVM COMPOSITVM**, quod abscessus iam coctos expellit, ut subinde pus in splenio reperiatur: nondum uero coctos in totum digerit. Lapidis pyritidis drachmæ
- 30 duodecim, ammoniaci trititantiundem, lomenti drachmæ sex, exceptum pice liquida, pelliq; illitum imponitur. Splenium uero non prius auferitur quam sua sponte deciderit, sed medicamentum non multo ante præparari debet, ut quod confestim siccescat. In his autem
- 35 si tumor non dissipatus fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello diuisa, id ipsum uacuabitur, cura deinceps

PAULI AEGINETAE

adhibita ne oleum, aut aqua admoueat, uerum si uulnus abluere interim oporteat, aqua mulsa, posca, uino & mulso utendum est. Si uero inflammatione conflatur, ex lenticula cataplasma inducitur. ubi illa caret, alio quodam medicamento, quod illiniquat in huiusmodi sectionibus utemur. quinetiam eo quod constat chalcitide. Ceterum super ipsis iniicitur spongia lana uel uisno austerio imbuta, uulneri autem nullum pingue medicamentum accommodatur, quale est tetrapharmacum nam uehementer postulat siccescere.

QVAE ABSCESSVS RVMPIT PANT.

Quoniam nonnulli abscessus ferramento diuidi non sustinent, tentanda sunt & medicamenta, quae ab extrahendo dicta sunt epispastica: narcissi radix in pollinem detrita, & in mulsa cum irino cocta illinitur, uel tenera calami radix, minutim detrita cum melle. quod si dura fuerit, mulsa prius incoquetur: uel aristolochiam cum melle applicato, rumpit autem picis aridae & propolis Creticae par modus, cicatricemque inducit.

DIONYSIA AD ABSCESSVS

mirabilis, item ad mammas & inguina, epispastice, quae per latentes meatus discutit. Olei ueteris, aquae singulorum pondo libra, hydrelaeum incoquitur, mox, aphronitri pondo unciae sex adiciuntur, misyos pondo uncia una uel duae, incoquuntur donec nec manus non inquinent. Deinde miscentur manae, thuris, cerae, terebinthinae, singulorum pondo unciae sex.

AD NERVICOS ABSCESSVS.

Cerae, colophoniae, butyri singulorum libra, picis aridae, mellis, singulorum librae duae, ruginis unciae tres. ALIUD epispasticum. Suffiminis ammoniaci sex librae, cerae, terebinthinae, singulorum triens, sulfuris uiui quadrans: nitri quadrans. Smilicon autem medicamen appellatum, & quod porris constat, ualide tumores iam mutatos rumpit. Quod lini

5 seminis succum recipit, p. cōmode discutit, mutat, rumi-
 pitq;. At mitioribus abscesibus medicamēta cōgruent
 etiam ad parotidas inscripta. Atq; hæc de abscessu, qui
 ab inflammatione emanat. Galenus autē memoriæ tradi-
 10 dit abscessum nulla præcedente inflāmatione constitui,
 quæ ex probo sanguine habeat originem. Statim signis
 dem ab initio, inquit, humor aliquis aliās specie alius in
 parte quadam collectus, vicina illi corpora excoriat tē-
 pore, & à subiectis dirimit. Sane inueniūtur in huiusmodi
 15 abscesibus cum scalpello sunt diuisi, omnigenæ, tū
 humorum, tum solidorum quorundam corporū spes-
 cies. Etenim stercori, urinæ grumo, humori mel referen-
 ti, mucosoq;: ad hæc ossibus, unguibus & pilis, consimi-
 lia corpora reperiuntur, imo & animalcula subinde in-
 20 uenta omnibus prope quæ ex putredine subnascuntur
 simillima. Præterea in abscesibus potissimum inuetera-
 tis, qui ex humorum decubitu prouenerint, colligi tra-
 dit, quæ lapides, arenas, testas, ligna, carbones, lutum, sor-
 des, amurcam & faciem repræsentent. Quare absolu-
 25 tior exteriorum maxime corporis abscessum significa-
 tio compendiose tradenda est, tum eorum qui medica-
 mentis discuti nō possunt. Abscessus itaq; est carniū seu
 partium carnosarum, nempe musculorū, uenarū, arteria-
 rum corruptio, mutatioq;. In genere abscessuum non
 30 nulli tunica comprehenduntur, ut atheromata, steatoma-
 ta, melicerides. Alii sine tunica constituuntur, quæ gene-
 ris uocabulum usurpant, unde sermo hic noster pro-
 cedit. Porro abscessuum generationem plurima parte
 inflammatio præcedit, de qua disceptatum est. Interim
 35 protinus ab initio, quemadmodum nuper diceba-
 mus enascuntur. Comites abscessuum sunt, igneus
 loci feruor, tumor eminens, ruberq; magis ac antea,
 durusq; cū dolore punctorio, pulsu, & gravitate, ut aliis
 quid ex particula suspensum esse uideatur. Quod si ue-
 40 ro locus insignis extiterit, febris accedit & rigor inor-
 dinatus, noctu potissimum dolor fatigat, & febricula.

Est cum inguinis inflammatio, proximis in glādulis exci-
tetur. Vbi uero abscessus in totum fuerit absolutus,
magna parte decrescit, punctus obueniunt pruriginosi,
& leuiter stupidi, tumor in mucronem magis fastigiatur
tactu lenis, cedensq; superficies in uertice auellitur. Dis-
co autem hæc de his qui foras rumpuntur. Si igitur uel
medicamentis, uel sua sponte rupti fuerint, emmoto me-
dicamine, curationem tentabis, parte iam pure uacuata:
sin aliter accadat, aperire ipsum in eum modū oportet,
quem in chirurgica explicabimus.

DE GANGRÆNA, ET SPHACELO.

Cap. XIX.

Cum inflammatio, neque discutitur, neq; in pus
mutatur, sæpe in gangrænam, & siderationem,
quæ Græcis dicitur sphacelos, incidit, de quibus
iam sermonem instituimus. Gangrænas enim appellant,
cum membrum aliquod ob inflammationis, qua con-
flictatur, magnitudinem emoritur: neq; iam confirma-
tas sic dicunt, sed quæ etiamnum sunt. Eius mali uis est,
ut nisi celerrime succurras, facile affecta pars, quatenus
uita comprehendit, mortis habitum repræsentet, &
hominem iugulet. Vbi uero membra sic uitiata in totū
sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangræna,
sed iam siderationem nuncupant. Quin et ossibus hoc
mali accedit, cum caro ipsis circumdata, praua scatens sa-
nie, ipsa hac imbuerit, ac putredine consumpserit. Cum
itaque membrum ex toto, uita, sensu, motuq; priuatum
est, confestim præcidi oportet quam proxime sanè par-
ti. Gangrænam uero curamus, sanguine ex parte uitiata
affatim emisso, uel enim uena incisa sanguis corruptus,
cum uena amplior in ipso membro appareat, detrahen-
dus, uel cute totius corporis diuisa, multis altisq; plagis
ubi uero sanguinem emanare permiserimus, medica-
mentum aliquod putridis consecratum induci debet,
quale est, farina erui, aut lolii, aut lomentum ex melle
acetofo. Quod si ualentius imponere cogites, salem

LIBER QVARTVS. 173

adiicito, aut pastillum Andronis, aut eius generis aliquē
 Faciunt ad gangrænas, & uetustæ nuces : cortex autem
 ipsas expurgat: item liquor tithymalli tempestiue & me
 diocriter adhibitus. Opitulatur ipsis & lupinorum amaro
 5 rorum decocti ius inspersum. Nonnulli uero ubi putris
 dam partem præciderint, quo securius mali radicem eo
 uellant, candens ferramentum adigunt. in quibus sale
 cum porro utendum est. Vt autem crustæ citius decia
 10 dant, cataplasma deinde accommodatur ex pane, uel
 hordeacea farina uel triticea ex hydrelæo incocta. Item
 cephalicum aridum ex melle, tetrapharmacum, & Ma
 cedonicum ut appellant, utiliter imponitur. Jam panis
 cum apio tritus, aut ocymo, sic iris, uel panax, uel aristol
 15 lochia, uel acorum cum melle, uel thus crustas probe
 separat. Idem præstat Macherionis medicamentum, &
 Ifus linamento illita ex melle. In teneris autem corpori
 bus abunde est etiam erui farina ex melle.

EX ORIBASII COMMENTARIIS

ad gangrænas.
 10 Æruginis rasæ, rubricæ, aluminis scissilis, singulorū par
 modus, aqua detritus gangrænis illinitur, scalpello uno
 diq; exasperatis. Item lolii farina cum radícula & sale,
 nonnunquam etiam aceto. uua passa acinis uacuata, cū
 cortice ex sale & oxymelite. Ad hæc nucum iuglandiū
 15 medulla, myrti folia uino incocta, tritaque ex melle, radi
 cula cum aceto, crustas etiam ad ossa usque rumpit.

DE HERPETE. Cap. XX.

Cum bilis flaua nullo infecta humore excreta in
 particulam quāpiam decumbit, malum herpes
 30 nuncupatur. Si quidem substantia crassior sit, acris
 orq; totam cutem adusque carnem subiectam exulces
 rat, uocaturq; herpes exedens. Si uero tenuior & minus
 acris calidaque, pustulas exiguas, per summam cutem
 milio similes excitat, ob quam similitudinem, herpes
 35 miliaris dicitur. At Oribasio authore, pituita cum flaua
 bile mista, miliarem herpetem creat. Corpore igitur

PAULI AEGINETAE

toto medicamine quod ducendæ bili est, euacuato, loco affecto refrigerantia siccantiaq; inducuntur, principio capreoli uitis, rubi & plantaginis applicantur. postea uero lentacula his miscetur interim, & mel & polenta. Item cataplasma siue semperuiuo, quod ad inflammationes ex confluxu inscriptum est. Verum exulcerata pastillis inunguntur passo, aut uino tenui & austero non ueteri, aut posca diluta subactis, inducitur & glaucium, eique consimilia ex aqua. nihil autem remittente morbo, aceto dilutum admouetur. succo autem plantaginis, aut solani, aut uino soluta medicamina magnifice auxiliantur: aut lini semine torridum oleo uinoque incoctum, in quo leuore redactum imponitur: aut terra cimolia, solani subacta succo pungitur: & argenti spumæ uncia .ii. porri succi septem cyathi, betæ succi tantundem, leuigata illinuntur: at inueteratis iam huiusmodi ulceribus. Musæ pastillus & Andronius efficax est. **ALIVD** Ad herpetem pustulosum. Recrementum plumbi ex uino austero leuigatum illinitur, superiniciuntur betæ folia uino incocta, uel ceræ triens, myrtei uncia sedecim, stercoreis plumbi triens, uino diluta illinuntur: at ubi id quod serpit repressum fuerit, cerato ex recremento utitur, aut lente cocta cum melle partem repleto. Ad herpetem uero qui sub cute affligit, recrementum plumbi, rutæ leuigatæ succo excipitur, aut ceratum myrteum in uicem rutæ. **ALIVD.** Lanæ ueteris illotæ circa tedam combustæ drachmæ duodecim & semissis, ceræ drachmæ uiginti quinque, recrementi plumbi drachma, seui caprilli curati lotiq; ex aqua drachmæ uiginti quinque myrtei uncia quinque. **ALIVD** ad herpetas acute despascentes, corii mali Punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantundem, lanæ illotæ tedæ combustæ adhaerentis drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, cerussæ drachmæ octo, thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, uino aut myrteo excipiuntur.

LIBER QVARTVS. 174

DE ERYSIPELATE QVI

sacer ignis dicitur. Cap. XXI.

- G**alenus tumorem ex feruente & tenui sanguine conflatum priuatim quidem & proprie erysipelas, qui sacer ignis Latinis dicitur, appellauit.
- 5 Cum uero nec plane biliosa, nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mista, utique ab eo quod in mistura superat nomen uitio indidit. Etenim ubi sanguis excollebat inflammationem erysipelaceam, ubi bilis flaua præpollet, erysipelas inflammatum dixit. Vtro autem modo dicas, nihil adeo ad præsidiorum usum interest. Id uero scire oportet erysipelata quæ capiti potissimum oboriuntur, plus facessere negotii, adeoq;
- 10 esse periculosa ut nisi efficax consequantur auxilium, interim quoque affectos strangulent. Quod simul ac fuerit deprehensum, protinus ab initio uena in cubito præsertim humeraria debet incidi. sin autem hæc non appareat, ea quæ se conspectui obicit. At si quid sanguinis dimissionem impediat, purgatione utendum ex medicamento quod bili ducendæ est. Hac
- 20 sane & in aliarum partium erysipelatis uti, uel clysteriis efficacioribus oportet, tum ipsis illinere quæ influentem materiam refrigerantium uirtute repellunt, collectam uero, calefacientium mediocriter & humectantium digerant, priusquam particula liueat, aut nigrescat, adhibita semper cura ut perliquida inungantur, ita ut frequentius immutentur, primis per spongas bene tinctas ablotis, siquidem multus particulae feruor celeriter in uaporem erumpens, hæc desiccet. Cæterum res
- 30 quirunt erysipelata per initia, ut dixi, quæ refrigerent cum humiditate, non astringant: quale est semperuiuum, portulaca, psyllion, lenticula palustris, seris, cucurbita solanum altercum, lactuca, glaucium, item apium, & rhamni folia per se uel cum pane illita, item ceratum ex aqua admodum frigida. His miscetur etiam opii aliquid, lachrymæ papaueris, cicuta & mandragoræ. Iam com
- 45

PAULI AEGINETAE

posita medicamenta inducuntur, fietq; ceratum, cera tra-
cta rosacei quadruplo admixto ex oleo immaturo sine
sale confecto: his in pila emollitis, aqua frigida super-
funditur, quantum potest recipi. Si uero aceti tenuis &
pellucidi momentum temperes, prestantius medicame-
tum hablturus es. Item polenta cum herba quadam fri-
gidiore ex iis quas enumerauimus affatim membrum
refrigerant. Idem efficiunt palmulae pingues cum horu
aliquo mixtae. Ad haec pars etiam delinetur cerusa, uel
terra cimolia, aut figulari cam solano, aut argenti spuma
cum rosaceo, aut chalcitide cum oleo passoq; aut ceru-
sa cum aceto & lycio, item acacia cum aceto. Cum fer-
uor remittit utendum simplicibus quidem, sulfure uiuo
& menta cum oxyrhodino, aut ruta cum absinthio, ace-
to & oleo, aut argenti spuma cum porri & betae succo.
compositis autem, priuatim in capite hoc pastillo. Argē-
ti spuma, cerusa, croco, sulfure ignem non experto, o-
pioque cum passo. Communiter autem omnibus, mi-
nio sinopico, chalcitide, misy tosto, ærugine, atramento
sutorio, alumine scisili pari pondere ex aceto utitor.
ALIVD. Sulfuris uiui, cerusae, opii, acaciae paribus
singulorum portionibus, ex aceto. Cataplasma ad sacrum
ignem, herpetas, abscessus, parotidas & ambusta. Al-
thae nouellae foliorum tenerorum pondo: cocta in hy-
drelæo perbelle teruntur, adiectoq; rosacei triente, argē-
ti spumae, cerusae singulorum unciis duabus & semisse,
iterum leuigantur cum succo coriani, aut semperuiui, aut
solani: deinde micis panis adiunctis ut emplastri formā
induat, illinitur. Hoc autem emplastro utitor quod reci-
pit recinini pondo, myrtei pondo, unguenti quincuncē,
argēti spumae trientē, æruginis rasae sextantē. Ærugo &
argenti spuma aceto leuigantur. Ceratum ad erysipela-
ta & ambusta. Cere tractae pondo triens, rosacei pondo
quadrans, oua sex, perdicii herbae pondo triens. Vbi ue-
ro inflammatio membri conquieuerit, aut uetustatem

polenta est imponendum. Quod si liuor iam occupauerit cute scarificatu incisa, cataplasma induci locusq; perfundi plurimum ex aqua calida dulci debet, sed & marina & muria interim conducet, quinetiam ipsi cataplasmati talis aqua, uel acetum, uel acetosa muria misceatur. Deinde commemoratis medicamentis compositis cura adhibita uti licet. Nam si inflammatio remaneat, aut in pus, aut in putredinem conuertitur.

DE PHYMATE, BVBONE

& phygetlo. Cap. XXII.

AVthore Galeno, bubo, phyma, & phygetlon, glandularum affectus sunt: bubo quidem inflammatio, phyma autem glandulae inflammatio ad suppurationem spectans. Aliorum uero quorundam sententia communiter omnes, qui à natura abhorrent, ceu timidi abscessus, quancunque corporis partem obfideant, phymata appellantur. Siquidem Hippocrates in hunc modum scribit: Quibus phymata urinarum meatum exercent, hi abscessu in uomicam erumpente liberantur. At bubones qui prolapsu, aut aliis ulceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo uacant: febribus autem superuenientes, qui plurima parte ex pestilentiali lue solent incidere, deterrimi sunt, siue femora, siue alas, aut ceruicem inuaserint. Verum priores initio, quemadmodum inflammatio quaelibet, auxiliis repelluntur, quæ refrigerant, astringuntq; uel spongiis ex posca impositis uel lani oleo crudo uinoq; imbutis, uel rosaceo, uel melino, uel lentiscino, uel myrteo, deinde iis quæ digerunt utendum. At si corpus uniuersum succis æquabiliter redundet, prius ipsum uacuari conuenit, ubi iam inanitum est, ulceris in quo id prouenerit, cura haberi debet, sicuti in capite de ulceribus explicabitur. Glandula si inflammatione tentetur, lani oleo quodam laxante, irriguis, recte lenitur totumq; ipsis membrum inuoluitur. Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non prompte diuidere, sed medicamentis quæ cerati specie

PAULI AEGINETÆ

referunt, digerere nitentur, cuiusmodi potissimum est
ex apyrano confectum. Item quod ab herbis dicitur
botanicon, si per hæc non discutitur rumpere adgre-
mur, aliorum abscessuum modo, similiterq; illis mede-
ri. In iis autem qui ob febres aut omnino humorum
abundantiam procreantur, cauere debent repellentia, ne
materies penitus detrusa cursum repetat, sed ab iis quæ
digerunt statim curationem incipere consilium est. Si
autem nihil prohibet, nempe aut ætas uult uirtus, san-
guis prius è cubito dimittetur, deinde loco fomenta in-
ducentur ex decocto chamæmeli aut anethi, aut eius
generis alicuius. Reliqua medicamentorum sylua, ma-
xime ex iis quæ tertio uolumine ad parotidas dicta
sunt, transferenda est. Item ex illis quæ nuper contra in-
flammationes prodidimus, quemadmodum etiam phy-
gethli curatio, tum hinc tum ex remediis erysipelati ac-
commodatis petetur. Aster atticus herba quam & bu-
bonion, quasi dicas inguinarium, ea ipsa de causa uo-
cant, non solum illitus sed etiam alligatus, bubonibus
auxiliari creditur. Phymata autem priuatim discutit a-
dianthum, si illinatur, atriplex, parietaria althææ radix ui-
no incocta, ammoniacum cum melle molitum indus-
tumque, uiscus cum resina ceratoque. Rumpit autem
abscessum propolis, lupini amari ex aceto illi, cucumis
syluestris radix terebinthina excepta capparis radix si-
militer, nitrum cum fermento aut ficis.

DE FVRUNCULO, QVI

dothien appellatur. Cap. XXIII.

Fvrunculus tumor est abscessum præ se ferens,
qui ex crassis humoribus in carnosissimis plerunque
partibus concipitur, mitis quidem, cum in sola cu-
te coit: perniciosa autem, malignusque, ubi subtera-
tis radicibus in superficiem erumpit. Dissipat au-
tem furunculum ac concoquit, triticum commansum
& impositum: mastiche ægyptia, uinæ passæ quibus
acini sint exempti cum sale tritæ, ac illitæ, hunc disciunt

aut rumpunt, uel siccae fici hydromelite incoctae impos-
nuntur, uel resina ficis mista inducitur, uel ipsae ficus
cum fuerint, pingnes dissectae, uel fermentum cum
nitro, uel lini semen cum melle, uel alterci folia, tri-
ta cum butyro. Composita uero haec proficiunt, quod
ex fermento quod polline farinaceo constat, & quod
priuatim à furunculo Graece dicitur dothienicon, for-
menta autem adhibentur ex spongiis mollibus consue-
calenti aquae intinctis, deinde sic medicamenta
iniiciuntur.

DE TERE B I N T H O.

Cap. XXIII.

ORibasius terebinthum sane phymatis speciem
esse asserit, super quam pustula nigra emineo-
at: hac rupta id quod subiacet desquamato si-
mile apparet. ubi scalpello diuiseris, pus deprehendi-
tur. Dioscorides autem Alexandreus literis man-
dauit terebinthos cutis esse excrecentias, rotundas,
nigrouirides, terebinthi fructum referentes, atque has
aliis phymarum tumoribus similiter curari censet: auxi-
lia ex supra comprehensis huc transferenda.

DE C A R B V N C V L O.

Cap. XXV.

Cum sanguis in atram bilem conuersus inferues-
censque aliqua se parte receperit, carbunculus
fieri solet, quod uitium plerumque à pustula
ambustis consimili, interim uero & sine hac incipit.

Cæterum inter initia, quibus hoc malum instat, parti-
culam omnino scabunt, unde pustula, nunc una oritur:

qua rupta, ulcus cum crusta gignitur: nunc plures erum-
punt, milii seminis modo exiles: quibus perruptis simi-
liter crustaceum ulcus prouenit, quale ferramenta
candentia excitant, modo crusta ipsa cinereum co-
lorem, modo nigrum præferente, sic ut inferiori
carni continua adhærescat, & quodam modo affixa
sit cum erosione. Reliqua autem caro circumposita,

In feruidam peruenit inflammationem, quā Græci phlogosim appellant, & colore nigrescit, splendētq; bituminis & picis modo. talis autem est bilis exacte atra. Verū carbunculi, qui in carne radices egerint, confestim circūscribuntur: qui membranas, nervosq; occupant, diutius remanent, luemq; subiectis corporibus impartiunt, ut etiam inflammationes quæ erysipelatis naturam respiciant, in ipsis excitentur. plerisque itidem in suppurationē conuersi sunt. multis febres accedunt. Iam uero carbunculi ex causis populatim grassantibus excitantur. Cura-
tio ipsorum, nisi admodum fuerint exigui à uacuatione sanguinis è uena ad animæ defectionem usque dimissi, tentanda est: mox scarificatus recte accommodatur plagis ob succi crassitiem altioribus: particule laboranti inducuntur, quæ modice reprimunt dissipantq; . tale est cataplasma, tum quod ex plantagine conficitur, tum quod ex discocta lente constat, scilicet, mixta panis furonacei mica. Esto autem panis, nec omnino à furfure purus, nec nimium eius habens, super ipsum uero ulcus ualens aliquod medicamentum imponitur, cuiusmodi est Andronis, Pasionis, & Polyide, diluiq; id uino alioquo dulci, ad sordium spissitudinem debeat. Item malsalioticum aridum, uel & ipsum similiter dilutum. Item radix dracunculi, uel aristolochiæ, uel liquor silphii, uel cirenaici, singula ex aceto probe delinentur. At quæ erysipelutis naturam referunt, supra comprehensis ad id uitii remediis perungentur. Quæ uero partes consortii lege affici putantur, succidis lanis ex œneleō madefaciendæ sunt. Vbi iam ardor acquieuerit, carbūculis iniiciuntur cerata cephalica, animeræ, emmota, generosissimum est quod herbis, tum illud quod nitro constat, item arida ulceribus depascentibus dicata, per se, & cū rosaceo. Cum autem durities remanet, utemur melino Serapionis, operam adhibentes, ut quàmcelerrime carbunculi in uomicam erumpant. Quod quidem fiet, si die bis, noctu semel, tum cataplasmata, tū medicamēta
mutes.

mutas. At quo radicitus carbunculos diuellas, dirimasq; ab adiacetium commercio, malum Punicum, acidum, minutatim concisum in aceto coques: ubi intabuerit, in leuorem deteres, linteoque illitum induces: cum siccescit, aceto humectabis. Item nucis auellanae ueteris, uel etiam non ueteris medulla carbunculos maturat rumpit. Hoc praestant & cupressi folia, tum germina, nouelli & molles galbuli cum polenta, uua acinis uacua, ficus siccae uino incoctae, papaueris ceratidis flores, liquor sulphurii, cum ruta & mellis momento, pix liquida cum uuis passis, & suillo adipe.

AD CARBUNCULOS VE-

hementer efficax.

Argenti spumae libra, olei ueteris libra & semissis, auripigmenti uncia. Oleo cum argenti spuma dum manus non inquinet incocto, sublatoque ab igne, auripigmentum adlicitur, rursusque medicamentum coquitur donec nigrescat, tritis in pila utitur per linamenta filiatim carpta.

AD GANGRENAS, VLCERA
uetera, chironia strumas, podagram: prius
uatim uero ad carbunculos, ac eos
qui palpebras infestant.

Opil, acaciae, misyos tostae, squamae aris, singulorum *
drachma, atramenti sutorii drachma, alterci seminis
drachma, tritis ex aqua utitur, probe facit & tetra-
pharmacum quod quintam thuris partem con-
tineat. Aduersus naturalium carbunculos, chalcitidis
atramenti sutorii, singulorum drachmis octo, aphros
nitri drachmis duabus. ex aqua tritis utitur. Valet
stercus quoque ouillum, torridum cum melle. In
Alexandria Serapiade quod orchis & triorchis dicitur
uiridi, cum micis panis, cataplasmatibus modo utuntur ad
carbunculos, omniaque crustosa. Vbi crusta exciderit, com-
munis ulceris modo curabis.

DE CANCRO. Cap. XXVI.
PAV. AEGIN. Z

* Aldus
habet dra-
chmas
duas.

PAVEL REGINETA

Cancer in qualibet corporis parte oriri consuevit, siquidem in oculis, & uulua, quemadmodum in ipsorum capitibus expositum est, aliisque pluribus particulis, sed precipue in foeminarum mammis accidit, quoniam natura fungosa & inanes, crassissimam atræ bilis, unde hoc uitium contrahitur, materiam possunt excipere. ex eo enim humore cum reserbit, prima uisum hoc rudimenta accipit. atque si acrior illa fuerit, cum exulceratione. Quapropter colore magis quam inflammationes nigricant, sed ita ut tantam caliditatem non experiantur. Venæ autem quæ circa sunt intumescunt, intendunturq; cancri animantis pedum modo, unde & appellationem hanc uitium est sortitum. Nonnulli uero inde sic nuncuparunt, quod distillamine ab his partibus quas obsederit, euellatur, quemadmodum cancer aquaticus animans. Hoc malum plañe propter succi crassitiem nō confanescit, utpote quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, tamq; maleficum, ut mitiora negligens remedia, uehementioribus irritetur excandescatq;. Prima sane cancri rudimenta prohibere, ne aucescant, licet, si melancholicus humor prius uacuetur, quàm in affecta particula radices subter egerit, impactusq; sit, uacuatione quidem primum tentanda est, sanguinis dimissione, mox purgatione, per initia quidē ex simplicioribus petita, quale est epithymon* quatuor uncis & s. in sero lactis, aut mulla exhibitum. Deinde ex hiera, quæ nigru ueratrum recipit. Loco autem dolenti inductum subsequens remediū, sine dolore facit exulceratis: solani succus linteo molli duplici eum tincto imponitur. Extrinsecus lana molliuscula & ipsa succo imbuta circūdatur, cura adhibita, ne hæc ficescant succo, continentius suffuso. Iam uti diutius poteris in cancris exulceratis medicamento quod pompholyge constet. Nec inepta sunt, quæ tertio uolumine de uulua cancris prodidimus.

*Forte
drachmis
quatuor.

AD CARCINODE, MALIGNA

que ulcera, tum ad sedis eminentiam, natura

liumq; uel testiculorum, uel mam

marū inflammationes.

- 15 In plumbea pila cochleario plumbeo lemniam spha-
gidem ex posca, & mulla, uel lacte conterito, ut nigres-
cat: uel rosaceo, uel immaturo oleo, succove semperui-
ui, uel cotyledonis, uel lactuca, uel psillii, uel acoris tri-
tam similiter inungito. Crebrior uictus agro dabitur, pti-
20 sanz cremor, lactisq; serum, ex oleribus malua, atriplex,
bletum, cucurbita, piscium saxatiles, omnis generis aues
præterquam palustres.

ARCHIGENIS AD CAR

cinode, & cacoethe ulcera.

- 25 Cancrorum fluuiatiliū crematorum, & cadmiæ par-
modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancrorum
cinis unā cum cerato inducitur, item erysimi semen des-
tritum cum melle accommodatur.

DE MOLLI ET LAXO TV

- 30 more, qui œdema Græcis dicitur.

Cap. XXVII.

- 35 CVM de tumoribus qui succis calidioribus cono-
trahuntur, disputatum sit, iterū de contrariis age-
mus, ab eo quod Græcis œdema dicitur, exor-
40 fi. Quemadmodum enim ex biliosa fluxione, erysipe-
las, ita ex pituita, œdema latus quidam atque indolens
tumor excitatur. Equidem scimus aliter quoque œde-
mata prouenire, nempe in pedibus, in subter cutem a-
50 quæ affectibus, habitū corporis cōtabescente, q̄ phthoe
Græce dicitur, & malo, qui cachexia. Atque in illis qui
dem tumor hic * affectus qui hominem premit acci-
dens est, nullam seorsum, curationem propriam postu-
lans. Satis enim est, si quidem curatione egebit ipsa tum
60 crura perfricare oleo cum sale, aut etiam oxyrhodii
no sal habente. At si ex pituitoso humore in particu-
lam influente œdema constitit, abunde quandoque
70

*Metho-
dus. Galeo
ni pro
πρὸς ἡέ
πλῆθος
sed uetus
translatio
cū Paulo
conuenit.

PAULI AEGINETAE

est spongia posca imbuta, cum ligamento leuiter strin-
gente imposita, quæ ab inferiori parte incipiens, supra
finiat. Esto autem spongia, modo cōductura sit, recens,
si huius copia non est, eam, cuius erit, detergebis, expur-
gabis q; nitro, magisq; aphronitro, & cinere lixiuo qui
distillauerit. Quod si per hæc tumor nō subsideat, pau-
lulum aluminis iniicies. Inouamq; spongiam admoue-
bis, si noua non datur. commodum est mollissimum
ellyphnion, posca madens impositum: bonū est, & glau-
cium. Quod si in uetustate œdema inciderit, parti oleo
prius inunctæ spongia ex lixiuo imponitur, eiusq; uiol-
entiore arctatione curatur. discutit autem, ac comprimit
tumores laxos cedentesq; quælibet terra illita, magisq;
Aegyptia, tum isatis satiuæ.

DE INFLATIONE. Cap. XXVIII.

INflatio ex flatuoso spiritu nunc sub cute, nunc sub
membranis, quæ ossibus circūdantur, & musculos,
*aut uiscus aliquod includunt, collecto, enascitur.

Porro is colligitur. Inon paucus. aliquando in uentre
& intestinis, itemq; in medio horum spatio & membra-
næ, quæ peritonæos dicitur, ut in aquæ subter cutem ge-
nere, cui nomen est tympanias. Differt quoq; hæc œde-
mate, quod pressa digitis non retinet uestigium, & soni-
tum tympani modo edat. Membrorum autem dēfitas,
tum spiritus simul crassities efficit, ut idem spiritus non
dissipetur. Vnde curandi ratio huc dirigenda est, ut mē-
bra rarefacies, crassioremq; spiritū extenues, quod me-
dicamenta tenuissima & potestate calida præstant: atq;
in uentre quidem & uisceribus oleum tenuius quod ru-
tam habet incoctam, aut aliquod ex calidis seminibus,
qualia sunt: cumini, apii, & *petroselini. Interim uero &
cucurbita iustæ magnitudinis citra cutis incisionem um-
bilico bis terve defixa, inflationem discussit. Muscu-
lis autem ex contusione, quemadmodum appulsu in-
flatis particulas calidis nimium, & acribus excandesce-
re contingit. Quare per initia medicamenta quæ ma-

Id Pau-
lus nō ha-
bet, sed
est apud
Galenum

* Non est
apud Pau-
lū, sed ex
Galeno
adiectum
Galenus

* Additur
Galeno

gis leniant adhibenda. Vbi facta est inclinatio, ea quæ digerunt. Utendum igitur decocto illorum, cum olei momento, quod lanis succidis calentibus excipiat, uel etiam ceratum ex œsypo admiscetur, cura adhibita ut caliditas permaneat, frigus enim non conducit. Vbi iam æger lenitus sopitusq; est, acetum admiscetur & nitrum, aut aphronitrum. deinde & cinis lixiuæ qui distillaauerit. Postremo emplastris utendum quæ discutiendi uim habent, quo inflatio subsidat, quale est quod sequitur, sordes gymnasiarum subferuefactæ percolantur primum, ut puræ euadant, & rursus lebeti iniiciuntur, tria q; calx Lrestincta J farinæ modo etiam inspergitur, dum luti fiat spissitudo, ac in usum conditor. Hoc est Galenus uiua. efficacius est medicamentum ex lycomoro compositum.

DE LVXATIS ET CONTUSIS. Cap. XXIX.

Articulis luxatis contusisq; faciunt lanæ succidæ, aut spongia oxelæo imbuta impositaq; ite bulbi elixi, ulticisq; tenera folia cum melle, sal, nitrum tostum, leuigata cum cerato inducuntur. Iam si perfusio aquæ dulcis, aut marinæ calentis utiliter adhibetur. Vbi uero inflammatio, & dolores conquerint, eluxatæ partes etiam recte perfriquantur.

DE CARNE CONTUSA, ET sanguinis subtercutem coitu, quod Græce ecchymoma dicitur. Cap. XXX.

Carne à graui quodam corpore, quod extrinsecus superinciderit contusa, uenisq; exiguis indidem diuortium expertis, sanguis profunditur, ut solet cum tunica uenarum rarefacta transcolat, quæ diapedesis Græce dicitur. unde id quod ecchymoma uocatur, sub cute collectum nascitur, cute inquam, intacta, tanquam tumor tactu mollis & cedens committatur liuidus, & magna ex parte indolens. eo igitur animo tendimus ut sanguinē qui continetur dissipemus,

PAULI AEGINETAE

Idq; confestim priusquam nigruerit. Per initia sane non
nihil ex astringentibus, iis quæ digerunt, admiscere oportet, eo quod tunica uenularum contusæ densationem
requirant: inde etiam solis digerentibus utemur, ac sca-
rificationis initio ecchymomatis, ita subsequenter curatio-
nem accommodabimus. Ad inueterata autem ecchy-
mota, radica illitu prodest. Quippe discutit ea ubi
erodere inceperit, aut radica succus, cum micis panis
inductis. Cæterum ecchymomatis species sunt, sugilla-
ta, & liuores ex ictu, hyposphagmata dicuntur, item san-
guinis inter ungues concursus ex percussu proueniens,
de quibus priuatim tertio uolumine dictum est. Verum
de unguum uitiis, in parte chirurgica differemus.

DE RUPTIS ET CONUUL- sis. Cap. XXXI.

Ruptio cum ecchymomate prorsus accidit: cu-
ratur autem medicamentis mediocriter calefa-
cientibus, quale est ex nigris populis acopon,
aliaq; huic cõsimilia. At altioribus rupturis magis acria,
magisq; incidentia ac dissipantia recte accommodan-
tur. Talibus sane & cucurbitulae usus proficit. Ergo si
euocatum celeriter per halitum ecchymoma totum
est, facile dehiscens ipsa caro coalescet. Sin longiore
spatio fordes copiosa succreuerit, ruptum deinceps coi-
re non potest, sed tantum prope ipsius labra admoien-
tur, quo fit ut leui momento ea facile separentur, & me-
dius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur, ni-
hilq; aliud, quàm assidue nouum quodammodo ecchy-
moma creetur, primo persimile, nisi quod extenu-
gis sanie nunc constat, cum per initia è sanguine ecchy-
moma esset, ideoq; facilius nunc quàm prius, digerit-
tur. Conuulsum autem fibris quibusdam lacescitis distra-
ctisq; leniri tantum desiderat, quoad dolor sopiatur,
quippe conglutinari nequeunt. Itaque aristolochia ro-
tunda ruptis conuulsisq; si quid aliud, idonea est: simi-

liter centaurei maioris radix eiusq; succus, rheum, cod
stus, bdellium cum oxymelite potum.

DE SCIRRIS. Cap. XXXII.

EXactus quidem scirrus, tumor est præter naturã,
sensus expers & durus: non exactus autem uix
sensilis est. ac qui sensu uacat sanari non potest:
qui ægre sentitur, uix sanescit, si quidem humor unde
huiusmodi uitium contrahitur glutinosus crassusq; est,
qui particulis induratis impactus solui contumaciter res
pugnat. Est cum statim ab initio prima rudimenta con
cipit augeturq;: plerumq; uero à medicis qui erysipe
lata & inflammationes uehementer refrigerauerint astrin
xerintq;, originem sortitur. Quod si quis ea quæ ualem
ter trahunt digeruntq; medicamenta, partibus scirro ob
ductis admoueat, huic paucis primis diebus, manifesto
scirrus decreuisse uidebitur. cæterum quod de affectu
restat, id reddit insanabile. siquidem toto quod in eo
subtilissimum erat dissipato, quod reliquum est desicca
tum, ceu lapidosa concretio relinquetur. Quapropter
nullum uehementer excalfaciens siccansq; medica
mentum est idoneum, sed ea tantum, quæ præter quod
molliant, digerere etiam commode possunt. Huius au
tem generis sunt medullæ omnes, magisq; ceruina &
uitulina. Ex adipibus commendatur, leonina, pardas
lis, ursina, deinde taurina. Inter aues anserina & gals
linacea & phasianica, ficciorq; caprilla & hircina. Ad
hæc ammoniacum suffimen, bdellium maxime scythi
cum, styrax qui humentior est & pinguis, ac Aegyp
tiaca mastiche. In aliis sane particulis scirrum expertis
his seorsum utendum est, tum iis quæ inde com
ponuntur. uerum in tendonibus & ligamentis in
hunc modum, lapis igni candens, aceto acerrimo
extinguitur, & si quidem haberi potest, pyrites: sin
eius copia non est, molaris, in quo pars affecta com
moueri debet, ut uaporem ascendente recipiat,
atque inde rursus medicamen quod emolliat imponi.

Z. iiii

tur, oleo tamen tenui non aqua quotidie ab initio. per totum morbi curriculum pars affecta perfunditur. Interea oleo althææ radix ac sylvestris cucumeris incoquitur. A balneo autem in totum ægri abstinebunt, uel certe copioso, sed posteaquam scirrus emollitus fuerit, amoniacum pinguisimum aceto quam acerrimo liquidum particulæ sat multis diebus inungitur. Deinde rursus emollienti medicamine utendum, quod receperit galbanum, & opopanacein, eaq; pinguisima. eiusmodi uero sunt potissimum, ex petasone confectum, & quod ad Amythaonem refertur, & strumis dicata medicamenta.

DE STRUMIS. Cap. XXXIII.

Strumæ glandulæ sunt induratae, quæ in ceruicæ, alis & inguinibus maxime nascuntur. Curatio earum, cum illa quam in scirris tradidimus communis est. Priuatim uero lupinorum amarorum farina ex oxymelire cocta illinitur, ea quoque phymatis proficit: uel bouillum stercus aceto incoctum delinito, id est tumores scirrosos omnes dissipat. probe autem discutit strumas calx, mel le, uel gymnastiorum sordibus excepta, uel oleo, uel adipe sullo: aut calcis nitriq; par modus, cardamomi & foenugraeci quadruplus cum melle, malagmatis modo impositus duritias digerit, in pus conuersas rumpit. liliacea farina cum fimo colubæ & semine lini uino incocta, grossi sylvestres, aut satui, aut cardamum album detritum cum pice liquida malagmatis forma applicatur, aut cucumeris sylvestris radicis sicca, lauri foliorum siccorum concrematorum cinis cum terebinthina induratur, aut pediculariæ, & nitri æquale pondus, erui ea duplum cum resina iniicitur, aut stercus caprillum bouillumve aceto incoctum, aut erui farina in urina pueri impuberis macerata excepta, pice, cera, & oleo liquefactis, aut anguem mortuum in ollam coniecto, gypsoq; oblitam in fornacem mittito, concremati cinerem æquali foenugraeci pondere misceto,

melle excepto utitor, item quod aspidibus constat me-
dicamentum, mirificæ uirtutis est, tum quod ex struthio
conficitur, tum quod cucumere syluestri, tum quod ces-
drio liquore conficitur: strumas ad suppurationem perducit

5 aut diffundit hoc, myrrhæ drachmæ decem, ammoniacæ
et thymiamatis drachmæ septem, uisci quercini drach-
mæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drach-
ma, in pila contunduntur. Ad strumas mammarum du-
ritiasque proficit subscriptum medicamentum, uisci e-
laborati, resinæ siccæ, ceræ, singulorum pondo, galbani
10 quadrans.

AD STRUMAS EX ULCE

ratas, & sine ulcere.

Ceræ, resinæ pityinæ, adipis suilli insulsi, marrubii, ærugi-
nis rasæ, singulorum selibra.

15 MEDICAMENTVM AD

strumas, quod dicitur cheradicum.

Olei ueteri, pondo dua, ceræ pondo, colophonis triēs
nitri tantundem, allia duodecim membranis detractis in
20 oleo per triduum macerantur. deinde cocta cum inta-
buerint, proiciuntur, eliquatis oleo postquam ab igne
amoueris, nitrum tenuissimum inspergitur: rumpit etiā
abscessus. A L I V D. Cineris è ficu uncia duæ, alumio-
nis scissi uncia, aphronitri tantundem, picis liquidæ un-
ciæ septem.

25 EXEDENS CHERADICVM.

Aluminis scissilis, sandarachæ, singulorum drachmæ
quatuor, squamæ æris drachma, auripigmenti tantundē
arido strumas conspergito, at si canceri naturam induer-
30 rint, rosaceo maceratis bis die utitor.

DE STEATOMATE, ATHEO

romate, & meliceride.

Cap. XXXIIII.

35 CVM hæc quoque inter abscessus, quemadmo-
dum in illis dicebamus, habeantur, singula proo-
priam appellationem à similitudine rerum quæ

*Exemplar Aldi
nū habet
duas

PAULI AEGINETAE

In tumoribus continentur, sortita sunt. Alii siquidem ipsa
 forum ueluti pingue quidam seu adeps subest, alii mel-
 li simile quippiam, alii quasi tenuis pulticula. Consilium
 igitur curationis est commune, ut quod tunica illa con-
 tineat, discutiatur, aut medicamentis totum exedatur, aut
 sectione auferatur. Quidam enim ex iis tumoribus, tri-
 plici hac ratione curantur, ii nimirum qui liquidiores
 humorem continent, qualis est meliceris: aliqui duplici
 tantum ut atheroma, quod & sectione auferitur, & medi-
 camentis exeditur, steatoma uero nec discuti, nec exedi
 potest, sed manu duntaxat curatur. Quomodo autem
 unumquodque horum agnoscas, in parte chirurgica eo
 docere. At medicaminum, quae dissipandi uim ha-
 bent, materiam, ubi actum est de strumis, reperies. Prius
 tum uero meliceridas hoc dissipat, uuae passae acinis ex-
 emptis triginti, squamae drachmae quatuor, parte fo-
 mentis prius nutrita imponitur. ALIUD. Ladani, bdello-
 lili, galbani, ammoniaci, thymiamatis, propolis, terebin-
 thinae, singulorum aequalis portio in pila contunditur:
 facit etiam strumis, parotidibus, furunculis, phymatis.
 At Archigenes contra meliceridas commendat aphro-
 nitrum & ueratri partem duplam, cum cerato duriore
 impositam, exedentibus autem, cute tuberculis circun-
 data, uti non licet. Hac igitur prius meliceridas athero-
 mata, uel etiam strumas medicamentis adurentibus de-
 gere oportet, simplicius illorum est, quod recipit calcē
 uiuam, saponem & cinerem lixiuae stillatitium. Varium
 autem magis, quodq; reconditum seruari potest, capit
 calcis uiuae denarios quatuor, foecule uini combustae, ni-
 tri liquidi tosti, singulorum denarios duos, minii dena-
 rium, cinere lixiui stillatitio teruntur: ubi mellis liquidio-
 ris crassitudo facta est, ter feruefacito, ut mediocrem co-
 sistentiam habeat, pixide plumbea reposito, lixiuam
 super destillans ne subito exarescat, ualet quoque ad uer-
 rucas, myrmecias, pterygia, clauos, callos, cicatrices sup-
 crescentes, facula bimestri non uetustiore cutem delini-

Impres-
 sum exē-
 plar hēt
 octo.
 *Impres-
 sum Aldi.
 exēplar
 hēt tres.

to: ubi arescere inceperit, sponsia elotam rursus per
ungito: ubi nigruerit, denuo abluēs medicamentis cru
stam inducentibus: postquam autem crusta deciderit,
exedentia adhibentur. Medicamentum exedens ualide
5 citra rofionem: Squamæ æris drachmę quatuor, sanda
rachæ drachmæ duæ, ueratri nigri tantundem, cum ro
faceo utitor. ALIUD. Squamæ, sandarechę, urticæ se
minis torrefacti pari mensura cum rosaceo utitor.

ALIUD. Erynaceorum combustorum, sepia testæ, aus
10 ripigmenti, æquale pondus ex rosaceo: quæ ambiunt
partes orbiculatim omnes prius delinito cerusa cum o
leo. Item efficax est compositio ex calcis uiuæ illabo
rata partibus duabus, chalcitidis parte una, auripigmen
ti parte una.

15 DE FAVIS. Cap. XXXV.

Fauis qui Græcis cerion dicitur, tumor est qui in
cute foramina habet, per quæ humor crassitudi
nem mellis referēs excernitur: recte igitur ipsi im
ponuntur uuæ passæ cum ruta, aut fici folia mollissima
20 cum melle, aut cardamum cum lini semine ex melle,
aut cucumis domestici radix cum melle, aut sulfur uinū
cum cerato, uel terebinthina. Cæterum uariam magis
fauorum curationem molire, si quæ tertio uolumine
de manantibus capitis ulceribus dicta sunt, in hunc loc
25 cum transferas.

DE SIMPLICI VLCERE. Ca. XXXVI.

Quoniam simplex ulcus continue solum est di
uortium, si quis partes diductas fascia orbicula
tim circumdata committat, utique citra aliquam
30 atiam molitionem coalescent. Cū uero alterū ulceris os
in obliquum spectauerit, inde deligaturam tentare & in
contrariū ducere oportet: cum utraq; illius labra eo uer
gant, à duobus principiis incipiendū est & ora sic addu
cenda. Nam cum nihil intra oras inciderit, nempe pilus
35 aut arena, aut oleū, aut sordes, aut id genus aliud, omni
no ulcus concreset. quod si magnū sit, adeo ut diducte

partes in totum prædicta deligatura committi nequeant, futuris ipsæ adducentur, deinde sic deligatæ, glutinatoriis, ut uocant, præfidiis utemur, quæ collectam humorum subluuiem deficcare & consumere queant; aliam, ne influat, prohibere.

QVÆ VLCERA GLUTINANT
nare possint. Cap. XXXVII.

Roboris folia illita ulceribus glutinandis sunt. Itē salicis, brasicæ, oleaginis fruticis quæ chamælea dicitur & fructus & folia & cortex, succusq; anterioris plantaginis, papyrus posca aut uino imbuta & in orbem circumdata. Recentia ulcera glutinant piceæ & tedar folia, cortexq; recens ligamenti modo circumdatus cum aqua aut posca aut uino, caseus recens leuigatus: extrinsecus imponuntur, folia lapathi, aut uitis, aut betæ, aut lactucæ. At ex acido lacte caseus qui oxyga lactinus dicitur, uulnera quoque ampliora committit: pyra syluestria quæ achrades dicuntur fluxionem reprimunt, equisetum si illinatur, neruos quoque præcisos iungit, isatis satiuia in duris corporibus ulcera etiam si musculorum capita affligant, idem præstat, cupressi folia, germinaq;, & nouelli galbuli mollesq; duris corporibus proficiunt, sed miscendus est araneus, qui circa molas agēs farinam euolantem excipit, in pollinem detritus, myrrha cum aqua illita, uel lachryma thuris, terræq; lumbrici uel neruorum præcisiones glutinant, pentaphylli folia cum melle, allia combusta illita. Inueteratis ulceribus e contrario prodest hordeum combustum cum cerato. Cerusa autem cum myrtei cerati triplicato pondere. Ad capitis ulcera ualet, myrrham aridam inspergere non madefactam, quippe celeriter contrahit, uel aloen aridam, uel aristolochiam tritam & melli & uino incoctam dum mediocris fuerit spissitudo in linteum illinens applicato. Composita autem ad glutinandum sūt Barbara, Chryse, medicamentum Nicolai. Item quod salicibus, quodque dictamno constat, atque alia his

LIBER QVARTVS. 183

confimilia, quæ magnis potissimum uulneribus glutinandis sunt.

SI DOLOR ET INFLAMMATIO

ulcera exerceat.

Cap. XXXVIII.

SI dolor & inflammatio uulnera obsideat, usus est medicamentorum, quæ desiccant, atque inflammationem arcent. Ex liquidis igitur laudatissimum est uinum, deinde posca. Si uero sordes quoque cum inflammatione occupent, mulsæ diluta conuenit. Ex iis autem medicamentis quæ siccandi potestate prædita sunt, communiter quidem cōferent, inflammationibus dicata, si oleosa acriæque excipias: priuatim hoc proficit, malum Punicum dulce uino incoctum tritumq; illinitur, mirabile nimirum & multiplici usu commendatum est remedium, facit enim tum ad capitis, tum naturalium ulcera, tum ea quæ toto corpore excruciant, oculorumque inflammationes. At si erysipelas, aut eiusmodi quippiam ulceri accesserit, iis utendum præditiis quæ aduersus illa inscripta sunt.

SI MATVRARI, ET AD

suppurationem perducere nequeant.

Cap. XXXIX.

Recentia quidem ulcera, & quod inflammatione adhuc occupentur, non suppurantia, concoquit maturatq; ex simplicibus, aqua temperata superfusa, farina triticea, uel chondrus, uel panis, uel glutinū librarium, cum terebinthina illitum, item cera, crocus, lachryma thuris, pix, rosaceum, adeps suillus, uittulinusq;. Inter composita uero tetrapharmacum quod linteolis illinitur, rosaceo subactum. Vetera autem & callosa maturant, simplicia quidem uua passa domestica, styrax, galbanum, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrum, mastiche Aegyptiaca, & hyssopum. Composita uero ex recinino, dictum aceron, id est, absque cera, quod ad Galenum authorem refertur, si linteolis illinitur, oleo

PAULI AEGINETAE

ueteri aut recinino solutum, item quod à duplici colore
dichromon dicitur, pari modo & basilicum, similiaq;.

DE CAVIS VLCERIBVS.

Cap. XL.

CAuum ulcus carnem quæ periit restitui postulat.
cuius generadæ materies opifexq; sanguis mo-
deratus est, & probus. Huius igitur mediocritatē
ex alimento sufficienti conciliabimus, temperiem uero
probam ex bonis ciborum succis, & proba particula in
quod ulcus est temperatura. At ex recremento tenui, hu-
midum ulcus redditur, ex crasso, sordes coalescunt, eo-
que mediramentis eget quæ modice siccant, purgantq;.
Eiusmodi sunt lachryma thuris, hordeacea farina, eruor-
umq; fabarum lomentum, iris, aristolochia, cadmia, pa-
nax, & pompholyx. Quod si nihil medicamentum ad-
creandam carnem inductum proficit, ad aliud sic digres-
diendum est. At si plusculum sordis sit, humidiusq; ul-
cus, sciendum uenit medicamentum intra modum des-
sicasse, intendendumque esse ipsum mellis nixtura: sin-
purum & absque humore cernitur, ultra, ac conuenit os-
leo pleniore dilutum ceratum inducere. Accidit nonnū-
quam carnem à medicamento ualentiore consumi, ut
sordidum humidumq; ulcus appareat, quemadmodū
ex iis quæ minus ac par est, desiccant. Verum hoc ul-
cus dum consumitur, cauum magis euadet, labris præ-
tumidum, rubens præterea & inflammationis particeps
sæpe uero æger manifestam erosionem percipit. Alter-
rum illud quod à parum siccantibus remediis humescit
nihil horum succidaneum habet. Putrida igitur ligna, &
potissimum quæ moderata astringendi abstergendiq;
uirtute donata sunt, quemadmodum & ulmus, purgant
ulcera, pura q; iam facta, carne replent, uel anemione ap-
posita. item piceæ cortex derasus, tritusq; cum cerato
lindeolis illitus, cavis ulceribus auxiliatur, & præsertim
recentibus, ut quæ carne destituta reficiat, repleatque.
Composita uero, ubi pura quidem sunt ulcera, accom-

modantur, quod ostreis constat, quod Manathoni ad-
scribitur ex uini fœcula, quod ex aloë conficitur, quod
melitera appellatur aridum, & quod amyli, mannae, ali-
ca, erui, pares portiones recipit. similea quod è thure
confit, & aphroditarium. Sin autem sordibus magis sca-
teant, cephalica appellata arida conueniunt, & quæ lin-
teis illinuntur, ut Trophos dictum, Isis, Athene, ex atra-
ctilide præparatum, Italicumque, & quæ experientia
comprobauit.

QVÆ SORDIDA VLCERA

purgent. Cap. XLI.

Sordida ulcera siue caua, siue plana fuerint, pbe pur-
gat aristolochia cum melle, terebinthina cum pari
rosaceo & melle, uel loco rosacei butyro, iris illyria-
ca ex melle, oliuæ colymbades illitæ. Ad ea uero quæ
neruosis obueniunt, terebinthina cum butyro liquefac-
ta: sordidis nimium & depascentibus benefacit marru-
bium cum melle, hoc etiam crustas deiicit. Composita
autem remedia hæc sunt, amurcæ coctæ, mellis despu-
mati, aluminis phorimi, hoc est, liquidum, paria pondera.
A L I V D. Serapiadis herba, quæ & triorchis dicitur,
sicca, iridis illyricæ, marrubii sicci, aristolochiæ, singulo-
rum drachmæ octo, erui farinæ drachmæ decem, ari-
doutitor & cum melle. Insuper ad sordida ulcera fa-
cit tum Ægyptia, tum ex sale cerata liquefacta, tum In-
dice, tum Athene, tum uiridia diluta. Ad hæc, quod pu-
mice constat, & ex eruo sicca, pastillusq; nigro uiridis si-
militer etiam Criogenes appellatus.

AD VLCERV M VERMES. Cap. XLII.

Ad uermes qui in ulceribus procreantur arcen-
dos, primum quidem est ut humiditatem pus-
tredinemq; eorum opificem tollas. Cæterum
necant uermes communiter quidem, omnia quæ ad-
aurium uermes inscripta sunt. Ad eos autem qui ulcera
infestant, Archigenes commendat cerusam poliumq;
pari modo cum pice liquida illitum.

PAULI AEGINETAE
QVOMODO CARO VLCERIBUS

bus supercrescens exedatur. Cap. XLIII.
Supercrecens ulceribus caro medicamentis, quæ
ualenter exiccant tollitur, cuiusmodi est diphryges
inspersum, squama æris, omniaque testacea com-
busta, & erinacei concremati utrique cum toto corpo-
re. Verum hæc modice purgant, & supercrecencia con-
tinent. Asia uero petra flos, ualidior est, hoc magis so-
ri, chrysocolle, chalcitis, misy: combusta minus rodunt:
item æris flos, similiter ærugo omnibus est ualentior,
sales autem concremati, humentes cum infirmitate car-
nes consumunt, sic etiam linamenta carpta è panniculo,
muria aciori imbuta & resiccata, quæ si imponantur,
mediocres carnum supercrecencias exedunt. Ærugo,
cum æris squama inter ea refertur quæ ualide reprimunt.
Composita rhodia (ut dicitur) arida, psaron, ad hæc xā-
thon, sine morfu retinet. At maximas carnum excrecē-
tias, adusque penitiora crustis obducunt, pastilli Faustia-
ni, triti inspersiq; & medicamentum, quod à solis æstu
heliocæes dicitur, aridum. Adde his quod recipit calcis
uiuæ squamæ æris, & manne, pares modos. Idem ea q
nimium excreuerunt, fungisq; respondent, cum melle
purgat: cum cerato, carne replet.

ARIDA COMPOSITIO AD

carne compescendam.
Argenti spumæ, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, sin-
gulorum æqualis portio. ALIUD uehementer reprimē-
s citra rofionem, ualet quoque ad pascentia ulcera,
& præsertim gingiuarum uitia, quas epulidas uocant,
ne non ad dentium candorem. Calcis uiuæ pondo, au-
ripigmenti selibra, hoc auripigmentum, inquam, ex a-
qua detritum calci uiuæ, cadmiæ modo lotæ adlicetur:
in puluerem redactis siccis utitor: ex pastillis autem, tū
qui Pantolmius dicitur, tum qui ad polypum inscripti
sunt, pulchre coercent, sic emplastra uiridia & præcipue
id quod ex sale cappadocico præparatur, similiter, & isis
summe

summe carnem supercrescentem in ulceribus continet.

DE VLCERIBVS SERPEN

tibus, & putridis, & phagedæna.

Cap. XLIIII.

- S**uperfusiones utiles sunt ulceribus depaſtis, putridisq; ex aceto, poſca, aut uino aſtringente, aut aqua frigida, aut marina, aut decocto lenticulæ, malicorii, balauſtii, lentis, myrti, ſpinæ ægyptiæ, aut aliquo ex iis quæ aſtringunt & ſiccant. Cataplaſma his ipſis exhibitur ex farina erui, alumine liquido, panis filiginei mica, gobio ueteri, aut alio ſaſamento ueteri carnis illotæ, terebinthina liquida pari pondere detritum, uel ariſtolochia, uel reciniorum foliorum ſuccus æqualis, æruginis pars dimidia, ex aqua ut mellis ſit ſpiſſitudo illinitur: ſi cruſta non deciderit, elaterii parem modum ærugini admifceto. putridis efficax eſt ſori ſi tritum inſpergatur. Et ſuper linamenta carpta arida, uel ariſtolochia rotunda, uel gallæ, æquo pondere cum oleo illinuntur, uel cucumis ſylueſtris radix, uel braſſicæ, uel betæ, uel lapathi folia illigata calidis cineribus reconduntur. Vbi uero emollita fuerint, cum ſale trita imponuntur, ualenterq; repurgant: uel oleæ ſummitates in uino decoctæ cum melle illinuntur, uel chalcitis applicatur, uel apii ſemen contritum, uel lini ſemen læuigatum, cum atramento ſutorio inducitur, uel thymum, uua paſſa, & ficus indecoctæ applicantur, aut ſici folia in læuorem tritum cum melle, aut nitrum, cuminum, & farina ex melle, aut cucumeris ſylueſtris radix, aut ſcilla cocta ex melle, aut ſoreos drachmæ duodecim, chalcitidis drachmæ decem miſſyos drachmæ quatuor, cum dimidia aceti accerri mi hemina, læuigantur donec areſcant: exceptis uteris, ſpecillum intingens, ac ulceri circumadigens ſuperq; duplex linteolum ex cæneleo imponis: ſi inflammatio ne ſint occupata, altercum cum polenta, aut braſſicam cum melle delinito.

PAV. ÆGIN.

AA

PAULI AEGINETAE
AD PVREDINES QVAMLI

bet partem occupantes, & ulcera
quæ depascunt.

Calcis ulug, chalcitidis, singulorum denarii duo, auripig
menti denarius: hoc quoque ad digitorum pterygia &
phagedænas efficax est. Item naturalium carbunculis
cum melle utiliter adhibetur. In reliquis uitis arido uti
tor, super splenium ex resina inducito.

AD OMNIA QVÆ DEPASCUNT
ulcera, quæq; os infestant, item sanguinis pro
fluuium, & carnem excrescentem, ari
dum compescens, longe uti
lissimum.

Chalcitidis, misyos, utriusq; crudi, denarii uiginti, squa
mæ ferri denarii * sex gallæ immaturæ denarii octo.

AD SERPENTIA VLCE
ra & putrida.

Salis drachmæ duodecim, aluminis qualiscunq; cōbus
sti drachma, squamæ, pumicis cōbusti, singulorum par
modus: ualet & ærugo rasa cum misyi combusto, pice
liquida excepta, squamaq; ferri cum oleo.

AD VLCERA PVDENDO
rum depascentia.

Hæc & meliterion, nomis proficiunt. Item ex acuta myr
to, & ex charta medicamen aridum omnibus nomis
efficax est. Accedit huc coracion ex oxymelite, pastilo
lus Andronis, & qui huic respōdent. Eadem uero hæc
medicamenta phagedænis quoq; congruunt: nam &
ipsa ulcera sunt quæ depascunt, exeduntq;.

AD FLACCIDA ET CVM IN
firmitate humentia ulcera foetidaq;.

Lemnia sphragis ex aceto, uel oxymelite, uel posca, uel
uino subacta, ad luti spissitudinem illita benefacit, aut
cupressi folia, germina & galbuli teneri, aut cucurbitæ,
aridæ concremata cinis, aut platani corticis combusti,
aut anethi cremati similiter, aut lanarum sordidarum

In exē
plari ma
nuscripto
textu decim

ustarum, aut plantago, aut isatis per se, uel cum polenta, uel peucedani radix arida.

QVOMODO CICATRIX VL
ceri inducenda sit. Cap. XLV.

- S**Umma ulcerum caro cuti similis efficitur, induciturq; ei cicatrix, si illam desiccemus astringamusq; adeo ut non solum id quod præter naturam redudat discutiat, uerum etiam quod secundum naturam est, attingamus. Idonea ad hoc sunt, galla imatura modice exiccans, tum quæ citra astrictionem rosionemq; siccant: eadem quoque cicatricem inducunt, ueluti myrrha, argenti spuma ostreaq; concremata. hæc namq; si inspergantur, arida sæpe cicatricem inducunt: piceæ cortex cum cerato myrteo, hederæ flos cum cerato lili radix cum rosaceo, resina ex picea arida, pumex tostus, squama æris pari portione siccis utitor, idem etiam resprimit: uel pumici trito, mannæ & diphrygis singulorum miscens paululum, utitor: uel argenti spumæ partem unam, diphrygis dimidiam cum cerato instar splenii impones. Vetera autem ad cicatricem ducit uiscus, cum lachryma thuris, ærugo cum diphryge æquali, ceratoq; myrteo: uel centaureum minus recens illitum. At humidiora cyperi radice illinito: sedis autem naturaliumq; ulcera, præsertim si inflammationem experiantur, aloepersanat læuigata arida: uel ex aqua: aut squama æris, aut chrysocolle in sole cum cera emollita inducitur.

ARIDVM AD CICATRICEM
INDUCENDAM.

- O**streorum drachmæ duodecim, mannæ drachmæ sex, cadmiæ drachmæ quatuor: facit & nomis. ALIVD. Aristolochiæ, drachmæ sex, piceæ corticis drachmæ sex, mannæ tantundem, pumicis, colophonix, iridis, singulorum drachmæ quatuor. ALIVD. Cornus ceruini combusti drachmæ quatuor piceæ corticis uncia sex cerusæ uncia quatuor, æruginis rasæ uncia nouē, cadmiæ drachmæ octodecim. ALIVD. Cytinorum, atramenti

AA ii

PAULI AEGINETA

tutorii singulorum drachma sedecim, squama æris, alu-
minis scisili singulorum drachma octo, gallæ drachma.

* Aldus
hæt uncia
octo.

A L I V D. Cerusæ, argenti spuma, singulorum * dra-
chma octo, recrementi plumbi, gallæ, myrrhæ aridæ,
singulorum drachma quatuor.

AD CICATRICEM INDU- CENDAM.

Aluminis scisilis uncia, trita in aque sextario maceratur;
ubi solueris, aqua linamenta imbuïs, & siccatis uteris.

EMPLASTRUM AD CICA- TRICEM INDUCENDAM ex simplicioribus.

Ceræ denarii quadraginta, argenti spumæ denarii trigin-
ta quinque, diphrygis denarii octo, myrtei hemina di-
midium: efficax est his quoque palmulatum, quod
phoenicine dicitur, item ex cadmia, tum myrsinatum, &
consimilia. Ad ea uero quæ cicatricem uix recipiunt, ce-
ræ myrtei, singulorū drachma sex, cadmiæ uncia sex,
plumbi, thuris, singulorum drachma duæ, aluminis scis-
ilis, æris combusti singulorum * drachma æruginis ra-
sæ drachma duæ: die interposito soluitur.

* Aldus
unciam le-
git.

DIV INVETERATIS ET AGRÆ AD CICATRICEM uenientibus.

Cadmiæ, chrysocollæ, aluminis scisilis, singulorum drachma
octo, æruginis, squamæ æris, singulorum drachma, resio-
næ pityinæ drachma quadraginta, ceræ drachma cen-
tum, myrtei quod satis est. A L I V D. Ceræ, resinæ pi-
tyinæ singulorum * uncia sex, cadmiæ tantundem, chal-
citidis crudæ uncia tres, myrtei quantum satis est: uino
laeuigatur cadmia cum chalcitide, cum caniculæ sidus
oritur: latiore utere splenio, quod platysma dicitur: sup-
id linamentum carptum & spongiam ex uino inducito.

* Exēplar
scriptum
hæt uncia
tres.

A L I V D. Aeris combusti, aluminis scisilis, singulorū
uncia duæ, salis ammoniaci drachma duæ, ceræ uncia
sex, colophonæ tantundem, myrtei uncia duæ, arida in
sole diebus uiginti ex aceto leuigantur, ubi mellis facta
fuerit spissitudo, cera eliquata refrigerataq; emolliendo

miscetur. Valet etiam ad hæc medicamentum ex pumice, item Isis, & id genus alia.

DE MALEFICIS VLCERIBVS

dolosisq; cacœthe Græci uocant, alias chironia & telephia. Cap. XLVI.

- I** Nueterata & quæ uix cicatricē recipiunt ulcera, alii chironia appellant, ceu Chirone medicinæ peritissimo indigentia: alii telephia, q̄ in tali ulcere Telephus cōsenuerit. Inspiciendum igitur uenit, num & totū corpus uitioso redundans succo, huiusmodi fluore ulceri transmittat, ac qui superat humor, cōuenientibus uacuari debet remediis. Si uero uarix cruribus ulcere infectis illum impertiat, et hic auferri debet, sicut in parte chirurgica explicabitur: aut uenæ sectione ipsos uacuabimus, abunde sanguinis detrahentes, deinde loco inducemus auxilia, q̄ sine morfu reficiēdi uim habent. simplicia igitur ex pumice, diphryge, squama, æruginē, calce mediocriter lota: alumen scisfile tritum inspergitur: hyssopi drachmæ quatuor, uuæ passæ tātundē, nitri drachmæ duæ, loco prius melle illito applicantur: squamæ æris drachmæ decem, aluminis drachmæ duæ, cum ceræ drachmis decem emollitis in sole, imponuntur.

COMPOSITA HÆC SVNT,

emplastrum ad chironia.

- 25** Cerusæ uncia octo, aluminis scisfilis uncia duæ, squamæ æris drachmæ duæ, salis ammoniaci, thuris, æruglonis rasæ, malicorii, singulorum uncia duæ, calcis uiuæ uncia, ceræ libra, myrtei libra una & semis, arida uino teruntur: hoc medicamenti protinus ab initio callum excindit, & reconditum seruatur, postremo autem in usu emollitum myrteo, cicatricem inducit. **ALIVD.** Argenti spumæ pondo, olei pondo dua, chamæleontis nigri, radicis aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum uncia, galbani, guttæ, ammoniaci, lachrymæ thuris, singulorum uncia duæ, præparato radicibus uiridiū arundinis agitans. Archigenis ad chironia, tum malefica ulcera

PAULI AEGINETAE

quæ tibiâs mamasq; obsidēt, itē strumas & parotidas,
Adipis bouilli libræ tres, terebinthinæ quincunx, manna
septunx, terræ sardæ dictæ, qua scriptores utuntur quincunx, his quæ liquari possunt in arida coniectis unitisq;
utitor. ALIVD. Archigenis, ceræ triens, olei omphacis
ni, mannae uel thuris lachrymæ, diphrygis, squamæ, singulorū drachmæ quatuor, arida cum aceto leuigas, ubi
mellis spissitudo facta, cerato misces, & uteris diluto qd
linoleis possit illini. ALIVD ad mulierū dolosa ulce-
ra, & aliorū q; tenera carne præditi sunt. Ceræ tyrrheni-
cæ drachmæ octo, adipis taurini, terebinthinæ plumbi
combusti lotiq; singulorum *drachmæ quatuor: utitor
*Aldus u- nam hēt. per linamenta ex rosaceo uel myrteo.

AD CICATRICES NIGRI

cantes. Cap. XLVII.

Cicatrices nigras tollit oleum in quo bryoniæ ra-
dix candidæ & nigræ incocta sit, dum succum
reddat, impositum: calamintha ex uino cocta, ar-
genti spuma cum rosaceo albo lota: ex impetiginibus
cicatrices, tum alias concolores efficit asini adeps illitus
ærucæ semen ex felle caprillo, bubulo, & ouillio, perun-
ctum cum argenti spuma ouillus talus combustus, ex ui-
no austero tritus, gutta animoniaci cū suillo felle illita.
Cōposita uero, argenti spumæ, mētæ, lachrymæ thuris,
pares portiones cū melle. ALIVD. Nitri, suffiminis am-
moniaci, sulfuris uiui, myrrhæ, paria pōdera, ex aceto al-
bo, aut uino, aut aqua, minutim detrita modice illinūtur
ne exulcerationē excitent. ALIVD. Cimoliæ cretæ, co-
lūbarum fini, saponis, thuris, æquales modi ex aceto.
Smegma ad cicatrices nigras. Cimoliæ cretæ drachmæ
octo, aphronitri drachmæ quinq; ueratri albi drachmæ
quinq; glandis ungnētariæ expressi drachmæ quatuor
in balneo cicatrices abstergito.

DE SINIBVS. Cap. XLVIII.

Cum adiacēs ulceribus cutis, diutius subiectis cor-
poribus nō coalescit glutinaturq; nostri sinum,

Græci colpō nominant. Si igitur ad superiorē partē por-
 rectus sit, facile sanies p̄ os emanat, atq; ideo prōpte cō-
 glutinatur. Si inferius ipse spectet, sanies uicinā aliq̄ partē
 intus erodit, ac nisi emissariū quoddam collectionis scal-
 15 pello prius feceris, nihil p̄mouebis, neq; carne ipsum
 replendo neq; cōglutinādo. Qd si artus aliquos nēpe
 cubitū, aut femur sinus occupet, poterit utiq; decliuis fi-
 guratus citra diuisionē ex aduerso factā coalescere. Et
 enim in cubito cū orē gibbero uicinē sunt, summā ma-
 20 nū elatius p̄tendens, sinū ad defluxionē incitabis. At in
 foemore si p̄p genu sinus desinat, decliui figura posito,
 iuxta poplitem mollē puluinū subiicis, quo inguina ge-
 nu humiliora sint. Si igitur sinus carne impleri non de-
 sideret, statim fistula quadam recto peruia foramine cui
 25 uesica illigata sit, ad saniē qdē quæ sinui inhæret abster-
 gendam dilutiore mulsa potabili, elui debet: uerum ut
 coalescat, uino aut mulso: deinde ad glutinans medica-
 mentū transeundū. Sin cauus sinus carnē regradat, primū
 medicamenti, qd charta cōstat, aridi paululū cū multo
 30 rosaceo inferi conuenit, deinde carpto linamēto os ob-
 turari. Inde emplastrū Isis aut Machæionis, aut simile
 quoddā unā cū rosaceo cerato liquidiore solutū iniici-
 tur. Vbi uero carne mediocriter sinus fuerit repletus,
 conglutinans quoddā medicamentum impones, quē
 35 admodū & recens cruentū uulnus curabas. Huius autē
 generis sunt: Barbara, Dichroma, & rubra appellata.
 Maxime uero oīum quod ex recinino, & metallicis si-
 ne cera p̄paratur rubrū Galeni emplastrū cōueniet. Post
 medicamentum spongia recens ex mulso aut uino cir-
 30 cumponitur, & q̄ fieri potest, mollissime, deligatura a
 sinus fundo incipiens in ipsius os desinet, linteorum ue-
 ro circumductus fundū sinus sine dolore cōstringat, pau-
 lo post soluatur usq; ad sinus oras, emplastro extrinsecus
 sinui circūdato, sed ita iuxta oras descisso, ut sanies que-
 35 at excerni: qd fiet paruo quodā alio emplastro sup̄ im-
 posito ex eodem medicamēto ob effluxum laxo: fines

id adusq; solutionē, qua tertio quoq; die facta idipsum
 auferes mutabisq;: quod toti sinui circumdatū est relin-
 quens. Nota uero erit an sinus ima coaluerint, si sanies
 probe emanet pauca & cōcocta, aut si nequaquā effluat:
 insuper eodē in sinu si neq; dolor aliq; sensibilis, neq; tu-
 mor, sed tota regio submissa, sicca, et doloris expers ap-
 pareat. At si pus etiam maturum in ore modicum con-
 spicias, multo magis de sinu cōglutinando sperandum
 est. At si primo alterove die sanies quādam tenuis ē si-
 nu excernatur, nihil adeo de glutinatione despera, quip-
 pe medicamenti uirtus humorem tenuem ex subiectis
 partibus frequenter extundit, unde partes siccae medio-
 criter factae coeunt & glutinantur. Tertio uero die aut
 quarto ab initio si cruda per os sanies euaserit, scito si-
 num nō coisse, eodēq; medicamento nō insistere, nā cū
 propter humiditatem quampiā, ut uerisimile est, a par-
 te decidat, nō alienum fuerit etiam mutare.

DE SINIBVS QVI AB AT-

tritis uestium fragmentis rhacodes dicitur.

Vbi abscessus tarde sectus fuerit, uel medici imperitia,
 uel eius q; curatur timore, & cutis sinui obducta tenuis,
 attritisq; uestium laciniis similis fuerit, quod Græci rha-
 codes dicunt, fieri nō potest, ut prædictis collutionibus
 adimatur, ob quod glutinante utendum medicamine,
 temperatura liquido, uiribus autem arido. tale est pal-
 mulatum dictum ex chalcitide, ueteri dilutum oleo, ne
 admodum indurescat, neque manus coinquinat, deinde
 uino mediocriter uetusto maceratum, postea orbicula-
 tim cum decenti deligatura impositum. Conuenit autē
 attritæ uestium instar ut comprehensum est, cuti, potiss-
 mum mel, quoad emplastri spissitudinem habeat co-
 ctum impositumq;. Præstiterit autem post illitionem las-
 cero in sinu factam, myrrham ei in pollinem coactā, cri-
 bro suspenso inspergere, uel aloen, uel thus, uel simul
 omnia. Expertus autem sum, tenue centaureum in hunc
 usum mirabile esse medicamentū. succedit huic symphis

LIBER QVARTVS. 189

tū, deinde iridis illyricæ radix, postremo erui farina. Nō
nunquam uero inter coquendum ea melli inspergun-
tur, cum cacabus. ab igne tollitur. Melius autem fuerit,
si lebere iam à flamma amoto hæc fiant, deinde dili-
genter agitemus: ubi medicamentum egelidum euas-
serit, sinui imponatur, illigeturq; sicut expositum est.

DE FISTVLA. Cap. XLIX.

Fistula sinus est callosus, qui magna parte ex ab-
scissibus nascens, ab arudinearum fistularum tras-
latione appellatur. Si itaque in os desinat, curari si-
ne manu haud potest, nisi temporis spatio, squama ul-
tro uel os deciderit. Si uero in os finiat, medicamentis
quæ callos elidunt & conglutinant persanabitur.

Itaque callos excidunt hæc quæ subiungam. Spōdiliū *Manu
radix *feruefacta impositaq; fistularum callos eximit, scriptum
item ueratrum nigrum duobus tribusve diebus insertū hēt πρὸς
dem præstat. Ad hæc amurca cocta & in collutionem ξίωλον
adhibita. Iam sory crudum uel concrematum cum uini
diluti momento iniectum: item sory & crocomagna cū
hydromelite, uel elaterium terebinthina exceptum in
collyria cogito, impositoq; uel laserpitii radice succum
infundito. Id quod sequitur callos consumit: æruginis
drachmæ duodecim, ammoniaci drachmæ duæ, excep-
ta aceto in longum inducuntur.

COLLYRIVM QVO FI

stulis exterendis utor.

Guttæ ammoniaci, atramenti sutorii, æruginis, misyos,
chalcitidis, gummi pari modo excipiuntur aceto.

ALIVD ex his, quæ in Heliodori chirurgica scribun-
tur. Cadmiæ, misyos, atramenti sutorii, æris combusti,
gummi, singulorum drachmæ quatuor, chalcitidis cru-
dæ drachmæ tres, excipiuntur pueri impuberis urina &
singuntur collyria ex quibus uno fistulæ imposito, panis
mica aqua madens extrinsecus superaccommodatur,
sed ita ut illud mutetur sæpius donec inflammatio con-
quierit, & crusta exciderit, ALIVD quod in Alexandria

PAULI AEGINETAE

accepi, Anchusæ radicem, mīssys tosti, chalcitidis, æruginis, aluminis scissi, atramenti futorii; aloes, singulæ unciæ, cantharides quinque, acetum trita in collyria coguntur. ALIVD. Atramenti futorii denarii duo, chalcitidis, æruginis, singuli denarii, excipiuntur gummi usuiq; sunt.

*Impres-
sum hēt
mulla.

Cum autem callus fuerit extricatus, ærugine cocta cum melle purissimo octuplo in collyrii formam reductis, repurgatur. Vbi uero callum eliseris, lis quæ carnem præcreant uti opportunum est.

COLLYRIUM AD CAR-

nem generandam.

Aloes myrrhæ, ammoniaci, ouorum putaminum combustorum cineris, æquale pondus, aqua detritis omnibus collyria formantur, imponunturque. ALIVD. Myrrhæ, aloes, thuris, malicorii, æqualis modus aqua excipitur, quidam uero taurino felle, carnes etiam oleo quod immaturis uvis expressum est eluuntur. Notus mihi est qui cedrino liquore fistulas collueret, ac mirum quantares felicitate successerit. Postquam uero carnes produrxeris, glutinatorio utendum medicamine, quomodo in aliis sinibus præcipitur. At cum fistula arctior, longaque fuerit, Galenus ait, neque callum adhuc, sed sorditiem tantummodo contraxerit, primum lixiuiam demissi, deinde eandem tantisper inibi permittens dum sordes excidisse spe rassent, medicamentum applicaui. Est autem id quod recinino oleo constat superius commemoratum.

DE VLCERIBVS DIRVPTIS. C. L.

Nonnulla ulcerum cicatrice obducta, frequenter haud magno temporis interuallo, iterum inflammatione tentantur rumpunturq;: siquidem offe quodam affecto, interdum caro circumdata ex facili cicatricem recipit, ac sana ex toto esse uidetur: uerum cursu humoris ualido paulatim ex offe in alto contabescēte, tum inflammatio tum pus oboritur, quod cicatricem deradit. Curatio igitur eiusmodi ulcerum, tantam requirit siccitatem, ut os affectum decidat. Huius autem sinus

concauos prompte replebūt papaueris syluestris ficiq;
folia cum polenta leuigata, atque ex uino illita, uel alter
ci semen, & atramentum sutorium pari pondere con
trita imponentur, uel peucedani radix de subito squa
mas ossium separat.

DE ARTICVLORVM VLCERIBVS. C. LI.

Cvm articuli carnosus partibus sicciore existant,
exulcerati sicciore medicamenta requirunt. Pro
be igitur facit pastillus Polyidæ ex uino subactus
donec sordiu fiat spissitudo. Itē q̄ similiter huic deficcāt
medicamina. Item marina, muriaq; frequēter irroratos,
melius affici conspeximus. Quare in articulis iis uten
dum est q̄ maiori etiam siccandi uirtute pollent.

QVÆ SPICVLA, SVRCVLOS,
spinas & consimilia educunt. Cap. LII.

Aculeos, arundines, insuper spicula & spinas ex
trahit utrunque anagallidis genus, aristolochia
rotunda, ammoniacum cum melle, alterci fruct
leuigatus inspergitur, arundinis radix contusa, melliq;
mista in linteolum largum illinitur, imposita de subito
educit.

SI EX VENA ARTERIA VE ET

naribus sanguis profluat. Cap. LIII.

Particulis sanguinem fundentibus, figura ei quam
in sinibus exposui contraria, recte adhibebitur, ne
pe quæ sursum uergat, neque id tamen immodi
ce, nam periculum est, ne dolore oborto, uas rursus san
guinem profundat: cum nihil æque sanguinis profluui
um excitet, inflammationesque augeat, ac dolor. Cum
itaque sanguis erumpit, statim digitum ori ulceris uascu
li inlicito, innitens leniter premensque citra dolorem,
nam simul & sanguinem continebis, & grumum uulne
ri induces. Quinetiam si altius deliteat uas quod san
guinem emittit, diligentius perdisces, & situm ipsius, &
magnitudinem, item uena sit, an arteria: deinde si exigu
um uas existat, aliquo ex his quæ sanguinem reprimunt

PAULI AEGINETAE

utendum est. Optima uero eius generis sunt, quæ ob-
 struendi uim obtinent, unde Græcis emplastica dicun-
 tur, ex resina fricta, farina triticeæ polline, gypso compo-
 sita, similiaque, oui candido macerata, & cum leporinis
 pilis imposita: at si amplum uas existat, hamo ipsum at- 5
 tollere conaberis & mediocriter circumages, sanguine
 represso, siquidem uena extiterit sine funiculo sanguinē
 hisipis medicaminibus sistere tentabis: sin arteria, alterū
 ē duobus facies, aut funiculo circumposito, aut toto ua-
 se præciso sanguinem coercebis. Est, cum magnis quo- 10
 que uenis funiculos circundare cogimur, quemadmo-
 dum nonnunquam easdem totas transuersim nimirum
 disseccare, in cuius rei necessitatem uenitur, in uenis quæ
 à penitioribus recte sursum feruntur, præsertim per ar-
 tium quoddam spatium, aut principes particulas, sic e- 15
 nim utraque pars utrobique reuellitur, & uulnus à uici-
 nis corporibus occultatur contegiturq;: tutius autem
 fuerit utrunque facere, funem quidem radici uasis circū-
 dare, quod autem inde procedit abscindere, his sic pe-
 ractis, uulneri celerrime carnem inducere, priusquam fu- 20
 niculus à uase decidat, si enim subito carnem contraxe-
 rit, & locus alibi inanis reperiatur, id quod Græce uoca-
 tur aneurisma sequitur. Dignosces autem num uena an
 arteria sanguinē pfundat inde, q̃ huius flauior tenuior
 que sanguis existat, & percussu uacuetur, illius autem ni- 25
 grior, & sine pulsu. Optimum igitur omnium quæ no-
 uimus ad carnem inducendam medicamentorum, quo
 etiam ad cerebri membranarum hæmorrhagias uti se-
 curissimum est, item ad colli uulnera, ipsarumq; uenarū
 iugularium quas sphagitidas Græci uocant, etenim & 30
 harum sanguinem citra uinculum cohibet. Recipit au-
 tem thuris lachrymæ pinguisimæ partem unam, aloes
 in mollioribus quidem corporibus partem semissem,
 in durioribus æqualem, ac in uicem lachrymæ thuris,
 manna tantundem, cum oui albo subigitur, dum mellis 35
 fiat spissitudo, deinde leporis pilo mollissimo excipis

tur, mox uasi ipsi, tum ulceri uniuerso liberaliter imponi
 tur. Deligandum uero extrinsecus est fascia ex tenui lino
 teo, cuius fasciæ primi quatuor aut quiuque amplexus
 super ipsum uas quod profluit, iniiciuntur. hinc ad radio
 5 cem ipsius distribuuntur, postea ubi tertio solueris die, si
 tuto adhuc medicamentum ulceri adhæreat, aliud rursus
 super ipsum accommodabis, ac ueluti id quod ex
 pills factum, deligabis quemadmodum prius, at si spon
 te sua primum reiecerit linamentum, uasis radicem dis
 10 gito leniter comprimens, ne uidelicet quippiam con
 fluat, hoc quidem sensim auferes, alterum uero impos
 nes, atque hoc modo quoad carne obducatur uas, cura
 rabis, ita ut semper particulam serues supinam, custodio
 to tamen sine dolore in hac situs figura modo. At quæ
 15 crustas generant, quoties decidunt, nudam magis partem
 quam naturaliter esse debet, relinquunt, multisq; iam ex
 iis quibus crusta decedit, sanguinis profluuium quod
 ægre supprimi queat superuenit, quanquam & his uten
 dum est cum magna urget necessitas. Maximam uero
 20 necessitatem uel crustam inducentibus medicaminibus
 uel ignitis ferramentis utendi puto, ubi ex erosione pu
 trescentis alicuius profluuium sanguinis concitatur.
 Quinetiam cum in huiusmodi affectibus totum quod
 putredinem expertum est exciderimus, tutius est uel ipso
 25 sius quasi radicem adurere uel medicamentis quæ cru
 stam faciunt, uti, hoc autem maxime tum in pudendis,
 tum in sede fieri consuevit. Id autem quo crustam gene
 rantium medicamentorum uim dirigas, erit calor cum
 astrictione, quemadmodum in chalcitide, misy & atra
 30 mento sutorio. Quæ autem ex calce uiua conficiuntur,
 uehementiora quidem his sunt, cæterum quia calx non
 astringit, crustæ citius ab ipsis decidunt, hæere autem ip
 sas longe est utilius, quippe ad basim earum caro super
 nascitur, efficiturq; uasis profluentibus ueluti operculū,
 35 at huiusmodi sanguinis profluuium isatis satius si insper
 gatur probe coercet, uel guttæ combustæ. Porro ipsa

PAULI AEGINETAE

Fertamēta ignita ex aceto aut uino restinguere oportet.
 In uniuersum sanguinis profluuionem sistunt, simplicia
 quidem, aloe, thus, manna, terra samia, ærugo ferri, lana-
 rum crematarum cinis tenuissimus similiter, stercus asi-
 ni aut equi, bitumen modicum, malicorium, diphryges,
 galla, myrtus arida, alumen omne, tum crudum tum co-
 bustum, resina fricta, uitis cortex, aut folia arida, platano-
 rum galbulorum pollen tenuissimus, maxime cum hu-
 morem concretum deposuerit: priuatim autem ex nari-
 bus profluuium imposita reprimunt iunci acuti fructus,
 urticae foliorum succus, chalcitis, anthyllis concremata,
 pili leporis, ferulae medium uisum cum aceto, ononis
 sicca uel humida, succus porri cum thure, ellychnio ex-
 ceptus: composita uero ad quodlibet sanguinis proflu-
 uium hæc quoque faciunt, spongia recens in liquida pi-
 ce tincta & bitumine circumlita, olla recenti concrema-
 tur, cineris partes duæ, miscentur plumbi & stammeos,
 singulorum parti uni. ALIUD. Thuris lachrymae, man-
 nae, sulfuris ignem non experti, æqualem modum in-
 spergito. ALIUD. Chalcitidis drachmae uiginti, lachry-
 mae thuris uel mannae drachmae sedecim, resinae frictae,
 gypsi combusti, singulorum drachmae octo. ALIUD
 crustas inducens sanguinemq; reprimens: Chalcitidis,
 æris combusti, atramenti sutorii, misys tosti paria ponde-
 ra, ite Rhodia dicta, & Xathe probe sanguine cohibet.

DE NERVIS CONVLNE

ratis.

Cap.

LIIII.

Neruis uulneratis aut punctis, ex sentiendi quod
 obtinent, acumine, inflammatio & dolor immo-
 dicus accidit. Quare & febres & conuulsiones
 his oboriuntur, quibusdam & delirium ob nervos cere-
 bro continuos. Interim uero in aliis quoq; particulæ af-
 fectæ locis inflammationes, & abscessus super ipsum
 neruum conuulneratum, quod cohaereat solent accide-
 re. Ratio igitur est, cutis uulnus apertum inglutinatūq;
 relinquere, quo per id sanies effluat. At si punctus in co-

spectum non ueniant, etiam duabus lineis sibi continuis
 incidere præerea oportet. Remedio autem est, si cor-
 pus succis scatet & magna uir inflammatio, primum à
 sanguinis demissione auspicari: si uero uitiolis repletum
 5 sit humoribus, etiam purgatione utendum est. Medicas-
 menta uero uulneri applicentur quæ dolorem sopiant,
 & effluxum saniei patefaciant, non facta præsertim di-
 uisione. Iraque aqua calida, quanquam reliquis inflam-
 mationibus sit accommodatissima, uulneratis tamen
 10 neruis est inimica, ac præsterit eos oleo subtili, quod
 astrictionis sit expers, ad sensum calido irrorare, neque
 enim frigida neque egelida admodum tuto adhibetur.
 Verum ex medicamentis idonea est terebinthina resina
 per se quidem, in pueris & mulieribus & summatim iis,
 15 qui mollis sunt carne, cum euphorbio autem emollita, in
 duris corporibus: & si nonnunquam duriora contige-
 rint, cum oleo quodam subtiliore. Cataplasmata uero
 in neruis, qui inflammatione tentantur & putrescunt, adhi-
 bebis hordeaceam farinam, aut fabaceam, aut eruina-
 20 instillatitia lixiua, cum oxymelite coctam. Si putredine
 careant puncturæ neruorum, recte cerato ueris, quod
 recipit cere quadrantem, euphorbii unciam, aut colum-
 bæ simi in duriusculis corporibus, olei sextantem, inter-
 dum etiam terebinthinæ unciam: ut autem emplastri fi-
 25 guram induat medicamentum, uncia euphorbii, sex sin-
 gulorum sequentium, ceræ, resinæ frictæ, olei, picis liqui-
 dæ uncias, iniicies. At si in uicem resinæ propolim pin-
 guissimam indideris, multo id reddes præstantius: atq;
 hoc ad neruos punctos laudatum est remedium: idem
 30 & à rabioso cane morsis efficax est. At aceti sextarius,
 picis pinguis pondo, opopanax quadrans (opopanax
 aceto solutus magis leuigatur, pix liquefacta mixtaque
 coquitur) medicamentum compunctis neruis idoneum est,
 ut quod os puncturæ non sinat conuere, quemadmodum
 35 nec in his, quæ à rabido cane morfi sunt, ulcus in cicatrice
 coalescere: sed efficax solis duris corporibus: sin autem in

pueris, aut molli carne præditis, punctura affectis, uti cogites, licet ipsum ex digerente quodam amaracino, aut opobalsamo, aut oleo ueteri liquefacere. Conuenit etiam medicamentum basilicum quod nitrum recipit, aut calcem uinam, aut euphorbium, aut sulfur uiuum, aut syluestris columbæ finum, aut opopanacem, aut sagapenum, aut liquorem cyrenaicum, aut castoreum, ac medicamenti libram, dictorum alicuius uncia debet injici. Facit autem bene, neruorum uulneribus & præsertim puncturis: quin & in agro ubi nullius copia datur, propolim recentem pinguemque; uulneri poteris inducere, aut fermentum maxime uetustum, per se aut cum propoli mixtum, uel cum liquore tithymalli: cataplasmatibus utendum ex oxymelite factis, aut lixiuio stillatitio, cum lomento fabarum, aut eruorum farina, aut ciceri, aut lupinorum amarorum, aut hordeacea, aut polenta, idque non solum dum inflammatione tentati sunt, sed iam inde ab initio protinus. Cæterum quæ relaxant cataplasmata in neruorum uulneribus semper uitare oportet. At si neruus non punctus, sed plane cassus uulneratus fuerit, cute etiam quæ interueniebat diuisa, ut nudus appareat rectusque; non transversim dissectus, commemoratis ex euphorbio & tam acribus nullis utere, quippe nudus cum sit neruus, uehementem ipsorum uim ferre nequit. Quare calcem quæ sæpius æstiuo tempore locata sit, & oleo liberaliore intincta, assumes. Proficiunt hic & quæ ex pompholyge confecta sunt, item quod melle constat, rosaceo largiore liquefactum. Sed ea adhibenda cura est, ne quid ex his uulnus contingat, quandoquidem neruus ipse & sensibilis maxime est, & temperamento suo frigidus, & principum corporis partium primario continuus, imò ne oleo quidem eiusmodi ulcus irrogare conuenit, hinc enim sordidum redditur. Abluenda igitur à uulnere sanies est molli lana specillo circumuoluta. Quod si omnia ex animi sententia processerint, etiam uino dulci madefacere citra periculum licebit, sed in robustioribus

in robustioribus Polyidæ pastillo in linamentum illito
 cum sapa calida uti, postquam neruum denudatum cō
 texeris, linamenta extrinsecus circumducere oportet ex
 medicamento quod angustis uulneribus faciat, nempe
 5 eo quod euphorbio præparatur, aut fimo columbarū:
 sed ita ut etiam sanas partes ampliter comprehendat.
 Quum uero transversum nerui uulnus est, maior con
 uulsionis metus impendet, ac quæ ad curationem uulo
 neris spectant, hic quoq; sunt eadem, quanquam non uul
 10 li in uulnere adhuc recenti futuris usi sunt, ac medicamē
 to aliquo conglutinatorio: uerum suturas non summæ
 nimium cuti, sed altius moliri conuenit, ne quæ in imo
 sunt inconglutinata dehiscant: rursus cura adhibenda
 est, ne ab acu nervus compungatur. Cæterum in sum
 15 ma sciendum erit, in neruorum uulneribus medicamen
 tum natura calidius quod puncturis medetur, diuisione
 nerui non posse curare, ut qui rosionem ipsorum feruō
 remq; sustinere nequeat: neque quod diuisionibus me
 detur, puncturis conuenire: non enim uirtus ipsius alte
 20 quum angusta est cutis diuisio, penetrat. Victus itaque
 adhibebitur tenuior, lectus mollis, oleumq; calidū alis,
 capiti, et ceruici superfunditur, at si in crure nervus uulo
 neratus sit, inguinibus, pubi, & locis uicinis: balneo in to
 tum donec inflammatio inclinauerit, abstinendum est,
 25 quum aquæ contactus nequaquā, ut dixi, ipsis conueniat.
 Quoniam uero nonnulli citra id manere consuetudine
 nis gratia non sustinent, siquidem læsa particula in ma
 nu fuerit, cauendū est quatenus fieri potest, ipsam aqua
 seu calida, seu multo magis frigida irrigare. Si pes uulo
 30 nus acceperit, quoniam fieri nequit ut nō madescat, ubi
 lauacrum ingressuri sunt emplasticum aliquod medica
 mentum uulneratæ parti superaccommodabis, iterum
 extrinsecus linteolos multiplicatos plures oleo imbu
 tos iniicies, iterum fasciam ex linteo à foris deligabis,
 35 deinde rursus in ipso balneo fasciam oleo prius supero
 fundes, cū æger in soliū descendet: ubi lauerit, omnia q̄

PAV. ÆGIN.

BB

PAULI AEGINETAE

imposita sunt abiicies, ac praedicta totius curationis ratione uteris. Contusi uero nervi ubi simul cum his cutis contusa exulcerataque fuerit, cataplasma ex fabarum lormento & oxymelite postulant, nonnunquam adijcitur erui farina & iris. At si dolor contusioni adest, picem liquida quidam admisce, sin autem citra cutis contusionem euenierit, magis digerens adhibebitur, nempe oleum calens, anethinum dico, superfusum continue aut rutaceum, aut irinum, aut amaracinum. Quod si totus nervus praecisus sit, periculum quidem nullum sequetur, uerum paritacula debilis manebit. Curatio autem eius communis est cum ea quae aliis ulceribus accommodatur, haec quidem ex simplicioribus remediis in nervis conuulsis curatio abunde est, quidam uero compositis uti consueuerunt, cuiusmodi sunt, ex metallicis confecta, Barbara appellata, Cissinum, ex senecione praeparatum, melanchloron, Indice, Harmonia, & Athene, quorum & compositionem, & utendi modum septimo libro reperies. Sed quia nonnulli praepotentium etiam sumptuosius ad nervorum uulnera remediis uti uolunt, Galenus literis prodidit, ad puncturas nervorum, haec: cinamomi, dictamni, foeniculi, singulorum uncia, amaraci sextans, cerae bes, opobalsami dextans, terebinthinae uncia. ALIVD. Liquoris cyrenaici uncia, cerae quadrans, opobalsami pondo. Ad denudatos nervos hoc ualet. Cerae unguentariae quadrans, unguenti spicati aut foliati, aut nardini pondo, pompholygis, spicae nardi, amomi, phylli, singulorum uncia, atque haec supra spem respondere Galenus pronuntiavit.

DE ARTICVLORVM CON

tractione seu ligatione, quae ancyle dicitur. Cap. LV.

Articulos ex humoribus infarctis ac neruea quadam tensione contractos, detentosque, ancylas & ancyloses appellare consueuerunt. In quibus facultate opus erit, quae emolliat relaxetque. Communiora igitur

tur his remedia cōueniunt, q̄ in particulis scirrō induratis ac adeo q̄ in resolutis cōmemorata sunt, ppria uero magis, irroratio ex hydrelatō, in quo decoctum sit lini semen, foenugræcū, althea laurus, cucumeris agrestis radix, ipsumq; sicyoniū. Vbi his artus irrorati fuerint, accōmodatur primū acopa simpliciora, cuiusmodi ex nigra populo, ex abiete Bromiū, Basilium, Pyxis, deinde Aristophaneū, & quod ad Asanitū refertur. Validissima, Liosponiū appellatū, & Pœcilū, emplastra, qd̄ Amythaoni ascribitur & Anicetum. Laudatissimū uero quod recipit bdellii, adipis uitulini, suffiminis ammoniaci, iris illyricæ singulorum denarios sedecim, opopanax, galbani, cachryos, styracis, thuris singulorū drachmas octo piperis grana centū sexaginta, ceræ librā semissem resinae terebinthinæ tantunde, irini sedimenti quod satis est, & ulni quantum sufficit: copton hoc est medicamentū. Est acopon nō inefficax dissolutum irino, aut cyprino, aut laurino. Inter acopa uero & emplastra, medicamentum est diapterhes uariis confectum misturis. Verū acoporum usus molli adhibebitur & cōtinua frictione: ita tamen ut affectum articulum simul tentes flectere & extendere.

DE ARTICVLIS RELAXATIS.

Cap. LVI.

LAxatur subinde articuli ob lōgos febrilū morbos colicos, & resolutorios, p̄sertim ubi calidior ipsos humidiorq; intēperies occupauerit, atq; motus inde impeditur. Succurrit his acaciæ succus aqua dilutus & ex alto in partē deturbatus: aut rubi, aut myrti, aut lentisci, uel ulmi radicū corticis decoctū cōgruet, aut malicoriū illitū, aut myrti folia, cū cerato myrteo imposita. Nā colligantes nerui firmari desiderāt facultate q̄ astringat deficet q̄, huiusmodi igitur medicamenta articulis imponi debent, cuiusmodi ex salicibus est & oxypura, & palmulatum quod uinum astringens, aut acetum assumpserit. Multū uero eiusmodi impotentiam

BB si

à frigore fieri putantes, deinde calidioribus usi præfidiis
maiores noxam intulerunt.

DE LUMBRICIS. Cap. LVII.

T Res sunt uniuersæ lumbricorum differētiæ, pri-
ma teretum, altera latorum, tertia eorum quos
ascaridas nuncupant. Origo omnium generum
est ex cruda, crassa, pituitosaq; materia & putredini ac
commoda, qualis in pueris aliisq; uoracibus colligitur;
non autem ex calida, acris, aut melancholica substantia.
Hæ siquidem alimenti naturam egressæ, lumbricis pro-
creandis ineptæ redduntur. e contrario, biliosa potissi-
mum recrementa etiam hos perimunt. At si quando fla-
ua bilis unâ cum lumbricis infra, aut etiam uomitu eru-
perit, ipsos quidem intestina obsidere, humorem uero
biliosum uentriculi os aut aliam quampiam particulam
occupare scito. Cuiusque igitur ipsorum differentię spe-
ciem, generationem, locum, notas, curationemq; ex-
quemur, à rotundis exorfi.

DE ROTUNDIS LUMBRICIS.

Teretes igitur lumbrici speciem habent omnibus per-
spicuum, quòd sanè aliis frequentiores sint, in gracilibus
plerumq; intestinis cōsistunt & superiorem uentriculum
subeunt, ideoq; frequenter per os reiciuntur. quibusdā
& è naribus redduntur: atque hoc genus infantibus pe-
culiare & plurima parte cum febricula: sed per febrium
initia orti, substantiam ex subiecta differentia retinent: in
statu: ex malitia morbi: in declinatione, ex toto corpore
ad melius mutato. Etenim Hippocrates memoriæ mā-
dauit bonum esse indicium teretes lumbricos prodire
cum morbus ad iudicationem tendit, qui subito etiam
intereunt. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos
continent, rosio intestinorum & uetriculi, tussis exigua
cum siccitate irritantes: nonnullos comitatur singultus
quoque, somnus cum *conuulsione, & qui his occupā-
tur, sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamor-
re expergescunt, & iterum sopiuntur: pulsus inæquales

Impres-
sum ex-
plar hēt
παραμω-
hoc est
palpita-
tione.

- & febres augescunt inordinate, quæ cum extremorum perfrictione, tertiam, interim quartam, die uel nocte accessiōem sine ratione habent. Infantibus autem & cōquassatio lingua temere exerta, & dentium stridor oritur, luminibus conuiuent, uoluntq; conquiescere, excitati-
 5 tibus ipsos indignantur, oculi apparent, genæq; rubescunt, ac rursus liuent: atq; hæc paulatim ex interuallo. Quibusdam nausæ & rosionis causæ stomacho peculi-
 10 lires creantur, atque ægri cibum respuunt, compulsi autem ad cibum nausæabundi uix quod assumitur deglutiunt, uel etiam reuomunt, plerisq; uero alius descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neque esurie, neq; euacuatione modica suborta. Atqui nō in om-
 15 nibus omnia quæ iam commemorauimus signa inquirere oportet, sed nonnulla ex eo quod præpollet, interim & plurima. Hæc autem eueniunt, dum animalia per intestina serpunt roduntq; febris autem calor uapores sursum cerebro transmittit prauos, ex putrida in uentris
 20 culo collecta humiditate exhalantes, in quibus ambo-
 rum partim similiter curam habere conuenit & febris & lumbricorum, partim de febre parum solliciti, lumbricos de corpore eximere conuitemur. Multi siquidem nulla lumbricorum cura habita, exesi, ab ipsis sunt, & cō-
 25 uulsi interierunt. Alii produnt se lumbricos uidisse, qui ex inguinibus ægri eruperint. Cæterum occisos hos omnes prius, educes: occides autem, amaris potissimū usus remediis. Cum igitur febris & lumbricorum com-
 30 munis sit curatio, conuenient auxilia simpliciora: potius igitur dabitur Lchamæmelorum decoctum uel myxariorum, ut appellant, uel ipsa myxaria decocta esui
 35 dantur: item sereos succus, aut coriani semen cū aqua calida uel cum posca, uel myosotidos herbæ decoctū, uel cornus ceruini ramentum, uel minium, synopicum tenuissimum, ac olei immaturi amarissimi paulatim cochlearia duo absorbeant, qua enim amarum est, lumbrici

eos occidit: qua lubricum, detrahens ipsos cum sterco-
 re reddit. At si inflammationem distentionemq; uiscer-
 ra experiantur, cataplasmate utendum est, quod lini ses-
 mine, farina lupinorum, absinthio & bryonia radice co-
 stat, ex hydromelite, uel etiā humido fotu ex oleo cha-
 mæmelino, uino, absinthii fructu, & aloe, præcordiis ac-
 commodato. Vbi uero non uehementer febres mole-
 stant, miscenda est myxariis mentha & exhibenda est.
 Cum ad integritatem uentum est, efficaciora quoque
 usurpantur, quale est decoctum seriphii uel calaminthæ,
 uel ptereos herbæ, uel cardamomi semen, uel mali Pus-
 nici acidi radicis ius ad tertias reductum, uel fricti cumi-
 ni, uel nitri fului singulorum scrupula tria, uel sandoni-
 chum, uel abrotanum, uel etiam ambo simul, cum mel-
 le in catapotia coacta, uel lupinorum amarorum scrus-
 puli terni uel brassicæ, uel erucæ semen leuigatum, uel
 absinthinum, quod etiam solū frequenter abunde fuit.
 Dantur autem & terna lotæ aloes scrupula, quod reme-
 dium est laudatissimum: in ualidioribus illota quoque
 aloe utimur, quæ uero infantes aloem nō admittunt, supis
 nis fasciola ipsis detentis ore adaperto per clysteriū quo-
 dā ualido munitū canali, inuitis aloem quæ penitissime tras-
 missam iniicimus. Atque hæc mirifica medendi ratio in
 pueris est, quæ difficulter possunt tractari: quibus et cibos su-
 binde sorbiles, quæadmodū iis quæ cibū auersantur, infun-
 dimus. Cæterum & cyphi & masuaphiū recte dabitur,
 itē cornu ceruinū cōbustum cū pipere & melle uel oxy-
 melite, reliquaquæ ex oxymelite ipsis dare conabimur, pos-
 stiterit aut si acetū scillinū fuerit, præsertim ætate puectiori-
 bus, aut sinapi cū oleo & aceto ad cochlearis magnitu-
 dinē. At quæ lubricis, cū alui pfluuiū infestantur, præbibet
 plantaginis succū, ipsamquæ plantaginē aridā assumet, ex
 æquo enim utriusque et fluori & lubricis efficax est. Cata-
 plasma his accommodabitur ex polenta cruda, pteri, ab-
 sinthio, farina lupini, sandonicho & abrotano. Iam uero
 & malicorium, acacia, galla, uel balauistiū admiscebitur.

Quoniam uero nonnulli subinde amaras potiones ceu in-
 gratas respuunt, ex iis quæ modo comprehensa sunt da-
 buntur non manifesto amara. His accedent insuper cha-
 mæpitys, marrubium, helenium, bacca lauri, acacia, thy-
 mus, pulegium, carpesium, iuncus odoratus angulosus,
 polypodium, iris, cnico, erithrodanon spina ægyptia cum
 pipere, singula sex scrupulorum instar: ite ius methæ, mo-
 ri radice succus decoctumve, petroselini, reliquaq; odo-
 rata semina, extrinsecus autem inducitur aloë cum melino
 & uino, hoc & appetentiam excitat, quæ uix magno nego-
 tio recipitur: miscetur autem sepius aloæ absinthium: aut
 felle taurino, cum amaris quibusdam prædictis umbilicum
 impleto: aut oleum ex rhododaphne factum liberaliter
 delinetur, aut liquor cedrinus & solus et cum cerato, to-
 ti uentriculo imponitur, aut pix arida trita inspergitur, uel
 mentha, uel melanthium cum rosaceo, uel et seriphii ius
 ipsis admiscebitur, uel fraxini persicæ folia in pollinem
 detrita delinimus. Utendum uero est medulla cerui, un-
 guinis modo, in umbilico, pube et lumbis: ceratumq;
 adiungetur, si res postulet, hoc, Aloes, absinthii, farinæ lu-
 pini, seriphii, melanthii, singulorum scrupula sex, ceræ
 uncia et semisis, chamæmelini quod satis est felle tauri
 no arida leuigantur. Porro ab inferioribus partibus mul-
 sam iniicere copiosorem expedit, quo lumbrici melo-
 25 lis dulcedine illecti deorsum, descendant: si autem pu-
 trefacti in alto corporis non excernantur, sed potius uap-
 pores sursum mittant, educendi sunt, aut aloes aut me-
 dicamenti amari ex ea confecti potione, quandoquis
 dem etiam in aliis mediocri alui uacuatio non exo-
 30 pers est præsidii.

DE LATIS LUMBRICIS.

Latus lumbricus mutatio est, ut ita dicam, ad natæ in inte-
 riori intestino membranæ in materiam animalis modo
 mobilem, quæ sæpe tota redditur longitudine incredi-
 35 bill, uel pars ipsius excernitur: dissolutus uero, non coale-
 scit: et nunc in iis etiam qui febri carent, abundant: nunc

febricitantibus accidit ex longo morbo continuas, stoma-
 machi rofiones inferens, ac impotentē ciborū appeten-
 tiam. Nam quod animatum euasit, in intestinis obiectū
 rapit alimentum, ut alio statim opus sit, & nisi assumpse-
 rit, intestina rodantur. His occupatos comitatur corpo-
 ris gracilitas, & impotentia, cum inæqualitate: at quod
 certissimum est indicium, cum recrementis nonnulla se-
 mini cucurbitæ similia excernuntur. Curatio cōcordat,
 potio enim ex accrementis petita, & aliorum esus, tum
 pteris uel centaurei decoctum & potum & ab inferioribus
 partibus inditum, uel calaminthæ uel dictan-
 ni, uel pulegii: dabitur autem in aluum & muria. Præbi-
 bere uero hoc medicamentum quod sequitur, neq; iis
 qui aliis lumbricis infestantur, inutile est, si febre potissi-
 mū uacauerint. Nitri rubri, piperis, cardamomi pares
 portiones: dantur terni scrupuli, cum uino aut aqua ca-
 lente. A L I V D eclegma. Piperis, baccarum lauri pu-
 rarum, cumini Aethiopici, mastiches, pares modi, melo-
 lis quod satis est: datur cochleare unum mane, & dor-
 mituro. At si efficacius id fieri desideres, nitri quoq; ru-
 bri parem portionem adiicies. A L I V D. Helenii, suffi-
 minis ammoniaci, l piperis, singulorum denarii quinq;
 cum oxymelite calido: tempore interposito dabitur eu-
 phorbii drachma, uel duæ prouectioribus. A L I V D.
 Pteris acetabulum, nitri denarii duo, datur unū cochlea-
 re aquæ euacuatione prius facta: satius autem erit si etiā
 scammonii momentum assumat. A L I V D. Mali
 Punici acidi radicum corticis in summo decorticati de-
 narii quatuor, piperis tantundem, cardamomi denarii
 sex, marrubii denarii duo, melle dantur, porro prius as-
 sumpto. Verum ut ex toto affectus discutiatur, theria-
 cen quoque exhibebis.

Exemplar
 aliud hēt
 pteris.

DE ASCARIDIBVS. Cap. LVIII.

Ascarides, ut modo ēt diximus, specie lūbricorū
 cōtinentur, uermibus similes q̄ in extremo lōga
 none & ani fibulę initio reperiūtur, uehementē

locorum horum pruritum excitantes : generant specie
hanc praua alimenta, perfrictio, & ciborum corruptio.

Vacuari igitur debent in infantibus, glandibus ex melle, cum salis momento, uel nitri: in prouectioribus, acrimuria, aut decocto centaurei, cum nitro & melle, aut cucurbitæ syluestris, aut absinthii, aut chamæleontis, aut anchusæ, aut cnici, aut hyssopi, aut pulegii, aut calaminthæ, aut lupinorum: secundum clysteres sublinetur longanum, simplicibus quidem, acacia, aut hypocyttide cum nitro, aut rhu syriaco cum alumine liquido: at quibus aluus astricta est, lemnia sphragide, cum uino compositis autem, Andronis pastillo, similibusq;. Cedrinus autem liquor ipsis iniicietur per clysterem multis peruium foraminibus, quales ab utero metrenchythæ appellantur: aut carnem fassam commode impositam deligamus, 15
quandiu sustineri possit, eamq; frequenter mutare oportet. Cæterum communiter omnes quos lumbrici male habent, pili ichneumonis iuuant, suffiti. Cibi præscribentur ipsis probi succi, & qui facile in membra digeruntur nec lumbricorum effectricem causam adaugent, nec uires superari permittunt, propter quas & uinum aquosum exhibebimus: liberalius autem nutrire ipsos ob hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici rosiones pariant, dabitur autem cibus, tum præcipue quum non inani fuerint. At si alui profluuium fuerit, sciendum est 25
lumbricos magis abundare, cibo non distributo, ac iam sorbiles ægris cibi dantur, admixtis quibusdam etiam astringentibus, uerbi gratia, piris, aut pomis, aut malis Punicis, præcipue acescentibus: à foris autem uentriculo remedia continentia inducuntur, de quibus supra dictum est. 30

DE DRACUNCVLIS Cap. LIX.

IN India & superioribus Ægypto locis dracunculi generantur, ceu animalia quædam lumbricos imitantia, in partibus musculosis, puta brachio, femore, tibia: in pueris etiam latera sub cute perreptant & palam 35

PAULI AEGINETA

mouentur deinde cum diu extremum aliquod dracunculi remanserit, locus suppurat, & cute ipsius adaperata, initium ipsius progreditur: cum trahitur, dolores mouet, praecipue abruptus. Qua propter nonnulli dicunt plumbeam molem ex dracunculo suspendenda ne uersim, sed particulatim molis pondere decidat. Alii uero hos damnant quod nihilo magis pondere molis plumbeae dracunculus abrumpatur, & dolores uarios concitet, iubent partem in aquam dimitti calidam, quo dracunculus tepesfactus foras proropat, deinde digitis ipsum membratim extrahere. At Soranus neque animal prorsus, sed neruosi cuiusdam substantiam esse putat, quod opinionem motus solum praebet, siue autem hoc sit, siue quod prius dictum est, Sorano & Leonidæ aliisque uisum est, calida superfusione & cataplasmatibus concoquentibus in his uti ex mulla, farina triticea, aut hordeacea. Est cum emplastri usum eiusdem potentiae probant. Conuenit autem & quod ex baccis lauri & quod ex melle constat: emortui siquidem horum usi dracunculi, nimirum quod continetur corpusculum excidit. Suppuratione autem facta, nisi exciderit, cutis diuidenda est: ubi denudaueris, quod continetur, auferes: & eundem linamento penetrabis, ac deinceps eam curandi rationem adhibebis quae puri sit maturando.

Libri Quarti Finis.

PAULI AEGINETAE
LIBER QUINTVS,
Ioanne Guinterio Andernaco medico interprete,

5 QVOMODO QVIS AB
omnibus communiter uirulentis
bestiis se tueatur. Cap. 1.



10 E VIRULENTIS BE
stiis præcipientes, ab iis quæ in o
mnibus huiusmodi communiter
proficiunt, exo diemur, ita, ut quo
modo quis ab illarum iniuria se
15 uindictet, prius expediamus. Si igitur
aliquis necessitate quapiam
coactus, loco feris frequenti ob
dormiat, ubi potissimum salamandra aut phalangia aut
serpentes aliqui abudent, horum cauas latebras allio in
aqua derito, aut aliqua ex herbis quas exponemus, ob
20 turare conuenit. Suffitus autem recte excitantur ex cornu
ceruino, caprarum ungulis pilisue, lapide gagate, bitu
mine, bdellio, galbano, cupressi aut cedri rasura, melan
thio, peucedano, uiticis foliis, nepita, sagapeno, castorio,
cachrys radice, cunila bubula, aut ex reliquis grauiter
25 olētibus aliquo. Culices autem proprie persequitur suffitus
ex atramenti sutorii, melanthii, syluestris cumini semina
nis, paribus modis, itē simus bubulus eosdē fugat. Ad
hæc et ignes incadere crebriores uincit, fugiunt. n. ma
gna parte ferarum eorum splendorē. Cæterum torum substerne
30 re ex hastula regia, nepita, uitice, pulegio, polio, cunila bu
bula, abrotano, expedit. At si toto huiusmodi toro uti
nō datur, stratis saltem imponenda sunt. Iam uero aium
adhibere oportet iis quæ coquuntur, aquæ & uinorū ca
dis, ut exacte sint operculati. Focus autem nō sub arboribus
35 quibusdam excitabitur, præsertim pino aut picea, in his
enim salamandra & erucæ lethales crebre uersantur,

PAULI ÆGINE TÆ

quæ ab ignis tepore calefactæ, decidunt in obsonia aut alia uasa, si non fuerint operta. Qui uero tutiores esse uolunt, iis conuenit etiam ceratum corpori oblinere iis quidiſ, ex cera, rosaceo, galbano modico, scobe ceruicis cornus exigua, uel etiam Æthiopico cumino peculariter autem maluæ folia cum oleo detrita si illinantur, ab apum & uesparum morſu præſeruant.

COMMVNIS OMNIVM QVI

à uirulento quopiam morſi uel icſi ſunt,
curatio.

Cap. II.

QUOD si feriri aliquem aut morderi à uenenato animali contigerit, homo adhibendus est qui uulnus exugat, non tamen eum ieiunum esse oportet, uerum etiam uino os colluisse, & oleum in eo continere. Deinde particulæ commorſæ, si admittit, cucurbitulam cum multa flamma adhibere oportet, sic ut uicinis etiam partes scalpello exasperentur. Nam uirus una cum sanguine & spiritu ita extrahitur. Item exulcerata adurere ac crusta obducere, adeoq; præcidere conueniet, si fera quæ momordit, lethalis fuerit, quales aspis, cerastes, uipera, ſimilesq; aliæ ſunt, quemadmodum Galenus memoriæ prodiſ, uinitorem quendam à uipera morſum, ubi feram cognosceret, falce læſum digitum abſciidiſſe, atque in totum periculo liberatum. At si uenenum per corpus fuerit diſperſum, ſanguis ſtatim demittendus eſt, præcipue ſi is, qui percuffus eſt, humorum æquabiliter omnium plenus, Græci plethoricum dicunt appareat. exhibere cum cibis edendum conducit piper aut allium: potui uinum ualidum: recentibus uaporibus & conuenienti naturæ caliditate, corporis temperamentum replere, deinde iis oblinere, quæ commorſam partem poſſunt calefacere & uellicare. Imponetur itaque cinis braſſicæ aut ſici aceto miſtus, aut lixiuiâ, aut garum & cepe cum polenta aut pane: item porra abunde cum ſale, aut pix liquida cum ſale, calida: aut cedrus, aut ſimus caprillus. Conuenit autem

LIBER QVARTVS. 199

ipsis acetum calidum quoque superfundere, in quo ne
 pita sit incocta: aut acetum & aquam marinam, aut os
 xalmen. Cæterum locis affectis gallinæ, & magis galli
 gallinacei, aliave animantia per medium dissecta calida
 5 q; imponi debent. Nam uirus transsumunt euocantq;
 & dolores mitigant. Emplastra quoque utiliter applica
 tur, quæ sale, cachry & adarce constant: in totum, quæ as
 crioris sunt potentia. Omnes tandem communiter &
 morfi & icti à uirulento animali, modo interiora omni
 10 no offensa sint, ex uino potabunt intybum, quod serin
 dicunt, aut ericen, aut asfragalon herbam cum aceto, aut
 bitumen, paliuri similiter aut ueteris rhu decoctum, aut
 mustelle inueteratæ denarii duo ex uino sumpti, præsen
 ti sunt remedio, uel marinæ testudinis sanguis, aut casto
 15 rii drachma cum diluta uini potione, aut roris marini tā
 tundem, aut sicyoniæ radicis, aut porri succus, aut cha
 mæpitys, aut smyrnium, aut cinnamomum, aut aristolo
 chia, aut uiticis semen, aut cupressi pilule, aut seseli, aut
 piper, aut trifolii semen, aut baccæ lauri, aut cancer fluo
 20 uiatilis tostus aut elixus: item composita hæc Theriace
 utilis est.

THERIACE ADVERSVS VI

rulenta & lethalia uenena, uiperæ
 morsus, & scorpionis ictus.

25 Bryoniæ, opopanax, iridis illyricæ, roris marini radicis
 zingiberis, singulorum denarii quatuor, aristolochiæ de
 narii quinque, lachrymæ thuris, rutæ syluestris, singulo
 rum denarii tres, farinæ erui, denarii duo: finguntur pa
 stilli uino, danturque singuli, qui treis obolos peno
 30 deant, ex eodem uino. Cæterum purgatio omni
 bus conueniet, desudationes, et theriace ex uiperis
 assumpta.

DE RABIOSI CANIS MORSV,

& metu aquæ, quæ hydrophobia
 dicitur. Cap. III.

35

PAULI AEGINETAE

EXordium sermonis à rabiosi canis morſu accipe
 re, quàm ob aliis maluimus, q̃ animal & foecun-
 dum prouentu, & contubernale homini exiſtat, ra-
 bieq; ſæpius corripatur & ægre caueri poſſit, ac peric- 5
 culum ab eo ſit inuitabile, niſi multis aliquis & conue-
 nientibus uſus fuerit præſidiis. Rabiunt canes plerunq;
 in æſtu uehementiore: ut autem Lycus memoriae man-
 dat, interim etiam per frigora maxima: rabidi autem &
 potum & cibum auerſantur, ſiti premuntur, neque tamē 10
 bibunt: anhelant præterea non parum, aures inclinant, ſa-
 liuam & copioſam & ſpumantem edunt, muti in totum
 ſunt, & uelut inſani, ut ne domesticos quidem agnoſcāt:
 inſilunt ſine latratu omnibus pariter & beſtiis & homi-
 nibus, mordentq; ubi momorderim ſtatim quidem ni- 15
 hil moleſtiæ adferunt, præterquam ex uulnere dolorē:
 poſtea uero aquæ metum, hydrophobiam Græci ap-
 pellant, faciunt, qui cum conuulſione, totius corporis
 rubore, præſertim in uultu, ſudore, & ſui faſtidio accidit
 aquam fugiunt, & dum uident, & dum admoventur: nō 20
 nulli etiam omnem humorem: alii canum ritu delatrant
 & obuium quenq; dentibus appetunt, morſuq; ſuo in
 alios eandem affectionem transferunt. Porro acciden-
 tium, aliorum quidem cāuſa mañiſteſta eſt, occupatis
 ſcilicet ueneno partibus uniuerſis: metum uero aquæ 25
 nonnulli ex immodica fieri ſiccitate dixerunt, quaſi hu-
 mida ipſorum ſubſtantia in contrarium penitus habitū
 mutata, uerum Rufus inſaniæ ex atra bile ſpeciem, eam
 eſſe teſtatus eſt ueneno humorem illum imitato: quem
 admodum alios atra bile inſanientes, nouimus alia ti- 30
 mere, quæ cauſa ſuperuenit etiam iis, qui dicunt canis
 qui momorderit imaginem in aquis opinari ſe uidere.
 At ex iis, qui hoc uitio ſunt occupati, nullum, præterq;
 unum aut alterum ſuperuiſiſſe, ex hiſtoria didicimus,
 eosq; non à rabioſo cane morſos, ſed ab homine quo- 35
 dam morſu uitium adeptos. At ante affectus huius oc-
 cupationem multi etiam quos canis momordit, ſeruati

- sunt hinc igitur curatio auspicanda est. Quoniam uero subinde, eo quod tunc aquæ metus non inuadat, (magna enim ex parte circa quadragesimum ferè à morfu diem solet ingruere, quibusdam & post sex mensibus, proditum est nonnullis post septem quoque obuenisse) nō nulli canem qui momorderat non rabire arbitrati sunt, properarunt uulneri cicatricem inducere: unde ipsi canesam huic affectioni dederunt. hanc autem probatione usus deprehendes, morsus rabiosine canis fuerit, an nō.
- 10 Iuglandibus nucibus concisis, uulnus diligenter obstruitur, sequenti die ablata, gallinaceo, aut gallinæ in cibo apponentur: ac primum sane non attingent, fame autem non urgente si edant, rem considerato. Nam canis qui momordit si non fuerit rabiosus, uiuent: si rabidus, sequenti die peribunt. atque tunc ad uulneris dilatationem properandum est, iterumq; post paucos dies eadem indicatione utendum, & si non perierint gallinacei, tunc ulcus ad cicatricem perduces, nullum ueritus periculum. Hanc itaque indicationem Oribasius tradit.
- 20 Quod si ex commemoratis indicis accurate canem rabire cognouerimus, statim iis medicamentis quæ apeririundi uim habent, utemur. Primum igitur ex aperiuntibus est, quod pice, aceto quàm acerrimo, & opopannace constat, in capite de neruorum uulneribus explicatam: at si qui morsum accepit delatationem cutem habeat, dilui ipsum irino debet, aut balsamo, aut eiusmodi ailquo: uel ulcera prius fomentis adiuta, allio oblines. hoc quod sequitur etiam crustam facit.

30
ARIDVM AD CRVSTAM
in canis rabiosi morfu excitandam.

- Salis fossitil denarii octo, chalcitidis denarii sedecim, scillæ tantundem, rutæ uiridis denarii quatuor, æruginis rasæ totidem, marrubii seminis denarius: utitor primum arido ut crustam inducat, deinde cum rosaceo, ut

PAULI AEGINETAE

crustæ excidant. Cæterum partes affectæ ad dies quas
dragintaduos, ut minimum, sine cicatrice seruentur.

CATAPLASMA QVOD

ras uulneris latis in rabidi canis

morsu seruat.

Cepæ cum sale & ruta illinuntur, aut silphium cum sale
aut fassamentum uetus, aut cinis sarmentaceus cum o
leo, aut allia, aut sambuci folia, aut mentha, aut apiastrū,
singulatim, aut cum sale: aut iuglandes nuces, cum allio
sale, & melle, aut cinis fici cerato exceptus. uulnus autē
aqua abluetur, in qua decoctum sit chamæmelum, &
syluestris lapathi radix. Nonnulli & ferro candenti ul
cus adurunt. Cæterum potui assument commorsi, sim
plicia quidem, lycium, absinthium, liquorem silphii, cha
mædrin, scordium, & polium: composita autem hæc,
cancrorum fluuiatilium, sarmentorum uitis albæ, in cy
prio uase, aut æreo combustorum, cochlearia duo, gen
tianæ radicis leuigatæ cochlear unum, cum uini meri ue
teris cyathis duobus, ad dies quatuor potui dato, aliqui
uero & perdicis sanguinis duo chlearia addunt. Capies
autem cancos, dum luna increfcit, priusquam sol exo
riatur, iis autem qui eodem die non biberunt, duplicē
portionem exhibeto, interim & triplicem. Iam theriaca
ex uiperis recte datur. Purgare expedit medicamento
ex cucurbita syluestri, ita ut quotidie id exhibeas, cum
decocto eleliphaci, aut sideritidis heraclæ, quam &
dialyson appellant: nonnulli uero & iecur canis qui mo
mordit, edendum dederunt. Cæterum uictus ratio talis
adhibenda est, quæ simul ueneni uireis hebetet extin
guatq; simul & descensum ad interiora prohibeat: quæ
duo præstare potest, uini dulcioris uetusti & meraci, la
ctisq; potio. idem efficiunt allia, porri & cepæ in cibo
sumpta. At si per initia ob impedimentum aliquod nō
præsumpta, quæ retulimus remedia fuerint, sectio uel
cucurbitulæ uel ustio non adhibenda est, ut quum iam
uenenum penitus secesserit, medicamentis autem quæ
euocent,

euocent, Græci metasyncritica uocant, uti consilium est, aquæ metu uidelicet non oborto. purgatio ex hiera & scisili lacte petetur. item sudoris euocatio, dropacismus & sinapismus, toto corpore particulatim adhibebitur. omnium tamen efficacissima deprehensa est purgatio quæ fit per ueratrum.

AD MORSVS CANIS NON
rabiosi. Cap. IIII.

Canis non rabiosi morsus, quum & ipsi uirulentæ cuiusdam substantiæ sint participes, statim aceto irrorans, lata manu morsum ferito, insuper nitrum cum aceto tritum desuper deturbato, deinde spongiam recentem aceto, aut ipso nitroso aceto madidam imposito, triduo id ipsum superfundens, tandem enim conforescet: uel erui farinam oleo maceratam imposito: aut spongiam recentem, aut lanam succidam aceto & oleo imbutam accommodato, aut rubi folia cum aceto tinsa illinito, aut cepam tritam cum melle, aut origani comæ, salis, cepæ, pares singulorum modos cum melle: uel marrubium nigrum, quod & baloten dicunt, cum sale, ad feruidos autem iam morsus, erui farina melle macerata admouetur. peculiariter enim his efficacax est: inflammatione conflantes argenti spuma trita ex aqua oblinito.

DE VESPIS ET APIBVS.
Cap. V.

Apium ictu dolor sentitur, locus rubescit, propinqua partes tument, crescuntque, aculeus in uulnere relinquitur. In uespis autem similia quidem sed intensiora omnia sunt, nec aculeus relinquitur. Remedio sunt aduersus utraq; lutum, & bubulus finus, illita, & lac ficulneum, aut concisa mori arboris folia, aut maluæ: aut farina ordeacea ex aceto imponitur. quætiâ muria aut marina aqua fouere conducit.

DE PHALANGIIS. Cap. VI.
PAV. ÆGIN. CC

PAULI AEGINETAE

P Halangiorum morsu, locus ipse quidē rubescit,
 & ueluti aculeo punctus apparet, non autem tu-
 met neq; incalescit, sed leniter rubidus, frigore &
 pruritu uexatur. Comites notae percussorum sunt: perfrī-
 ctio, tremor, corporis grauitas, sudor frigidus, labor uas-
 lidus, pallor, continua urinæ excernendæ incitatio: quib-
 usdam & urinæ difficultas, colis intensio, lumina humē-
 tiora: inguina & poplites contenduntur rigentq; conuul-
 sorio modo, ualida stomachi rosio urget, lingua sermo-
 nem manifesto non explicat, uomitus aquæ uel aranea-
 rum textis similium erumpit. sunt etiam quibus per uri-
 nas, & aluum eadem descendunt, demissi igitur in aquā
 calidam dolore liberantur, ac rursus ualide indolent. Au-
 xilio est, si extrinsecus cinerem ficulneum cum sale læui
 ex uino maceratum, imponas: aut radicem syluestris pu-
 nicæ tritam, aut aristolochiam, cum farina ordeacea ace-
 to demersam. Iā & ulcera fouere marina aqua calidior-
 re, aut apiastri decocto conducit, eiusdemq; folia impo-
 nere, ad hæc balneum frequentius utile est, atq; his po-
 tionibus medicis uti: abrotanti semine, anetho, aristolo-
 chia, agresti cicere, cumino Aethiopico, cedri baccis cō-
 cisis, platani cortice, trifolii herbæ semine, myricæ semine,
 singulorū drachmis duabus cum uini cyatho & uiri-
 dium cupressi pilularū decocto, uino tēperato. Ferunt
 nonnulli & cancrorum fluuiatilium succum cū lacte &
 apii semine datum, periculo subtrahere.

DE ARANEÆ ICTV.

Cap. VII.

Est quoddam etiam aranearum genus quod per-
 cussu ualidos dolores circa media præcordia ex-
 citet, item ruborem, & urinæ difficultatem, non
 nunquam & strangulatum. Leuantur autem icti hisce
 remediis: cumini syluestris thebaici, aut uiticis seminis,
 aut albæ populi foliorum potu, uel alliis solis assumptis
 & uino meraciore superbibito iuuantur.

LIBER QVINTVS. 202
DE SCORPIONIS ICTV.

Cap. VIII.

A Scorpione ictis locus quàm primum inflame
mari incipit, duratur, rubet, & cum dolore supra
modum rigescit, nunc feruor, nunc frigus uicis-
sim inuadit, acceditq; dolor qui itidem modo decrescit
modo intenditur, comitatur ipsos sudor horroris sensus,
tremor, extremorum perfrictio: inguina his attollun-
tur, particula intenditur, sæpe etiam flatus cum sonitu
per sedem erumpunt, pili rigent, cutis fit discolor, do-
lorq; tota cute affligit, ceu acus spiculo excitatus. His
auxiliantur protinus, lac ficulneum instillatum uulneri-
bus, ipseq; scorpio qui percussit minutim contritus, uul-
neriq; impositus, sibi pulcherrimum medicamentum
est. post hæc sal tritus cum lini semine salutariter im-
ponitur, item altheæ herbæ, quæ hibiscus est, semen succu-
rit, & sulfur uiuum resina terebinthina exceptum: simili-
ter etiam galbanum splenii modo dilatatum impositumq;
nepitaq; concisa & applicata, & ordeacea polenta uino
confecta & in rutæ decocto exhibita: auxiliatur his etiã
trifolii herbæ semen leuigatum iniectumque. Ad hæc,
potiones hæc conueniunt: aristolochiæ denarii duo,
præsertim corticis radice cum uino, gentiana tusa,
pulegiumque abunde decoctum, item baccae lauri
numero decem leuigatæ, nepita cum posca largiter
incocta, cyperis cum uino, ruta similiter, lac ficulne-
um & silphium, si adsit: si desideretur, particho liquo-
re utendum erit. benefacit etiam trifolii ocimiq; se-
men epotum. idem præstat argenti spuma subito ictui
præter opinionem imposita. omnibus his addatur bal-
nei continuus cum multo sudore usus, uini potio tem-
peratura meracior. Porro composita hæc potari de-
bent: sulfuris uiui fabæ Aegyptiæ instar cū piperis gra-
nis octo, in dimidia uini hemina: uel liquor silphii
cum cancro detricto in uino: aut melanthii, cumini

CC ii

PAULI AEGINETAE

Aethiopici, uiticis seminis, pares portiones cum uino.
AD SCORPIONVM PERI
culosorum & phalangiorum idus.

Fecis drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, ru-
tæ syluestris seminis drachmæ tres, castorii, erucæ seminis, singulorum drachmæ duæ: excipiuntur sanguine te-
studinis marinæ. dantur quaterni oboli cum uini meraci
uel aceti cyathis tribus. ALIVD. pyrethri, aristolochiæ,
singuli trientes, piperis denarii duo, liquoris silphii dena-
rius: exhibetur ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem.

DE SCOLOPENDRA TERE

stri & marina. Cap. IX.

AT si scolopendra momordit, communiter quid-
dem locus affectus in orbē liuescit, attolliturq;,
aliquando feci similis, rarius autem ruber appa-
ret, exulceraturq;: sumptu à morsu ipso initio, laboriosa
ac curatu difficili exulceratione. præter hæc etiam toto
corpore pruriginis sensus percipitur. peculiariter autem
iis qui à marina scolopendra impetiti sunt, aquosus pel-
lucidusq; tumor interim efficitur: à terrestri, rubens. Pla-
gæ igitur imponi debet sal bene tritus, uel ruta concisa,
aut cinis aceto maceratus, aut scilla, fouendus locus est
oxalme. Archigenes autem oleo calido liberaliore fieri
id iubet & prædicta sic imponi. Potui dabitur aristolo-
chia cum uino, aut serpillum, aut nepita, aut syluestris ru-
ta, aut trifolium, aut succus radicis asphodeli dimidiæ
heminae mensura cum uino.

AD STELLIONIS TRANS

marini morsum. Cap. X.

Sesamo trito illinito.

DE FELE. Cap. XI.

Qui à fele mordentur, ualde quidem dolent, &
locum affectum liuidum habent: sed statim ce-
pæ & allia istui applicata auxiliantur. insu-
per eorundem elus, uino meraco superassumpto, res
medio est.

LIBER QUINTVS.

203

DE MVRE ARANEO. Cap. XII.

- V**Bi uero mus araneus nocuit, sequuntur dolores pulsatiles, & in singulis dentium eius animalis ictibus, rubores: pustula insurgit sanioso humore plena, propinquæ partes omnes liuent: cute pustulæ dirupta, album ulcus apparet. nam ad membranas nervosas deraditur. ad hæc, excidunt etiam partes de pastione oborta, his quæ serpunt simili: præterea etiâ intestinorum tormina comitantur, urinæ difficultas, & frigidi sudoris undiq; eruptio. Auxiliatur ipsis galbani splenium per se impositum, uel tritum cum aceto, uel ordeacea farina, cum oxymelite applicata, ipseq; mus araneus qui momordit dissectus admotusq; sibi est remedio. aduersatur etiam pyrethrum illitum, uel mali Punici dulcis corium incoctum, uel malua syluestris, uel alia contrita, uel sinapi leuigatum cum aceto: item ex calida muria fots conducit, deinde ordeum ustû ex aceto applicatum. Potui propinabitur abrotanum ex uino coctum, aut sisymbrium, aut serpillum, aut eruca, aut galbanum, aut elelisphacum, aut teneræ cupressi pilulæ cum oxymelite, aut pyrethrum cum uino, aut chamaeleontis radix, aut hædiagnive coagulum, aut gentianæ radix, aut uerbenaca, quæ etiam imponitur: ipsumq; murem, qui momorderit exakte detritum cum uino bibunt. Efficax hoc etiam quod sequitur: myrrhæ drachmæ sex, aristolochiæ corticis drachmæ quatuor. porro ad muris aranei & scolopendræ morsum, sal cū liquida pice recte applicatur, aut cedria cum inelle, aut alium cum fici foliis & cumino, aut nepitæ folia, uel ordeum etiam cum aceto.

DE VIPERA TVM MARE
tum foemina. Cap. XIII.

- I**N uiperæ, tum maris, tum foeminæ morsu, simillimumve animalium uirus relinquentium, dolor loci statim ab initio sequitur, mox totius corporis: appas

CC lli

PAULI AEGINETAE

rent etiam in morfu duo foramina paruo inuicem spatio discreta, fluitq; ex his sanguis humorq; saniosus, de inde oleosus, postremo etiam æruginosus, quem nonnulli uirtus bestiarum esse dicunt. præter hæc tumores iuxta morsum subrubri liuidiq; assurgunt, corporis color perit: uertigines oculorum, stomachi resolutio, & animæ defectus oboritur, quibusdam etiam uomitiones biliosæ, urinæ angustia: insuper pustulæ in commorsa parte erumpunt, ueluti in ambustis: item depastio ipsa inuadit, ad uiciniam procedens, gingiuæ his cruentantur, accedit etiam tremor, sopor, & frigidi sudores. minori autem cum periculo liberari quos uipera mas, quam quos foemina momordit, uidentur: ex his ipsis minus periclitantur qui cibum præsumpserunt. In curatione autem præstantissimum remedium est, allii esus, & uini meraci potio, adeo, ut si aliquis uti sustineat, nullum præterea remedium desideret. eduntur etiam utiliter & porra & cepæ et salsamentum quàm acerrimum. Sunt qui et ranas in cibo elixas dederunt. benefaciunt & hæc quæ sequuntur cum uino singulatim pota, testudinis marinæ sanguis resiccatus cum cumino syluestri, coagulum leporis aut hiniuli tribus obolis, ceruini genitalis sicci denarius, anchusa tenuifolia tota, hanc autem nonnulli etiam collo suspendunt, porri succus dimidiæ heminae mensura ex mulla, apiastri foliorum succus, syluestris ruta, gallinaceorum cerebrum, panacis radix cum uino incocta, agarici drachma, iuniperi baccae, hastulæ regiae radix, pistacia trita, uiticis semen, mustelæ inueteratæ siccataq; denarii duo, echini radix succusque, cancri fluuiatiles aut marini per se, cumq; uua passa syluestri, sale et polio: aristolochiæ radix cum myrrha, gentiana, baccis lauri, æquali modo melle excepta, atque hoc quod subiungam mirisfice efficax est.

ORIBASII AD VIPERAM RVM MORSVS.

Anisi acetabulum, piperis, *singulorum drachmæ quatuor, aristolochiæ corticis, opii, castorii, myrrhæ, singulorum drachma: passo leuigata in pastillos instar fabæ Græcæ cogito, et pro uiribus cuiusque exhibeto, cū

* Videtur aliquid deesse.

- 5 ternis diluti uini cyathis. **A L I V D** ex Lyci commentariis medicamentum uiperæ moribus efficax. Myrrhæ, castorii piperis, sandarachæ, singulorum drachma, anethi seminis acetabulum: leuigata ex passo dantur.
- 10 **A L I V D** ex Archigenis commentariis. Cancros uisginti cum farinæ triticeæ quod satis est, in pila diligenter contundito, admixtaq; nepita et salis momento, pastillos fingito et siccato: in usu, cum lacte illinito, unumq; cum mulsâ potato. At si fluuiatiles cancros desideres, marinis utitor. extrinsecus autem plagæ delitus caprarum
- 15 finus ex uino strenue auxiliatur: aut lauri folia cū oleo incocta, aut baccae lauri, aut nepita, ericæ, ruta, apiū, abrotanum, galbanum in splenio adhibitum, origanum uiride concisum, gallinacei pulli dissecti, et protinus calidi impositi, farina erui cum uino macerata crebro illita, radiculæ cortex concisus, scilla tosta, cruda polenta ex oxymelite, cucumeris syluestris folia cum tenuissimō
- 20 farinæ ordeaceæ polline, sex uini similiter cum farinæ polline, ruta cum sale et melle, surfures in aceto coctæ, cinis cum aceto, cedrinus liquor cum sale, pix liquida cum sale. Fouere debent trifolii decocto aut pulegii, aut oxalme. Quum autem subcruentæ pustulæ euaserint, ipsas scarificabis, ita ne excories. deinde multa aqua foueto, lenticulam coctam cum melle oblinito, dum consanescant. At ex uiperis antidotum
- 30 proprie his et potum et plagæ impositum efficax est.

DE AMPHISBÆNA ET SCYTALIS. Cap. XIII.

- 35 **C**onsimilia ex horū moribus eueniunt, eademq; ipsis auxiliantur: quare peculiarem aliquam descriptionem sortita non sunt.

CC iiii

PAULI AEGINETAE
DE DRYNO. GALENI HÆC
præfatio. Cap. XV.

DRyinus in quercuum radicibus uitam agens,
tam malefica parataq; ad nocendum ui est, ut
calcatus solum, pedes hominis cute nudos res
linquat: totisq; cruribus tumorem laxum quē oedema
uocant, copiosum excitet. Ad hæc quod multo magis
est mirabile, ferunt omnes eorum pariter manus exco-
rari qui curationem uitii administrauerint: & si quis ul-
ciscendi studio interemerit, grauiter olere bestia, illoq;
suo odore omnium aliorum odorum sensum auferre.
Itis ab hoc animali tumor circa locum uilitatum cum
rubore excitatur, pustulae in circuitu assurgunt. aliquan-
do aquosus humor emanat: stomachi erosio uexat, &
tormina. Congruunt ipsis aristolochia uino pota, item tri-
folium herba, radixq; hastulae regiae consimiliter assum-
pta, prosunt & concisa pota; cuiuscunq; quercus gla-
des. itidem illicis radices tinsa, & loco admotæ dolo-
rem leniunt.

DE HÆMORRHOO, ET PRE
stere. hoc est, diplade. Cap. XVI.

Qui hæmorrhoi ictu sensere, grauib; cruciatur
doloribus, iisq; crebris, admodū breuia angus-
taq; redduntur corpora, multus ex plaga san-
guis erumpit: et si cicatrix toto corpore inducta fuerit,
rumpitur, funditq; sanguinem. cruenta excernuntur res-
crementa, sanguis qui distillat, in grumum cōcretus est:
tusi ex pulmone sanguinem reijciunt, euomentes sine
remedio intereunt. A diplade percussos ardor intolerabi-
lis urget, sitis tanta excruciat, ut nec extinguere nec itermit-
ti possit: copiose potū acri hauriunt, eadē tamē siti cō-
ficiuntur, tanq; nihil plane hausissent, similisq; ex conti-
nuo licet poculorū haustu habitus subsequitur. unde pre-
ter ab urendo, diplas à sitiendo serpens appellatur. Mul-
ti autem ueterum ab hæmorrhoo et diplade commor-
sos ceu desperatæ salutis et cōclamatos esse putauerūt.

Porro si specialia aduersus færam præsidia desideremus, communia tentare oportet, ac protinus scarificationem uisionemq; adhibere: & si liceat, partem uitias tam præcidere. deinceps autem acria cataplasmata imponi debent, utilia sunt omnia ciborum accrementa ad uomitionem quæ sita, præsertim quæ ex fassamentis petuntur, uini meraci potio, & lauiacrum. hæc autem continue, & exiguis temporum interuallis subinde adhibenda, priusquam morbi accidentia corripiant. nam ubi illa

10 la semel emerferint, nulla medicorum ope iuuantur. Ceterum remedia quæ loco inducuntur, contra morsus inscripta reperimus, dipsadis quidem, portulacæ folia concisa ex aceto, polentam, rubi folia cum melle læuigata, plantaginem, hyssopum, allium album, porrum, rutam,

15 urticam: hæmorrhoi, præter iam dicta etiam hæc bene faciunt, uitis folia cocta cum melle concisa. per os autem hæmorrhoi ipsius caput crematum potui datur, aut scordion herba cum irino oleo: esui dantur etiã uuæ passæ

DE NATRICE, QVAM GRÆC

20 ci hydron dicunt. Cap. XVII.

Natricis morfu ulcus factum dilatatur, & liuescens augetur, sanies ex eo nigra, copiosa, & foedi odoris, qualis ex depascente ulcere, excernitur.

Curatio mali, temporis processu, & uix procedit. imponetur itaque morfibz origanum læue, ex aqua maceratum. confert & cinis quercus, oleo temperatus: uel hordeacea farina cum melle deliquato bibitur, item aristolochia drachmis duabus, uel in poscæ duobus cyathis: deinde marrubii succus aut decoctum cum uino, aut

30 nasturtium syluestre, aut semen asphodeli seu flos, aut foeniculi semen cum uino: item recens fauus cum aceto comeditur.

DE CENCHRO. Cap. XVIII.

Quod si cenchrus nocuit, morsus eius uiperæ similis est, putredo comitatur & carnes intumesfactæ, prius, ut in aqua inter cutem, decidunt,

35

PAULI ÆGINETÆ

inexpugnabili dormiendi necessitate premuntur sopiunturq; Testatus Erasistratus est, iecur ipsis, uesicam, & colon affici: resectis siquidem ipsis, partes quodammodo corruptæ inueniuntur. His igitur lactucæ semen cū lini semine illitum auxiliatur, succurrit & satureia concis sa, ruta syluestris, serpillum cum hastula regia leuigatum potui uero datæ protinus, centaurei radicis drachmæ duæ cum ternis uini cyathis: aut aristolochiæ radix similiter, nasturtium itidem & gentiana, potu conducunt.

DE CERASTE ET ASPIDE

DE. Cap. XIX.

TRia aspidis genera Galenus prodit, primum eius quam chersæam quasi terrestrem uocant, mox eam quæ chelidonia dicta est, tertiam pyada appellarunt, quæ omnium est perniciosissima. siquidem erecto in priorem partem collo ex interuallo quod satis esse coniciat, uenenum in hominem iaculatur, hanc memoriæ tradit, reginam Cleopatram, quum Antonio deuicto Augustum uictorem timeret, sinistræ mammæ admouisse, morsamq; ab ea interiisse, ut quæ longe celerissima mortem inferat. Porro cerastis morfu locus cū duritie & pustulis intumescit, emanat ex uulnere sanies, modo nigra, modo subpallida & porraceo colore: totum corpus uaricum modo attollitur, genitale arrigitur mente alienantur, oculi obscurescunt: postremo conuulsione rigentium instar pereunt. Verum aspidis morsus acus puncturæ similis, omnino exiguus sine tumore apparet, sanguis non copiosus sed exiguus & niger destillat, subita oculorum hebetudo inuadit, dolor corporis multiplex admodum, sed mitis, nec sine uoluptate comitatur. Quapropter recte Nicander cecinit.

Et uir perit absque dolore.

Mutatur color & uitescit, stomachi rosio exigua infestat frons continue contrahitur, palpebræ sine sensu ueluti in somno commouentur, atque inter hæc mors pres

hendit, ne tertia quidem diei parte dilata. His ita
que utrisque membri affecti mutilatio mox à morfu
facta, succurrit: eoque sine mora, si fieri potest, præ
cidendum est: aut in his & propinquis partibus om
nem carnem circum secare statim, & radicitus usque ad
os excindere oportet. deinde reliqua ferro candenti
adurenda sunt. etenim uenenum hoc, quemadmodum
& basilisci, bubuli lactis instar, sanguinem in arteriis &
spiritum congelat.

DE BASILISCO. Cap. XX.

HÆc bestia raro quidem hominum oculis occur
rit. Erasistratus autem hæc inquit: quum basiliscus
morderit, plaga sub flauo quasiq; aureo co
lore tingitur. cōducunt ipsi, inquit, castorii drachmæ tres
potæ. similiter etiam papaueris liquor. Nos autem hæc
experti non sumus.

DE PASTINACA MARINA,
& muræna. Cap. XXI.

IN marinis nempe pastinaca & muræna, agnitio ma
nifesta est, pisces enim hi ab omnibus cognoscun
tur. Auxiliantur ipsorum moribus, lactis ficulnei
guttæ quatuor aut paulo plures, cum cicutæ, sero
pilli tribus aut quatuor, & quæ ad uiperas comme
morata sunt.

DE DRACONE MARINO.
Cap. XXII.

MArini draconis ictum, plumbo infricato, aut
serpillo conciso illinito, aut lente elixa, aut
sulfure cum aceto, aut dracone ipso dissecto.
foueri locus urina humana debet: absinthium cum
diluta uini potione bibi: aut elelisphacus, aut surcus
li ficulnei, in dulci uino dilutum, aut piscis ipsius
cerebrum.

DE SCORPIONE MARINO.
Cap. XXIII.

PAULI ÆGINE TÆ

Scorpia marini ictum sanat nullus piscis dissectus
impositusque, sulfur uiuum cum aceto, infricatum
bacca lauri tres concisæ potæq;.

Q V O M O D O T E S T V D I

nis marinæ sanguis præpare-
tur. Cap. XXIII

Testudinis marinæ sanguis in hunc modum præ-
paratus, reponitur. In ligneo aut fictili uase resu-
pinata testudine, caput ipsius celeriter amputato,
concretum autem sanguinem in multas partes arundi-
ne diuidito, impositoq; operculi instar uasi cribro, in so-
le reponito: siccatum excipiens utitor aduersus uipera-
rum morsus, ut prædictum est, drachmis duabus cum
uno aceti cyatho: tertio die, drachmis duabus cum tri-
bus aceti cyathis.

DE CROCODILI MORSV.

Cap. XXV.

Ad crocodili morsus nitrum cum melle tritum
usq; dum ulcus repurgetur, imposito: deinde re-
pleto melle, butyro, medulla ceruina, adipe anse-
rino. Galenus autem tradit se cognouisse qui à croco-
dilis commorsi, adipe ipsorum imposita uulneribus, ex-
acte fuerint adiuti.

DE HOMINIS MORSV.

Cap. XXVI.

Non extra institutum fuerit, cum uirulentis besti-
is, etiam hominis morsus conscribere. siquidem
maligniores multo aliis ulceribus apparent, præ-
sertim si ieiunus momorderit, prius leguminibus usus,
& præsertim lenticula. Communiter itaque quæ in aliis
uirulentis commemorata sunt, etiam in his extrinsecus
per initia morsibus applicare conueniet, præterea quæ
nimium acria adurentiaq; sunt. peculiariter autem oleo
morsum prius illitum, foeniculi radice cum melle obli-
nito, aut lomento cum posca & oxyrodino, frequen-
ter immutans. Emplastro autem hoc utere, quod recio

pit squamæ æris, galbani, æruginis, singulorum unciam
teræ libram, plumbaginis libras duas, olei sextarium:
plumbago cum oleo prius incocta assumet æruginem
& squamam: ubi coierint, quæ liquari possunt, adduntur.

§ Finita autem inflammatione, communis ulceris modo
etiam hæc curabis.

DE VENENIS. Cap. XXVII.

10 **Q**Uum de uirulentis bestiis succincte tradideris
mus, proximum fuerit, ut de uenenis sermonē
aggrediamur, simplicia quidem referentes eo
rumq; notas & remedia, tum communia, tum specialia:
composita autem ex studio omitemus. etenim nonnul
li uariorum medicamentorum lethalium composicio
nes exposuerunt, quæ nocere magis, quàm iuuare le
25 gentes possunt, neque enim exacta horum indicia in his
qui assumpserunt, inueniuntur, ut etiam congruum ipsis
remedium queas adaptare. Quum igitur hæc uaria ex
superante in ipsis ui appareant, id etiam aliquis recte qd
exhibetur, uarium adaptans, nonnunquam ex æquo nõ
30 nunquam ut excellat medebitur. Incipiemus itaq; & hic
rursus à præcautione.

DE VENENORVM PRÆ
cautione. Cap. XXVIII.

25 **D**E uenenosis medicamentis disciplinæ ea pars q
præcauere illa & declinare præcipit, longe diffi
cillima est, propterea quòd ii qui huiusmodi insi
dias homini clàm machinantur, tanto id astu faciunt, ut
uel peritissimus quisque decipi possit, siquidem amari
tudines uenenorum dulci aliquo admixto, obtundunt,
30 grademque odorem odoramentis additis operiunt, ino
terim ceu ad sanitatem, salutisque gratia in morbis hæc
propinare crediti, quod genus est absinthium, abrotanū
opopanax, castorium, uenena ipsis admiscunt, tum in ci
bis, puta durioribus, uel obsoniorum uarietate adum
35 brantes, ipsa offerunt. unde cui in suspitione huius doli
uita fuerit, uitare cum oportet condita elaborataque

PAULI AEGINETÆ

cibaria, omneisq; in gustu qualitates iutesiores, exem-
pli gratia, dulceis, acidas & salsas. potissimum uero
aquæ quod satis est præsumere oportet. restincto
enim hac appetitu, postea qualitates aliæ à stomacho
non apprehenduntur, ueruntamen alia quædam ratio as-
serendi hominem ab iniuriis uenenorum est efficacior.
Conuenit enim quum suspicio mali medicamenti acces-
pta fuerit, præcomedis aliquid quod obtundere uene-
na possit, & inefficacia reddere: cuiusmodi sunt carica
cum nucibus iuglandibus, ruta, salis grumo, & quæ mas-
la medica dicuntur: item naporum semen denarii pon-
dere cum uino, aut nepitæ folia, aut rubrica, quam lemn-
niam sphragidem uocant, aut rutæ folia uiginti: nullūq;
nocebit uenenum. Iam uero antidota cum uino quoti-
die fabæ Egyptiæ instar assumpta, tuto admodum præ-
seruant, quale est quod terrestri crocodilo constat, dia-
scincus dicitur, & quod à uariorum animalium sanguine
dia hæmaton uocatur, & Mithridatium. hoc aliquādo
etiam ipse rex Mithridates usus est, quotidie præsumēs,
ut à lethali medicamento se uindicaret præseruaretq;. 5
Quum igitur à Romanis captus, bis lethali medicamē-
to epoto, mori non posset, gladio sibi ipsi uitam ademit.
Quoniam uero etiam citra insidias propter necessita-
tem aliquādo locis desertis, nocuius uersantes, forte sub
arboribus, exempli gratia, picea aut pinu cibum assu-
munt, diligenter attendendum est, ne ex his aut superio-
ribus locis mortifera labantur animalia, & uasa, tum
quibus hauritur uinum, tum quibus aqua, tum quibus
obsonia incoquantur, exacte operculentur, quem-
admodum in uirulentorum animalium præcautione 10
expositum est.

COMMVNIS VENENORVM

quomodocunque assumptorum

curatio.

Cap. XXIX.

AT si nonnulli lethale uenenū sponte sua, ut mori-
tem sibi consciscant, assumpserint, qualia multa 15

- in hominum uita solent accidere, aut etiam aliquorum infidiis, siquidem nobis constet quod ueneni genus potatum sit, protinus ad conueniens ei remedium descendemus, ut in horum enumeratione dicetur: at si medicamen exhibitum tunc nobis fuerit incertum incognitūq; conuenit statim ad ea quæ communiter ad quęcunque uenena sumpta congruunt, diuertere. Nam indicia quæ comitantur si expectes, nihil plane in medicina spei est, egris propter moram iam deploratis desperatisq;.
- Adutū igitur nulla mora interposita, oleo calenti per se, aut etiam cum aqua exhibito, uomere cogendi sunt. Si eius copia non est, butyrum cum aqua calida ingeri debet: aut maluæ, liuue seminis, aut tragi frugis, aut fœnugræci, aut urticę seminis decoctum. Non enim solum uomitionibus euacuabunt, sed aluum quoque subducent & uenenorum malignitati aduersabuntur, acrimonias ipsorum hebetantia, præsertimque oleum, quod manifesto inde licet cognoscere. Si nanque cutis exulcerandæ studio cantharide aut calce uiua aut eius modi quodam acri utaris, corpus oleo prius oblitum non exulcerabitur, imò neque corpus spissare potueris, oleo præunctum. Præterea uomitus non modo quod nocuum euacuat, utilis est, sed interim haustum uenenum odore, concretis grumis, aut colore prodit, odore siquidem & amaritudine, cicutam: colore, cæruleam uel gypsum: concretis grumis, lac, aut recentem sanguinem: halitus grauitate, uirus qualitate & odore, leporem marinum & rubetam ranam ostendit, ut per hæc ad accommodata singulis remedia uia non sit difficilis. Admiscetur autem oleo maluæ decoctum, aut anserinus adeps, aut ius ex carnibus pinguisimis, uel gallinaceorum: aut ex lignorum cinere facta lixiuia. Facit etiam huc nitrum detritum cum hydromelite potum uinum copiosum & uetus: & quæ adipe aut butyro constant. Verum iis quæ in aluo hærent, per uomitum ablatis: quod intestinis illapsum est,

PAULI AEGINETAE

clystere acriore euacuabimus. Post hæc lac potui dabi-
mus. nam ab hoc quod afficit, & uenenosum est: facile
immutabitur. Iam uero medicamenta omnibus com-
muniter conuenientia offeruntur, quale est, rubrica lem-
nia, abrotanum, agaricum, erysimum, cryngii radix, pasci-
nacæ erraticæ semen, uel nepitæ, nardum gallicum, cas-
torium, medulla uiridis ferulæ, nerii, quod rhododen-
dron est aut rhododaphne flores, marrubii succus, sil-
phium aut liquor ipsius, sagapenum, opopanax, peuce-
dani liquor & radix, aristolochia longa, ruta syluestris
semen, folia cestri, quæ betonica dicitur, danturque sin-
gula denarii pondere cum uino. Efficax in id est polii
herbe decoctum, & picis liquidæ linctus, generosissime
etiam opitulantur antidota superius comprehensa, ma-
gisq; ex uiperis theriaca. non autem easdem uireis ha-
bent, si post medicamenta lethalia assumantur, quas præ-
sumpta, quæ enim ipsorum quantitas præsumpta ad af-
fectum cauendum est sufficiens, hæc si, quadruplo auc-
tior, aut quintuplo, post præstetur, adiuuat: idque non se-
mel die, sed bis etiam, sic enim & Galeno illi, admiran-
do uisum est.

ENUMERATIO SIMPLICI

um uenenorum. Cap. XXX.

INter uenena, animalia quidem sunt uitæ noxia hæc
cantharis, buprestis, salamandra, piceæ eruca, lepus
marinus, rana rubeta, & mutescens palustris rana, hi-
rudines deuoratae: ex seminibus, altercum, coriandrum,
psillium, cicuta, melanthium: ex liquoribus opium, opo-
carpasum, thaspiæ succus, elaterium, mandragora: ex ra-
dicibus, chamæleon, aphronitrum, thapsia, ixia, ueratru,
agaricum nigrum, ephemerum, quod nonnulli colchicū
dicunt qd in colchide nascatur: ex ramosis & oleribus,
smilax, quæ nonnulli thymium uocant, Romani taxum
solanum furiosum, quod etiam dorycnion appellant,
sardoe herba, quæ species est ranunculi, papauer corni-
culare, pharicum, toxicum, ruta syluestris, fugi ab anima-
libus

libus autem, sanguis tauri recens, lac cui coagulum sit admixtum, uel quod ad Heracliam nascitur: metallica, gypsus, cerussa, calx, auripigmentum, sandaracha, argenti spuma, adarce, plumbum, et quod uocatur argentum uiuum: ex iis quæ domestica & in quotidiano uitæ usu sunt, uinum copiosum raptim à balneo potum, aut passum, aut frigida aqua similiter.

DE CANTHARIDE. Cap. XXXI.

- 10 **Q**VI cantharidem assumpserunt, eos notæ grauissimæ comitantur. fere enim à stomacho usque ad uesicam cuncta illis morderi sentiuntur, gustum simile pici aut cedrino liquori habent, dextra præcordiorum parte inflammationem experiuntur, urinam 15 difficulter, sæpe etiam sanguinem per eam reddunt: ite per aluum ipsis excernuntur, qualia in torminibus intestinorum egeri solent. præterea animo linquntur deficientq;: nausea ex ciborum repletionem, & uertiginibus laborant: tandem uero mente alienantur. Succurrit ipsis 20 uomitus ex hydrelæo petitus, & lactis potio, terræ cimoliæ denarii quatuor cum mulla, nuclei pinei, cucumeris semen. Adiuuat bene & ius pingue ex bubula factum, aut anserinum, aut ouillum: carnesq; gallinaceorum, aut agninae aut ouillæ, aut porcellorum, omnesq; 25 flacciscentes coctura longiore, & pingues cum lini semine elixæ: uinum itidem dulce & copiosum, thuris corticis denarii quatuor. Post cibum iniicietur per clysterem cremor oryzae aut chondri, aut tragi, aut ptisanæ, aut maluæ, aut lini seminis, aut altheæ, aut fœnugræci. interim etiam mulla cum nitro intestino absterge 30 so, conuenit hæc rursus inserere: postea uero inflammatione occupata medicamentis ex lini semine & ordeo lenire, per initia enim offendit. deinde & lauacris aquæ dulcis utendum est, item unguentum irinum rosaceumq; potui dabitur.

DE BVPRESTI. Cap. XXXII.
PAV. ÆGIN. DD

PAULI AEGINETAE

B Vpresti potione ingesto, in gustu nitro quippiā simile percipitur, dolor stomachi uentrisq; uehemens comitatur, eademq; partes in speciem hydropici intumescunt: extima totius corporis cutis intensditur, urinaq; cohibetur. Pro sunt ipsis quæcunq; aduersus cantharides opitulantur. priuatim autem conducunt, post euacuationes & uomitu & clystere factas, si cus aridæ, earumq; decoctum cum uino, aut lacte, aut mulso, prodest & pirorum omne genus, lactisq; mulieris potio.

DE SALAMANDRA. Cap. XXXIII.

Q Vibus salamandra data est, eis lingua inflammatur, sermo impeditur, tremor cum torpore quodam & resolutione urget, partes quædam corporis in orbem liuoribus uariantur, ut subinde pmanente ueneno putrefactæ defluant. Ad quæ omnia faciemus, quæ in cantharidibus dicta sunt, proprie autem resinam è picea, aut pinu, uel galbanum cum melle offeremus, aut nucleos pineos cum decocto chamæpityos: aut urticæ folia cum liliis in oleo decocta, testudinis marinæ uel terrestres oua elixa, ranunculorum ius esculentorum, incocta simul ipsi eryngii radice.

DE PICEARVM ERVCIS.

Cap. XXXIIII.

P Icearum eruca pota statim sequitur oris palatiq; dolor, ualida linguæ inflammatio, stomachi, intestinorumq; cruciatus, quæ cum pruritu circumtendi sentiantur: feruor itidem toto corpore affligit, tū nausea ciborum ceu ex repletionē infestat. Succurri debet non aliter quàm iis qui cantharidas biberunt. priuatim autem in ipsis loco simplicibus olei melinum adhibebimus.

DE MARINO LEPORE.

Cap. XXXV.

L Eporis marini potum, gustus sequitur piscibus nō ab similibus, uirosusq; tempore procedente alius

Indolet,urina supprimitur: si quando autem eruperit, purpurei coloris cernitur, præterea qui illum assumpserunt, auersantur oderuntq; pisceis omneis: sudor foetidis erumpit, biliosusq; uomitus, nonnunquam sanguine mixtus superuenit. Adiuuari autem debent hoc malo circumuenti, lacte asinino aut passo continue exhibito, aut maluarum radicis & foliorum decocto, uel peucedani radice concisa ex uino, aut ueratri nigri, aut scammoniae liquoris denario ex mulla, anserisq; sanguine recenti adhuc calido, item cæcros fluuiales solos, si sustinent, adferre oportet. Nota autem salutis est, quum piscem quoque possunt comedere.

DE RANA RUBETA, ET
palustri. Cap. XXXVI.

Rana rubeta, aut palustris hausta, corporis tumorem inducit, palloremq; intensum, buxo simile: ægre spiritus trahitur, os foetet, singultus infestat aliquando etiam semen sine uoluntate prorumpit. facile autem post uomitum reficiuntur, multa meraci uini potione assumpta, arundinis radicis denariis duobus, aut cyperi totidem. Cæterum cogendi sunt obambulare celeriter & currere, ob torporem, qui ex hoc malo contrahitur: ad hæc quotidie lauare.

DE HIRUDINIBVS.
Cap. XXXVII.

Hirudines potas cum aqua & adhærescenteis fauibus, inde adeo dignosces, quod uentriculi os uellicatur mordeturq; atq; hæc etiam nota est hirudinis deuoratae, nonnunquam & sanguinem floridum, hoc est, uiuum excreant, hirudinibus gutturi affixis, quas muriae sorbitio expellit, aut betæ folia cum aceto, aut nix cum posca epota, gargarizandum quoq; nitrû cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhæserint, in calidam aquam descendant. item lupinorum farinam assument: frigida in ore retenta eximentur, quippe frigida aqua appetentiores, ad

PAULI AEGINETAE

eam festinant, profiliuntq;. Nonnulli cimices iis, quibus sanguisuga epota erat, exhibuerunt. ego autem, inquit Galenus, aliis in his utens, cimicibus nunquam opus habui.

DE CHAMAELEONTE.

Cap. XXXVIII.

Chamaeleonte nigro assumpto, ualida superuenit uentris erosio, dolor, cum totius corporis peruersione, tremor, mox cōuulsio incidit: item uomitiones pituitosæ & spumantes: quibusdam etiam singultus aduenit: uox nihil sonat, facies distorquetur. His autem conuenit cremor tritici pinguis, calidus epotus: item dulce uinum aquosum calidum, uomitus, laetis potio, mollis clyster, fomenta q; ex cataplasmatibus. ad eum uero, qui suffocationem parit liuoremq;, absinthii bibitur, aut nitrum cum oxymelite, uel radiculæ: fots q; præcordiorum congruet.

DE ALTERCO. Cap. XXXIX.

Sialtercum aliquis, aut ebibit, aut comedit, mente ab alienatur ebrii modo: facilem tamen curationē recipit, mulsa liberalius pota, & lacte, præcipue asinino: sin minus caprillo, aut uaccino: ficorumq; siccarū decocto. benefaciunt ipsi & nuclei pinei, & cucumeris semen cum passo assumptum, præterea uinum salsum cum recenti adipe suillo & passo: urticæ semen similiter, uel nitrum cum aqua conducit: insuper cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepæ, & allia, singula cum uino sumpta. Cæterum conuiescere cogendus est qui altercum hausit ut id, sicuti, qui uinum biberunt, concoquat.

DE CORIANDRO. Cap. XL.

Coriandrum latere propter odorem non potest: potum uero raucitatē facit & mentē mouet, cōsimiliter ebriosi. Loquuntur itaq; qui id sumpserunt turpia, toto corpore in ipsis odor coriandrū indicat. Adiuuantur, ubi id oleo aut irino unguento, ut supra

LIBER QVINTVS. 217

monstratum est, eduxerint, uino meraciore cum absinthio, & per se poto: ouisq; uacuatis in sese detritis, cum muria sorptis, ad hæc muria ipsa bibitur, & ius fallum, & gallinaceum & anserinum: postremo passum, cum lixiuia sumitur.

DE PSYLLIO. Cap. XLI.

Psyllii potu totum corpus refrigerat stupetq; in ualidumq; efficitur, cum resolutione & animi tristitia. Præsidio sunt omnia, quæ contra coriandri

10 potum commendantur.

DE CICUTA. Cap. XLII.

Cicutam potam caligo uertiginesq; insequuntur ut nec minimum è longinquo uidere liceat: itè singultus, mentis alienatio & artuum perfrictio

15 comitatur: ultimoq; conuulsi qui eam sumpserunt, præfocantur, cessante à motu omni arteriis spiritu. Per initia igitur, quemadmodum & in aliis, uomitu eam eliciemus, deinde hac euacuatione usi, quod in intestina delapsum est, excernemus: ac tunc, ad uini meraci potionē
20 ueluti præsentissimum remedium transibimus, per interualla eam exhibentes: in quibus interuallis lac uaccinum, aut asininum, aut absinthium cum pipere communi & castorio, rutamq; & mentam cum uino exhibebimus: præterea cardamomi, aut styracis drachmam, aut
25 piper cum urticæ semine ex uino, aut tenera lauri folia: similiterq; silphium, aut eius liquorem cum uino et passo. Item passum per se potum, præclare opitulatur.

DE PAPAVERIS LIQVORE, quod opion uocant. Cap. XLIII.

30 **P**apaueris liquorem, qui opium dicitur, epotum, subsequitur sopor cum perfrictione & pruritu adeo uehementi, ut subinde ueneno incrudescēte tanta oboriatur prurigo, ut ab ea qui id biberunt, excitentur: ad hæc toto corpore opii odoris grauitas sentitur. Saluti est post uomitiones oleo factas, acri uti clystere. Item oxymel cum sale potum proficit: aut cum

DD iii

PAULI AEGINETAE

calido rosaceo, mel: præterea merum copiosius, cum
absinthio & cinnamomo: nec non acetum calidum per
se: insuper nitrum cum aqua: rutæ semen cum pipere,
ipsumq; piper cum castorio & oxymelite, uel satireiæ,
aut origani decocto, uino addito. Cæterum excitare
ægros oportet illis, quæ naribus admouentur, & in aquâ
calidam deducere, fomentisq; propter accedentem prur
ritum adiuuare: à lauacro, pingui iure, cum uino aut pas
so, uti. Iam medulla cum oleo pota ipsis opitulatur.

DE CARPESIA LIQVOR

RE. Cap. XLIII.

Carpesiæ liquor potus, soporem & strangulatū
præcipitem inducit. Eodem remedio, quo & ci
cutæ auxiliantur.

DE MANDRAGORA. Cap. XLV.

Accidit mandragoræ potus quâprimū sopor,
languor, ualidaq; dormiendi necessitas, ut nihil
à morbo, qui lethargus dicitur differat. quibus
antequam horum aliquod eueniant, uomitus conducit,
post hunc, aqua mulsa, nitrum, & absinthii decoctum
cum passo, aut uino dulci sumpta, caput rosaceo foueri
et aceto debet, corpus excitari commoueriq;: adhiben
da itidem, quæ odoratu excitant, piper, sinapi, castoriū,
ruta cum aceto trita, pix liquida, lucernarum funiculi cō
busti extinctiq;. Quod si ægre excitentur: etiā quæ ster
tutamenta mouent, adducenda, aliisq; communibus re
mediis in his quoq; utendum est.

DE ACONITO. Cap. XLVI.

Aconitum statim quum potum est, linguā edul
cat & nonnihil astringit: inde uertigines, præse
tim in assurgendo, & oculorum humiditates in
ducit, thoracis grauitatem et præcordiorum, ita ut mul
ti flatus per anum erumpant. In quo uitio uomitu uene
nū educi debet, & aluus clystere subduci. Potiones con
tra aconitum hæ proficiunt, origani, rutæ aut marrubii
cum uino, aut absinthii, aut erucæ, aut abrotani, aut cha

mæleæ, aut chamæpityos. Prodest ipsis et opobalsami
drachma cum uino. item coagulum hoedi, aut leporis,
aut huiuli cum aceto, ad hæc ferri recrementum, aut ui-
num in quo ipsum ferrum, aut aurum, aut argentum sit
restitum. insuper lixiolum cum uino, & gallinacei eli-
xi carniūve pinguium ius cum uino assumptum. Cæ-
terum chamæpitys quæ peculiariter aduersus aconitū
conducit, in Heraclia Ponti, ubi et aconitum nascitur,
holocleros appellatur, Athenis, didonia: in Euboea
sideritis.

DE IXIA. Cap. XLVII.

IXia, quæ et ulophonos dicitur, odorem habet et
gustum quum sumitur oculi, linguæ inflammatio-
nem ualidam inducit, mentem abalienat, neq; om-
nis naturalis exitus supprimit, strepitus tumultusq;
alui edidit cum animæ defectu, nec quicquam tamen
elicitur. Aduuantur læsi ab ea, postquam uomitionibus
fuerit educta maior ueneni portio, aut aluus soluta, ab-
sinthii diluto cum uino pleniore aut aceto aut oxymeli
te potio: item rutæ syluestris semine, uel silphii radice: si-
militer hircinæ origani decocto cum prædictorum ali-
quo, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut cas-
torio, aut silphio, singulis oboli pondere. Profunt cum
uino etiam nucis iuglandis nuclei leuigati, resina, casto-
rio, et ruta additis, singulis denarii pondere. Proficiunt
item chamæleæ denarii duo, aut thapsiæ succi totidē
cum aqua mulsa. utiliter et acetum calidum bibitur.

DE EPHEMERO. Cap. XLVIII.

EPhemeron, quod nonnulli Colchicon, eo quod
in Colchide nascatur, uocant aut bulbum agre-
stem, epotum, protinus totum corpus prurire fa-
cit, uelut urtica et scilla tactum irritatumq;: interiora ero-
dit, stomachum urit cum ponderosa grauitate. Inua-
lescente autem malo, cruenta strigmentis mista p alui
egeruntur. Succurrendū, ut salamadræ uomitionibus et

DD iiii

PAULI ÆGINETÆ

clysteriis: sed anteq̃ uireis sibi asciscat uenenū, dari debet
foliorum quercus, aut glandium, aut malicorii, aut sero
pilli decoctum cum lacte bibēdū: aut polygoni succus,
aut surculorum uitis, aut rubi, aut tenerarum ferularum
medullæ, aut myrti cum uino. item ipsæ myrti baccae le
ues contusæ, & in aqua madentes, poto earum diluto,
auxilantur: benefacit itidem castanearum interior tuni
cula, si cum aliquo è succis quos prædiximus, assumas
tur: organum quoq; cum lixiula potum, in idē efficax
est. Adeo uero exactum præsidium est lac uaccinum, ca
lidum potum, & simul in ore contentum, ut hoc præ
sente nullum aliud desideretur.

DE SMILACE. Cap. XLIX.

Smilax, quæ à quibusdam thymion, à Romanis ta
xis nominatur, pota perfrictionem totius corporis
& strangulatum, mortemq; maxime præcipi
tem inducit: quibus omnia auxilantur, quæ & cicu
tæ epotæ.

DE SOLANO FVRIOSO,

quod dorycnion à nonnullis di
citur.

Cap. L.

Dorycnium potum, quod aliqui solanum furio
sum appellant, gustum quidem ceu lactis repræ
sentat, singultus crebros facit, linguæ siccitatem,
& confarctam sanguinis excreationem: per aluum mu
cosa feruntur, simillima torminosi. Auxilio sunt, anteq̃
horum aliquod fuerit secutum, quæ in ephemere dicta
sunt, uomitus dico & clyster, et quæcunq; potum uenes
num possunt excernere. Proprie autem ipsi succurrit
aqua mulsa, aut lac asininum caprillumve, & passum te
pidum cum anisi modico potū: item amygdalæ, et eli
xa gallinarum pectora, idem præstant conchulæ crudæ
pariter et tostæ, in cibo, ad hæc carabi astaciq; et ius ex
ipsis esculentum potui assumptum.

DE SARDONIA, Cap. LI.

LIBER QVINTVS. 213

QUæ sardonias herba nuncupatur, ranunculi species est: pota autem, aut comesta mentem abalienat, conuulsiones adfert cum laborum conuulsione, ut risus imaginem præbeat, à quo affectu etiã risus sardonius non laudabili dicitur inter homines laetatur. Cui uitio priuatim post uomitionem conducit aqua mulsã liberalius exhibita, lactisque potio: item corporis totius respersio inunctioque, ex medicamentis quæ calefaciunt petita, uincit item in hydrelæum calidum descendere, deinde corpus inungere & ualenter infricare. summatim, ut in conuulsione tota curatio administranda est.

DE PAPAVERE CORNUVOTO. Cap. LII.

PAPAVER quod cornutum appellatur, esum potumve, eadem quæ papaueris liquor inducens pericula, iisdem quoque curatur remediis.

DE PHARICO. Cap. LIII.

PHARICUM dictum toto gustu nardum repræsentat potum uero resolutionem cum furore & conuulsione excitat. Aduersus quod, ubi uomitu fuerit eductum, absinthium cum uino propinatur: item cinnamomum aut myrrha, aut nardum Cilicum, quod nonnulli isatin uocauerunt: aut spicæ nardi denarii duo, myrrhæ oboli duo cum passo misti: aut iris, crociq; flos ex uino. Caput ipsorum derafum farina hordeacea cum ruta concisa & aceto oblinere oportet.

DE TOXICO. Cap. LIIII.

TOXICUM inde nomen uidetur accepisse, quod barbari sagittas, quas toxumata uocant, eo illis nunt, ubi potum est sequitur laborum & linguæ inflammatio, mentis furor, qui coerceri non possit, uariis obnoxius imaginibus, eoque difficilem curationem recipit: raro etiam nonnulli qui id biberunt uitæ restituntur. Conuenit igitur continuis ipsos uinculis constrictos cogere: & ui adigere, ut passum cum rosaceo bibant

PAULI AEGINETAE

reddantq; per uomitum. Item raporum semen cum ui-
no potum peculiariter ipsis confert, & quinque folii
radix, hircinus caprillusve sanguis potui datus, ad hæc
quercus cortex aut fagi aut ilicis cum lacte leuigatus
potusque proficit. Idem faciunt mala cotonea mandu-
cata, uel trita cum pulegio, ex aqua pota: præterea as-
monum, & balsami cum uino semen. Qui uero mali
huius periculum euaserint, diu in lecto decumbunt, &
quam surrexerint, attoniti ac stupentes reliquum uitæ te-
pus transigunt.

DE FVNGIS. Cap. LV.

Fungorum alii genere, alii copia offendunt: inte-
gri sumpti strangulatus laqueis simileis inducunt.
his statim communi præsidio resistendum est, &
qui eos hauserunt, oleo ad uomitum cogendi. Mirifice
his proficit lixiuium ex farmentis aut ex syluestris piri-
cinete cum posca, sale uel nitro, potum: item pira ipsa
syluestria aut folia simul incocta, uim strangulandi que
fungis inest, tollunt: eademq; in cibo conferunt. ad hæc
oua gallinarum elixa, & in posca pota, aristolochiæ de-
narius aut absinthii, cum uino: insuper mel delinctum
potumq; cum aqua. Prodest apiastrum cum nitro, pa-
naxis radix & semen cum uino, floces uini combustæ,
cum aqua aut æris flos cum aceto: radica cula itidæ
aut sinapi, aut nasturtia in cibo sumpta. Quoniam uero
nonnulli fungi à uenenatis corrosi non modo strangu-
lant, sed etiam intestina exulcerant, dari debet ab-
sinthium copiosum & ficorum decoctum, origaniq;
ad hæc ex aqua mulsa uomitum ciere confert, in
calidam descendere, & crudam polentam præcor-
diis admoovere.

DE SANGVINE TAV- rino. Cap. LVI.

Sanguis tauri recens occisi, spiritus angustiam &
strangulatum procreat, dum tonsillarum & guttu-
ris meatus cum ualida conuulsione obstruit. Iam

LIBER QVINTVS. 214

lingua iis qui sanguinem hauserunt rubens inuenitur,
dentes erosi, & uestigia cruoris concreti inter ipsorum
commissuras. In hoc malo uomitus uitari debet, grum-
mis magis in stomacho concrecentibus, eò quòd uo-
5 mitionis attractu ad superiorem partem efferuntur. Ex-
hibentur quæ sanguinem coeuntem soluere, & alium
subducere possunt, exempli gratia, grossi liquore suo
pleni cum posca & nitro. huc facit etiam omne coagu-
lum cum aceto, & silphii radix cum suo liquore. simi-
liter etiam brassicæ semen, lixiuiumq; ex cinere ficula-
neo: item cunilæ folia cum pipere rubiq; succus cum a-
ceto. Iam uero alius recte subducetur, solent iis, qui
seruantur inferius recrementa fœdi odoris egeri: stoma-
chus & uenter hordeacea farina cum aqua multa fos-
15 ueri debent.

DE LACTE COAGVLATO

gelatoq; Cap. LVII.

LAc coagulatum uniuersam multamq; strangula-
tionem parit, eò q in grumos coit gelaturq;
20 Auxiliatur huic malo, antidoti modo coagulum,
si cum aceto frequenter bibere compellas eum, qui lac
hausit, item conferunt nepitæ folia arida, aut succus ip-
sius similiter, aut silphii radix liquorue cum posca: idem
præstat thymus cum uino, & cinis lixiua. falsum uero
25 nihil offerri debet, nam hinc lac magis coit ac in ca-
seum transit, nec uomitus in hoc malo conducit, nam
in grumos concretum, dum ad stomachum assurgit,
strangulat.

DE MELLE QVOD IN

Heraclia nascitur. Cap. LVIII

MEl quod in Heraclia Ponti prouenit, aut esum,
aut bibitum, eadem pericula, quæ aconitum, in-
fert, quare & eadem utriq; conueniunt remedia.
Facillime autem curantur qui id hauserunt, continuo hy-
35 dromelitis potu, cui rutæ folia sint admista.

PAULI AEGINETAE

DE GYPSO. Cap. LIX.

Gypsum potum strangulatum parit, in lapidem coalescens: unde transferre oportet huc praesidia quae aduersus fungos conueniunt. datur etiam in hoc malo maluae decoctum loco olei. pingue siquidem quum sit, & lubricas uomitiones procreet, corpora deradi non sinit, quod lapidescens gypsus facit. Porro conducit & oleum in mulsam, & ficorum decoctum, lixiuuaq; ficulnea, aut e sarmentorum cinere facta cum uino copiosiore: Item origanum, aut thymus cum lixiua acetove. Clyster ex passo & maluae decocto in anum dabitur.

DE CERVSSA. Cap. LX.

Cerussa propter colorem facileprehenditur, quoniam sponte sumpta palatum & linguam, dentiumque commissuras albefacit: praeterea singultum, tussim, linguae siccitatem, extremorum perfrictionem, cum mentis abalienatione, & pigro corporis motu, inducit. His prodest aquam mulsam, aut ficorum, aut maluae decoctum propinare. item lac calidum, uel sesamum cum uino tritum, aut lixiuuium e uitium sarmentis: aut oleum amaracinum, siue irinum, uel persicorum ossa cum ordeï decocto: uel lachryma thuris uel prunorum gummi, aut ulmi humor qui in folliculis ipsius seruatur, cum aqua tepida. Iam uomitus continue ciatur. Proficiet etiam succus thapsiae, uel liquoris scammoniae terni oboli cum aqua mulsam poti.

DE CALCE, SANDA

racha & auripigmento.

Cap. LXI.

CAlx, sandaracha & auripigmentum pota, uentris & intestinorum cruciatus cum uehementi resolutione faciunt. quare omnia quae temperare & soluere ea possint, adhiberi debent, item quae uomitiones

nes facileis & aluum lubricam efficiant, qualis est hibiscus & maluae succus, decoctumq; lini seminis aut tragi, aut oryza: lac praeterea copiosum, aqua multa, iura pinguis, boniq; succi.

5 DE ARGENTI SPUMA.

Cap. LXII.

Spuma argenti pota, quam Graeci lithargyron dicunt, grauitatem stomachi, uentris & intestinorum, cum torminibus ualidis infert: nonnunquam & intestina pondere uulnerat, dirumpitque, urinam impedit: corpus eorum qui eam biberunt, intumescit & coloris plumbei fiunt: & deformitas circa faciem deprehenditur. Adiuuantur, secundum uomitiones, agrestis orminii semine cum uino: myrrhae denariis octo, absinthii, hyssopi aut apii semine: aut pipere, aut ligustri florem cum uino: palumbium fimo arido cum nardo & uino.

DE PLUMBO. Cap. LXIII.

Plumbi scobs aut lotura pota, similia inuehit argenti spumae pericula: eademque requirit praesidia.

DE ARGENTO VIVO.

Cap. LXIIII.

Et argentum uiuum potum, eadem cum spuma argenti infert, atque eisdem remediis qui id assumpserunt, adiuuantur. ad haec prodesse ipsis uidetur lac copiose datum. caeterum & hi uomitionibus sollicitabuntur.

DE VERATRO ALBO,

30 thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, & pappis.

Cap. LXV.

Habenda cura est & eorum, quae iuuandi gratia exhibentur, saepe uero non minora alijs pericula adferunt, cuiusmodi sunt superius commemo-

PAULI I EGINE TAE

morata, nempe ueratrum album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum. hæc enim strangulatus excitant, aut magis quam opus est, purgant: in quibus strangulationes, ut in fungis & similibus comprehensum est, curabuntur: nimias purgationes, iis quæ excretiones cohibent, sistimus. Iam uero quæ paululum nocere uidentur, interim tamen pericula inferunt, negligi non debent, cuius generis est syluestris ruta, nigella, recentes papipi, qui flores sunt spinæ, quæ cactos dicitur: in quibus solus uomitus adhibitus laborantes sanitati restituit.

DE FAMILIARIVS AC

domesticis, nempe uino & aqua frigida. Cap. LXVI.

Aqua frigida uniuersim pota, uinumque meracius copiosum, dulce, præsertim à balneo, aut cursu ualidisque exercitiis, strangulatus & dolores concitat, in quibus sanguinis dimissio protinus adhibita & inaniatio, imminens periculum dissoluit.

Libri Quinti Finis,

DE VERATRO ALBO

thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta

nigella, nigella, & papipi

Cap. LXVII.

Abundantius est & ceteris, quæ inaniatio gratia

adhibetur, uinum non minus aut potius

laqueum, cuiusmodi sunt ligaturæ communes

PAULI ÆGINETÆ

LIBER SEXTVS,

Ioanne Guinterio Andernaco medico interprete.

PROOEMIUM CHIRVR
gicæ. Cap. I.

VONIAM CHIRVRGI
ca in partes duas diducta est, ut uo
una sit quæ carnis uitia tractet: al
tera, quæ osium, tam in fractur
ris quàm luxationibus speculetur
ab ea quæ carni seruit in præsen
tia exordiemur, consueto & hîc
usi compendio. Rursus igitur à
superioribus auspicantes, quomodo caput, præsertim
que eius uertex uratur, exponemus.

QVOMODO CAPVT ADV
ratur in lippientibus, ægrespitantibus &
elephanticis. Cap. II.

CVM humor oculis influit superne & difficilis ur
get spiratio quæ humiditatis excrementitiæ co
pia è capite inferius in thoracẽ transmissa, & par
ticulas indidem consortio suo infestante contrahitur, ca
put per medium hoc modo urunt: Vertex ad cutem
prius tondetur, cutis ad usq; os ferramentis mucronatis
aduritur: quod, ubi crusta deciderit, raditur. Nonnulli ue
ro ubi id ipsum os adusserint, faciunt ut squama inde re
cedat exigua, quo facile humores illinc perspiratu dissi
pentur euacuenturq; seruato diu ulcere, deinde sic ipsũ
ad cicatricem perducunt. At in elephantiasi curanda, qn
q; nonnulli crustas in capite excitant, unam in priori parte
supra sinciput, alteram hac inferiorem, paulo superius q̃
frons habetur, ubi fere pili desinunt: ac aliam in occipio
tio, quod Græci opisthocranion uocant, reliquas duas
iuxta ossa à squamis dicta lepidoides, q̃ superius aures

PAULI ÆGINETÆ

conglutinant: unam ex his, parte dextra: alteram, sinistra
atque ita pluribus squamis detractis, & copiam & cras-
sitiam humorem euaporatu ex alto capitis deriuantes,
lumina offendi prohibent. Iam lieni quoque aliud
ferramentum adigunt, ut primo melancholici recremē-
ti opifici per crustam in cute excitatam medeantur. 25

CVM HUMOR CAPITIS CV

tem inflat, eaq; intumescit & prementi digi-
to cedit, hydrocephalon dici-
tur. Cap. III. 10

SI humor natura aqueus capitis cutem subit, uitium
proprie hydrocephalon appellatur: accidit autem
pueris, quamprimum in lucem eduntur, capite à nu-
tricibus parum dextre presso, aut ex causa latente, aut ex
causa latente, aut ex uasis unius, pluriumve ruptura &
sanguine, qui emanat in alienam mutato substantiam,
aut materia ob meatum raritatem resudante, ac inter cu-
tem & membranam quæ caluariam integit, pericranion
Græci uocant, erumpente: uel enim inter hanc, & cutem
humor consistit, uel inter pericranion & os, uel inter os
& cerebri membranas. Cum itaque cuti & membranæ
caluariam integenti, humor interiacet, tumor sequitur,
tactu mollis, concolor, indolens, turgidus, puluino sub-
limi, exigua capitis parte digitis prementibus subsidens
facile cedit & rursus assurgit. Quibus pericranion &
os intercedit humor, reliqua sanè respondent, sed tu-
mor durior multo est & lente cedit, ut qui etiam pluri-
bus locis sublabatur, dolorq; magis urget. Si inter cere-
bri membranam & hos humor se receperit, tumor qui
dem erit, sed qui prementi non cedat, neque tactu sit
mollis, tamen uiolenter pressus cedat, siquidem os in-
fantium recens adhuc compactum facile cedit, præser-
tim cum suturis rarefactis humor foras euaserit: cogno-
scitur ex facili inde quod in humoris constrictione, in-
altum cum ex aduerso deducitur, recurat. Dolor his
acrior obuenit, caput totum in diuersa agitur, frons ipsa
foras 35

sis foras producta est, oculis cernunt inconniuentibus, et crebrius illachrymant. His igitur ceu desperatae salutis non est manus adhibenda, etsi maxime nonnulli chirurgorum terebra perforatum os exemerint, ut in capitis fracturis dicetur. At si intra cutem & membranulā quae sub cute caluariam cingit, humor sit collectus, tumore quidem exiguo substante, una linea per medium transuersa caput incidendum: si membranulae caluariam inuoluenti & ossi calluies interueniat magisque, caput inturgescat, duabus utemur lineis per medium se mutuo secantibus: si magis adhuc sit turgidum etiam, tribus, ad similitudinem H literae. Vbi manu humorem exemeris, insertis linamentis commode partem deligabimus, & usque ad tertium diem oenelao perfundemus, inde solum medicamento in linteolum illito perfanabimus. Quod si longiore spatio os carne non recipiat, leuiter ipsum rademus.

QVOMODO ARTERIAE DIVIDANTUR, ANTERIOTOMIA DICITUR. Cap. IIII.

IN longis oculorum defluxionibus, tum uertiginoso affectu, arterias post aures incidere consueuimus. Radenda igitur posterior capitis pars, & digitis notanda est. Nam arteriae situs ex loci pulsu facile deprehenditur, deinde ipsam linea scriptorio prius attramento ducta, duos digitos longa, usque ad os diuidere oportet. Quod si in conspectum ita non uenit, incidendum circiter trium digitorum interuallum, atque tunc manus iniicienda, sic ut arteriae transversim dissecantur, quousque & pulsatis sanguinis fluor apparuerit, & instrumentum os propius accedat. Vbi sat fluxerit sanguinis membranula, quae caluariam sub cute ambit, diuisa, ne ex tensione inflammationem contrahat, rasoque ossi se obturamentum ex panniculo uulneribus debet insinuari. & medicamento quod linteolis illinitur adhiberi, quod si remaneat etiam hoc os lene, similiter huius rasura utemur.

PAV. AEGIN.

EE

PAULI AEGINETAE
QVOMODO LATENTIA CA
pitis uasa diuidantur, quæ angiologia dici
tur, eorumq; adustio sit admini
stranda. Cap. V.

IN quibus alteram capitis partē dolor exercet, & ca
lidus acrisq; pituitę cursus, aut longus, aut acutus in
festat, ut et tēporū musculi incalescāt, ac laxo tumo
re attollantur, omnes in his medici uasorum in capite
latentium diuisionem probarunt. Derasis igitur primū
in temporibus pilis, digitis uasa notabimus, sic ut fomē
ta præcesserint, aut collum constrictum sit: ubi iam uasa
oculis sese obiecerint, atramento notabuntur, & cutis ex
lateribus tum sinistra manus nostrę digitis, tum minis
tri leuabitur, ipsumq; uas per summa, linea incidemus,
deinde ubi totum penetrauerimus hamulis eleuatum et
instrumento quo membranę detrahuntur, deuudatum
suspendemus undiquaq; liberum: & si tenue fuerit per
hamulum retusum, elato circumductoq; membranam
detrahemus, ita ut partem quoque ipsius apprehenda
mus. At si magnum est duplex acu funiculus subiicie
tur, aut linū crudū, aut aliud quoddā ualidum, ac q̄ pri
mum uas in rectum scalpello diuisum, sanguinis quātū
satis est fuderit, in utroq; extremo quod denudatū est,
lino ligabimus, quod intercedit excisum, aut protinus
aut cū soluetur auferre cōuenit. Nōnulli et candentibus
ferramētis citra sectionē uasa adurunt plagis satis altis.
ubi iam ferro negotiū absolutū est linamētis carptis sic
cis uulnere oppleto, spleniū quoq; super accōmodatū
deligabimus. postq̄ solutum fuerit, medicamenta arida,
quæq; carnem generant, tum cicatrici inducendę apta,
ad curationem absoluendam inducemus, nimirum ubi
uincula deligaturę computruerint exciderintq;.

QVOMODO FRONS INCIDAT
tur, hypopathismum uocant. Cap. VI.

Istrumenti species nomen administrationi dedit:
utimur autem hypopathismo, in quibus fluor inul

tus & calidus in oculos deferatur, faciesq; rubescit, & in fronte sensus quidam & discursus ueluti uermium, aut formicarum oboritur. Derasis itaq; in fronte pilis iubebimus, ut inferior gena moueatur, cauentesq; musculo
 5 rum ad tempora motionem, tres lineas rectas pari spatio distantes in fronte incidemus, longas quidem singulas duos digitos, altas adusq; os, trium digitorum intervallo inuicem discretas. secundum sectionem, spatham subiicientes à linea quæ in sinisteriore tempore ad meo
 10 diam tendit incipiemus, totum quod interfacet excoriâtes, cum membrana quæ caluariam incingit, deinde rursus spatulam à media ad reliquam dimittemus. Deinde scalpri quod scolopomachæion dicitur, aciem in primam conicientes lineam, ut acutum ipsius iatus exte
 15 ræ cutis carni accommodetur, retusum uero, osli. propelemus ipsum adusque mediam lineam, omnia à capite ad oculos descendencia, uasa præcidentes, non autē usq; ad cutis superficiem: rursus à media ad postremā ipsum deducemus, similiter uasa amputantes. Vbi meo
 20 diocriter sanguis effluerit, extusis grumis, tria linamenta tortilia singulis incisuris inseremus, panniculumq; implicitum aqua madentem superiniectum deligabimus. Postridie œnelæo non solum ulceribus respersis, sed etiam temporum musculis auribusq; propter inflam
 25 mationem, tertio die cum solueris, superfusione diu utēdum, & basilico rosaceo soluto, linamentis insertis curationem quæ restat, absoluemus.

30' QUID AGENDVM IN SIN
 cipite secando, periscythismum appellant
 Græci. Cap. VII.

35 I N quibus multa, & in alto uasa fluorem copiosum oculis transmittunt, tribus lineis transuersis coronæ modo sinciput secatur, quæ ratio periscythismus, Græce uocatur. Hoc morbo laborantium

comites notæ sunt tales: Primum oculi alimentum nō
 sentiunt, exigui, & ad uisum impotentes, sunt anguli ero-
 si, palpebræ exulceratæ, & pili ipsorum deflui, lachrymæ
 tenues admodum & acres cum calore deferuntur. Do-
 lor in alto capitis acutus, & uehemens urget, sternutamē-
 tum continuum. Itaq; de raso capite transversam lineam
 sine musculorum in temporibus, motus offensa, ut di-
 ctum est, incidemus, quæ à sinistro tempore parte
 incipiens in alteram definat, habeatq; terminos, ubi mo-
 tus nullus est, paulo superius q̄ frons habetur, ducta: sic
 ut futura capitis à rotunditate dicta *σιφανία*, uideatur.
 Leonides per mediam frontem lineam deducit. Cæter-
 rum osse detecto, obturaminibus, aut linamentis pluri-
 bus inuicem ipsum separabimus, oras lineæ uinciemus,
 oenelæo etiam ut prius dictum est, asperfas. A solutione
 cum inflammatio iam declinauerit, os radetur, quoad ca-
 ro suppullulare incipiat, rationemq; carnis producen-
 dæ accommodabimus medicamentis aridis in id effi-
 cacibus utentes, quale est, quod recipit farinæ triticeæ
 partes duas, colophonix resinæ partem unam. Item
 quale est Cephalicum appellatum. Item quod ex pumi-
 ce ad carnem creandam conficitur. Nam cicatrice cras-
 sifuscula cute densata, & occlusa, uasorum ora priorem
 pituitæ impetum in oculos deferri prohibent.

DE SUPERIORIS PALPE-

bræ futura aliisq; modis. Ca. VIII.

Cum sub ordine naturali pilorum palpebræ, alius
 ordo succrescit, uitium Græce distichiasis appel-
 latur, ex humoris cuiusdam in eam partem im-
 petu contractum, cum is copiosus, sed rosionis expers
 & acrimoniæ fuerit. Nā acrior, aut falsus magis, aut alio
 quodāmodo rodens, spatio tēporis ēt naturales palpe-
 bræ pilos corrūpit. Interim igitur in hoc affectu, futura
 utimur: interim in ea dispositione, qua pilorum subna-
 scentium duplex triplexq; acies, uel in superiore, uel in
 inferiore palpebra prouenit, hoc est cum cilium intro

spectat pilorum acie simul cum eo inuersa, phalangosis
 uocatur interdū ēt in palpebris relaxatis, quando natu-
 rales pili bulbum compungunt. Aeger itaq; in sedili col-
 locabitur, uel aduersus, uel à latere, superiorq; palpebra
 5 inuertetur: si quidē lōgos habeat pilos, illos ipsos indice
 & magno sinistrae manus digito apprehēdemus: sin ad
 modū breueis, acus filum ducens per medium cilium
 & exteriorem partem transmittetur, deinde p filum sinis-
 tra manu sublata palpebra, dextra, mucrone scalpelli,
 10 post filum eadem in sinum coacta inuertetur, & subtus
 linea interius q̄ pili pungentes habeantur per cilium du-
 cetur, à maiori angulo usq; ad minorem pertinens. filo
 autem post interiorem sectionis lineam subiecto, polli-
 ce manus sinistrae exiguum quoddā linamentū implici-
 15 tum obicientes, supcilium attollemus, aliaq; parua lina-
 menta implicita summis angulis imponentes famulo
 posterius stanti iubebimus, ut palpebras p ea attollat, atq;
 que tunc lineā ueru modo rectā, obeliazam Græci uo-
 cant, primū scalpello fibulis aptato incidemus paulo su-
 20 perius q̄ naturales pili existant, ab angulo ad angulum
 tendentē, altā ut sola possit cutis diuidi: post eā, lunatā
 adhibebimus, incipientes qdē unde & ueru similis linea
 inceperit, in tantā uero sublimitatē tendentes, ut totā cu-
 tē quæ supflua est circūscribamus, desinentesq; similiter
 25 ubi & illa iā cōmemorata linea. Postea cū cutis duabus
 lineis circumscripta myrti similitudinē repræsentet, angu-
 lo q ad dextram nostrā spectet hamulo transfixo totā
 hanc cuticulam excoriabimus, deinde uibicibus spon-
 gia ter quaterve ablutis, oras uulneris contrahemus à
 30 media auspicantes, acum uero per ipsam interiorem se-
 ctionē transmittentes: porrò filum ex lana esto: Caterū
 quod eius superfluum est amputabimus non prope fi-
 bulas, sed ut circiter trium digitorum longitudo otiosa
 p̄deat, eamq; per frontē exporrectam, cum emplastro
 35 quodam conglutinante applicabimus, palpebræ autem
 pilos à fibulis mucrone acus liberabimus. Hic igitur

PAVLI ÆGINETÆ

agendi modus & communis & securus est. Nonnulli
excoriationem fugiunt, eoq; post ductam subtus lineā,
specillo palpebris continendis accommodo, hoc est,
ad palpebræ circumductum figurato, id quod superest
cutis, eleuatum scalpro amputant, ac fibulas, ut compre
hensum est inlucunt. At si in parte aliqua solum palpe
bræ ex pilis oriatur punctura, illi etiā soli manum adhi
bere conuenit, deinde linamenta implicita posca, mad
da imponemus deligabimusq; imbuentes ipsam partē
posca aquatica usque ad tertium diem quo ligaturam
soluemus, ac superflua sili parte abscisa oblinemus pal
pebras, uel croco, uel glaucio, uel aliquo collyrio, quod
inflammationem arceat, exempli gratia, crocode & ex
rosis composito aliquo. At si inflammationem fibulæ
intulerint, etiam emplastrum aliquod tenue ipsis super
accommodabimus, & ueluti lacte infuso oculum lenie
mus, rarefactas autem suturas amputando abstrahemus.
Notus mihi quidam est qui palpebra, ut dictum, exco
riata, fibulis non uteretur, sed medicamento cicatricem
inducente curationem absolueret. Nam uulnere ad ci
catricem ueniente, palpebram particulatim attollens pi
los extra inclinationem coegit. Quemadmodum igitur
alius quispiam ne excorians quidem palpebram ne
que externis duabus utens diuisionibus, sed interiore so
lum adhibita, palpebræ rugas digitis uel hamo attolle
bat, item duabus arundinulis aut hapsulis quibusdam
palpebræ longitudinem æquantibus, latitudinem angu
sti scalpelli, quod uenis secandis adhibetur, superfluum
totam cutem mediam prehensam constringebat, utrius
que ipsius terminos deuinciens. Atque hac ratione, tota
posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriens,
intra decimum aut plurimum quintumdecimum diem
cum arundinulis aut hapsulis excidebat, ita ut ne cicatrix
fere aliqua appareret.

QVOMODO PALPEBRÆ ME
dicamento urantur, Cap. IX.

Vstionem palpebrarum ex urente medicamento factam, omnes, ut uno uerbo dicam, ueteres dā nauerunt, tum propter medicamenti acrimoniā oculis insidiantem, tum quod ex immodica ustione affectus nascitur, quem Græci lagophthalmum appellāt, in quo hiantibus palpebris qualicunq; de causa lumen offenditur. Quoniam uero multi à pilis semper punitionem experiunt, ne uocabulum quidem futuræ frequenter audire sustinentes, detinent plerunque nos etiā inuitos, tanquam aliis destituti præsidis ustionem per medicamentum adhibemus. Compositio uero medicamenti hæc recipit, calcis uiuæ partes duas, saponis gallici uel communis totidem (quidam etiam aphroni tri partes quatuor) lenigatas cinere lixiuo, aut saponario, aut alio, è ficu, aut quercu, aut urina pueri impuberis excipientes mucrone scalpelli palpebræ iniciemus, tantum in myrtacei folii figuram adurentes, quātum etiam in descriptione comprehenderimus. ubi iam primo medicamenti impositu cutis fuerit adusta, eo spongia ablato rursus aliud iniciemus, tam diu id cuti inhærere sinētes quousque nigrescat. Sin id non affecuti fuerimus, etiam tertio inducetur. Postquam uero cutis nigruerit, & reliquum iam crusta oborta medicamentum ablueris, & balneis, & superfusionibus, quousque crusta deciderit utemur. Inde rasilibus linamentis & collyriis tenebris, cicatricem moliemur.

SI OCVLVS CVTE NON CON

tegatur, lagophthalmum dicitur. Cap. X.

Lagophthalmon uocant cum superior palpebra sursum retracta est. Accidit autem hoc uitii, aut naturaliter, aut ex cicatrice uulneris eiusq; uel sua spōte facti, uel ex sutura, uel ustione, ut nup̄ dicebamus, parū dextre administrata: in qua etiā solum mediocris emendatio fieri potest si palpebra crassitiem notādam habeat, non enim cōuenit ipsa cicatrice diuisa, & oris p̄ linamentum diductis, etiam deligatura prorsus usq; ad

EE iiii

PAULI AEGINETAE

absolutam curationem uti, ita ut non nimium sicca, sed relaxantia magis unguina adhibeantur: quale est foenu graeci succus superflus & basilicum tetrapharmacum quod linteolis illinatur resolutum.

DE INFERIORIS PALPE

brae futura & uestione per medica
menta. Cap. XI.

QUot pilorum affectibus superior palpebra oportuna est, tot etiam inferior. Etenim ultra naturae suae modum excrescens, inuertitur & phalangosim, & distichiam, hoc est, sub ordine naturali pilorum, alium ordinem succrescentem sustinet. Eodem igitur modo quo in superioris palpebrae futura, utendum est, ordine inuerso primum lunata incidi linea debet, ut sanguinis fluor impediatur, deinde ueru instar recta. Subtus nitanda est sectio, quoniam palpebra inferior pondere suo genuino prompte inuertitur. Ceterum reliqua curatio in alterius palpebrae futura tractata, hic quoque conueniet, praeter quod filorum excessus fronti non sint agglutinandi. At si in hac etiam affectione manu in extis mescens, uestionem potius e medicamento deligas, hanc quoque iam traditam habes.

DE ECTROPIO.

Cap. XII.

QUemadmodum superiori palpebrae uitium uocatum lago phthalamon, ita inferiori ectropion oboritur: uerum id intercedit discriminis, quod hoc non e natura prouenit, sed nonnunquam ex relaxatione, quam medicamenta in id efficacia, inflammatione praecedente concitarint, nonnunquam ex futura, aut inartificiose uestione palpebra inuertitur. Acu igitur duo lina trahente carunculam transsuemus, a sinistro re angulo ad dextrum deducta. Deinde lino utrisque ipsius extremis admoto, carunculam per acum attollemus, atque ipsam scalpello excindemus, auferentes simul cum ea & acum. Atque si figuram palpebrae receperit, & aequaliter sit conuersa, satis manu profectum est.

Si autem postea quàm caro fuerit ablata, adhuc inuero
 tatur, auersum scalpellum quam partem Græci cyathio
 scum nominant, iuxta mucronem palpebræ sectæ subli
 ciemus, ac in externa illius parte duas incisas lineas, à
 duobus factæ sectionis angulis, auspicantes, in fastigium
 mucronatum ducemus, easq; in figuram Δ literæ Græ
 corum similem cogentes, carunculam amputabimus,
 ut acumen ipsius infra spectet oculum, latitudo supra, ci
 lium appellatum respiciat. Secundum hoc diductas o
 ras acu ex lana filum ducente committeremus, duabus fi
 bulis contenti. Quod si uero suturæ, aut ustioni fertur
 acceptum ectropion, etiam sub inferioribus palpebræ
 pilis, per ipsam primam cicatricem lineam simplicem in
 cidemus, labrisq; diductis linamenta inferemus, ac aliis
 præsidis, quæ in lagophthalmis comprehensa sunt, ute
 mur, præterquam fomentis, usque dum futura fuerit cō
 glutinata.

QVOMODO PILI PALPEBRAM

irritantes euelantur, & ustio per ferrum
 adhibeatur. Cap. XIII.

IN quibus haud multi palpebræ pili habentur, qui
 oculum irritent, sed circiter unus, aut duo, aut pluri
 mum tres, inuicem propinqui, euulsionem quam ana
 brochisimum uocant, probamus. eaq; sit hunc in mo
 dum: Per acus tenuissimæ auriculam capillus muliebris
 aut simplicissimum byssinum linum transmittitur, duobus
 simul extremis commissis, ut quod inseritur dupli
 cē habeat ansulam, itē alterū huiusmodi filum, aut capil
 lus ansulæ insinuatur: traductaq; acu per cilium ubi pili
 enati apparent, pilum, pilosve per amentum ansulæ in
 sertos detrahemus. Et si quidem palpebræ pilus prehē
 sus est, ansulam attrahimus. Si uero unus, aut plures ex
 ciderint per initium iniectum, rursus ansulam deorsum
 trahemus, iterumq; pilo, seu pilis in eam positis, attrahe
 mus. At si unus duntaxat pilus gracilis oculum pungat,
 etiam alterum ex naturalibus palpebræ pilis simul euela

PAULI ÆGINETÆ

temus inunctum prius gummi, aut alio quodam glutinante, deligabimusq; donec pilus coalescat. Nonnulli autem uisionem præponunt euulsioni: palpebram inuertunt, extractoq; uulsella pilo pungente siue uno, siue duobus, uel etiam tribus, candēs aut specillum, aut eius modi aliquod tenue instrumentum loco adigunt, unde pilus, pilive sint euulsi. Sic enim cute desata, nullus pilus enascitur.

DE HYDATIDE. Cap. XIII.

Hydatis pinguis quædam est substantia, palpebre cuti naturaliter substrata. In aliquibus autem, & præsertim pueris ceu natura humidioribus auge scens malorum superuenientium causa redditur, dum oculum pondere suo grauat, eoq; fluxionem excitat. palpebræ igitur in hoc uitio detentæ infra supercilia quam inter cutem repræsentant, nec ut par est sursum possunt attolli. Si uero digitis ipsas deprimamus, inde digitos separemus, quod medium intercedit, inflatur. Horis autem antelucanis potissimum defluxione tentatur, neque contra solis splendores cernere sustinent, sed illachrymant, continuisq; lippitudinibus infestantur. si gurato igitur commode ægroto digitis duobus, indice & medio paululum distantibus palpebram constringemus, collectionem quandam hydatidis ad medium digitis interpositum molientes. Ministro autem posteriori stanti caputq; ægrotantis firmiter continenti iubebimus per medium supercillii palpebram modice attollat. Nos sumpto in manus scalpello, ipsam per medium linea transuersa diuidemus, non maiore quam in sanguinis per uenas detractioe fieri solet, alta uero ut totam cutem diuidat, uel etiam hydatidem ipsam attingat, sed cura omnino debet adhiberi plerique siquidem altius demisso scalpello, uel membranam quæ a cornu similitudine Ceratoides dicitur, uiolarunt, uel certe palpebræ musculos conuulnerunt. Atque siquidem protinus hydatis in conspectum uenerit, ipsam extrahemus:

fin minus, iterum diuisionem leniter moliemur. Vnde si
apparuerit digitis cum linteolo molli apprehensam huc
illuc nonnunquam etiam circumactam mouendo extrahe-
mus. ubi ablata fuerit implicitum panniculum posca-
madentem impositumque deligabimus. Sunt autem quæ
leuigatum salem scalpelli capitulo diuisionibus inferat,
ut si ex hydatide quippiam fuerit relictum, ipsam consu-
mat: postquam soluerimus si desit inflammatio col-
lyriis quæ illini possint, aut lycio, aut glaucio, aut
croceo curationem expediemus. Sin inflammatio
urgeat, cataplasmatibus ad eam inscriptis, aliisque præsidis
medebimur.

DE PALPEBRIS COMMIS-

sis. Cap. XV.

Interim superior palpebra cum inferiori cilio coad-
lescit, interim cum membrana adnata, interim etiam
cum ea quæ ob cornus similitudinem Græce cera-
toides appellatur, ac morbus oculum difficilem efficit.
Conuenit igitur uel specillo, lato palpebræ spatio suble-
cto, uel ea per hamulum eleuata commissuram dissolu-
ere, cura adhibita ne cornea membrana uulneretur, atque
inde procidentia occasio fiat. Vbi inciderimus, suc-
co in oculum infuso linamentis palpebras diducemus,
ne rursus commissura fiat, lanaque ouo madente imposi-
ta post tertium diem extenuantibus & quæ cicatricem
inducunt collyriis utemur.

DE CHALAZIIS. Cap. XVI.

Chalazium otiosi humoris in palpebra colluies
est: quæ si ab exteriori parte palpebræ coacerue-
tur, scalpello extrinsecus transuersa linea incidi de-
bet: deinde specillo, uel aliquo huiusmodi instrumento
chalazion auferemus. Quod si magna est diuisio, aut
dehiscit, fibulis oras committemus, ac emplastro utea-
mur. Si exigua est, omisissis fibulis, curationem absola-
uemus. Si ab interiori parte fuerit, ut per cartilagi-
nem ipsa pelluceat, inuersa palpebra & transuersim

PAULI ÆGINE TÆ

intus diuisa chalazion tolletur: quo facto, muriam uul-
neri infundemus.

DE VERRVCIS ET EN-

canthide.

Cap. XVII.

PAlpebrarum uerrucis, & in maiori angulo encan-
thidibus appellatis uulsella prehenfis, scalpelo
loque amputatis, chalcitidem leuigatum impos-
nemus.

DE VNGVE OCVLORVM,

quod pterygion à Græcis uoca-

tur.

Cap. XVIII.

PTerygion neruosa membrana est, quæ ab ocu-
li angulo maiore initium capiens per minorem
ad exteriora progreditur, officitq; oculo, motum
ipsius, & bulbi contractione impediens, & quod progre-
diens totam pupillam contegat. Cum igitur facilius cu-
rationem recipiant, quæ tenuia sunt, & albicant, hunc in
modum admouenda manus est. Diductis palpebris, un-
guem hamulo mucrone intus recuruato exceptum atq;
tollimus. Acum uero, pilum equinum, aut linum ualidū
ducētem, ac paululum inflexam per summa ad unguis
dimidium traicimus. Et lino quidem unguem deliga-
tum sublimem eleuamus, pilo autem partem pupillæ p-
ximam perradentes, usque ad terminum excoriamus.
Reliquam partem maiori angulo uicinam scalpello su-
turis decato ex basi abscindimus, ita ut anguli caruncu-
lam relinquamus, ne ea ablata, humor postea semper
descendat, rhyada Græci uocant. Aliqui lino unguem
eleuatum, ut diximus, scalpello in id accommodato, to-
tum illum excoriant, cauentes ne à cornu dictam Cera-
to idem tunicam attingant. Post manus administratio-
nem momento salis in leuorem detriti loco iniecto la-
nam ouo imbutam illigabimus. Ab huius solutione,
muriam ipsis liberaliter instillabimus. Si inflammatio sub-
secuta fuerit ad eam inscriptis auxiliis succurremus.

DE STAPHYLOMATE. Cap. XIX.

Staphyloma est membranæ corneæ cum ea quæ ab acino *παγοειδης* appellatur, infirmatæ, aut uitio defluxionis, aut exulcerationis incuruatio. Admo-
 5 uemus autem huic uitio manum, non ut uisum aboli-
 tum restituamus, uerum ut moderatum egrotanti deco-
 rem conciliemus. Itaque acu ab inferiore parte sursum
 per basim staphylomatis traiecta, deinde alteram acum
 duplex linum ducentem ab angulo qui ad manum spe-
 10 ctat, ad alterum per basim staphylomatis transmittere
 oportet, manenteque prima acu, lini plexu amputato,
 staphylomatis aliam partem sursum, aliam deorsum
 filis deuincere: atque tunc acu detracta lanam oui liquo-
 re imbutam imponere. Post solutionem blandis infu-
 sionibus oculum lenire, donec fila simul cum staphylo-
 15 mate decendant.

DE OCVLIS PURULENTIS,

qui hypopyi dicuntur. Cap. XX.

DE oculis purulentis Galeni uerba apponere abū-
 de est, quæ in eum modum habent: Nostra æ-
 20 te medicus quidam ocularius cognomento Iuo-
 stus, etiam concussione capitis plerosque hypopyos per-
 sanauit, collocans enim eos in sella rectos, ac capita ip-
 sorum utrinque à lateribus comprehendens, mox qua-
 tiebat adeo, ut pus ipsis descendere palam uideremus.
 25 mansit autem horum puris colluies infra propter gra-
 uitatem substantiæ, tametsi hypochymatis nequaquam
 manentibus nisi admodum quis diligenter ea impingi
 cogeret. Ac progressus iterum idem Galenus, inquit:
 30 Frequenter autem multum simul puris uacuauimus tu-
 nica ea diuisa, quæ cornus speciem refert, paulo supra
 locum quo uniuersæ inter se tunicæ committuntur, no-
 minant autem locum Græci nunc irim, nunc stephanen
 hoc est, coronam. Hoc quidem Galenus in commenta-
 35 rio de morbis curandis prodidit. Cæterum post puris
 euacuationem, ulcus ex mulsis factis, aut apomelite in-
 fusionibus repurgantes, deinceps reliquam purgatio-

nem accommodabimus.

DE SVFFVSIS. Cap. XXI.

Svffusio, pigri humoris in cornea membrana iuxta pupillam concretio est, quæ uisum impedit, aut certe ne clare oculus cernat, efficit. Accidit potissimum ex perfrictione ac imbecillitate spiritus uisorii, eoq; senes magis & longo morbo confectos inuadit, fit etiam ex uomitu uolentius concitato & ex ictu, aliisq; pluribus de causis. Verum de iis suffusionibus, quæ nondum radices egerunt, nullam manus administrationem requirunt, tertio libro comprehensum est. In hoc autem eas, quæ iam confirmatæ sunt & ex toto concreuerunt, notis suis describemus. Omnes igitur suffusione laborantes lucem uident, aut multam, aut paucam, eoq; discrimine suffusiones ab hebetudine & glaucomate separamus, tum eo quod hebetudinem & glaucoma experti lucem omnino nullam cernunt. Rursus igitur Galenus docebit te suffusionum & concretionem & differentiã, item quomodo his manu mederi conueniet. Oculus suffusione tentatus concluditur, & palpebra magno digito ad oculum premitur, eiq; adducitur, simulque hac illac exprimitur, deinde oculo aperto & mente ei adhibita suffusione conspicimus. In iis enim quibus humor nondum coaluit, fusio quædam ex digiti impressione oboritur ac primum latior apparet, rursus in suam & figuram & magnitudinem recurrit. At in confirmatis suffusionibus nulla immutatio nec latitudinis nec figuræ ex impressura obuenit. Quoniam uero commune hoc est indicium & eorum in quibus modice, & illorum in quibus supra modum humor concreuit, colore ipsos discernemus. Nam si ferri aut marinæ aquæ aut plumbi colorem suffusio habeat, moderate coaluit, & ad eoductionem idonea redditur: si uero gypso & grandini similis color suffusionis est, supra quod par est concreuit: Sed quia hæc à Galeno didicimus, collocato ægrotante aduerso lumine citra solem, oculum sanum accurate deli-

gabimus, & diductis alterius palpebris recedemus ab iride appellata ad minorem angulum, quantum scalpellum muro spatii continet, atque tum punctorii stili mucrone locum designablis quem puncturus os: in sinistro quodam oculo dextra manu functionem obiens: in dextro autem sinistra. Atque inuersa punctorii specilli acie quæ ad extrimum rotunda est, ualenter impingimus, & partem designatam usque ad uacuum intus sinum penetramus, idque tam alte fiet, quam pupilla ab iride nuncupata distat. Ex superiori igitur parte uertici suffusionis stimulum adigentes, (uidetur autem conspiciue ferrum, quod tunica cornea pelluceat) humoris colluuiem per ipsam in subiecta loca deriuabimus. Et si protinus educta fuerit, sistemus quiescentes paululum. sin autem recurrerit, 25 rursus ipsam deducemus. Euacuata suffusione, stilum tollemus, leniter circumuertendo. Post hoc oculo aqua elotopauxillum salis cappadoci instillabimus, lanamque, uel luteo madefcentem impositam deligabimus, ita ut sanum quoque oculum comprehendamus, ne una commoveatur. Cæterum collocantes ægrum in domuncula subterranea iubebimus prorsus ipsum conquiescere, tenui uti uictu, adusque septimum diem illigatum nisi quid prohibeat. Post hunc solutis ligaminibus uisum 20 experiemur, ostendentes ei res quasdam uisibiles, quod dum manu curamus, aut postea, fieri dissuademus, quæ ex conuiuenti admodum intuitu prompte rursus suffusio repleatur. Si inflammatio urgeat, etiam ante septimum deligatura soluta, aduersus hanc pugnabimus.

DE ÆGILOPE. Cap. XXII.

30 **A** Egilops, tumens abscessus est inter maiorem angulum & nares proueniens. Vix curationem admittit: tum partium tenuitatis causa tum periculi ne oculus consortii lege indolescat. Si igitur per summa ruptus fuerit abscessus, totum id quod eminet usque ad os excidendum. Et si ad malum subluuius deciderit, totam ipsam explicabimur. os autem carie non dū senties,

PAULI AEGINETAE

rademus. Quod si iam carie uexatum est, ferro candente
 si aduremus, spongia frigida madente, oculo imposita.
 Sunt qui post carunculae excisionem terebra usi, humo-
 rem, aut pus in nares deriuarint. Nos autem satis habui-
 mus eousque solum ferramenti ad agilopem accom-
 modatis adurere, ut squama abscederet. Abustione om-
 phacomelle, uel sidioto, reliquisque siccantibus presis
 diis utemur. At si agilops serpat ad angulum summaque
 inuadat nequaquam, tunc scalpello, quo aut pterygia,
 aut uenas secamus media anguli parte ad abscissum
 resoluta, carnes ex alto educemus, item mediocriter des-
 siccabimus. Vitri autem puluis tenuissimus ipsis inspar-
 sus, mirabiliter desiccet. Ad haec aloë similiter cum man-
 na. Reliquam uero agilopum medicinam, tertio libro
 sumis executi.

SI MEATUS AUDITORIIL non perforati sint. Cap. XXIII.

Hic affectus à prima natali die contrahitur, mem-
 brana quaedam auditorium meatum obstruens
 te, nunc per summa, nunc in alto. postea accidit
 facta exulceratione, siquidem caro supernascens ipsum
 occludit. Itaque si membrana auditum impediens alte
 inhaerescit, difficilis erit curatio. Tentandum tamen est,
 tenui quodam instrumento ipsam incidere, si in summo
 fuerit, scalpro quod Graeci scolopomacharion appel-
 lant, hanc diuisam, ubi usus exigat, etiam auferemus. At
 si caro supercreuerit, hanc unguium scalpello aut spa-
 thula acutiore tollemus; deinde tortile linamentum ex
 uiliore panniculo spatioso meatus sinul aptatum aqua
 imbuemus; inuolutumque chalcitide leuigata, aut huius
 modi quodam arido in meatum demitemus, ne rur-
 sus caro enascatur. Si inflammatio male habeat, protis-
 nus id auferemus. Si fundat sanguinem meatus, spon-
 giam aqua frigida imbutam imponemus, aliisque conue-
 nientibus utemur remediis.

Ad ea

LIBER SEXTVS. 225
AD EA QVÆ IN MEATVM
auditorum inciderunt extrahenda.

Cap. XXIII.

Solet etiam in aurem incidere, non modo calculus, sed etiam uitrum, faba, & siliquarum grana, uitrum itaq; & calculus suam seruant magnitudinem: fabæ aut, & siliquarum grana, aliaq; id genus naturali modo re corporis inflata, maximos cruciatus mouent. Conuenit igitur uel specillo, uel hamulo, uel uulsella hæc extrahere. Aut uiolenta capitis conuulsatione, aure super circum quendam imposita. Iam uero acu arundinea hæc subinde extraximus, exugentes etiam aquam auribus illapsam similiter, cera arundinis ambitum quo auri iniicitur, obstruentes ne spiritui usquam sit exitu. Calculos & eius generis corpuscula, eduximus specillo lana inuoluto & in resinam terebinthinam, aut aliud quoddam glutinans demisso, eoq; in meatum auditorium confecto leniter. Sin ista nihil proficiunt, medicamento quod sternutamentum prouocet, naribus indito, os & fauces obturato. Si ne horum quidem ulli cesserit prius q̃ inflammatio, conuulsio, & omnino periculum fuerit subsequutum, scalpello ipsa auferemus: figurabitur itaq; ægrotus ut auris auersa sit ad basim ipsius retro appellatam fibram, & lunata utemur diuisione exigua, retusaq; specilli parte corpusculum quod insidet, eximemus. Hoc ablato uulnus fibulis suemus, & medicaminibus ad cruenta inscriptis utemur.

DE POLYPO. Cap. XXV.

Polypus tumor est præter naturam in naribus oborsiens, ex marini polypodis similitudine nomen sortitus, tum quod illius carnem repræsentet, tum quod suo complexu quemadmodum ille, captantes ulciscitur, nares ipsorum comprehendens, ita & uitium hoc laborantium nares obstruit, id efficiens ut difficulter respirent, & sermonem ægre exprimant. Duri igitur polypi, tactui renitentes, liuidi & maligni, ceu cancri nas

PAV. ÆGIN.

FF

PAULI ÆGINE TÆ

turam induentes, attingi non debent. Friabiles autē magis, laxos, stupidos, neq; maleficos scalpello curare tentabimus. Figurato homine in sedili aduersus solis radios, & narium meatu sinistra manu explicato dilatatoq; spatula ad id facta in myrtacei folii modum acuta orbi culatim polypum, aut carunculam dextra præcidemus, illic acie ferramenti imposita, ubi naribus adhærescit: secundum hæc auersa instrumenti parte quam cyathiscū appellari diximus, succisam carunculā foras eximemus. Et si quidem purum naris meatum uiderimus effectū, ad curationem descendemus. Sin reliquæ aliquæ polypi superfuerint, alterius cultelli rasorii acie relictum corpus cū tensione, agitatione & rasura ualenti auferemus. Malignos & peruicaces polypos candentibus ferramentis adurere consilium est. inde remediis uestioni dicatis uti. Postquam ferro satis effectum, spongiam exacte posca, aut uino imbutam in nares effundimus. Et si humor per palatū in fauces euaserit, bene se habent munia scalpello obita: sin minus permeet, nota est carunculam polypi ossibus à colando ethmoidibus dictis insidere, aut supremis narium partibus, quam instrumenta non comprehenderint. Linum igitur medioeriter crassum funiculi instar, ceu duorum triumue digitorum longitudinis in nodos constrictum, per specilli foramen transitemus, alterumq; extremum specillo per nares sursum ad meatus colatorios inseretur: idem per palatum & os efficiētes utraq; manu extrahemus, tanq; sarcomata nodis perforantes. Deinde funiculari linamento meatum diductū habentes post triduum pastillo Musæ, & consimilibus, reliquias absumentur simul & locum exiccabimus. Postea uero pastillis cicatricem ducentibus utemur, plumbas solenas naribus, si opus sit, per totam curationem accommodantes.

CVRTA IN AVRIBVS, ET
labris quomodo sarciri possint, Græci
uocant colobomata, Ca. XXVI.

Curta igitur in auribus aut labris, colobomata Græci uocant, hac ratione curantur. Primum cutis ab inferiori parte soluitur: mox oræ uulnerū contrahuntur, ac id quod in callū coaluit, aufertur. Deinde futuræ illis iniici debent, & conglutinantia.

DE EPVLIDIBVS ET PARV

lidibus, quæ sunt gingiuarum tubercu-

la. Cap. XXVII.

Epulis carnis tuberculum est iuxta dentium aliquē in gingiuis oriens. Parulis exiguus abscessus est, gingiuas infestans. Epulidem itaq; uulsella, aut hamulo eleuatam præcidemus. Parulidi in orbem exactæ linamēta inserimus. Vidi autem subinde scalpello, quo uenas secamus, ipsam duntaxat punctam, & pure uacuatō, consanuisse. post ferrum, uino collui præcipimus. In sequenti die mulla, tertio, antheram aridam uulneri inducimus, usq; dñ curatio finiatur. At putredo gingiuis oborta si congruis medicamentis non curetur, candenti ferro ipsam aduremus.

QVOMODO DENTES EXI

mantur. Cap. XXVIII.

Dens qui eximetur usq; ad receptaculum suum circūradi debet, inde forcipe paulatim concussus, extrahitur. At si exesus est, id foramen tenui linamento primum replendum est, ne cōstrictus sub forcipe confringatur. Eo exempto, sale tenuissimo insparso relictas carunculas consumemus. Postea uino, aut posca os colluetur dum consanescat. Quoniam uero superflui nonnulli detens enascuntur, eos qui in naturalū sinus inserti sunt, scalpris excindemus: qui non illis cavitatibus insinuantur, forcipe tollemus. Sin autem dens aliquis excreuerit, aut etiam contractus fuerit, nonnunquam rhinario, id quod excedit, superfluumq; in eo est, consumemus. adiectasq; ipsis, ut uerisimile est, squamas auerso scalpello, aut ratorio, aut rhinario per purgabimus.

PAULI AEGINETAE
DE LIGATIONE LINGVÆ

quod ancylion dicitur. Ca. XXIX.

Ligatio linguæ, quæ ancylloglosson Græcis appellatur, aliàs naturaliter accidit, membranis durioribus magisq; à prima origine curtatis linguâ continentibus, aliàs ex acquisito ob cicatricem quampiam duriores sub ipsa ex ulcere contractam. Qui igitur ex natura hoc uitii habent, eo quòd tarde sermonem explicare incipiunt & uinculum sub lingua iusto magis appareat, exulceratione non præcedente, cognoscuntur. Qui uero ex acquisito, cicatricem manifesto conspicuam habent, Collocari igitur debet ægrotus in sedili ea figura ut linguam ad palatum suspendeat, & nerueū illud uinculum transuersa plaga incidetur. Quòd si ex cicatrice aliqua ligatio prouenerit, hamulo transfixum, superiore callum extrahemus, ac laterali facta diuisione ligationem soluimus, cura adhibita ne particulas alte latentes incidamus. Nam sanguinis profusio quæ sisti nequeat frequenter inde secuta est. Post hæc aqua frigida aut posca uulnus debet elui, deinde medicina utendum quæ relaxet & carnem inducat.

DE TONSILLIS. Cap. XXX.

Quemadmodum glandulæ induratæ, strumæ appellantur, ita etiam tonsillæ inflammatione expertæ, aut supra naturalem modum auctæ, & ueluti desiccatae cibi potusq; & spiritus iter impediētes, è regione utrinq; sibi inuicem oppositæ, eodē partis uocabulo, tonsillæ, Græce antiades uocantur. Quibus cum adest inflammatio, scalpellum ad mouere cautio est, ubi illa modice conquirit, manum admoliermur, præsertim albis, contractis, angusta basi firmatis. Nam humiditate flaccescentes, rubicundæ, amplā basim habentes, facillime sanguinem profundunt. Collocato igitur homine aduersus solis lumen, iubebimus ut ore hiet, ministro caput continente, alteroq; linguam spatula ad id facta quam Græci glossocatochon appellat,

inferiori maxillæ apprimente, nos hamulo per tonsillam
 tralecto, etiam pro uiribus ipsam attrahemus, ita ut non
 membranas simul euellamus. Deinde totam ipsam ex
 basi ambutabimus scalpro ligationi dicato *αγκυλοτομοι*
 nuncupant. Sunt enim duo eiusmodi instrumenta,
 aduersos acle inflexus habentia. Postquam una fuerit
 succisa, ad alteram eodem modo uice conuersa uenlun-
 dum est. Functione scalpello obita, æger ex aqua frigida,
 aut posca gargarizabit. At si profluuium sanguinis
 eueniat, etiam rubi, et rosarum, myrtiq; decocto egellando
 utetur. Si uero copia sanguinis prorumpat, plantagi-
 nis & symphyti succo: item ex electro pastillo & lemnia
 sphragide posca soluta os collui debent. Cessante autē
 profluio, proximo die rosarum flore, croco & amylo
 cum lacte perungentur ex aqua, uel oui liquore candido,
 uel hydrorofato. Si sordes ulceribus increuerint, et
 ex melle & collutiones & illitus commode adhibetur.

DE VVA.

Cap. XXXI.

G Vrgulio tanquam aliquod uocis plectrum sub-
 binde destillationem à capite recipit: idemq;
 præter naturam auctus, si oblongior, tenuisq; fue-
 rit, columella nuncupatur: si uero crassior in rotunditas
 tem creuerit, feraturq; deorsum, uua dicitur. utrunque
 autem nomen à similitudine factum est. Si igitur uniuersis
 salibus, nempe & per sanguinis dimissionem, & medicamento
 adhibitis uacuationibus non abigatur, neque etiam remediis
 loco admotis, quæ astringant, repellantq;, uel etiam digerere
 possint, cesserit, ad scalpellum uenimus: ne continuo irritatu,
 tussis, uigiliæ, interim etiam strangulatus subsequatur. Quæ igitur contractæ sunt,
 rotundæ, non oblongæ, cruentæ, uel subnigræ, non attingi
 scalpello debent. Tenuēs autem, oblongæ, per summa
 graciles muris caudæ modo, remissæ, sanguinolentæ
 non admodum, sed albicantes, ex curandæ sunt. hæ siquidem
 protinus inflammatione liberantur. Id autem ex uua præci-
 ditur, quod præter naturæ modum eminet.

FF iii

PAULI AEGINETÆ

Etenim si ad finem illa præcidatur, extremam omnes
 thoracis regiones noxam percipiunt: & uox inter mor-
 ritur. Itaque figuratur ægrotus in sedili contra solis lu-
 men, iubeturq; magnum hiare. deinde uulsella, aut spe-
 cillo quod superuacuum est prehensum, inferioriq; par-
 ti adductum scalpello uuis accommodato, aut suturis,
 præcidimus. inde quæ in uasorum sectione compreen-
 sa sunt, agemus. Sepe uero, aut propter laborantis timo-
 rem, sanguinis profluuii metum, medicamentive aridit-
 tatem, ferrum uitantes, adurente potius medicamento
 hanc absumimus. Conuenit igitur medicamento adu-
 rente quod in palpebrarum uisione dictum est, aut eius
 generis alio, uux ustæ sinus implere, ac homini magnū
 hiare iussu lingua per famulum forcipe constricta, instru-
 mento dilatato tantam uue partem comprehendemus,
 quantam etiam sumus amputaturi. Cæterum spissitudi-
 nem medicamentum habebit neq; liquidam, ne diffusus
 ens ab uua deerret subiectas autem partes adurat, ob
 quod ægro interdiciamus ne per totum uisionis tēpus
 deglutiat, neque omnino duram, quo facilius uux insis-
 dat, ac si ex uno ipsius iniectu summa uux pars nigrues-
 rit, abunde est: sin minus, etiam bis utemur, ægro per
 totum administrationis tempus hiante, ut salua eliquas
 ta simul cum medicamenti particulis extra os euadat,
 siquidem hora una emoritur, excidit autem tertio quar-
 tove die. Secundum uisionem, lana molli aut stappa
 indice digito inuoluto q̄ gurgulioni circū adherescunt,
 extergemus, uel etiam aqua os collui iubebimus. At
 ceruicis regionem fomentis ex chamæmelino, tum in
 his tum in illis quibus tonsillæ ademptæ sunt ex confor-
 ti lege adiutabimus. Ad hæc gargarizationibus & per-
 unctionibus similiter utemur.

QVOMODO SPINÆ GVT

turi eximantur. Cap. XXXII.
DEuorantur subinde inter edendum spinæ, aut
 piscium, aut aliorum quorundam, diuersis

in partibus. Quæ igitur in conspectum ueniunt, uul-
 sella, quam Græci proprie appellant acanthobolon, exi-
 memus: quæ inferius ad ipsas fauces peruenerint, alio
 modo. Sunt qui dicant maiores moles esse deuoran-
 5 das, exempli gratia, caulem lactucarum, aut buccellam
 panis. Alii uero spongiam puram mollemq; exiguae
 magnitudinis lino illagatam deglutire iubent, linoq; ap-
 prehenso retrahi, idq; frequenter efficere ut spina impa-
 cta spongiæ educatur. Leonides autem iubet cataplas-
 10 matis uti quæ concoquant, cuiusmodi ex cruda polen-
 ta conficiuntur, quo spina in pus redacta sua sponte ex-
 cidat. At si eadem hora aut etiam ante uentriculi con-
 coctionem in ægrotum inciderimus, eo quod infixum
 est nobis nō conspicuo, uomere iubebimus digitis aut
 15 pinnis in os dimissis. Nonnunquam enim, id quod est
 infixum unā cum uomitu educetur.

QVOMODO GUTTUR IN-
 cidi debeat. Cap. XXXIII.

20 **C** Hirurgicorum præstantissimi hanc quoque ad-
 ministrationem literis prodiderunt. Antyllus itaq;
 que hunc in modum scribit. In synanchicis quis-
 dem, ut in ea parte dicetur, quæ uictus rationem tradit
 chirurgicam improbamus, cum inutilis sit præcisio, in
 25 quibus omnes arteriæ & pulmo affectus est. In ore au-
 tem & mento inflammationem experiuntibus, aut etiā
 tonsillis faucium, os operientibus, incolumi quidem ar-
 teria, ratio est guttur incidere, quo periculum strangula-
 tus euitetur: deinde cum infra gutturis caput spatium triū
 30 ipsius quatuorve circulorum manū adegerimus, partē
 nonnullam arteriæ amputabimus, totā enim diuidere se-
 curum non est, tum q; hic locus excarnis sit, tum quod
 uasa pcul à loco diuiso, sint dissiata. itaq; cōcusso ægro
 tī capite posterius, ut guttur reddatur cōspiciū, transuer-
 35 sam sectionem inferemus, inter duos circulos ipsum
 statuentes, ne cartilago, sed membrana cartilagine

PAULI ÆGINETÆ

inuoluens, discindatur. At si meticulosior aliquis inter
agendum fuerit, hamulo prius cutem eleuatam diuidet:
deinde sic ipsi gutturi incidens, uasis, si forte sublabantur
præteritis, lineam ducat. Hæc quidem Antyllus, conli-
ciens guttur præcisum, tum quod spiritus per id cum
murmure quodam erumpat, tum quod uox intercisa
sit. ubi uero de strangulatu metus amplius non est, oras
uulneris recentes factas suturis committemus, ita ut so-
la cutis citra cartilaginem fibulis traiciatur, utemurq;
medicamento quod cruentis facit. Sin minus congluti-
netur, præsidio quod carnem inducat insistemus. Simili
uero curatione utendum etiam, si quis nobis obtigerit
qui mortis desiderio iugulum sibi inciderit.

DE ABSCESSU. Cap. XXXIII.

Quod abscessus carniū, uel partium carnosarum corruptela mutatioq; sit, quomodo gene-
retur, quotq; eius sint differentiæ, quarto libro
abunde tractatum est. Nunc autem quemadmodum
manu scalpelloq; ei medendum sit, exponemus: cum
omnino in pus transierit. Hoc autem deprehendimus
inde quod dolores, febris, si præcesserit, rubor, pulsus
& reliqua inflammationis signa minora tunc appareant,
ubi iam tumor in mucronem fastigatus est, & pus digi-
tis innixis sublabitur, præsertim cum summa occupat
abscessus, tunc ad scalpellū ueniūdū est. Si uero neq; ad
tactum subsidat, neq; fastigietur, q̄ in alto delitescat, aliis
mutationis notis ad tendētes, manū admoliemur. Sciē-
dū uero est crudos interim ipsos priusq̄ ex toto in pus
mutati sint, incidi, si aut articulis, aut principibus particu-
lis uicini sint, ne ligamentum, aut aliquod membrum ne-
cessarium assidua putredine pariter contabescat. Por-
rò abscessus digito proximos crudos antequam in to-
tū ematuruerint, dissecari Hippocrates præcipit, ueritus
ne perforationem experiantur. Inciduntur ergo non
omnes simili linea, sed naturali, ut in fronte: & pilosis lo-
cis, ut in capite, cura decoris quantum licet, habita.

Recta uero linea artus secamus, ueluti in musculis, diligē-
gentiam adhibentes ne & neruos & arterias & princī-
pales particulas attingamus: interim in rectum, interim
transuersim abscessu prout cuiusque usus exigit, diuiso.
5 In minoribus unam scalpello sectionem molimur: in
magnis plures, iuxta amplitudinis rationem, ubique ea
quæ tenuiora sunt & effluxioni idonea, incidentes. Illos
sane abscessus qui plurimum fastigiantur, crudi, tenues,
& emortui sunt, plaga in trianguli, aut myrtacei folii, aut
10 alterius anguli figuram facta, diuidimus, cum circularis
ad cicatricem recipiendam sit inidonea. Qui uero non
in fastigium attolluntur, eos simplici duntaxat linea dis-
secamus. At ubi magnum sinum inuenimus, si cutis su-
periniecta carnosâ sit, & queat conglutinari diuisione lo-
ci ea duntaxat utemur, quæ humoris emissario conue-
15 niat, sin tenuis admodumq; ex carnis, totam in longitu-
dinem simpliciter dissecabimus. Inde si corpora utrinq;
sita gracilia ualde & non carnosâ uideantur, ipsa tolles-
mus. Administrato iam scalpelli munere, spongia locus
20 foueri debet: si paruus est abscessus, unaq; diuisio, sim-
plex linamentum inferemus: si magnus est & plures in-
cisæ lineæ, implicitem aliquod in longitudinem linamē-
tum, lemniscum Græci uocant, ipsis demitemus, ipsas si-
militer plagas linamentis replentes. Quod si erumpat
25 sanguis, aqua frigida, aut posca utendum, si ita non sub-
stiterit, chalcitidis pollinem inspergemus, eoq; frequen-
ter ob flaccidam humore putredinem utemur. Splenia
si hyems est, & partes sint neruosæ œnelæo imbuta des-
ligabimus: sin æstas, & partes carnosæ, hydrelæo, aut ip-
30 so quoque œnelæo frigido tineta illigataq; sequenti die
eisdem liquoribus superfundemus. Post tertium diem
soluuntur, & per spongiam fotum adhibentes tetraphar-
maco, quod in linteola illinitur, utemur. Si inflammatio-
ne caret uomica, idem fomentum ex medicamine lina-
35 mentis illito accommodabimus. Si inflammatio adest,
cataplasma quod concoquendi uim habeat, iniiciemus,

PAULI ÆGINETÆ

superfusionibus antea usi: ubi cessauerit inflammatio, medicina quæ pus maturet, & carnem inducat, medebimur. Cæterum sinus, glutinantibus remediis, ut quarto uolumine de sinibus comprehensum est, curabimus.

DE STRUMIS. Cap. XXXV.

Struma, quæ Græce choëras dicitur, glandula est indurata, in ceruice, alis & inguinibus potissimum enascens. Nomen habet à choëradis petris, aut suis, quod numerosæ sobolis existant, aut quod colla habeant glandulosa. Oriuntur autem strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut utrinque una, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata, & melicerides. Quæ igitur indolent tactu, & medicamentis impositis deteriores redduntur, malignæ sunt, quas etiam carcinodas aliqui dixerunt, notumque est omnibus per manum curationi ipsas non cedere. Morigeræ autem ac blanæ tum tactui, tum congruo medicamentorum usui, hoc modo tractandæ sunt. Superficiares igitur, & in cutem erumpentes, simplici linea diuisæ, ab incumbētibz dissoluntur: orarum cute hamulis distenta, membranz excoriantur, ut in uasorum confectione, quam angiologiam uocauimus, expositum est, ac paulatim eximuntur. Maiores autem strumas hamis transfixas suspendemus, & similiter excoriatæ corporibus eas continentibus undiquaque liberabuntur, animo adhibito ubique, ne arteriæ, quas carotidas uocant, & nerui recurrentes uiolentur. At si uas aliquod diuisum opus adumbret, funiculo id excipietur, uel per medium amputabitur, nisi magnum fuerit: ubi in arctum strumæ basis uenerit, dextre ipsa præcidetur: ac indice demisso tentabimus, num & aliæ sint strumæ adiectæ quæ eodem modo auferentur. Quod si magnum aliquod uas aut etiam plura subinde in strumæ fundo esse suspicemur, non ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere conuenit, quò par

ticulatim citra periculum sua sponte excidat; quo tempore medicamento in lindeola illito, curatio tentabitur. Si uero inde excindantur, oras committemus, omnino autem rectas diuisiones adhibere oportet. Atque si nihil superfluum habuerint, inde fibulas iniiciemus. Sin ex strumæ tumore cutis sit amplior, parte ipsius myrti instar ablata, suturis utemur, & medicamen cruentis aptus iniiciemus.

DE STEATOMATIS, ATHEROMATIS & MELICERIDIBUS. C. XXXVI.

HÆc quoque in abscessuum genere comprehenduntur: sed hoc discrimine ab illis uariant, quod abscessus proprie dicti inflammationem doloremque testentur, & acrem humorem, ac rodentem continent, neant, nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi. Cæterum illa inter se quoque differunt, quod humor in steatmate contentus, appellationi congruenter seuo sit persimilis. In atheromate, puli frumentaceæ. In meliceride, humor mel repræsentet. Agnosces ipsa hunc in modum: Steatoma aliis durius est, tactui renititur, & basim habet solidiorem. Meliceris laxi cuiusdam corporis modo subsidet, & tarde quidem funditur: cito autem rursus succrescit. Curantur hæc quæadmodum strumæ, incisione, excoriatio, suturis & reliqua curatione, id solum cauendo, ne membrana uulneretur, unde humor qui continebatur, profusus operationem impediat, & pars ipsius relinquatur, nam renascendi illius occasionem plerumque in brachiali malleolo & articulamenti motu indicatis exhibet, quemadmodum etiam struma uel tota, uel portio ipsius relicta quæ si huiusmodi quippiam fuerit deprehensum, satius est non suere, sed exedentibus medicaminibus reliquias absumere.

DE ANEURYSMATE.

Cap.

XXXVII.

Aneurysma tumor blandus tactu est digitisq; cedit, ex sanguine & spiritu contractus. Galenus de

PAULI ÆGINE TÆ

eo hunc in modum scribit: Arteria aperta, affectus aneurysma uocatur. Fit autem eadem conuulnerata, quoties exterior cutis cicatricem duxerit, arteria uero sine cicatrice remanserit, nec coalescens, nec carne obstructa. Agnoscuntur huiusmodi affectus artieriarum pulsu, imo etiam prementibus nobis tumor quodammodo euanescit, substantia quæ ipsum efficit, in arterias recurrente. Hæc quidem Galenus. Nos autem ipsos hoc modo inuicem discernimus. Qui ad aperta arteria sunt, prolixiores apparent, & in alto constituuntur: digitisq; impressis ceu strepitus quidam exauditur, cum nullus sonus in his qui rupturæ feruntur accepti percipiatur: illi uero rotundi magis sunt, & per summa oboriuntur. Quæ igitur alas, inguina & ceruicem infestant, aliaq; loca eximie magnitudinis aneurysmata curare propter uasorum amplitudinem non tentabimus. Quæ uero summas partes artus uel caput affligunt, hac ratione aggredi conuenit. Si quidem ex arteria dilatata tumor obuenerit, cutem linea recta in longum incidemus: deinde diductæ oræ sicut in uasorum dissectione dictum est, excoriantur, & scalpellis quibus membranæ auelluntur circumpurgata arteria nudabitur, acu traiecta duobus funiculis deligatur, puncta prius scalpello per medium: ubi cum ambientis membrana unita fuerit, curatione pus maturante utemur usque dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriæ ceratum sit aneurysma, totum id quatenus fieri licet, cum cute digitis apprehendendum est, deinde acuduplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transsuendum. Et post acus traiectum ansulam forfici precipitare oportet, atque sic duobus filis hic illic tumorem deligare, ueluti in staphylomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumuoluantur, altera etiam transmittenda est acus per totum quod priorem premat similiter duo fila ducens: amputata ansula ex quatuor ita tumorem deuinciemus, uel tumore per medium ad aperto post excretionem cutem adinuemus, eam quæ ligata est

relinquentes, ac splenium ex cœnelæo imponentes, res
mediis in linamenta illitis utemur.

DE CERVICIS TUMORE

qui bronchocele dicitur.

Cap. XXXVIII.

Grandis in ceruice, & rotundus tumor fit, inueno
to ab interiore parte nomine, quam bronchon
Græci appellant. Duplex eius tumoris differen
tia est, alius enim adipe tumet, qualia sunt in abscessuum
10 genere, quæ iidem Græci steatomata dicunt alius par
tium illarum dilatatione accidit. Atque hunc notabim
ueluti & aneurysmata, desperatumq; fugimus: cum simi
liter uniuersa aneurysmata periculosam habeant admi
nistrationem: præcipue uero quæ circa ceruicem oriun
15 tur, ob arteriarum magnitudinem. Qui adipe inturges
cit, steatomatis similiter curari debet, discretis, præte
ritisque uasis, eo nimirum modo quem in strumis ex
posuimus.

DE GANGLIIS. Cap. XXXIX.

Ganglion, nerui est concretio, ex ictu, aut labore
proficiscens: plerunque uero in manus iunctura
qua cum brachio committitur, talo, & articulo
mentis absoluitur, quanquam in aliis quoque partibus
proueniat. Hæ comites sunt notæ, tumor concolor, res
25 nitens, indolensq;. At si uiolenter premas, stuporis sen
sum exhibet, non in alto, sed ipsa sub cute radices agēs,
& ad latera spectans, sin autem ui adigas, tum ante, tum
post, nequaquam id facit. Quæ igitur in cruribus aut
brachiis aut summis partibus oriuntur, excindere tutum
30 non est: periculum enim ne particula reddatur mutila.
At quæ caput aut frontem inuadunt, cute scalpello diuisa
curamus, & si quidem parua fuerint, uulsella compre
hensa ex basi præciduntur: si maiora, hamis transfixa ex
coriataq; tolluntur: oras suturis commissas, medicamen
35 to ad cruenta apto persanamus.

PAVLI ÆGINETÆ
DE SANGVINIS DETRA

ctione per uenas. Cap. XL.

Etsi omnibus satie constet, quomodo sanguis per uenas mitti debeat, tamen ne parti chirurgicæ aliquid deficiat, & propter artificiosas ipsius distinctiones, committendum non est, quin de ipso uerba faciamus. Primum itaque uenę sectionis consilium est, ut sanguis qui redundat, euacuetur. Copia uero ipsius duplici modo capi demonstrata est, uno ad uires, uenę licet plenę non appareant: in quo statu homo, protinus infirmatur & uiribus destituitur: natura ceu ad graue aliquod onus ferendum impotente, altero uasa quę id continent in alia pondus loca transfundere spectantur: etsi uirtus haud cum molestia ipsum toleret. In quibus ruptis interdum uenarum commerciis sanguinis sputum, aut alię fluxiones accidunt. Copię igitur, quę ex uiribus aestimatur, corporis grauitas, nota est. Venarum copia tū extensione, tum quod illę plenę tument agnoscitur, utraque autem uacuationem necessariam indicat. Itaque per morbi initia sanguinem usu id exigente demittes, sola in uentriculo ciborum concoctione, aut etiam perfecta in iocinore sanguinis elaboratione expectata. At si inter initia ob causam aliquam sanguinis detractio prætermissa fuerit, uel ultra septimanam eum mittere alienū non est, si necessitas postulet, & uires non dissuadeant. Caterum qui uenam incisurus est, id habet inspiciendū, num multa stercoreis retentio intestina urgeat. Quod si ita deprehensum est, molli clystere aluus antea uacuari debet: ne uenę putridam aliquam excrementorum colluiem ab intestinis attrahant. Iis igitur qui ob morbi necessitatem, sanguinis detractiōem requirunt, quouis tempore uenam incidemus, si particularium duntaxat in febribus accessionum uigorem seu statum excipiamus. At si continens febris exiterit, matutinum omnino tempus magis idoneum est. Qui uero nullo morbo urgen

te, sed præcauendi illius gratia sanguinis uacuationem
postulant, his uerò opportunum est. Porro in ætatibus
usque ad quartumdecimum annum sanguis mitti non
debet, sicut etiam post sexagesimum, nisi necessitas quæ
5 dam ineuitabilis huc nos compellat. in summa imbecil
lis uiribus præditi, hanc uacuationem uitabunt. Cæterum
in particulis recens inflammatione tentatis, ex opposito
inanitionem moliri conuenit: in uetustioribus, ex pro
pinquo: siquidem ex omni corporis parte sanguinem
10 mittemus: frequentius aulem ex interiori cubiti uena.
Verum id considerandum uenit, interiori & alariæ dis
tæ uenæ, per totum, arteriam subici: mediæ neruum:
superior quæ & humeraria dicitur, periculi expers est.
Ac in capitis morbis humerariam incidimus. In his qui
15 infra ceruicem affligunt, alariam: media utrisque conue
nit. ligamine igitur arcto partem aliquam circa brachii
musculos deligare oportet, & frictione manuum altera
nante, repletam uenam usui commodam intrepide per
totam ipsius latitudinem solam diuidere. Etenim maio
20 res hac plage, ægre cicatricem admittunt: arctæ nimium
inflammationem experiuntur, præterquam quod cras
sioris succi transitum impediunt. In quibus autem & ses
cundo & tertio die, interim uero & quarto sanguinem
detrahendum esse metuimus, obliquius uena secari de
25 bet, quo manus inflexu dehiscens non protinus cicatri
ce obducatur, sic enim uisum est Antyllo. At quantum
euacuabitur, ex uirium robore, & morbi magnitudine
metiemur. Si humoris copia subest, & materia efferue
scit, una uice usque dum anima deficiat extrahemus, uir
30 tute uidelicet robusta, sic autem ut æger non ex humo
ris in uentriculum cōfluxu deficiat: ob quod etiam mul
ti ante iustam uacuationem p̄ initia statim animo desti
tuuntur: uerum eius deliquium his uacuati humoris ra
tione obuēire oportet. Iam uero si magnam uacuatio
35 nem res postulet, uires autem sint inualidæ, distribuēda erit
inanitio: ac primū parcius detracto sanguine denuo idē

PAULI ÆGINETÆ

auferetur: si res exigat etiam tertio. Caterum uacuare
 solemus corpus uniuersum non modo succis æquabi-
 liter exuperantibus, quem statum Græci plethoricon
 appellant ueluti & Galenus tradit, sed etiam propter af-
 fectus magnitudinem quanquam totum corpus humo-
 ribus uideas commodatum, quemadmodum in san-
 guinis ex naribus, aut alia parte profluuium, quod non co-
 pia excitauerit: ac uacuare reuulsorio modo ex opposi-
 tis conuenit. Quinetiam in ualida inflammatione idem
 faciendum est, sicut in colicis & renibus calculosis, lippi-
 tudine, & iis quæ tam præcipiti modo urgent. Nam do-
 lor & partis inflammatae calor defluxioni præbent oc-
 casionem, licet uniuersum corpus superfluitatibus careat.
 Quapropter parcius id tunc faciendum est, uacua-
 tione adhibita, quæ potissimum laborantis ætati, & na-
 turæ competere uideatur: considerato etiam anni tem-
 pore, loco, & ægrotantis consuetudine. Porro in quibus
 prope uenam quæ diuidetur magna quædam est
 inflammatio, quemadmodum in pleuriticis & iocinos-
 rosis, optimum est expectare, dum color sanguinis, &
 substantia mutetur. Diuersus autem est in inflammatio-
 ne sanguinis naturalis: quoniam largius incalescens, si qui-
 dem prius erat crudior, rubicundior magisque, flauus es-
 uadit: si autem talis prius extiterit, in nigrum adustus mu-
 tatur. Non tamen ex toto mutationem ipsius expecta-
 re consilium est. Est cum & ante illam cessare conueniat
 idque duplici de causa, aut ob uirium imbecillitatem, quæ
 ex pulsuum tactu cognoscitur: sunt enim ipsi inæquales
 uehementia, & magnitudine, uel etiam languidi, & tes-
 nor fluxionem rumpens imbecilles iam uires notat: aut
 propter inflammationis malignitatem: nonnunquam
 enim nihil remittit, sed uehementer impacta est. At si ni-
 hil horum obstiterit, ægerque florida ætatis sit, expectan-
 da est sanguinis mutatio, magisque: si ambiens aer tem-
 peratus fuerit. Si uero sanguis ante congruam uacuatio-
 nem fuerit suppressus, id autem accidit aut propter
 timorem,

1 timorem, & animi defectum, aut sanguinis grumum, aut
 uiolentam constrictionem, contra singula pugnabimus.
 Animam deficientem, odoratis naribus admotis refo-
 cillantes: constrictionem, uinculo remisso soluentes: in-
 grumum coactum sanguinem, uel olei infusione, uel dis-
 gitorum fotu dissoluentes. Reliqua sanguinis dimittens
 di præparatio nulli non cognita est: uerum hæc in cubi-
 ti uenis fieri solent. At ex fronte sanguis detrahatur in ca-
 pitis doloribus ita: capite fomentis adiuto, ligamine cer-
 10 uicem uinciemus, digitis super guttur interpositis ne suf-
 focatu ægri intereant: repleta iam uena in fröte, acie scal-
 pelli diuidetur. Eodem modo etiam circa guttur extan-
 tes uenæ sphagitides appellatæ ob uetustam lippitudi-
 nem aduersa scalpelli parte scinduntur, ita ut sanguis erū-
 15 pat. Item uenas linguæ subditas, ueluti in anginis, trans-
 uersas incidimus, euitantes constrictionem. Nonnulli ue-
 ro in maioribus oculorum angulis uenas eminentes, si-
 cut in longis capitis, uel oculorum morbis, similem in
 modum diuidunt. In quibus internas quoque narium
 20 uenas uel mucrone scalpelli contundentes, uel quibus-
 dam asperis irritantes dirumpunt, item post aures sitas
 ob capitis affectus feriunt. Quæ uero poplitem perres-
 ptant, in renum cruciatibus aperiuntur. Quæ extremas
 corporis partes intercurrunt, superiacentibus uinculo
 25 exceptis & manuum frictione, & pedum incessu reple-
 tæ diuiduntur, in sinistra quidem manu, cum lien male
 habet, uenam quæ inter paruum mediumq; digitum
 porrigitur, præcipue incidemus, cum iecur affligitur, in
 dextra. Nam extremarum partium inanitio, è longin-
 30 quo magis facta efficacior molitur reuulsionem: in
 pede, ueluti cum coxendicum dolores aut uteri uitia ur-
 gent, eam quæ supra interiorem malleolum eminet,
 dissecabitur.

DE SANGVINIS DETRACTIO

ne per cucurbitulas. Cap. XLI.

PAV. AGIN,

GG

PAULI AEGINETAE

Cucurbitulis neq; per affectuum initia, neq; cum corpora sūt plethorica, utemur: sed iis prius euacuat, cumq; nihil particule influit. Vfus eius est mouere aliquid, agitare, & foras extrahere. Leuis itaq; cucurbitula inflationes discutit, distillationes in stomachum suspendit, sanguinem attrahit, & profluentem rursum sistit, obiectis partibus admota: & quod alte conditū est, in summa rursus educit, in totum humores traducit, spiritus euacuat. At quæ cū scarificatu adhibetur efficacius ipsos per halitum egerit, sensibiliter ex alto ea quæ nocent eliciens: quippe nō modo sanguinem, sed alios quoq; humores uacuat, præsertim cū flamma ampliorē ad glutinata: uerū si à carnosīs particulis detractionē moliri statuimus, primū cutis scalpello exasperanda, deinde cucurbitula imponēda est. Sin ex carnis magis pars fuerit leuē prius cucurbitulā defigemus: ubi in timorē particula eleuata sit, scarificatu adhibito, rursus ipsam accōmodabimus: & si paululū uacuare cogitamus, una diuisio abūde est: sin amplius plures adhibētur. Itē si tenuiorem q̄ continetur sanguinē acceperimus, summa scarificari, si crasfiorem, alta debent: quando etiā concretū ex istu sanguinem educere animus est. Terminus autem moderatæ diuisionum altitudinis est, sola cutis crassitudo. Nonnulli instrumentum ad hoc excogitarūt tribus scalpellis æqualibus simul iunctis, ut unica iniectione tres fierent plagæ, uerum hoc nos inutile putantes simplici scalpello contenti sumus. Alii cucurbitulis usi sunt uitreis, ut sanguinis qui uacuatur mensura in extractione pellucescat: uerum æneæ cum maiorem sustineant flammam, multo sunt efficaciores uitreis, quæ facile dirumpuntur. Quinetiam quæ ex cornibus, ore sugentes trahunt minus quidem inaniunt, non autem siccant, quemadmodum quæ cum flamma si opus fuerit, adhibentur. Cæterum cum admoturi sumus cucurbitulam, particulam in rectum figuratam ex latere hanc defigemus. Si enim iacentibus ipsis desuper linamentum ex lucerna

simul cum flāma inducamus ex cute decidens illa gra-
uiter adurit,usu hoc non postulante.Est cum cucurbitu-
læ magnitudo subiectæ parti adæquabitur,eaq; de cau-
sa permultum cucurbitulæ & paruitate & magnitudine
differunt,quemadmodum etiam collo prolixiores &
spatio inferiori latiores aliis efficacius extrahunt.Cauen-
dum autem ne prope mamillas cucurbitula applicetur
nam illapsæ cucurbitulis nonnunquam mammæ & in-
turgescences ualide haud facile ipsas relinquunt, atque
tunc spongiæ ex calida cucurbitulis circumdare oportet,
sic enim remittuntur:sin minus hoc modo fuerint la-
xatæ,perforari ipsas ratio est.

QVOMODO ALÆ ADV-

rantur. Cap. XLII.

HVmeri articulo luxato in nōnullis caput frequen-
ter & continue excidit,uel humiditatis superan-
tis uitio,uel quod continuæ luxationi opportu-
nus locus euaserit,quando ad uisionē descendere oportet.
Proinde ægro, aut supino, aut in sanum latus inclina-
to,interiorem alæ cutem quā potissimum articulus ex-
cidit,duobus sinistrae manus digitis,uel hamulis tenuio-
bus & oblongis eleuatam,candenti ferro adurere oportet,
quousq; ferramentum contraflexum uno impressu
duas crustas excitarit,& si magnum intercedens harum
spatium fuerit,mucrone scalpelli per ipsas traiecto, aliā
in medio crustam faciemus,adurentes usque dum cau-
terium scalpello inciderit.Item alias duas Hippocrates
iuxta utriusq; dictæ mediam fieri cōsulit,æquali illis spa-
tio distantes quadrangulæ figuræ modo.Altius autem
cute non penetrabimus,quod nerui,glandulæ,aliaq; ad
inflammationem creandam procliua, difficultatemq;
functionum,subiecta sint:curari adusta debent porro cū
sale trito imposito,tum aliis præfidiis ad crustas inscrip-
tis,postea manu operandum caute fuerit.

DE ADNATIS DIGITIS ET

sexto digito.

Cap. XLIII.

GG ii

PAULI ÆGINE TÆ

AD nascuntur digiti in manu nunc prope maiores digitos, nunc prope exiguos, raro autem uisi sunt iuxta aliorum aliquem. Eorum uero qui ad nascuntur, alii per totum carnosum sunt, alii ossa in se continent, nonnunquam & ungues. Ossa habentium, hi ab articulo procedunt, cuius commissuram alteri digito communicant, illi ex naturalium digitorum fissura oriuntur: atque huiusmodi perpetuo sunt immobiles: reliqui mouentur nonnunquam. Carnosorum expedita est præcisio, nam scalpello quod superuacuum est una uice tollimus. Eorum qui ab articulo prodeunt difficilior est tractatio illis qui à digitorum fissura originem traxerunt: primum caro orbiculatim usque ad os excinditur, ipsumque os excisum aut erasum, aufertur. Cæterum inter curandum radimus ipsa, & cicatrice obducimus, quemadmodum est in ossium uulneribus declaratum est.

QVOMODO PURULENTIS

adustio adhibenda. Cap. XLIII.

Vstio efficacissimum purulentis præsidium inuentum est. Conuenit igitur ferro candenti crustas excitare: unam inter clauiculæ compagem cute sursum educta, duas autem exiguas iuxta mentum, sicut ab arteriis quæ carotides appellantur, recedatur. Duas item sub manillis ampliores inter tertiam quartamque costam: alias duas inter quintam & sextam paulum in posteriora spectantes: aliam, per medium pectus: rursus aliam supra os uentriculi, tres posterius: per medium dorsum unam, utroque spinæ latere duas, quæ in dorso facta crustam excedant non admodum extantes. Alii, ut tradit etiam Leonides ferro mucronato candenti per medias costas qua abscessus est, adacto, usque ad pus ustionem moliti sunt. Nonnulli etiam hos curare ausi sunt, transuersa linea quinque aut sex costis per medium diuisis paulo infra cutem, atque deinde scalpello membrana quæ costas succingit perforata pus excreuerunt. Atque hi cum illis, qui ferro usque ad inum adurunt, aut stao

tim mortem inferunt, uitali spiritu confertim una cum pure euacuato, aut fistulas reddunt insanabiles.

DE CANCRO. Cap. XLV.

Cancer, tumor est inæqualis, oris p̄tumidis, aspe-
ctu teter, liuidus, & indolens, interim sine ulcere,
quem Hippocrates latentem nominauit: is si cu-
retur, peior euadit: interim exulceratus: nam cū ex atra-
bile ducat originem, magna parte eroditur. Pluribus
quidem corporis partibus accidit, præcipue foeminarū
10 locis, & mammis, quæ uenas undiquaque turgidas habent,
quemadmodum cancer animal pedes, unde etiam no-
men sortitus est. Quæ igitur per medicamenta curatio
adhibetur, quarto uolumine abunde explicata est: eius
autem canceri qui uulnam infestat, tertio. Quoniam uero
15 ro partes putrefactæ, aut quæ, ut simpliciter dicam, natu-
ræ modum exceſſerunt, ablationem sui postulant, uul-
uæ canceris, nec utiliter manus admouetur, nec potest quod-
dem. Galenus autem solam administrationem quæ per
sectionem fit, recipiens, hoc modo scribit: Si quando
20 cancerum scalpello curare audebis, incepisse uacuatio-
nem à melancholici humoris purgatione oportebit, ubi
iam totum quod uitiatum est exacte præcideris, sicut
nulla radix superſit, sanguinem effluere finito, nec cele-
rius eum cohibebis, uerum etiam premendo uicinas
25 uenas, crasſiorem ex ipsis sanguinem exprimes: deinde
aliorum ulcerum modo curabis. Hæc quidem Galenus
memoriæ prodidit. Reliqua uero maligna putrida que ul-
cera, nempe phagedænas, gangrænas, & conſimilia eo-
dem tractare modo debes.

DE IIS QUIBVS MAMMÆ FOE-
minarum modo inturſcunt. Cap. XLVI.

Quemadmodum foeminis, ita masculis quoque
pubertatis tempore, mamillæ modice inflantur
sed plerisque rursus ſubſidunt: in nonnullis ſum-
15 pto initio creſcunt pinguedine ſubnaſcente. Cum itaque
indecora hæc corporis figura muliebris habitudinis no-

PAULI ÆGINETÆ

representet, digna est cui manus admoveatur. Lunata per imam mamillæ partem linea ducitur cute detracta: adempta; pinguidine, suturis committetur. At si forte mamilla partibus ipsius ob magnitudinem ad ima, ut in mulieribus, inclinauerit, lunatas duas plagas in extre-
mis inuicem coeuntes iniiciemus, ut minor à maiore comprehendatur. Cute quæ intercedit cum pinguedine adempta, similiter fibulis utemur. At si aberrantes minus exciderimus, tunc eo quod superest rursus adempto, suturas iniiciemus, & medicamentum cruentis idoneum accommodabimus.

QVOMODO IECVR ADV ratur. Cap. XLVII.

SI dolor cum gravitate iis oboriat, quibus iecur abscedit, carnea ipsius substantia uitiata ostenditur. Si acutus dolor magis urgeat, puris in tunica col-
lectio: adurere hoc modo oportet. ferrum candens mucrone tenui, paulo supra inguen qua iecur desinit, iniicitur: ut crustam unam excitet: Vbi uero totam cutem adu-
ferit & usque ad tunicam penetrauerit, pus excernetur. Ab euacuatione omphacomel utiliter adhibetur, tum ea quæ mulla & speciebus ad carnem creandam com-
ponuntur: postea uero et cicatricem ducētib; utemur.

QVOMODO LIEN ADV ratur. Cap. XLVIII.

Cutis quæ lieni incumbit, hamo eleuata, oblongo ferro candenti per totum ipsa aduretur, ut unico impressu duæ fiant crustæ, quo omnes crustas numero sex habeas. Marcellus autem tridente, quæ trianā Græci dicunt, aut tridenti simili ferramento utens
uno adactu crustas excitauit.

QVOMODO STOMACHVS aduratur. Cap. XLIX.

IN longis stomachi defluxionibus, recentiores usi sunt adustione. Alii ferro mucronato candenti tres
crustas moliuntur, unā iuxta cartilaginem mucrona-

tam quæ Græcis uocatur xiphoeides : alias duas inferius trianguli figura, altas ut cutem diuiderent : Alii unā duntaxat adhibent, ampliorem supra ipsum os uentriculi. Sunt, qui ne ferro quidem urant, sed iscis appellatis : sunt autem hæ spongiosa quædam corpora in quercubus & coryllis nascentia, barbaris magis usitata. permittunt autem uulnera sine cicatrice diu manere, imo et prius diuidunt, ut maiore per ipsa diffusu os uentriculi ab influxionibus immune permaneat.

10 QVOMODO AQUA HYDRO-
piciis emittatur. Cap. L.

15 QVomodo aqua intercus contrahatur, quot sint ipsius differentiæ, quæ causa, quæ notæ, quodq; remedium, tertio uolumine sumus executi: ubi & demonstratum est, illud solum aquæ inter cutem genus quo in uterum aqua confluit, asciten dicunt, manus operam postulare. Atque eam hoc loco explicabimus. Itaque rectus homo statuitur, sin minus, in sedili collocatur: si ne hoc quidem fieri potest, attingi non debet, cum adeo sit inualidus. Stante recto homine ministris retro assistentibus, iubebimus ut tumorem ad pubem digitis premant depellantq;. Nos scalpello, si ex partibus iuxta intestina fitis originem contraxerit, sub umbilico tribus digitis interpositis abdomen ad usq; tenuem membranam quæ peritonæos uocatur, diuidemus. Sin autem primario iecoris affectui malum fertur acceptum, à sinistro umbilici parte dissecabitur si à liene uisum trahit originem, in dextra. non enim in illa parte sectionem moliemur, cui incumbit. Ac cute quæ superiacet acie instrumenti excoriata, membranam quæ 30 finit abdomen, peritonæos uocatur, diuidemus, quousque scalpellum inania penetrauerit. Deinde per foramen illius membranæ æneam fistulam scriptoriis calamis acie similem demitemus, & per hanc humor effundendus est pro cuiusque uirium ratione, quam ex 35 pulsus tactu deprehendemus. Deinde exempta fistula

GG iiii

PAULI AEGINETÆ

humor sisti debet, sistetur aut statim uicissim. Ictis linea.
 At nos securitatis gratia linamentū tortile per solā abdo-
 minis diuisionem dimittimus, ægro recumbente recrea-
 toq; per insequentē diem rursus momentum humoris
 quantū uirtus exigit fistula euacuabimus, atq; ita deinceps
 faciundum est, quousq; minimum humoris super-
 sit, ita tamen, ut ubiq; subitam uniuersamq; uacuationē
 uitemus multisquidem imperite manum admoliti unā
 cum humore uitali etiam spiritu uacuato subito homi-
 nem iugularunt: qui uero securius rem agunt, modico
 humore educto, ut uirtus magno leuaretur pondere, re-
 liquum medicamentis aquam ducentibus, saburraratione
 in sabulo, sole, siti, & cibis desiccantibus cōsumpserunt.
 Iam uero uestione super stomachum, iecur, lienem, imū
 uentrem & umbilicum usi sunt, quinq; crustas adhiben-
 tes. Alii ferro tenui candenti: alii iscis nuncupatis, aut ali-
 quo ex alia huiusmodi materia: & plerique hac curandi
 ratione magis confanuerunt, interim nullam in totum
 compunctionem (quam paracentesis uocant) experti.

DE UMBILICO PROMINENTE. Cap. LI.

Vmbilicus in decore prominere solet, quod uis-
 tum Græce exomphalon dicitur, interim mem-
 brana qua abdomen finit, peritonæum appella-
 ui, illic dirupta, ac procedente, aut omento, aut intestino
 interm colluue otiosi humoris sub umbilico contra-
 cta, interim uero carne subnata, aliquando sanguine ir-
 rumpente, propter uenæ, aut arteriæ rupturā, ut in aneu-
 rysmatis, interdum non sanguine, uerum spiritu solum
 irruente. Si igitur omentum prociderit, circa umbilicum
 tumor concolor, mollis tactu, indolens & inæqualis ap-
 paret. Si intestinum prolapsum est, præter commemo-
 rata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impresso
 sis cedit, euanesctq; nonnunquam strepitū elidens, bal-
 neis, & distentionibus magis increfcit. At si humor col-
 lectus est, mollis similiter tumor apparet: pressus

autem non cedit, neq; decrescit, neque tamen augetur. Quod si autem accedat superioribus signis, ut tumor sit liuidior, carneq; subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadem in magnitudine manet. Si ex inflatione emi-

5 net, tumor mollis ad tactum subsequetur, qui digitorum impulsu sonum quendam reddit, & pressus aboletur.

Hunc in modum curabitur: erecto homini iubemus ut spiritum contineat quo in omnem partem distendatur: deinde omnem umbilici excrescentiam orbiculatim a-

10 tramento scriptorio notabimus, resupinatoq; homine scalpello tumorem, qua nota atramenti est exasperabis-

mus: deinde medium hamo eleuatum, lino aut neruo qua exasperatio est, circum astringemus (hoc enim pa-

15 pto continebitur ne deuoluatur) ansulam supra nodum ponentes, postea tumore constricto iuxta uerticem ada-

perto digitum indicem demitemus, tentabimusq; dili-

20 genter num intestini implexus, aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac si quidem intestinum fuerit relictum laxata funiculi ansula, id introrsum pellemus: si uero o-

25 mentum sit, eo retracto, quod superuacuum est ampu-

tabimus, uase quod (ut uerisimile est) coincidit, deligato

30 mox duplici acu simplex linum ducente, hiantia per in-

cisionem cutis factam traiectamus, & ansulis linorum

præcisis, quemadmodum in aneurysmate dictum est

35 ex quatuor linitis constrictionem moliemur. Vbi corpo-

ra lino deuincta computruerint exciderintq; linamentis

curatio absoluetur, si cauam magis cicatricem fieri sem-

per cupiamus. Hæc quidem ad omenti, aut intestini affe-

ctum pertinent. At si caro, aut humor, aut sanguis uitium

crearit, tumoris medio circulatim præciso: deinde quod

incidet extra peritonæum sublato curationem in umbi-

lico carni generandæ dicatam tentabimus. Porro si um-

bilicus emineat aut ex uenæ ad apertione, aut spiritus

interpositu attingi non debet, quemadmodum etiam

aneurysmata.

PAVLI AEGINETAE
DE INTERIORE ABDOMINIS

membrana conuulnerata, item de intestini, aut
amenti procidentia. Vbi etiam tractatur,
quomodo uentris uulnera san-
ciantur ex commentariis Ga-
leni. Cap. LII.

Quomodo interioris abdominis membranae uul-
nera optime queas manu curare, deinceps ue-
nit considerandum. Si igitur paruum adeo uul-
nus extiterit ut inflatum iam quod procidit intestinum
remittere non liceat necessarium est, aut flatum elicere,
aut uulnus ampliare. Satius autem fuerit meo iudicio
quod prius dixi agere, si modo id consequi possis. At
qua magis ratione id consequare, quam si causam unde inte-
stinum inflatur, è medio sustuleris: Quare igitur ea est mi-
nimum, ambientis nos aeris refrigeratio: quare etiam re-
medium ex calore petetur. Itaque spongia, molli aqua
calida madenti, mox expressa calefacere intestinum o-
portet. Præparetur autem interea uinum austerum cali-
dum etenim hoc magis quam aqua calefacit, ac robur inte-
stino adiecit. At si per hæc intestini inflatio non cesserit,
tanta peritonæi pars incidi debet, quanta, id quod exci-
dit, opus habet. Idonea uero ad eiusmodi sectionem
habentur ea quæ Græci syringotoma uocant, id est, quæ
ad fistulas incidendas sunt accommodata. Scalpelli ue-
ro quibus acies utrinque est, aut quibus cuspis acuta ha-
betur, omnino uitari debent. Situs laboranti appositus
fuerit, cum in inferiori parte uulnus factum est, si sursum
uerget: cum in superioribus, si deorsum, & si in dextris
uulnus sit, in contrariam partem corpus incumbet, si in
sinistris, in dextram, atque hoc tum magnis, tum exiguis
uulneribus commune est. Ceterum cum intestina in pro-
prium reponi locum debent ex magno uulnere collap-
sa ministro dextro opus est: oportet enim ipsum, ubi
manibus suis totum uulnus à foris apprehenderit, intro
repellere, constringere ac exiguum semper suenti denu-

dare quinetiā id qđ consutum est, mediocriter cōprime
 re, quoad totū psuatur, Porro qđ idonea suendi abdomi
 nis ratio existat, deinceps dicamus. Qđ m̄ colre abdomē
 cum interiori ipsius mēbrana nempe peritonæo conue
 5 niet, incipiendum qđē à cute est, atq; ab extremo intror
 sus acus demittitur ubi iam & cutē & rectū musculū totū
 tū transferit, p̄terito qđ ei subiacet peritonæo, p̄ reliquā
 huiuspartē eā ab interno extrorsum, atq; inde p̄ reliquū
 10 abdomen traiectabis: ubi hoc penitus p̄transferit, rursus
 ab externo introrsum, idem abdomē p̄forādū est: mox
 ubi peritonæum quod illi quoq; subest p̄terieris, & ad
 cōtrariū puenieris, id quoq; ab interno extrorsum ppun
 gi, unaq; cū eo totū ipsi cohæres abdomen debet. Dein
 de ab hoc rursus incipiēdū, atq; id cū cōtrario pitonæo
 15 cōsuendū. Ac rursus uicina ēt cute traiecta, iterū ab ea
 parte acus introrsum est iniicienda, cōsuendumq; id cū
 cōtrario peritonæo, inibi quoq; uicina cute transmissa:
 atq; hæc iterū iterūq; facienda sunt, quoad totū uulnus
 similiter cōsuerimus. Intervallū uero futurarū qđ ad cō
 20 pescenda ea qđ subsunt p̄tinet, breuissimū esse postulat.
 Qđ aut ad firmitatē requiritur, inter futuras cutis ne alibi
 rūpatur, ut iliter breue nō est, quare uisitato utriusq; abscef
 su, eligenda mediocritas est. Iam hoc quoq; oīum ulce
 rū cōe quodāmodo est sicuti ēt ipsius quo suuntur, si
 25 li ratio. Qđ n. durius est, cutē rūpet: qđ mollius, cōfēs
 tim ipsum rūpitur, pari modo si p̄xime oras summas
 acū transegerit, qđ reliquū est cutis, qđ minimū est, dū
 uiolenter abducitur, rūpi cogitur. Sin plurimū ab iis res
 cesseris, nō paræ cutis iglutinatū relīquet. Hæc licet oīm
 30 sint ulceræ cōia, maxime tñ seruanda in abdomine suen
 do arbitror. Porro ipsum abdomē, aut quēadmodū est
 expositū, cōsuetur, huc diligentia adhibita, ut peritonæū
 abdomini coalescere possit: qđ uix sperare audeas, cū
 neruofū existat: aut sicuti qđā faciunt, qđ cognatæ na
 35 turæ sunt, ea committunt, utpote peritonæum perito
 næo, abdomen ebdomini, Id autem fiet in eū modum.

PAULI ÆGINE TÆ

A uicino nobis abdomine incipitur, atque ab externo
 introrsum per id solum acus traiecitur post præteritis
 utrisque peritonæi labris, ex obiecta parte à foris intror-
 sum per utrūque eius labrum acus reuocatur: dein hæc
 rursus reducitur, atque ab interioribus foras per aduer-
 sum abdomen transmittitur. Hic modus à communi,
 & ex prompto, quo nimirum uno adactu per quator la-
 bra acus traiecitur, id differt, quòd peritonæum totam
 intra abdomen prorsus recondit. Cæterum medicamen-
 ta ad hæc idonea materiæ esse debêt, cuius sunt ea, quæ
 cruentis iniiciuntur. Vt autem nulla pars principalior cõ-
 sortii, lege doleat, lanam conuenit mollem oleo medio-
 criter calido imbutam toti, quod inter inguina, & saxilis
 est, circundare. Præstiterit autem si per clysterem in-
 testinis aliud simile infundas. Si uero [nonnihil in ipsis
 quoque intestinis conuulneratum sit: quod iniicietur, ul-
 num nigrum, austerum & tepens erit, eoque magis si to-
 tum usque ad interiorem meatum pertusum sit. Facile
 igitur curationem recipiunt intestina crassa: secus habêt
 tenuia: ieiunū uero omnibus insanabile est, tum propter
 uasorum magnitudinem multitudinemq̃, tum quod tu-
 nica eius prætenuis neruosaque existat. accedit huc qđ
 etiam bilem synceram totam recipiat: adde quòd om-
 nium maxime iecori uicinum habeatur. Ventriculī por-
 ro imæ partes carnosæ curari cum fidutia debent, siquis
 dem fieri potest ut res bene succedat, non solum quod
 hæc crassiores sint, sed etiam quod sanantia remedia faci-
 le hoc ipsius loco subsistant. At ulcerum quæ os infe-
 stant curationi sensu illius acumen aduersatur. Cum au-
 tem peritonæo rupto omētum prolapsum aut liuescat
 aut nigruerit, sune exceptum antequam nigrescat, ne san-
 guis profundatur, præcidere conuenit id quod post uin-
 culum habetur, atque ut in imo sine iam commemora-
 tæ abdominis luendi rationis uinculi fines pendeant, cu-
 rabimus, quod scilicet facile eos cum ex uulnere suppu-
 rante eruentur, eximamus.

LIBER SEXTVS. 239
AD TEGENDAM GLANDEM
colis si nuda est. Cap. LIII.

IN quibus glans colis penuria cutis non contegitur, aliqui indecoris gratia duplicem administratiōis modum excogitarunt, nunc in superiore colis initio cutem orbiculatim secantes, ut facto ipsius diuortio, inferior cutis attrahatur, donec glans occultetur: nunc subtus internam cutem à glandis radice scalpello excoriantes, inde internam trahentes, mox linteo quodam molli ambiens præputium deligantes, ita ut linteolum aliquod qua cutis excoriata est, interponatur, ne præputium cum glande coalescat. Hunc modum Antyllus magis recipit, longiore ipsum oratione exponens. Nos autem summatim dixisse contenti sumus, quoniam raro inter artis opera huiusmodi administratio requiritur, tum quod affectus nullam muniis obnundis difficultatem pariat, tum quod neque tantum indecoris afferat, ut eo magis glandem aliquam ex chirurgia deligas.

QVOMODO GLANS PENIS CON-
tecta aperiri possit, uitium dicitur hypospadiæon. Cap. LIIII.

PLerisque glans ab origine non perforata est: uerum sub cane appellato qua glans suspensa est, foramen habetur: unde neque urinam facere antequam possunt, nisi particulam admodum pubem uersus inclinent, neque iberis dare operam, cum semen ipsorum in uterum recta non possit eiaculari. Omnium itaque simplicissimus tutissimusque curationis modus est, qui fit per abscissionem. Itaque resupinato homine glans sinistrae manus digitis ualide attolletur: deinde eadem scalpelli acie iuxta coronam præcidetur plaga non obliqua, sed sculpturae simili, ut per medium eminentia quædam glandem repræsentans appareat. Quoniam uero sæpe sanguis profundi solet, si fieri potest medicamentis ei retinendo dicatis sistemus, sin minus tenuibus feramentis aduremus.

PAULI ÆGINETÆ
DE PHYMO. Cap. LV.

Dvplex phymi causa est: aliquando enim sic glā-
dem præputium tegit ne nudari possit: aliquan-
do retrorsum deducta reduci non potest. Hæc
species proprie periphymosis dicitur. Prior itaque dif-
ferentia, aut ex cicatrice quæ in præputio concreuerit,
aut ex carnis incrementō q̄ illic coaluerit. Altera genitaliū
inflammationibus fertur accepta, quoties deducto præ-
putio glans intumuerit, nec ultra reducto operiri ea pos-
sit. Si igitur prima phymi causa fuerit, curationem hoc
pacto tentabimus figurato homine, ut par est, præputiū
in anteriorem partem attrahemus, demissisq; in sum-
mum ipsum hamulis tribus, quaternisve, ministris conti-
nendum exhibebimus, iubentes, ipsum quantum fieri
potest, dducant aperiantq;: deinde sic ex cicatrice exte-
rior collectio fuerit creata, scalpello ab interiore parte
præputium in tribus quatuorve locis incidemus lineis
directis & æquali inuicem spatio distantibus, idq; intrin-
secus: est autem duplex in glande præputium: os igitur
ipsius ab interiore parte diuidemus, sic enim contractio-
ne quæ ex cicatrice coaluit, dissoluta, præputium super-
inducemus. At si caro ab interioribus adnata phymum
produxerit, carne tota ferro scarificata, præputium nus-
dabimus: carnem inter lineas eminentem rademus, pos-
tea plumbeam solenam glandi uniuersæ circumdabis-
mus, inuoluta ipsi papyro sicca. Habeat autem solena
foramen undique æquale, sic enim huius circumpositu
præputium adductum rursus coalescere prohibebitur,
dum & à plumbo & papyro inuoluta distentum serua-
tur: intumescens enim ex deligatura magis adhuc cutē
diducet. Hoc igitur faciendum est, siue ob cicatricem, si-
ue carnis processum phymo generato manum adhi-
buerimus. Sin autem periphymosis appellata creetur, ue-
litate temporis committitur, & curationem non reci-
pit, nisi quis eo modo uelit tractare quem ad tegendam
glandem usurpamus. Sin autem nondum coaluerit, uis

bicibus super ipsum rectis tribus, aut quatuor, aut etiam pluribus circulatim excitatis, oleo copiosiore tepido suo perfuso extrorsum attrahemus.

SI PRÆPUTIUM GLANDI
adhærescit. Cap. LVI.

Glans & præputium inuicem committuntur ex ulceratione præcedente. Conuenit igitur sub cute, quantum licet, excoriata, acie scalpelli, aut spathula polypo accommodata, ea quæ resistunt, dissoluere id potissimum conantes, ut glandem pure à præputio adhærescente discernamus: quæ si non fuerit expeditum, glandis potius non nihil ad præputium assumere, quàm econtra: cum. n. præputium tenue sit, facile perforatur. Vbi commissuram dissolueris linteum tenue aqua frigida madens, glandi & præputio interponendum, ne rursus coalescant, uino astringente cicatricem ipsis obducemus.

DE CIRCVMCISIS. Cap. LVII.

Non de iis qui religioso gentium more circumcuntur, nunc uerba faciemus: sed de iis quibus affectu naturalium oborto, præputium nigrescit. Itaque in iis totum quod nigruerit, orbiculatim præcis di debet, deinde squama cum melle utendum, uel etiam maliconio, & eruo medicamento instar quod linteolis illinitur. Si uero sanguis quandoque profluat ferramentis lunatis utendum, quæ utrisque simul iniicietur, & ipsi sanguinis profluuium, & uulneri depascenti. At si tota interim glans absumpta fuerit, exiguam è plumbo solenam imponentes meatui, per ipsam ægrotum urinam redde re iubebimus.

DE THYMIS NATVRA
lium. Cap. LVIII.

Thymi carnosæ sunt tubercula, nunc in glande, nunc in præputio concrenentia. Ex his, alii contumacis, alii facilis curationis sunt. Mitiores itaque scalpelli acie deradere conuenit, & chalcitidem ipsis inspergere: in malignis, eo quod uitiatum est, exciso

P A V L I Æ G I N E T Æ

adoptione utendum. At si contra se mutuo in præputio
fiant thymi, hi, intra ipsum; illi, extra, oportet omnibus ip
sis confestim manum admoliri, ne præputium structu
ra tenue, imprudenter pertundamus. Sed primum inte
riores auferre consilium est, iisq; cicatrice obductis, tunc
quoq; exteriores aggredi. Nonnulli uero recentiorum
forfice ipsos auellentes equino pilo deligatos curare so
lent, quemadmodum alii refrigerato ferro cadenti eos
dem deurant.

D E R E C T O S Y P H O N E

qui catheter dicitur, & clystere
uesicæ. Cap. LIX.

Cum urina non redditur, quod iter ipsius obstru
ctum sit, aut concreto intus sanguine, aut calculo
aut alia quadam causa, recto syphone id quod su
perfluum est eximemus, quem modum Græci cathete
ris non uocant. Sumpto igitur eiusmodi syphone, ætati
& sexui conuenienti, in rectum ita ipsum dirigemus, quod
hoc modo fiet: lana exigua lino deligata per medium,
linoq; ex acuto iūco per catheteris fistulam traducto la
nam foramini adaptabimus, iuxta catheteris mucronē,
ac præciso forfice quod ex lana eminet, catheterem in
oleum demitemus, ægro in subsellium prius irroratū,
si nihil prohibet, collocato, & catheterem in rectum in
feremus usque ad colicis basin: deinde naturalia ad um
bilicum intorquebimus: etenim ab hac parte obliquus
uesicæ meatus existit, deinde sic cathetera adigemus.

Quum uero in pene prope sedem id euenerit, rursus
genitalia imposito instrumento deflectemus, in natura
lem reducentes figuram (nam à peritonæo uesicæ me
atus sursum tendit,) propellemusq; catheterem usque
ad uesicæ sinum penetrauerit: secundum hoc, linum
catheteri iniectum retrahemus, quo urina simul cum la
na attracta subsequatur, quemadmodum in syphonibus
accidit: atque talis demittendi catheteris modus est. At
quia subinde exulcerata uesica collui desiderat, si quidē

oricularii

uricularii clysteres enema possint trāsmittere, illis in prædictum modum utemur, in uesicam demissis: si fieri nequit, per catheterem pelle, aut uesica bubula adaptata, enemate colluemus.

QVÆ CVRATIO CALCVLO

sis adhibeatur.

Cap. LX.

CVM alibi demonstratum sit quæ ex causa calculi generentur, tum quod pueris in uesica magis: prouectioribus, in renibus crescant, nunc rationē exponemus, qua excindi possint, ubi notas prius eorū q̄ in uesica nascitur, designauerimus. Vrina igitur aquosa est, quod in eis subsidet, arenosum: pudendum continuo uexatur pruritu, laxatur sine ratione, rursusq; arrigitur, crebro id contrectant irritati ægri, & maxime pueri. cum calculus in ceruicem uesicæ incidit, etiam repente urina suppressitur. Porro inter eos quibus calculus excinditur, pueri quidem usque ad quatuordecim annos propter corporum mollitudinem, facile curationem recipiunt: senes, quod corpus ipsorum contumax sit, uix conualescunt: mediæ horum ætates etiam in hoc, medio quodammodo habent, ac rursus facile sanantur qui maiores calculos habent, quod inflammationibus assueverunt: qui minores, difficulter sanantur, contrarias ob causas. Hæc cum ita se habeant, ad chirurgiam profecti, cōquassatione utemur prius, interim per famulos, interim ipso ægroto ex alto quodam loco desilienti, quo calculus ad uesicæ ceruicē propellatur, deinde figurari æger debet ceu rectus in sedili, manibus subter femora porrectis, quo in angustum uesica compellatur. Si igitur contingentibus nobis calculus in penem procidat, quassatus exturbatus, ferrum inde tentabimus. Sin minus sublabetur, indicem sinistræ manus digitum, si puer sit qui ægrota, uel etiam medium, si ætatis sit prouectioris, oleo inunctum, in anum demitemus, & supinis digitis perquirentes, calculumq; illapsum paulatim traduentes, in uesicæ ceruicem impingemus: & digito uno, pluribusq; pro-

PAV. ÆGIN.

HH

PAULI AEGINETAE

pellentes ipsum in exteriora impactum, ministro altero
 manibus uesicam premere iusso, alteri præcipientur des-
 extra manu testiculos sursum teneat, sinistra penem exten-
 dat in alteram partem, qua sectionem molierimur: ipsi as-
 sumpto scalpello ad calculos aptato, inter anum & testi-
 culos, non per medium penem, sed in alteram partem
 iuxta sinisteriorem clunem obliquam super lapidem q-
 parti secandæ supponitur, ducemus lineam, quæ extrin-
 secus latum habeat spatium, intus non amplius, q- ut cal-
 culus per id queat excidere. Interim siquidem digitis
 super anum innixis, aut digito unâ cum sectione sine
 euulsione calculus clementer exilit. sin minus exilierit,
 uulsella superiniecta huic accommoda eximemus. Cal-
 culo iam ablato, medicamentis sanguinem coercētibus
 ex manna thuris, aloe, symphyto, uel etiam misy, & con-
 similibus sanguinis profusionem sistentes, lanas, aut lina-
 menta implicita, œnelæo madentia imponemus, & liga-
 minibus septem costarum ad calculos accommodatis
 utemur. At si profluuii sanguinis metus sit, linamentum
 implicitum ex posca, aut hydrososato iniiciendum est,
 & ægro decumbente crebrius locum perfundemus.
 Postq- tertio die solueris, & hydrelæo copioso irrorau-
 ris, tetrapharmaco linteolis illito utendum, ita ut frequē-
 tius ipsos dissoluas, curesq- propter urinæ acrimoniam.
 At si inflammatio quæpiam superuenerit, cataplasmatibus
 & superfusionibus ad eam inscriptis adiuuabimus, ac
 in uesicam rosaceum aut chamæmelinum, aut butyrum
 nisi aliqua nos inflammatio impediât, demitteremus. simi-
 liter etiam si ulcus pascēdo aut alio quodam modo ser-
 pat, aut maleficum fuerit singulis congruentia adaptabi-
 mus, cum ulcus inflammatione caret, lauacrum adhibe-
 tur, inde emplastrum dia chylon, tum lumbis tum imo
 uentri superaccommodatur. Per totum uero curationis
 curriculum, femora simul conuenit deligare, & cum re-
 mediis requiescere. Sin exiguus calculus coli inciderit &
 per urinam reddi nequeat, præputium ualide in anterio

ra attractum deligabimus supra glandis summitatem, item post pudēdum colem uinciemus, iuxta terminum ad uesicam spectantem constrictione adhibita: deinde in fra calculum diuidemus, super lapidem qui illi exciden-
 5 do subiicitur, flexo autem cole illū eiiciemus, solutisq; uinculis ulcus sanguine cōcreto uacuabimus. Posterius itaque uinculum iniectum est, ne calculus retrorsum re-
 currat: antierius, ne post lapidem exemptum præputii so-
 luti cutis in oppositum recurrens diuisionem contegat.

DE TESTICVLORVM PAR-
 tibus.

Cap. LXI.

Naturæ testiculorum finitiones, cum ad ramicu
 incidendorum rationem conferant, priusq; ad
 illam ueniatur, proponendæ sunt. Igitur testicu-
 15 lus substantia quædam est glandulosa fragilis, ad genitri-
 cem seminis uim effecta. At nerui testium, quos Græci
 parastatas & cremasteras ab eo appellant, quod ex illis
 genitales partes dependent, spinalis medullæ ex cerebri
 membrana propagines sunt, cum uenis arteriosis ad te-
 20 sticulos pertinentes per quos semen in naturalia perme-
 at. Seminaria autem uasa, uenæ sunt à caua uena in testi-
 culos sinuosis anfractibus pertingentes unde testiculi ali-
 mentum capiunt. item tunica naturæ neruosa in orbes
 implicata, in gibba quidem parte, atque anteriori, à testis-
 25 culo libera est: in concava & posteriore, ipsi adhærescit,
 ex interiore abdominis membrana originem trahens.
 Vocant autem partem hanc qua testiculo adnata est,
 posteriorem prosphyin, quasi dicas adnexum. Darti ue-
 ro membranæ sunt, quæ exteriorem testiculī cutem cō-
 30 glutinant, iuxta tunicam erythroidem dictam ei adhæ-
 rentes: quibus partibus & illa post testiculos tunica
 adunetur. Hæc autem ipsa cutis exterior rugosa tes-
 tibus circumdata, scrotum nobis Græcis oscheon di-
 citur.

DE AQVOSO RAMICE, HY-
 drocele dicitur.

Cap. LXII.

HH ii

Humoris otiosi in parte aliqua corporum scrotū
 implicantium colluuiēs, tumorem excitans sensu
 fibilem hoc nomen sortita est. Colligitur itaque
 humor magna ex parte, in tunica erythroide appellata,
 circa anteriorem testiculi regionem, qua potissimum
 membrana illa à testiculo separatur. Raro extra memo
 branam hanc erythroidem uitium contrahitur. Subinde
 peculiari tunica humor comprehenditur, uocantq; hoc
 mali chirurgici in superuenienti ortum. Quare si ob
 causam præcedentem, exempli gratia, particularum im
 becillitatem uitium oboriatur, sanguis alimenti ratione
 adductus, in aquosam serosamq; substantiam mutatur:
 si ex ictu, sanguinea, aut fœculenta substantia compre
 ditur. Communis nota est, tumor indolens, firmus, ac fla
 bilis in scroto, quacumq; tandem occasione non euane
 scens, sed in iis qui modicum continent humorem, ce
 dens: in illis qui copiosum habent, non item. Ac in quib
 us erythroides tunica humore distenta est, tumor rotū
 dus paululum, & oui modo longiusculus apparet. His
 testiculus in conspectum non uenit, ut qui undequaq; sit
 implicitus, si extra erythroidem membranam sub darts
 habeatur, per pauca corpora sublabitur. At si humor
 ex superuenienti coierit propter cōtractionem ex omni
 parte, & rotunditatem, tumor alterius testiculi imaginē
 exhibet: & cum aquosus humor extiterit, tumor conco
 lor pellucet: cum fœculentus aut sanguineus, aut rubicū
 dus, aut liuidus apparet: cum autem in utraq; scroti par
 te hæ notæ apparuerint, duplicem ibi ramicem esse cog
 nosces. hoc modo scalpello curantur: derafa pube &
 scroto, nisi puer fuerit, ægrum sup sedile resupinabimus,
 podici panniculo multiplici subiecto, scroto autē spon
 gia iustæ magnitudinis: ac sedentis à sinistra ægrotantis,
 ministro qui ad dextram sedebit, iubebimus ut genitale
 in alteram partem protendat, & cutem scroti ad abdo
 men eleuet, nos scalpello scrotum à medio iuxta lon
 gitudinem usque ad pubem fere recta linea incidemus,

quæ uicina sit lineæ scrotum per medium secanti, diuide-
 musq; tunicam erythroidem. Porro si humor ex accenso
 sorio in adnata membrana hæreat, qua uerrex eiusdem
 tunicae eminet, illac diuisionem moliemur. Hamulo au-
 tem oræ uulneris diducentur, & cultro ad hydrocelicos
 aptato scalproq; membranæ detractis tunica erythroi-
 des nudatur, mox eadem per medium scalpello findit-
 tur, per illas potissimum partes, in quibus à testiculo re-
 cedit, humore iam toto, aut maiore ipsius portione in
 10 uase aliquo excreto, erythroidem membranam hamu-
 lis eximemus, utpote tenuissimam ipsius partem. Inde
 uero Antyllus suturis & medicina cruentis accommo-
 data utitur: recentiores ea: quæ quod carnem inducat,
 sarcotice appellatur. At si testiculus putredinem expe-
 15 tus aliove modo uitiatus deprehendatur, uasa cum ner-
 uo, qui ab inguinibus dependet, cremastere dicto fune
 excipiemus, ipsoq; cremastere præciso testiculus eximi-
 tur. Item in iis qui duplici laborant ramice, similiter bifa-
 riam curationem moliemur utrinq; per scroti partes ad
 20 inguina lineas incidentes, mox specilli mucrone per di-
 uisionem deorsum ad scroti extremum demisso, ipsoq;
 scrotum extollescentes, acuto scalpro lineam qua humo-
 ris est emissarium, incidemus, ut & sanguinem concre-
 tum, & pus per eam excernamus, ipso uero scalpelli mu-
 25 crone linamentum in longitudinem implicitum superio-
 ri diuisioni inferemus, & uibicibus per spongiam deter-
 sis lanam oleo madentem per inferiorem testiculum in-
 sinuabimus, extrinsecus alias lanas œnelæo imbutas scro-
 to, imo uentri, inguinibus, peni & lumbis supiniiciemus,
 30 linamentum triplex super hæc explicitum deligamus
 uinculo in sex costas porrecto, congruisq; ligamentis:
 deinde homo decumbet lanis scroto subiectis, ut con-
 quiescat, pelleq; super ipsas molli explicata, quo fomen-
 ta excipiant. Cæterum superfundemus oleum calens.
 35 post hoc ubi solueris tetrapharmaco linteolis illito in
 uulnere uteris, linamentum ex fariuaceo polline immu-

PAULI AEGINETAE

talis, extrinsecus fomenta rursus propter inflammationem usque ad diem septimum iniiciuntur, inde medicamento quod linamentum contineat utemur. Vulnere expurgato, & carne iam mediocri obducta, deinceps et lauiacris adhibitis linamentum auferri debet, & reliqua curationis parte subsequente quemadmodum prius explicatum est, utemur. At si inflammatio quępiam fuerit, aut sanguinis profluuium, aut aliquid eiusmodi interea superuenerit, conuenienter unicuique occurrere conuenit, ne semel dicta iterum repetam. Si uero uestionē potius in aquoso ramice, sicut recentioribus uisum est, adhibeamus omnia quę ante chirurgiam, & post eā dicta sunt, exequemur, ipsum uero chirurgię opus sine ferro solū & diuisione per humoris emissarium fieri debet. Decem itaque aut duodecim ferramenti literam Græcorum T imitantibus, & duobus gladiolis primum scrotum ferro T referenti per medium aduremus, cultello autem, aut obtuso hamo membranas excoriantes ferramento ensi simili, has ceu præcidentes aduremus. Nudata uero tunica erythroide, facile autem cum alba & tenuis existat cognoscitur, acie ferramenti instar T literę facti perurentes humorem excernemus, postea totam ipsam detectam haniulis attolentes, ferramento gladio lo simili auferemus.

DE CARNOSO RAMICE

& tophaceo. Cap. LXIII.

Caro in parte aliqua corporum quę scrotum implicans succrescens carnosum ramicem producit. Nascitur autem ea ex causa latente, testiculo fluxionem experto induratoque, aut ex ictu, aut imperita post ramicis succissionem curatione: subsequitur autem hos color ubique sui similis cum duritia. Si autē tumor in scirrum coalescat, nullus nec color, nec sensus adest: si maligni referat naturam, dolor urget punctorius. Itaque ferrum admouentes ægro, figurabimus ipsum, sicut & prius diuidemusque similiter, & si quidem ex concreta te

LIBER SEX TVS. 244

5 Sciculi carne uitium creatum sit, & darton membranam
 & erythroidem consimiliter discindemus, deinde testis-
 culo eleuato, eoq; extra erythroidem exempto, crema-
 10 stere segregato à uasis, hæc quidem constringemus, illū
 uero nempe cremasterem amputabimus: testiculum ue-
 ro qui cum aliorum carne coaluerit, ceu alienum elicies-
 mus. Sin hæc concretio in tunica aliqua, aut uase subna-
 scatur, scroto diuiso subiectisq; carni membranis, totū
 15 quod in carnem cōcreuit auferemus. quod si posterior
 commissura carne fuerit glutinata, iis quæ ambiunt ip-
 sam adeptis testiculum simul cum ea excipiemus: q̃p-
 pe fieri nequit, ut testiculus sine hac permaneat. Cates-
 rum tophi & in testiculo & in membrana erythroide
 20 occalescunt, renixu multo, duritie, & inæqualitate à caro-
 noso ramice & aquoso discreti. His igitur manum sicut
 etiam carnosio ramici admolierur.

DE VARICOSO RAMICE & uentoso. Cap. LXIII.

20 **V**asa in scroto, aut dartis membranis dilatata ua-
 rices simplici uocabulo nominant. Alia uero
 quæ testiculum nutriunt, si uaricum more dila-
 tentur, uaricosum ramicem, Græci cirrocelen uitium nu-
 cupant. Notæ horum euidenter sunt, quippe pars affe-
 25 cta tumidior, obliqua modice uuæ in modum, & testis-
 culi relaxatio apparet, tum aliæ nonnullæ difficultates,
 maxime in cursu, exercitio, & itinere. Hoc modo cura-
 mus: ubi commode ægrū figuraueris, scrotum manu p-
 mulcetur, neruus cremaster in partem inferiorē repelli-
 30 tur. Facile autē dinoscitur, ut qui tenuior uasis sit, solidior
 renitensq; seu potens ualidusq;: eger quoq; ad depres-
 sionem ipsius indolet, & iuxta colem turbatur: uasa autē
 35 digitis nostris & ministri excepta ī scroto, ualideq; distē-
 ta, acie scalpelli obliqua adacta supra instrumentū quod
 uasis cedendis supponitur secabimus. deinde p hamus
 los ea q̃ cuti subiacent eleuata excoriantur. uasis ut in

HH iiii

PAULI AEGINETÆ

capite de angiologia & aneurysmatis disputatum est,
denudatis, acus duplex linum trahens transmittitur, an-
saq; lini abscisa, uasa & in prima ipsorum dilatatione &
inferiori extremo fune deligabimus: & per medium re-
cta incisa linea, & sanguine qui coierat euacuato, medi-
cina ipsos curabimus quæ pus moueat, ut etiam funicu-
licum uasis sua sponte excidant. Leonides autem præ-
cipit, quod si aliqua ex uasis testiculum nutrientibus di-
lata fuerint, hoc modo esse faciendum: si omnia, testicu-
lum cum ipsis capi oportere, ne uasis alentibus destitu-
tus contabescat. Porro uentosus ramex, quum genere
aneurisma existat, Leonidi quidem non attingendus ui-
detur, propter periculum quod in uaricibus ab incessan-
tibili sanguinis profluuiio accidit. Recentiores autem quum
duplex ipsius sit generatio, alia ex quatuor uasis testicu-
lum alentibus, alia ab arteriis darton membranam &
scrotum inter currentibus: hunc quidem ceu desperatæ
salutis, repudiant: illum priorem scalpello curant. discer-
nimus autem ipsos, quod qui ab arteriis enascitur, facile
ad digitorum constrictionem euanescat, qui à uenis tes-
ticulum nutrientibus, aut neutiquam, aut cum multo
metu. Cæterum curamus ipsos, ut in uaricosis ramichis
bus comprehensum est, singulas uenas fune excipientes
deligantesq;.

DE INTESTINORVM RA

mice. Cap. LXV.

INtestinorum ramex, quem Græci enterocelen di-
cunt, est in scrotum intestini deuolutio. Fit aut peris-
tonæo circa ilia dirupto, aut eodem extenso. utraq;
igitur, ruptura, dico, & extensio ex uiolenta quadam oc-
cassione præcedente proueniunt, nempe ictu, aut saltu,
aut clamore. At qui ualidæ tensioni fertur acceptus, pro-
prie, & ptopter relaxationem, & alias corporis imbecilli-
tates, accidit. Notæ utrique cōmunes sunt: conspicuus
in scroto tumor: item quod in exercitiis, itinere, spiri-
tus retentione aliisq; occasionibus, idem maior quàm

prius euadat: compressus, tarde quidem recurrat, celeriter
 autem rursus deuoluatur, superne intestinum resupina-
 tatis in loco permaneat, donec erigantur. Stercus autē
 in scrotum receptum periculum subinde ipsis intulit: do-
 5 lent enim nonnunquam etiam impressis digitis sonitū
 elidunt. Peculiaria ramicis ad extensionem relati indicia
 sunt, quod nō uniuersim, sed particulatim temporis spa-
 tio & ob causas quaslibet, nonnunquam intestinum de-
 uoluatur, tumor æquabilis & profundus appareat, inte-
 10 stino quod deuolutum est interiore abdominis mem-
 brana, peritonæon uocant, constricto. Ex ruptura facti ra-
 micis signum est proprium, quod uniuersim ab initio in-
 testinum deuoluatur, idque ob causas uolentas duntaxat:
 tumor immensæ magnitudinis, inæqualis, & per sū-
 15 ma protinus in cute emineat: quod intestina extra perito-
 næum elabantur. Si igitur rupto peritonæo omentū
 duntaxat in scrotum inciderit, uitiū omenti ramex, Græ-
 cis epiplocele appellatur: si intestinum quoque delaba-
 tur, omenti intestiniq; ramex, Græce epiploenterocele
 20 dicitur: si uero & aqua in tunica à rubenti colore ery-
 throide dicta apparuerit, composita ex tribus quoque
 appellatio sumitur. Cæterum neque hos, neque ex rup-
 tura intestinorum ramicem chirurgiæ subiicimus, solū
 uero ex intensione ramicem intestini manu curamus,
 25 hunc in modum: homine resupinato & cute iuxta ingui-
 na per ministrum eliuata, transversam lineam incidimus
 ut in angiologia explicitum est. Nonnulli uero non trans-
 uersam, sed rectam lineam ducunt, hamuloq; defixo di-
 uisionem explicant, quæ testiculum supraiectum men-
 30 sura adæquet, deinde rursus hamulis per quartam cutē
 transmissis quot ad uulneris magnitudinem sufficiant,
 retuso hamo, aut cultro membranas & pinguedinem
 subtus excoriantes scalpello præcidimus. detecto autē
 35 undequaque peritonæo, demissoq; indice digito ad po-
 steriorem scroti partem inter peritonæum & dartum
 membranam, posteriorem connexū soluimus, deinde

dextra manu extremum implicantes, ad interiora scroti
 simulq; sinistra peritonæum retrahentes ad diuisionem
 excipiemus testiculum una cum membrana rubenti, ac
 ministro uni iubebimus testiculum eleuet, ipsi uero pos
 teriorem adnexam ex toto simul cum membrana rus
 5 benti dissoluentes, explorabimus digitis num intestini
 inuolutio quædam in tunica erythroide relicta sit, & in
 fra hanc ad aluum propellemus, deinde acu bonæ ma
 gnitudinis linum ducente duplex decies implicitum ad
 peritonæi terminum qui diuisionem respicit, per mediū
 10 transuemus. Succisis autem linis quatuor faciemus, in
 tia, atque his per uinculum rursus implicatis, utrobique
 peritonæum ualenter destringemus iterumq; initiis cir
 cumuolutis, astringemus quidem strenue, ut nullum ex
 uasis nutrientibus adhuc possit cedere, ne inflammatio
 15 inde concitetur: item secundum extrinsecus uinculum
 iniciemus, minus quàm duos digitos à priori distans.
 Secundum hæc uincula digiti instar ex peritonæo relin
 quentes, totum ipsum orbiculatim præcidemus, auferē
 tes simul & testiculum: rursus diuisione iuxta emissariū
 20 scroti adhibita, linamentum longum iniicitur, & fomen
 tis oleo imbutis uinculisq; ut in aquoso ramice iniectis
 omnia quæ restant, quemadmodum illic expositum est
 perficiemus. Nonnullos autem non imperitos chirur
 gos noui, qui membrana erythroide excisa, ferramentis
 25 candentibus extremum ipsius adurerent, sanguinis pro
 fluii metu, ut est uerisimile. Hi autem ipsi post scalpelli
 administrationem egros protinus in solio oblongo li
 gneo, cui aqua inesset calida ad septimum diem usque
 lauabant, quinquies per diem noctemq; id facientes, p
 30 sertum in pueris, & mirifice res procescit: nam citra inflā
 mationem ipsi secabant, & funiculi una cum corporib?
 protinus decidebant. Interea uero dum ægri lauabant,
 prædictæ superfusiones iniiciebantur. Alius quispiam
 præter commemorata, etiam pipere trito cum oleo cer
 35 uicem ipsorum eodem tempore infricabat.

DE INGVINVM RAMICE,
bubonoccele uocatur. Ca. LXVI.

INtestini ramicem ex intentione creatum, inguinum hernia præcedit: primum enim peritonæo intenso, intestinum laxatum tunc quidem in inguina abscedit facitq; ramicem, quem Græci bubonocelen dicunt.

Hunc uetustiores in eum modum scalpello curant, linea transuersa per inguina intumescencia, tres digitos longa inciditur. Hinc membrana & pinguedo eximuntur, mucro autem scalpelli per mediū peritonæo detecto, qua fastigiatur adigi debet, is enim intestina in altum repellit. Itaque peritonæi eminentias utrinq; factas per scalpelli mucronem suturis inuicem committemus, deinde mucronem extrahemus, neq; peritonæum præcidentes, neque testiculum, neq; aliud quippiam retinentes, sed præsidio cruentis idoneo perfanantes. Quoniam uero recentiores uisionem potius in inguinum ramicibus probarunt, hanc quoq; non incongruenter trademus. Homo mediocriter moueatur, tussi uiolenta, intensio, spiritusq; retento: ubi tumor in inguinibus apparuerit locū qui uri debet, atramento scriptorio aut collyrio figura triangula circumscribemus, transuersam lineam per inguina sursum ducentes, iniciemusq; signum per trianguli medium. postquam æger decubuerit, candens ferrum per mediam notam imprimemus, primum clauatum, inde per trianguli costas Γ literæ figuram representans, tertio in lateræ aut lenticulæ modum factis, totum triangulum exaquauius ministro per totam uisionem saniem panniculo extergente: tā alte uero aduremus, quousq; pinguedinē pertingamus, idq; in habitu corporis moderato, neq; n. in gracilibus ob siccitatem ferrum altius admouendum est, ne imprudentes peritonæum aduramus, neq; tamen in crassioribus pinguioribusq;, in quibus uel ante iustam uisionem pinguedo apparet. Sed ætūm uri conueniat artificiosa deprehēdem? cōiectura. Secundum uisionem sal unā cum porro tritus crustæ

PAULI ÆGINE TÆ

insinuabitur, & inguinario in literæ X similitudinem ligamento utemur, per insequentes dies remediis quæ crustam adimunt, nempe omphacomelite & similibus curabimus.

CVM SCROTVM ATTRITIS

uestimentorum fragmentis similiter atq;

tenuantur. Cap. LXVII.

L Axata scroti cute sine interioribus ipsius corporibus vitium maxime indecorum gignitur, quod Græci racosin appellant. Leonides igitur resupinato homine, quod in ea superfluum erat scalpello super asserem, aut durum corium, quod incidendis subiicitur excidebat, orasque uulneris futuris committebat. Antyllus autem tribus etiam quatuorve futuris superfluum cutem prius punctam forfice acuta aut scalpello post futuras auferebat, futurisque adunitam ut cruenta curabat.

QVOMODO FIANTEV

nuchi. Cap. LXVIII.

C Vm ars nostra huc tendat, ut corpora à statu qui præter naturam est, in naturalem deducat, eunuchos faciendi ratio, quam Græci eunuchisimum dicunt contraria promittit, uerum quia & inuiti subinde à præpotentibus quibusdam eunuchos facere cogimur, explicandus compendiose modus est, quomodo illis satis faciamus. duplex itaq; est, alter contusione, alter excisione perficitur, & prior quidem in hunc modum: Pueri adhuc infantes in aquæ calidæ solium collocantur: deinde ubi corpora eodem solio fuerint relaxata, digitis testiculi premuntur, usque dum aboleantur & euanescent, dissoluti non amplius ad tactum sublabantur. Excisione hac ratione efficitur: Resupinatur in sedili qui eunuchus fieri debet, & scrotum cum testiculis sinistræ manus digitis premitur quo facto duas lineas rectas usque nam per alterum testiculum scalpello incidit: ubi exierint testiculi cute detracta excabuntur, ita ut tenuissimū

solum naturale uasorum commercium relinquatur, atque hic modus, eo qui per contusionem fit magis probatur. Nam qui contusionem testiculorum sunt experti, nonnunquam uenerem appetunt, parte aliqua, ut uerisimile est, testiculorum inter contundendum delitescente.

DE HERMAPHRODITIS.

Cap.

LXIX.

Hermaphroditon uitium ex compositione. Mercurii & Veneris appellatum est, multum utrique sexui adferens indecori. Cum enim quatuor, Leonide authore, differentiae existant, tres quidem in uiris, una in mulieribus constituitur. In uiris siquidem alias iuxta penem, alias in medio scroto muliebris pudendi pilis obfita forma apparet. Tertia uero adhuc accedit, in qua nonnulli per scroti ueluti pudendum urinam profundunt. In mulieribus supra pudendum iuxta pubem uirile frequenter genitale inuenitur, tribus quibusdam ex tantibus corporibus uno tanquam cole, duobus autem ueluti testiculis. Tertia itaque uirorum deformitas qua urina per scrotum excernitur, curationem non recipit, reliquae tres curantur corporibus superuacuis e medio sublati & ulcerum modo tractatis.

QVOMODO NYMPHA EX

cidenda sit, & cercosis emendanda.

da.

Cap.

LXX.

Caruncula in sinu mulieribris pudendi subsultas, Graecorum lingua nymphæ dicitur: quibusdam immensæ magnitudinis efficitur, & non decentis inuerecundiae notam præ se fert. Quemadmodum uero nonnulli memoriae produnt, sunt quæ per hanc partem etiam erectæ uiris similiter consistunt & in uenerem ruunt. Quapropter resupinata muliere specillo nymphæ superfluum prehensum scalpello excindimus: diligentia adhibita ne alte ipsam penetremus: unde fluidus affectus, rhyada uocant, excitetur. Porro cercosim, cum

PAULI AEGINETAE

fit carnis ab uteri ore propago q̄ muliebri pudendum
repleat, interim foras caudæ modo procidat, nymphæ
consimiliter auferemus.

DE MULIEBRIVM LOCO

rum thymis condylomatis & hæmorrhoidibus. Cap. LXXI.

Thymus eminentia est à reliqua cute recedens,
nunc rubens, nunc alba, plurima parte sine dolo
re thymi corymbis similis: condylomata uero,
excrementiæ sunt in callum indurata, quemadmodum
hæmorrhoides iis quæ in ano sunt respondentes, inte
rim & sanguinem profundunt. oēs itaq̄ eiusmodi in mu
lieribus excrementias, q̄ in conspectum ueniunt, inter de
tegendum specillo comprehensas, ferramenti quod ex
dimidio spatham refert, acie excindemus, utemurq̄ gal
la leuigata, aut scisso alumine. Nam deligaturam in his
maiores chirurgi non admittunt.

DE NON PERFORATIS

& phymo. Cap. LXXII.

Genitales mulierum partes clauduntur, interim ex
natura, interim ex accessorio morbo quodam p̄
cedente, aliàs in imo, aliàs in summo ore, sæpe es
tiam in medio spatio, idq̄ aut secundum naturam aut
ex obstructione. Quod autem foramen intersepit in
tercluditq̄, uel caro uel membrana est. Caterum hoc
mali graue sit impedimentum, modo in coitu, modo in
conceptu uel puerperio, aliquando mensium purgatio
ne, si quæ loca obstruit caro totum spatium occupaue
rit, in quibusdam. n. mediū foramine patescit. Causa igi
tur inuenta, uel ex pròptu, uel etiam demisso specillo, si
qdem cōmissura solū fuerit, hāc recta linea scalpello si
stulis accommodato dissoluemus: sin aut distētio hamu
lis p̄ mediū corp⁹ siue id mēbrana, siue caro existat trāf
fixis eleuatū, scalpello diuidem⁹, ac sanguinis fluore me
dicamētis sine rosione siccātib⁹ suppresso, iis q̄ cicatricē
ducūt utemur, instrumēto priapi instar factō iniectis, in q

bus potissimū nō alte admodū administratio est adhibi-
ta, qđ ea de causa fiet, ne particulæ rursus coalescant. Iā
phymus in ostio uulvæ succrescens pari mō curatur.

DE ABSCESSV VVLVÆ.

Cap. LXXIII.

V Bi abscessus circa os uulvæ prouenerit q̄ manu
tractari queat nō prōpte ad sectionem properas-
re consilium est, sed cum affectus fuerit absolus-
tus, in ^{fl}ammatio plurima parte increuerit, corpora quæ
humoribus incumbunt, attenuata, idq; propter uteri ex-
cellentiam. Inter agendum uero mulier in sella resupina-
bitur cruribus ad abdomen & femina contractis, inuicē
diuaticatis: cubiti ipsius sub poplitibus subiicientur & fu-
niculis cōgruentibus ad ceruicē deligabuntur, medicus
aut ex dextra sedens tentabit specillo, quod dioptram
dicunt ætati accōmodo. cōuenit aut specillo sinus mu-
liebris altitudinem metiri, ne maiori specilli spatio uterū
premi cōtingat, & si amplius illud sinu reperiatur, lina-
menta implicita summis oris imponūtur, ut super ipsa
specillum firmetur. Cæterum conuenit specilli trifolium
testulam habens in superiora demittere, & specillum à
medico contineri, testulā à ministro cōuerti, ut laminis
trifolii diductus sinus aperiatur. Iam uero si abscessus
sublapsus mollis & tenuis existat, quod digitorum tactu
subsidet, iuxta uerticem diuidetur spathula, aut scalpello
ori uulvæ pure uacuato, linamentum in longitudo-
nem implicitum, lemniscō dicunt, tenerrimum ex oo-
leo rosaceo imponetur, uel potius extra diuisionem
sinui muliebri sine compulso inferetur. Extra uero sum-
mas oras & super pubem lumbosque lanæ succidæ
aut puræ, oleo madentes accommodabuntur. Tero-
tio die insidebit mulier in hydrelæum calidum, aut mal-
uæ decoctum: absterfis sadoribus linamentum in longi-
tudinem implicitum in fissuram tetrapharmaco per-
se, uel cum discocto melle inunctum leniter insinuas-
bis: erit autem solum butyro aut rosaceo, exterior

P AVLI AEGINETÆ

regio cataplasmatibus obducetur dum inflammatio cessaverit, & uulua abscessu purgata fuerit. Sin autem difficulter expurgetur, collui debet oriculario clystere ex iris decocto, aut aristolochie, aut melle. Cicatrix duci debet medicamento ex cadmia, soluto uino per linamentum irroratum. At si intra os uulua abscessus fuerit, attingi non debet.

Q V A R A T I O N E P A R T V S

ex utero excutiat excidaturque

Cap. LXXIII.

Quomodo ægre parienti succurratur tertio uolumine tradidimus: sin autem eo nihil proficiatur, ad chirurgiam merito diuertimus, id primū notantes, mulier superstes ne futura sit, an minus: & si quidem salus speratur tunc manum admouebimus: sin contra, attingi non debet. Quæ igitur perniciem sui portentant, inexpugnabili dormiendi necessitate premuntur, resolutæ sunt, & uix possunt excitari, ac si excitentur inclamatae, imbecilliter respondentes, rursus graui somno sopiuntur. Nonnullæ conuulsionis modo contrahuntur, aut neruis conturbantur, aut alimentum non sentiunt, pulsus ualde inturgescēs deprehenditur, sed languidus & imbecillis: quæ incolumes futuræ sunt, nihil eiusmodi patiuntur. Oportet igitur resupinam mulierem in lecto sic collocare, ut figura ipsius magis sit decliuis, utraque ipsius exporrecta mulieres utrinque contineant, aut quædam ministræ. Si uero non adfuerint, mulieris thoracem uinculis quibusdam lectulo adfirmabunt, ne corpus attrahentes sequens, attractionis uim dissoluat, ac sumis uulua oris diductis, per ministrum sinistram manum contractam conualentibus digitis inunctam, in os stium inferemus, idemque pertentabimus, & oleo infuso relaxabimus, disquirentes ubi uncum quo foetus extrahetur, designi conueniat. Idonei uero loci sunt quibus iniicietur, si in caput conuersus infans descendit, oculi, occiput, os iuxta palatum, mentum, clauiculæ, & sub

sub costis sitæ regiones, ad hæc præcordia, quæ Græci
 hypochondria appellant: si in pedes conuertitur, ossa su-
 per pubem extantia, intercostalia, clauiculæ rursus & de-
 inde uncus dextra manu continebitur, flexu ipsius digi-
 5 tis occultato, sinistra manu leniter inferemus, & particu-
 læ cuiuspiam ex prædictis usque ad uacua transmittemus.
 huic alter opponetur, quo attractio recta procedat, neq;
 alteram in partem inclinet, deinde æquabiliter trahetur
 non solum recta, sed etiam in latera, quemadmodum
 10 in dentibus eximendis fieri solet, & tensionem interea
 remittere iterum non conuenit, postea uero indicem di-
 gitum unctum, aut etiam plures demissos inter os uul-
 uæ & corpus impactum, orbiculatim circumagere, ues-
 luti ex coriando: si autem iuxta rationē uncus subsequa-
 15 tur, in superiora transferre conueniet, atque sic agere dū
 perfecta foetus sit extractio. Si autem secunda obiecta
 fuerit, nec propter obstructionem queat conuerti, circū
 posito pāniculo, ne deuoluatur, modice attrahere oportet,
 ac prolapsum totum ab humero abscindere, idemq;
 20 facere etiam si duæ secundæ prociderint, similiter etiam
 pedes procidentes corpore reliquo non subsequente,
 ab inguinibus amputari oportet: deinde reliquum cor-
 pus distorquere conandum. At si caput iusto maius ob-
 structionem pariat, & aquam subter cutem capitis infans
 25 collegerit, spathula polypis dicata, aut scalpro, aut cultro
 quod scolopomacherion dicitur, inter digitos occulta-
 to, caluariam diuidemus, ut uacuata concidat. quod si
 naturaliter amplum sit caput, similiter diuisam caluariam
 forpice qua dentes aut ossa extrahuntur, cōprimemus.
 30 Si ossa emineant, hæc quoq; auferre ratio est. At si capis
 te ad thoracem adacta obstructio prouenerit, eodem
 instrumento clauicularum compages usq; ad interiora
 spatia diuidentur, ut humore uacuato thorax concidat
 & collabatur, quod si non concidat, diuisas etiā clauicu-
 35 las ipsas auferemus, tūc enim collabatur. Porro si imus
 uenter mortuo foetu sit inflatus, aut aquam subter cutē

PAULI ÆGINE TÆ

Collegerit, eadem ratione ac uia eum uacuare cum ipsis
interaneis aggrediemur. Cæterum si in pedes deferun-
tur, inclinatio facile ad uteri os dirigitur: quod si iuxta tho-
racem aut inum uentrem fuerit impactus, linamēto ip-
sum attrahemus, eodemque modo ea quæ ambiunt diui-
demus. At si reliquis ablatis caput reuersum inhæserit
firmius, sinistra manus demittetur in uterū, & si os ipsius
pateat, manum in ima transferemus, ac caput inuestiga-
tum digitis ad os deuoluemus: deinde uncum unū aut
alterum defigentes, propter orificii inflammationem nō
propellemus, sed infusionibus pinguibus copiosisque ute-
mur: item inlesibus, fomentis, & cataplasmatibus, ut didu-
cto ore auferatur, quemadmodum superius comprehē-
sum est. Porro quum in latera educitur foetus, si quidem
dirigitur, prædictis utemur rationibus: sin minus, totum
ipsum intus dissectū particulatim eximemus, cura adhi-
bita, ne particula quæpiam ipsius nobis nesciis inrus re-
linquatur. Postquam manu scalpelloque administrationē
obierimus, remediis ad inflammationem inscriptis uten-
dum est, quod si profluuium sanguinis oborietur, huius
quoque curationem acceperis.

SI SECUNDÆ FVERINT

relictæ. Cap. LXXV.

Foetu excusso frequenter accidit, ut uelamentum
illius in utero firmiter adærescat, quod nostri secū-
das, Græci chorion, & deuterion appellant. Didu-
cto igitur uulua octio, secundæ, quæ inibi relictæ sunt, et
in partem aliquam orbiculatim conuersæ, facile educū-
tur. Manu si quidem sinistra calida, inunctaque in fundum
demissa, secundas sublabentes oportet eiicere. Si autem
fundo uteri fuerint adnatæ, demissa similiter manu com-
prehendentes tendemus, neque in rectum, ne uulua pro-
cidat, neque uiolenter admodum, sed leniter primum
deducemus, huc illuc circumagentes, deinde paulo ual-
lentius, hoc enim pacto obsequuntur & à connexu dis-
solvuntur. Quod si uulua os conniuere fuerit depre-

hensum, remediis ad hoc cominematatis utendum est. Si vires non fuerint inualidæ, etiam quæ sternutamenta prouocant, & aromatum halitu ex fictili uaporari conueniet: & si os uteri diductum sit, manu inserta, secundas ut dictum est, extrahere conabimur. At si ne sic quidem exemptæ fuerint, negotium facessere non oportet, secundum paucos enim dies putrefactæ & in saniem resolutæ excidunt. Quia uero grauitate odoris & caput opplent & stomachum peruertunt, suffitus conuenientes excitabuntur, ad eos autem cardamomum & ficus arida commendantur.

QVOMODO COXENDICES

adurantur. Cap. LXXVI.

Quemadmodum humerus, ita etiam coxa propter humiditatis copiam nonnullis excidens, uisionem postulat, quod Hippocrates his uerbis testatur: Quibus coxa ex diuturno ipsius cruciatu loco suo mouetur, crus contabescit & claudi fiunt, nisi uisionem experiantur. Conuenit igitur tunc illum præsertim locum adurere, è quo articulus excidit, sic enim humor redundans desiccabitur, & locus cicatrice densatus non amplius os suscipiet, quare etiam penitus illic uisionem moliri conuenit. Recentiores autem tres crustas adhibent, unam retro urentes in acetabuli sinu, alteram supra genu extrinsecus, & tertiam supra exteriorem talem, qua est carnosior.

DE FISTVLIS ET CERIIIS.

Cap. LXXVII.

Cum locus postulet de ani fistulis differere, nihil mali fuerit prius generatim de omnibus fistulis uerba facere. Itaque fistula sinus est callo obductus, aliquatenus indolens, in pluribus nascens par ticulis, magna uero parte ex abscessibus oritur parum dextre curatis. Callus autem continua quædã caro est, albida, madoris expers, eoq; etiam doloris neq; uena, neq; neruo ad ipsum pertinente. Interim sinus ficans, in

PAULI ÆGINE TÆ

terim humidus est, nunc humor incontinenter fluit, nūc
 certis quibusdam temporibus remittit, ore ipsius opple
 to iterumq; adaperto. Alias fistulæ in os desinunt, alias
 in neruum aut aliam quampiam principem particulam,
 uel recte intus tendentes uel oblique, item uel uno ore, 5
 uel pluribus peruiæ. Quæ igitur in grandes arterias, aut
 neruos aut tendines notatu dignos, aut membranâ co
 stas succingentem, aut aliquam principalem particulam
 deueniunt, uel nequaquam uel certe cum multa artificio
 saq; diligentia attingere debemus. reliquis hunc in mo 10
 dum manum admoliamur. primum tentabimus, si quis
 dem recte intus tendant cultro excisorio si oblique, spe
 cillo inflexo. Huiusmodi autem sunt quæ ex stagno sūt
 item ex ære tenuissima. In quibus autem duæ pluresue 15
 oræ habentur, notationi per specillum non obtempera
 tes, sinu per unum ipsius orificium adusto ex clysteris in
 reliquas oras transitu deprehendemus, num una fistula
 sit pluribus oris dehiscens, an plures: ac ubi tentatū est, si
 quidem per summa habeatur sinus, arcusq; sit, demisso 20
 specillo explicantes, scalpello figura commodiore callū
 tollemus, aut unguibus, aut acie scalpri deradentis: at si
 latitudinem habeant corpora superflua, circum adimi
 debent: sin autem non summa occupauerit, sed penitus
 recte tendat eo quatenus licet, in alto diuiso, orbicula
 tim totum callum auferemus: quod si reliquæ ipsius ali 25
 quæ remanserint, medicamento adurente eas consume
 mus. Porro si amplius quam sit medicamento non ces
 dat, ferro candente crustas ei inducemus. Cæterum si fis
 tula in os terminatur, hoc quidem quod integrum est, 30
 duntaxat rademus: ubi uero cariem aliamue quandam
 corruptionem experitur, quod uitiatum est, totum exci
 soris aciem inter sese oppositam habentibus tollemus,
 si opus sit, prius terebra pforatū, siue ad pspiratū duntax
 at, siue ad medullā usq; fuerit uitiatum. At si os quoq; 35
 emineat caulis modo porrectū, sera ipsum adimemus.
 Sumptis itaq; duobus loris, unius qdē mediū osi emio

LIBER SEXTVS.

251

5 nenti subiiciemus, ipsumq; per ministrum attollemus: al-
terius autem quod crassius est, uel ex lana quoq; factū,
similiter medium carni quæ osfi subiacet adaptantes, ini-
tiaq; infraprehendentes, per ipsum lorum carnem deor-
sum iubebimus detrahi, ne ipsa ferræ dentibus perrada-
tur, atq; hoc pacto nos excretionē molimur. Vbi uero
particula quæpiam princeps subiecta est, exempli gra-
tia, membrana costas inuoluēs, aut spinalis medulla, aut
eiusmodi aliqua, inter excidendum aut ferra concutien-
10 dum os, laminam, quæ quod mēbranā cerebri custodit
meningophilax græce dicitur, subiiciemus: non uitiato
autē osse, totū orbiculatim carne nudum ferra eodem
modo deradetur. Fieri nāq; haud potest, ut ossa circula-
tim implicata carne obducantur. Simili ratione si ossis
15 terminus prope articulum fuerit uitiatus, idem ferra au-
ferri debet. At si totum subinde os, nempe cubitus aut
radius aut tibia aut eiusmodi aliquod contabuerit, totū
adimetur. Femoris autē caput, aut coxa, aut spinalis me-
dullæ uertebra affecta, attingi non debet, periculi quod
20 ex arteriis adiacentibus accidit euitandi gratia. Hoc igitur
modo ac uia faciendum est, in singulis ubiq; parti-
cularum uitiatarum situ, uicinitate, & naturæ cōsortio in-
specto, item morbi magnitudine, & laborantis uiriū ro-
bore considerato. Cerion aut quum sinus sit fistulosus,
25 mellea diffuens humiditate, eandem administrationem
curationemq; cum fistulis & aliis sinibus requirit.

DE ANI FISTVLIS.

Cap. LXXVIII.

10 **A**Ni fistulæ latentes quidem notantur inde quod
ore non apparente dolor ipsis oboritur, et pus-
culenta humiditas per anum profundatur. Pluri-
mis abscessus quoq; indicia præcesserunt: manifeste au-
tem cultro excisorio, aut ferra porcina demissa noscun-
tur. Nā instrumentum ad ima penetrat, & digito indice
5 in sedem transmissio sublabitur, fistula nimirum ad inter-
iora pforata. At in iis q; perforatæ non sunt, instrumentū

II lli

digito ne litiquam similiter occurrit, sed per mediū cor-
 pore nō perforato. Tortuosas autem & labyrinthi mo-
 do flexuosas agnosces inde, quod instrumentum paulu-
 lum procedat, pus autem ad illarum portionem copio-
 sum efferatur. At quæ prope intestinum oriuntur fistulæ,
 agnitionem sui præbent, quod nonnunquam & lumbrici
 & sterus per orificium erumpat. In omnibus autem,
 fere callus aliquis in orificio prominet. Itaq; fistula insa-
 nabilis est, quæ uesicæ ceruicem perforauerit, aut quæ
 ad femoris articulum sit, aut ad ipsum longanionem ten-
 dat. Aegre uero conulescit, quæ orificio caret, tum quæ
 delitescit & in os terminatur, multifariamq; fissæ est: reli-
 quæ in uniuersum facile curantur, administratione hunc
 in modum adhibita resupinato homine, ut cruribus sur-
 sum porrectis femora ad uentrem inclinent, quemad-
 modum fit in iis quibus clyster in aluum mittitur, si fistu-
 læ extremum in summo sublabitur, culter, aut specillum
 per orificium demittitur, subiectaq; cutis simplici linea
 exciditur: si autem alte intra sedem fistulæ terminus fi-
 niat demisso per orificium cultello, siquidem perfora-
 tam ipsam inuenerimus, demisso opposite affecto anu-
 lo, nianus indice digito eiusdem scalpelli initium adigē-
 tes & deflecentes, ipsum foras reducemus, ac corpora
 quæ incumbunt, cultello simplici diuisione liberabimus.
 At si nondum fistula perforata reperiatur, in altum uero
 aniduntaxat terminetur & tentantibus nobis indici digi-
 to sublabatur, corpus intercedens quod squamosum
 membraneumq; est, uehementius mucrone cultelli per-
 forabimus, traductoq; per sedem cultro, rursus scalpelli
 lo corpora quæ incumbunt resoluemus, quæadmodū
 prius explicatum est. Si igitur terebræ aut scalpelli ad fi-
 stulas accommodati acie sinus fundum iuxta sedem p-
 forauerimus, ipsum instrumentum per anum inferentes,
 illinc totum quod interiacet acie terebelli pertundemus,
 & post excisionem specillo aut forcipe corpora diuisio-
 nem ambientia (calli autem sunt) prehensa ex toto adia-

memus, musculum qui anum constringit, sphincter dicitur, ubique uitantes. Nonnulli siquidem rudius dum in alto sectionem molirentur, ipsum conuulnerarunt, atque inde inuoluntaria stercoris excretio homini accidit. At si qui timidiusculi chirurgiam fugiant, Hippocratica uti debent deligatura. Iubet siquidem Hippocrates, linum quintuplex crudum per cultrum foratum uel specillum fistulae demittere, & lini principia coniungi, ac quotidie cōstringi, donec corpus totum quod duabus oris intercedit, dissectum, linum eructet. Si uetustatem malum contraxerit, quum dissolues etiam psaro aut eiusmodi quodam arido illito linum oportet extrahere. Sunt qui foramini terebrae fistulis dicatae insertum linum iuxta praedictam rationem propellunt, quod meo iudicio non conuenit. Dum enim chirurgiam uitant, praeter quod hanc requirunt, etiam curationem remouantur. de latentibus autem fistulis Leonides hunc in modum tradit: Quum autem inum stringentis musculi fistula sit occupata, quae uel à sede incipiat, uel longius praecedat, post notas indicatas, instrumēto quod ad sedem diducendam sit aptatum, dico autem quod Graeci dioptrion appellant, muliebri sinu modo, anus distendetur, atque quum fistulae os clare apparuerit, per ipsum specilli mucro demittetur, pro pelleturque in inum: lamina uero subiecta tota fistula super eam diuidetur semispathula, aut spatha fistulis incidendis peculiari. Nos autem quum in talem incidisse mus affectum, hoc administrationis modo uti non posuimus, quod ductus fistulae in conspectum non ueniret. Nam inter anum & eius fibulam dextra parte sita erat, instrumentum uero quod ei diducenda erat impositum, magis operationem adumbrabat, at per digitos distendentibus anum nobis, rima quaedam inter unam quandam ani rugam ceu fistulae emissarium apparebat, etenim pus per ipsam emanabat, per eandem uero cultelli mucronem in fistulam ceu ab ea manu ducti demittebamus, deinde dextrae manus indice digito,

PAULI ÆGINETÆ

ani fibulæ inserto, quum inuenissemus quoddam inter
digitum & instrumentum tenue corpus, uiolentiusq; cul
tellum digito adegissemus, fundum fistulæ sursum con
uersum perforauimus, quumq; digito mucronem in
strumenti foras traiectissemus, conspicuum nobis factū
totum corpus quod inter fistulæ oras habebatur, dico
autem earum quæ initio ad humoris emissarium sitæ
erant, & earum quæ nunc à nobis factæ sunt, scalpello
præcidentes dissoluimus.

DE HÆMORRHOIDIBVS.

Cap. LXXIX.

Cum hæmorrhoidum notæ, ex ipso quod uas
cuatur innotuerint, antequam manum admo
liamur, clystere utemur copiosissimo, simul intesti
ni superuacua inanientes simul & anum, ut promptius
inueratur & extrema ipsius pars exeat, irritantes. Resu
pinato igitur ægrotante aduersus lumen clarum, si quis
dem constrictione usi fuerimus, linum quintuplex ferras
mento quo ora uenarum in ano extantia aduritur, uel
quo uas labris hæmorrhoidum circumponentes unā
quancq; hoc fune astringemus, una duntaxat relictā, qua
sanguis superfluous emanet, quod etiam Hippocrates
præcipit. Post astringentem linameto implicito oleo ma
dente, & ad sedē accommodato ligamine, usi, ægro quie
tē indicemus, oleo tepido, aut mulla uentri medicantes,
deinde postea cataplasmate ex micis panis & croco ute
mur. Vbi hæmorrhoides exciderint uino cicatrix ducit
tur. Leonides autē nō deligat, sed focipe prehenas am
pliter hæmorrhoidas scalpello excindit. A chirurgia, mā
na utendum & amylo, chalcitide, uel eo medicamento
quod usta sponsia simul & pice constat, item pastillo
faustino ad absolutam adustionem. Alii uero instrumen
ti quo uas uruntur utriculo, medicamine qd adurat res
pleto, quæadmodū uas, sic etiā hæmorrhoidas uesserūt.

DE CONDYLOMATIS, TV

berculis, & rimis. Cap. LXXX.

A Ni condyloma loco solum ab eo quod mulier
bres locellos infestat, differt occalescens & ip-
sum sedis tuberculum, aut inflammatione, aut ri-
ma quæ dicitur rhagas præcedente. Primum itaque tu-
berculum appellatur, occalescens autem, condyloma:
quare conuenit, quemadmodum illa, specillo apprehen-
sa excindere, & medicamentis crustam ducentibus cura-
re, rimas autem à stercore potissimum indurescentes, et
cicatrice spatio temporis occalescentes, recentes facies-
mus, uel unguibus uel scalpello radentes, & cicatricem
ut par est, inducemus.

DE ANO NON PERFORA-
TO. Cap. LXXXI.

P Veris recens natis, anus ex natura non perfora-
tus interim inuenitur, membrana uidelicet obstru-
ctus. hæc igitur si fieri potest, digitis ipsis dirumpe-
tur: sin minus, acie scalpelli eam excidentes, uino cura-
bimus. Quoniam uero & prouentis subinde ob ulcus
non dextre curatum anus committitur, conuenit hanc
unionem instrumento conuenienti disruptam curare, si-
stula plumbea, aut obturamine quodam ano usque dum
in totum conulescat, commode imposito, ne rursus co-
alescat. Porro obturamentum medicamine quodam ci-
catricem ducente oblini debet.

QVOMODO VARICES EX-
cendantur. Cap. LXXXII.

V Arix uenæ dilatatio est aliquando in temporis
bus, aliquando in ima uentris parte sub umbilico,
nonnunquam etiam circa testiculos, sed ma-
xime in cruribus. Hic igitur originem plurima parte ex
materia melancholica trahit. eorum autem qui testicu-
lis oboriuntur curationem per scalpellum iam in capite
de uaricum ramice tradidimus, atque his similiter crura
infestantes aggrediemur, ab interiori femoris parte incie-
pientes, ubi etiam origo ipsorum magna ex parte inue-
nitur, inferius enim, in plures, distributi propagines diffu-

PAULI ÆGINETÆ

cilius tractantur. Loto igitur homine, tuniculum superio-
ri femoris regioni circundamus, iubemusq; ut inambu-
let, inde repletam uenam atramento scriptorio aut colo-
lyrio notabimus iuxta uaricis situm, trium digitorum,
aut paulo ampliori spatio interposito, decumbente æ-
gro cruribus extensis, alterum funiculum supra genu inii-
ciemus. Elata autem in uerticem uena scalpello scindis-
mus, qua atramenti nota est, tam alte, ut cutem duntaxat
scalpellum penetret, ne uenam diuidamus, ubi oras uul-
neris hamulis diduxerimus & membranas cultro ad ras-
micem aquosum accommo excoiauerimus, uena
detecta & undequaq; explicata femoris ligamenta solo-
uemus, uase per obtusum hamum suspensio, acum duo-
plex linum trahentem subiicientes, habenulam amputa-
bimus & diuisa scalpello per medium uena, detrahem-
sanguinis quantum usus postulat deinde funiculo supe-
riorem uasis partem constringentes, rectumq; crus ele-
uantes manuum expressu, sanguinem qui in crure est eo
uacuabimus, deinde infra rursus uas deuincientes, uel id
quod inter uincula est abscissum, à uena adimemus, aut
manere id sinemus usque dum sua sponte cum funibus
excidat, & uulnere siccis sinamentis oppleto splenium
cœnelæo madens iniectum deligabimus, medicamen-
toq; ad pus faciendum apto quod linteolis illinatur pro-
sanabimus. Noui autem ueteres nonnullos, funibus non
usos: alios inde uas denudatum excindere: alios alte ip-
sum eleuatam cum uiolentia extrahere abruptum. Ve-
rum omnium tutissimus chirurgiæ modus, quem su-
pra diximus. Porro uarices in imo uentris suborientes
consimiliter tractabimus: item eos qui tempora in-
festant, quemadmodum in angiologia comprehen-
sum est.

DE DRACUNCULO. Cap. LXXXIII.

DE dracunculo quomodo medicamenti potissimum emendetur, quarto libro peregrinamus.

LIBER SEXTVS

254

DE EXTREMARVM PAR

tium uitio, acroterialmon appel-
lant. Cap. LXXXIIII.

S Vmmis partibus nonnunquam putredine cōsum-
ptis, nempe manu aut pede, ut etiam ossa ipsa con-
tabuerint, uel causa exterius adueniēte, uel fractura,
uel præsertim putredinem experta, & excisionem ipso-
rum quæ serra fit postulent, ante hanc necesse est corpo-
ra ossibus circundata primum diuidere. Verum quia
dum hoc primum fit, deinde longiore temporis spatio
illa serrantur, sanguinis profluuii metus subsequitur, re-
cte Leonides non omnia primum corpora pertundit,
priusquam ex toto putredine contabuerint, sed partem,
ubi non plures neq; grandiores esse uenas aut arterias
existimet principio celeriter usque ad os resecat, deinde
os protinus serra execat, panniculum lineum partibus
præcisīs circumponens, ne serra per ipsa tracta dolores
pariat, reliquo exciso, ferramenta candentia uasis iniicit,
& sanguinis fluore suppresso linamentis insertis & con-
uenienti deligatura adhibita, remedio utitur quod pus
moueat.

DE VNGVIVM PTERYGIIS.

Cap. LXXXV.

P Terygium in unguibus carnis incrementū est, par-
tem unguis operiens. Fit autē in pedis manusq;
potissimum pollicibus: in pedibus quidem, ex of-
fensione ple runq; in manibus autem, ex neglecta redus-
uia, & post inflammationem in pus mutata. Siquidē hoc
spatio temporis uuguis radicem exedit, ipsumq; cor-
rumpit, subinde totum abolet, sæpe medium unguis ad
modum infestat. Iuxta unguis autem radicem ipsam,
nonnullā ipsius partē putrefactā, aliquando totam radio-
cem à rosione immunē relinquit. Est quū & os corrup-
pat, odor edatur grauis, digitus p summa dilatetur, ma-
gisq; liueat, his igitur manus debet admoueri, ita ut totā
unguis ptē relictā acie scalpelli resecemus auferamusq;

PAULI ÆGINEYÆ

deinde exulceratam incisamq; partem ferramenti adu-
ramus. Etenim pterygium genere depastio est, quæ nos
me Græce dicitur, neque subsidet, nisi adustum, ut si ne-
gligatur, digitur corumpat. At si osse & ungui à uitio
immunibus, exterior unguis angulus qui delitescit, &
carnem ipsi agnatam pungit, inflammationem excitet,
conuenit pūgentem unguis particulam tenui cultro aut
eiusmodi quodam subiecto sublimen eleuatam, acie
scalpelli adimere & quod eminet medicamento crustis
faciundis idoneo consumere. Plerique hoc modo ad
ministrationis consanuerunt. Si amplius fuerit uitium,
primum scalpello circum adimemus, mox remedium
ex medicamentis petemus.

DE VNGVE CONTVSO.

Cap.

LXXXVI.

Quoniam uero subinde ex appulsu unguibus cō-
tusis dolores subsequuntur, qui ad manus ope-
rationem nos pertrahant, satis est. Galeni uerba
hic apposuisse, quæ sonant in hunc modum. Unguibus
contusis præsens plane remedium ad dolorem auferen-
dum sanguinis detractionem experti sumus, quum pul-
sus doloresq; uehementissimi oboriuntur. Ceterum li-
nea obliqua non recta in imum superne deorsum scal-
pello acuto debet incidi, ut sanie excreta, secta hæc un-
guis particula ueluti operculum quoddam subiacentiū
efficiatur. At si in rectum superne carnis excrescentiam
incidas, aliud corpus carne quæ ungui subicitur per me-
diam diuisionem suppullulante gignitur, inde rursus do-
loresprehendunt, quos in reduitis nominauimus, car-
ne quæ sub ungue succreuit, contusionem experta. Eius
modi igitur sectione dolorem protinus ægro adimi ui-
dere licet, per dies insequentes commodum est, nobis
subsectam unguis carnem leuiter attollentibus, unguis
saniem excernere, ac rursus subsectæ carni quemad-
modum dixi, unguem operculi modo imponere,
eliqua digiti totius medicina uti conuenit quæ le-

LIBER SEXTVS.

255

niat discutiaturque.

DE CLAVIS, MYRMECIIS,

& uerrucis.

Cap. LXXXVII.

Claus circinatus in orbem callus est, coloris candidi, clauorum capitibus similis: toto corpore, sed pedum solo digitisq; præcipue enascitur, dolor sequitur, & incessus impedimentum. Itaque circumsarificatus specilloq; apprehensus, scalpro acutæ aciei, aut quo uenæ scinduntur, radicitus eximetur. Nonnulli ne rursus succrescat, candenti ferro utuntur. Myrmecia uero cutis tuberculum est exiguum, callosum, rotundum & crassum, ad basim insidens, & ad frigora sensum formicarum moribus similem excitat. Hæc quoque totum corpus, præsertim autem manus infestat. nonnulli igitur, inter quos & Galenus est, præcipiunt scarificata extrema parte, fistula pennæ durioris, quales sunt ueterum gallorum, anserum, & aquitarum, in inum adacta, ex basi myrmeciam auferre. Alii ærea aut ferrea fistula idem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam specilloq; apprehensam, scalpro, clauorum modo, excindere. At uerruca, quæ acrochordon Græce dicitur, exigua cutis eminentia est, doloris expers, callosa, rotunda plurima parte basim habet angustam, ut suspensa esse uideatur. Nominata uero sic est, quod chordæ nexui respondet. at, producta igitur ea eminentiam excindimus: sin autem hoc non fiat, lino saltē aut pilo deligabimus. Noui plerosque & has & prædictas omnes excrescentias ferramento extincto, ut dicunt, consumpsisse.

DE TELIS E CORPORE

extrahendis.

Cap. LXXXVIII.

Chirurgicæ partem telis extrahendis dicatam maxime necessariam esse, poeta Homerus his uersibus innuit:

Vir medicus multis aliis præstantior, ut qui

Corpora tela trahens, medicamine uulnera curat.
Primum itaq; telorum differentia enumerari debent.

PAULI ÆGINE TÆ

differunt autem tela: materia, figura, magnitudine, numero, habitu, uiribus. Materia quidem quatenus ea quæ imponuntur aut lignea sint, aut arundinea. Ipsa uero tela, aut ferrea sunt, aut ærea, aut stannea, aut plumbea, aut cornea, aut nitrea, aut ossea, aut arundinea, uel etiam eadem lignea, tot enim differentiæ potissimum apud Ægyptios reperiuntur, figura autem, quatenus alia sunt rotunda, alia angulosa, nempe triangula, alia sulcata, quæ & gonchota dicuntur: alia trifulca, atque alia cuspidata, alia cuspidibus carent, ac cuspidatorum, hæc cuspides posteriora spectantes habent, ut dum extrahuntur, contra defigantur: illa in anteriora, ut propulsata idem faciunt: quædam obuersas cuspides habent, fulminis instar, ut dum ipsa trahuntur propellunturq; in obiecta infixantur. Sunt quæ mota cardine cuspides habent contractas quæ dum in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine uariant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parua, ut unum digitum æquent. quæ sane & myiata apud Ægyptios uocantur, alia medium inter hæc locum occupant. Numero autem, quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita, tenuia siquidem ferramenta ipsis imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescunt. Habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent insitum, alia concuum: ac quædam firmiter ligno infixæ sunt, quædam negligentius, ut in extractione separata intus remaneant. Viribus differunt, quatenus uenero quædam sunt oblita, quædam non. Atq; hæc sunt telorum discrimina. Nunc dicamus quomodo extrahantur in conuulneratis, & in bello, & extra bellum sponte, & inuito, quacumq; occasione, ac qualibet ex materia confecta. Cæterum dupliciter tela in carne extrahuntur, tunc euulsione tunc propulsatu. In quibus n. p. summa telum impactum est, euulsione eximi debet, similiter etiam quæ alte inhareret, obiectæ uero partes si conuulnerentur sanguinis profusio aut dolore ex consortii lege periclitantur. At propulsatu utimur in quibus alte telum infixum est, & par

res obiecta breue spatium continent, neque neruus, neque os, neque eiusmodi aliquod diuisionem impedit: osse autem conuulnato, euulsorium modum assumit. Si igitur telum conspicuum fuerit, inde extractionem
 5 moliemur: si occultatum est, conuenit authore Hippocrate modo uulneratus possit, in ea figura constitutum notare in qua etiam uulneratus est: si non possit, iacentis certe quatenus licet modo figurantes specillo tentabimus, & si quidem in carne fixum est telum, manibus
 10 extrahemus, aut eius impositorio quod etiam attractione appellant, nisi exciderit, ligneumque id potissimum sit: si excidat, forcipe qua dentes radicesue euelluntur, aut ferro mento quod a telo extrahendo belulcum Græci uocant, aut alio quopiam instrumento accommo, extractio-
 15 nem moliemur, nonnunquam etiam carnem prius incidentes, si uulnus instrumentum non recipiat. At si etiam in opposita telum processerit, nec illac ipsum possit extrahi qua infixum est, diuisis his quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, uel euellentes ut dictum est, uel
 20 per eam partem in quam retendit propellentes, uel si id quod imponitur exciderit, demisso instrumento propulsorio ita ut neruum, aut tendinem, aut arteriam, aut eiusmodi aliquod necessarium uitemus, protrudere oportet. turpe siquidem est, dum telum extrahimus, peius eo
 25 malum efficere. Et si quidem acumen, quod ὀφθαλμοὶ uocant, telum habeat (hoc autem specillo deprehendemas) foemina, propulsorii instrumenti demissa accommodataque telum appellemus: si concauitatem, mare. Cæterum telum eximemus, si crenas quasdam habere appareat, ceu alia tenuia fer-
 30 rameta eis possint imponi, ac specillo rursus usi illa si inueniamus, eadem ratione & uia auferemus: si in oppositas cuspides, ut uerisimile est, telum hinc non exilierit, uicinus ei locus diffecari debet, si nulla pars necessaria contigua sit, detectumque telum sustentantes modeste extrahemus. Nonnulli uero exigua ariditate cuspidibus ipsis circumposita sic telum euellunt, ne carnes a cuspide radantur, & si uulnus inflammatioe

PAULI AEGINETÆ

uacauerit, futuris uis, cruentorum modo curabimus, si in
 inflammationem experiatur, fomentis, cataplasmatibus, &
 consimilibus medebimur. Porro si uenenato telo quis
 ictus est, totam carnem quæ ueneno iam mutata est, si
 quidem fieri potest, præcidemus. Agnosces autem eam
 quod à sana carne differat, pallida enim, subliuida, & ue
 luti emortua apparet. Aiunt autem Dacos & Dalmatas
 cuspidibus elenium & nimum dictum oblinere, idque ubi
 sanguini uulneratorum obuenerit, hominem occidere;
 comestum uero ipsis innocuum esse, & nihil mali effice
 re. At si telum osse inhæserit, rursus instrumento experie
 mur, & si quidem caro impediatur, hanc adimemus aut
 diducemus: si uero etiam alte in osse demersum est, quod
 cognoscimus si firmiter id infixum nulla uis commouea
 tur, excisorio cultro osse quod iuxta est exempto, aut e
 tiam terebra prius perforato, si crassum sit, telum libera
 bimus. Porro si in principem aliquam particulam telum
 defigitur, exempli gratia, cerebrum, aut cor, aut guttur,
 aut pulmonem, aut iecur, aut uentriculum, aut intestina,
 aut renes, aut uulnam, aut uesicam, quum iam notæ le
 thales apparuerint, & euulsio præsertim multum crucia
 tum uexationemque accersitura est, nihil tentabimus, ne
 præter quod nihil sumus profecturi, etiam conuitiandi
 occasionem idioris præbeamus. Si uero quæ ad basim
 sunt, in conspectum tunc non prodeant, præfati pericu
 lum, opus aggrediemur. Multi siquidem abscessu quo
 que in aliqua uitæ necessaria parte oborto, præter opi
 nionem confluuerunt, quum & iecoris fibram, & omne
 ti partem interiorisque abdominis membranæ, perito
 riæ dico, & totam uulnam subinde ademptam fuisse,
 nec mortem inde subsequutam, memoriæ prodatur. Est
 quum guttur de industria subinde in anginis diuidamur,
 ut in capite de ipsius incisione dicebamus. Telum itaque
 si in his relinquatur, in præsentaneam mortem præcipi
 tat, præter quod artem etiam inhumanam ostendat: si
 eximatur forte etiam salus subsequitur. Porro principa
 lium

illum particularum uulneratarum agnitio non est diffi-
 cilis, ut quæ ex accidentium proprietate, excrementis, &
 particularum situ, inueniatur. Si igitur cerebri membrana
 uulnus accepit, dolor capitis ualidus subsequitur, oculi
 feruent, rubentq; lingua agitur, mens desipit. Si cere-
 brum percussum est, ægri concidunt, uox nihil sonat, fa-
 cies peruertitur, bilis uomitus sequitur, sanguis per nare
 is erumpit, per aurem humor albus pulticulæ similis ema-
 nat, sanies per uulnus exit. At si in uacuâ thoracis regio-
 nem telum defigatur, salua spatiofa intus laxitate, spiritus
 erumpit. Corde uulnerato iuxta mamillam sinisteriorē,
 telum apparet non penetrans, sed ceu alteri impactum,
 ac nonnunq; pulsatilem motum edens, sanguis niger ef-
 fertur, si transitus pateat, extrema frigescent, sudor ema-
 nat, animus deficit, & sine mora exitium subsequitur. Pul-
 mone ictō, si spatiofa laxitas est, sanguis ex plaga spu-
 mans uacuatur: quum non est, ore magis per uomitum
 redditur, ceruicis uasa attolluntur, lingua alium colorem
 assumit, multū spiritus attrahunt ægri, frigidi appetētes.
 In septo transuerso, telum iuxta spurias costas defixum
 apparet, inspiratio aut magna oritur, cum gemitu et do-
 lore per totam humeri partium compagem. Quod si
 abdomen uulnus acceperit, id ex recrementis innotescet,
 quum latum intus spatium existat, uel etiā telo exempto,
 uel eo quod imponitur intus fracto, succus ex uentricu-
 lo euacuatur, ex intestinis sterqus, interim & omentum,
 uel intestinum procidit. Vesica aut uulnerata, urina ex-
 cer-
 nitur. Itaq; in cerebro eiusq; membranis ictis, caluaria per
 forata telum eximimus, quemadmodum in capitis fra-
 cturis mox dicitur. In thorace autem, nisi telū subsequus
 tum fuerit, per mediocrem intercostalium incisionem,
 uel etiam una excisa costa, lamina quæ reliqua tueatur
 subiecta, euellemus. Similiter in uentre, uesica, cæterisq;
 in alto particulis, si quidem telum subsequatur, citra ne-
 gotium eximemus: sin minus, rursus diuisione adhi-
 bita medicina utemur, quæ cruentis conueniat.

PAV. ÆGIN.

KK

PAULI ÆGINETÆ

In uentre, si res postulet, et suendi eius ratio, quæ gastro-
 raphia dicitur, accommodabitur, quæ in modum cōprehē-
 sum est. At si in grandiore quodā uase, exēpli gratia, in
 iugularibus uenis quæ in imo latent, aut arteriis quas ca-
 rotidas appellant, aut et magnis arteriis quæ alas uel in-
 guina intercurrent, telum defixum, copiosius sanguinis
 p̄fluum p̄ exemptionem minetur, ratio est hæc su-
 nibus antea ex utraq; parte cōstringere, deinde teli euul-
 sionem moliri. At si particulæ plures confixæ fuerint,
 uerbi causa, brachio cum thorace coniuncto, uel cubito
 cum aliis corporis particulis, uel pedibus inuicem, si qui-
 dem nō per totas utraq; partes telum penetrauerit aut
 hasta, apprehensa hæc extrinsecus, uelut etiam in una
 euellemus: sin ambas penetrauerit, dimidia ligni parte
 serra refecata, particulatim singula faciliore figura extra-
 himus. Quoniam uero & lapides subinde uel buccina,
 uel plumbum, uel simile quippiam ex funda mittitur, tū-
 ui, tum quod angulosa sunt defiguntur. Agnosces igitur
 ea, quod moles aspera & inæqualis illabatur, item quod
 non omnino in rectum tendit diuisio, sed amplior, & ca-
 ro ueluti contusa liuidaq; appareat, ad hæc, quod cum
 gravitate dolor affligat. Hæc igitur conuenit agitata in-
 strumento quo quid attollimus, aut aduersa scalpelli par-
 te, aut uulnerario specillo recipere, si autem fieri potest,
 etiam forcipe extrahemus. Multis autem infixæ tela inte-
 gra intus infederunt, quæ uulneribus cicatrice obductis,
 deinde longiore temporis spatio partem eam abscessu
 occupante & disrupto, exiliere.

DE FRACTVRIS, ET QVOT ipsarum sint differentia. Cap. LXXXIX.

Proximum fuerit tradita carnis uitiorum manu
 scalpellove curandorum ratione, etiam de ossiū
 fracturis, dico sane etiam luxationibus sermonē
 instituere, quoniam & ipsæ chirurgiæ generi subiiciun-
 tur, & primum de fracturis agam iisq; prius quæ in cas-

5 pite sunt, tum quòd inter carnis & ossium chirurgiam
 medium locum obtinent, tum quòd omnibus partibus
 caluaria præcellit. In uniuersum igitur fractura ossis est
 diuisio, aut ruptura, aut præcisio à uiolentia quadam ex
 10 trinsecus accidens. Cæterum plures fracturarum sunt
 differentia, alia siquidem dicitur fieri raphanidon, hoc
 est ad raphani speciem, alia schidacidon, alia eis onycha,
 alia alphiuon, alia cata apothrausin, id est, iuxta refrac-
 tionem. Raphanidon igitur ruptura ossis est tràsuer-
 15 per crassitudinem facta, quæ etiam sicyedon & cauledon
 nonnullis appellatur, ex cucumerum & caulium fracto-
 rum similitudine. Schidacidon autem quasi assulæ mo-
 do, est oblonga ossis fissura. eis onycha, quasi dicas in
 unguem, iuxta partem aliquam recta est fissura in extre-
 20 mo lunata: quæ etiam calamidon appellatur. Alphiu-
 on, ad farinæ similitudinem dicta, est quum os in mul-
 tas tenuis partibus finditur, quæ & ipsa caryedon à quis-
 busdam uocatur. Refractio autem, quæ apothrausis di-
 citur, uel etiam præcisio, est quum pars ossis per summi-
 25 tatis rupturam auferatur, ut ablata superinnatet. Atq; tot
 fracturæ constant differentiis.

DE FRACTVRIS CAPI-

tis.

Cap. XC.

25 **F**ractura in capite peculiaritet caluariæ est diuisio,
 nunc simplex, nunc multifida, à ui quadam exte-
 riore facta. Porro differentia capitis fracturarum
 hæc numerantur. Rhogme, id est fissio, Eccope hoc est
 excisio, Ecpiesma, quod est effractio, Engisoma, id est,
 corporum appropinquatio. Camarosis hoc est testudis
 30 natio, in infantibus etiam Thlasis quod est contusio.
 Rhogme igitur caluariæ per summa est diuisio, aut ri-
 ma profundior, in qua nequaquam os uitiatum foras
 emouetur. Eccope caluariæ fissura est cum ossis offensa
 si ruptura. At si à reliquo osse pars offensa discesserit,
 35 aposceparnis non nonnulli uitium appellant. Ecpiesma
 in multas partes caluariæ effractio est, in qua profundius

KK ii

ossa descenderint, & cerebri membranam contactu suo
 premant. Engisoma caluæ ictus est, in quo os uiliatum
 ad interiorē cerebri membranam descenderit. Cama
 rosis diuissio caluariæ est, in qua pars affecta cameræ mo
 do exaltata relinquitur, ut Galenus tradit, ac intro à sanis
 fracturæ partibus ossa magis recedunt, membranæq;
 innituntur quemadmodum in ecpielmate. sic enim il
 le existimat. Alii etiam trichismōn, quasi dicas capillatio
 nem, his adnumerarunt. Est autem trichismus arctissima
 rhogme, sensum plerunque fallens, eoq; latens: quæ ga
 non facile se ostendit, mortis causam sæpe adfert. Thlas
 sis caluariæ diuissio non est, eoq; nec fracturam recte di
 xeris eiusmodi affectionem, uerum est ossis caluæ in in
 teriorem partem impulsio, aut inflexio, concauitatem in
 tegra caluæ continuitate tantum efficiens, ut licet in plu
 beis æneisq; uasculis si foris percutiantur illidanturue cō
 spicari. Porro contusionis huius duæ existunt differen
 tiæ: uel enim calua per totum sui affectum contunditur,
 ut frequenter etiam cerebri membrana abscessu occu
 petur: uel omnino à caluaria hæc per totum aut nō per
 totum premitur, sed iuxta exteriorē duntaxat, superfi
 ciem usque ad laminam secundam deprimitur. Sunt q
 his differentiis apechema, quasi dicas ab Echo respon
 sionem, addiderint. Ea est, à cōraria ictus parte facta cal
 uariæ fractura. At saluntur hi, quoniam non fit in homi
 nis calua quemadmodum in uitreis uasculis fieri illi do
 cent, illa siquidem uacua sunt, ideoq; id patiuntur, calua
 autem hominis undique plena & alioquin solida est, fit
 que in hoc ictu, quod in capite alijs ex causis fieri uide
 tur, in quo integra cutis cōtinuitate factus abscessus, quū
 sectus ferit, offensam illic hominis caluariam fuisse in
 nuit, sic etiam & in hoc malo factus contraria in parte
 abscessus, illic fuisse os credi postulat. atq; hoc uitium
 quemadmodum prima dicta rhogme curatur. Si igitur
 fractura capitis facta fuerit, speciem ipsius ex corpore
 quod percussit, apprehendes, si acutum fuerit, aut graue

aut durum, aut uolenter impactum. Item ex sympto-
 matis quæ ictu superueniunt, exempli gratia, uertigini-
 bus, uoce amissa, aut subito collapsu, præsertim in engi-
 somate, aut contusione, aut ecpiemate, aut interiori ca-
 5 marosi cerebro compresso: item ex notis quæ à sensu
 capiuntur. Si enim ampla cutis fuerit diuisio, per ipsam
 prompte cognoscemus: si autem diuisio non per tot-
 tum ierit, aut angusta sit, fracturam tamen esse suspice-
 mur, cute diuisa, & oculis, & specillo demisso eam per-
 10 noscemus. Si enim ex aliis quæpiam fracturis fuerit, ina-
 de manifestum euadet: at si rhogme solum angusta &
 pilosa sensum fugiens, medicamento aliquo nigro, liqui-
 do, uel etiam ipso attramento scriptorio infuso, os rade-
 mus, ipsa nanque rhogme nigra ostenditur, conuenitq;
 15 rasuræ tam diu insistere, quousq; signum rhogmes abo-
 leatur. Si ad cerebri membranam usque peruenerit fra-
 ctura, non rademus, sed agnoscere conabimur utrum
 membrana ab osse recesserit, an affixa permaneat. Si
 enim ipsa manet, inflammatio nulla uulnus infestat, æger
 20 paulatim febris liberatur, & pus coctum apparet: si reces-
 serit membrana, augentur dolores, & febris similiter, os
 alium sumit colorem, pus tenue & crudum effertur, &
 si medicus rem negligentius tractet, nec perforatione
 utatur, hoc grauiora oboriuntur symptomata, nempe
 25 bilis uomitus, conuulsio, mentis delirium, febris acuta,
 in quibus manum admoliri non oportet. Quod si his
 absentibus membrana cerebri non abscesserit, rhogme
 autem duntaxat fuerit, etiam solo rasorio curatur, uel si
 usque in altum penetret. Sin autem tantum usque ad la-
 30 minam secundam quæ diploe dicitur, fractura peruene-
 rit, eousq; radendum est, uel etiam confractum os exi-
 mendum, quemadmodum docebitur. At si in tenuia
 frustra os fuerit comminutum, etiam hæc diligenter in-
 strumento idoneo auferentur, etiam si membrana non
 35 abscesserit. Ab initio autem quum uulneratum susce-
 peris, hyeme quidem ante diem quartumdecimum

PAULI ÆGINETÆ

omnino os auferre tentato: æstate, ante septimum, prius
quàm commemorata oboriantur symptomata, Catez
rum manum hoc modo admolieris.

CALVARIÆ FRACTÆ CV

RATIO.

Deraſo ſuper uulnus capite, duas lineas iuxta rectos an
gulos mutuo ſe ſecanteis, quæ literæ X figuram accipio
ant, incidemus, harum autem alteram eſſe cõuenit, quæ
iam præceſſit, deinde quatuor in uertice angulos exco
riantes, ut totum os, quod perforabitur nudum exiſtat:
ſi quidem ſanguis fertur, linamentis ex poſca obiectis
cohibebimus: ſi minus, ſiccis deinde implicito linamẽ
to ex œnelæo iniecto, conuenienti uinculo utemur, ſes
quenti die, niſi recentius aliquod ſymptoma prohibeat,
perforare os uitiatum aggrediemur. Collocato igitur
in ſedili ægroto, aut recumbente prout uulneri conue
nit, auribusq; ipſius lana obturatis, propter ſonitum qui
ex appulſu redditur, uinculum aliquod uulneris ſolue
mus, linamentis omnibus exemptis, & ſpongia deterſis
ſordibus, iubebimus miniſtris duobus, ut tenuibus fa
ſciolis circumpoſitis, quatuor angulos corporum quæ
fracturæ incumbunt, attollant, & ſi quidem os fuerit im
becillum, aut natura, aut fracturæ uitio, id ſcalpris exci
ſiis acie inter ſe aduerſis, auferemus, primum cauſ exci
ſiis ſcalpris, quos Græci cycliſcos uocant, à latiore in
cipientes, mox anguſtioribus, deinde ſpecilli modo an
guſtis, malleolo ſenſim adactis, ad capitis concuſſionẽ
utemur. Si autem ualidum os fuerit, prius eo terebellis
quæ mergi nõ poſſint, quas ab argumento abaptiſmos
dicunt, perforato, (eiufmodi uero ſunt, quæ paulo inte
rius q̃ culpis acuta eſt, eminentias habent, quæ ipſas ad
cerebri membranã demergi prohibeant) per ſcalpra cir
cuncuſſione uſi, id quod uitiatum eſt, auferemus, non uni
uerſim, ſed particulatim, ſi quidem fieri poteſt, digitis: ſi
non, forcipe, aut uulſella qua uel oſſa uel pili apprehen
duntur, aut eiufmodi quodã instrumento. Locus autem

qui inter foramenta est, tantum spatium continebit, quantum maximi mucronis specilli longitudo. tam alte uero descendet, ut interiorem ossis superficiem accedat, cura adhibita, ne membranam cerebri terebra attingat. Quare etiam terebram ossis crassitudini respondere conuenit, compluribus id genus ad hoc præparatis. At si fractura caluariæ usque ad secundam laminam duntaxat peruenierit, ad hanc etiam usque solum foranda est. Osse iam ablato, asperitudinem quæ ab excisione caluariæ prouenit, rasorio aut quodam scapello excisorio adæquabimus, laminam quæ membranæ custos est, subicientes, ac ossiculis quæ remanserant, ut uerisimile est, aut spiculis ingeniose ablati, linamenta inseremus, quem modum diamotosin appellant. Hæc ratio chirurgiæ cõmunior simul & promptior est, & periculo uacat. Item modus qui per lenticulatum excisorium scalprum fit, mirum in modum Galeno cõmendatur, sine foratione, post inscriptionem cycliscis salpris factam, ipsum adhibenti. Scribit itaque hunc in modum. Si uero unam semel partem nudaueris, ac scalprum qui in cuspide præfixam habet retusam leuemque lenticulæ speciem, aciem uero per longitudinem erectam, submiseris, ubi latam partem lenticulæ super membranam defixeris, malleolo feries, diuidesque sic caluariam. ita siquidem agentibus, omnia quæ requiruntur, euenient. Nam membrana, ne si dormitans quidem agas, latæ tantum lenticulæ parti occurrens uiolari non potest. Quod sicubi adhæreat caluariæ membrana, huius quoque adhærentiam in noxie dirimit rotundam lenticulæ extremum, subsequitur autem præeuntem eam à tergo ipse scalper caluariam secans. Quare nec qui minore cum periculo, nec qui celerius perficiatur, forandi modum inuenias. At quæ administratio ferris & modio, quem chœnicion siue chenicida Græci uocant, peragitur, recentioribus, ceu noxia, improbatum est, sed administrationem quam in rhogme exposuimus, probant. Idem uero modus ossium excidendorum

PAULI AEGINETÆ

conueniet in reliquis etiam caluariæ fracturis. Quantum uero excidete conueniat, Galenus nos docebit, hunc in modum manifesto scribens. Quod uehementer est contractum, id totum auferri debet: si uero ab eo fragmenta quædam longius excurrant, quemadmodum aliquando cernitur accidere hæc persequi ad extremum non oportet, illud probe scientes, nullam inde noxam sequuturam, modo reliqua omnia rite sint confecta. Post chirurgiam panniculo simplici lineo, uulnere æquali, rosaceo madenti, cerebri membranam operiemus, exiguaq; lanæ stuppam similiter rosaceo imbutam prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum implicitum duplex in œnelæo aut ipso rosaceo tinctum, toti uulnere circumponemus, diligentia adhibita ne cerebri membrana grauetur, postea latiore utemur ligamento, neque hoc astringentes, uerum ut linamenta solum retineat. Victus adhibebitur qui inflammationem arceat, & febribus peculiaris est, membrana cerebri crebrius interea rosaceo superfusa. Post tertium diem ubi uincula dissolueris, & sordes spongia deterferis, res medium induces quod cruentis iniicitur, & inflammationem repellit, superaccommodans membranæ aliæ quod ex cephalicis dictis aridis, usque dum carne opus pleatur. Nonnunquam os radetur, si hoc res postulet, propter quasdam summitates extantes, aut etiam propter ipsius carnis productionem. Reliqua medicamentorum materies, ut in uulneribus comprehendimus, ad moueri debet.

DE CEREBRI MEMBRANÆ

inflammatione.

Quoniam frequenter cerebri quoque membrana post chirurgiam, inflammationem experitur, ut non solum caluariæ crassitudo, sed etiam cutis ipsius excadat cum renixu, & naturalis ipsius motus pulsatilis impediatur, quæ potissimum & conuulsio aliaque graui symptomata uel ipsa mors subsequitur.

Origo inflammationis aut ex acuta quadam ossis emi-
 nentia pungente ducitur, aut ex linamentorum gravita-
 te, aut perfectione, aut multo esu, aut vini potione, aut
 alia quadam occasione latente. Si quidem ex manifesta
 occasione inflammationem contrahat membrana, ea
 protinus amputanda est: si ex latenti, magis pugnare
 conuenit, utpote sanguinis dimissione, si causa non ob-
 stiterit, uicū qui inflammationi congruat. Item loco in-
 duci remedia debent, calentis rosacei fomentum, & alo-
 theæ decoctum, aut foenugreci, seminis lini, chamæme-
 lorum, similiumq; superfundi: cataplasmata uerò ex cru-
 da polenta, aut lini semine, cum prædicto decocto &
 gallinarum, adipe, adhæc fomentum ex lana adhibebis-
 tur. Capiti & occipitio meatuq; auditorio oleum ali-
 quod inflammationem prohibens instillabitur, ita ut uis-
 cerū cura habeatur, cataplasmatibus adhibitis, itē toti cor-
 pori prospicere consilium in calidam id aquam, ut par-
 est, collocantes inungentesq; Si perseverat inflammatio
 & nihil aliud prohibet medicamento quod bili ducen-
 dæ est, purgare ipsos Hippocrates præcipit.

SI MEMBRANA CEREBRI NIGRVERIT.

Cerebri membrana si quidem per summa ex medica-
 mentis in id efficacibus nigruerit, mel triplum rosaceo
 miscentes & per linamenta id applicantes, curabimus,
 deinceps & reliqua admouentes. At si nigrities sua spon-
 te prouenerit, idq; in imo potissimum, cum aliis graui-
 bus indiciis, attingi tunc non debet, ut quæ natuum cas-
 lorem emortuum innuat. Noui quendam qui post an-
 num quam affectu conflixisset, caluaria perforata sus-
 peruixerit, erat enim fractura in sincipite ex telo facta,
 emissariumq; habens per quod etiam membrana ab af-
 fectu immunis conseruata est.

DE NARIBVS FRACTIS CON- tulsq; Cap. XCI.

PAULI AEGINETAE

Narium pars ima, quum sit cartilaginosa, frangi non solet, sed contundi, si ma fieri & perueri: superior quæ ossea est, nonnunquam frangitur. In his autem deligaturam damnat Hippocrates, ut quæ magis resimas efficiat & distorqueat, præterquã in his quæ appulsu quodam per medias nareis emineant, hic enim convenientem habenam cum medicamine imposito assumit, ut compressæ nares naturalem figuram recipiant. Fractis igitur naribus, in ima quidē parte, indice aut paruo digito demisso in exteriora diriguntur: in interiore, etiam scalpelli mucrone id faciendum est, primo statim die, aut non multo post. Quum uerò decimo die naris ossa continentur, extrinsecus indice magnoq; digito hæc efformare congruit. Ut aut figura quam fingis non concidat, duo obturamina tortilia ex panniculo inuoluta, naso impones, unum singulis nasi foraminibus. & si altera duntaxat naris pars sit peruersa, eaq; sinere, donec os aut cartilago contineat. Nonnulli fistulas ex anserum pennis panniculis replentes, naribus insinuarunt, quod figura custodiatur, & respiratio non impediatur. quod non necessarium puto, quum spiritus per os trahatur. At si inflammationem nares sentiant, medicamentum aliquod quod eam arceat indemus, exempli gratia, ex succis inscriptum aut quod oxelæo constat, aut eiusmodi aliquod uel ex triticea simila & thuris fuligine seu gummi unā incoctis cataplasma iniiciemus, tum propter inflammationem, tum ut nares contineantur. Quod si in alteram partem nares declinantur, Hippocrates postquam commodè eas figuraueris, oblongam habenulam digitali latitudine iubet circundari, alterum ipsius extremum taurino glutine, aut gummi illitum summæ narium partii agglutinari, ex latere quo inclinant ubi illa exaruerint, habenam transferre per aurem oppositam uersus occiput, & frontem oportet, deinde ipsi sub altero habenda principio affirmabitur, ut nares in latera retractæ ad mediam dirigantur figuram, quod non admo-

dum recentioribus placuit. Porro minutim confractis
 narium ossibus diuidere ipsas, aut superiorem ipsarum
 partem conuenit, ac fragmenta ossiculorum uulsella au
 feremus, futuris diductas partes committentes, accom
 5 modantesq; ipsis remedium quod cruentis aptum est,
 & conglutinat. Sin autem extra nares ulcus fuerit exci
 tatum, linamentis in lōgitudinem implicitis curabimus.
 Sunt qui plumbeis canalibus, quas solenas Græci di
 cūt, usq; dum cicatrix fuerit obducta usi sunt, ne caro ex
 10 ulceribus super crescat.

DE INFERIORE MAXILLA confracta, & aure contusa. Cap. XCII.

15 **D**E aure contusa tertio libro tractatū est, tanquam
 huiusmodi affectus ad fracturas non pertineat.
 Inferior maxilla multas ob causas frangitur. Si
 igitur extrinsecus solum offensa non per transuersum
 fissa introrsus cauiata fuerit, promptum est cognoscere.
 Opus autem est altera manu, si quidē dextra maxilla fra
 20 cta fuerit, dextra: si altera, sinistra, indice igitur & medio
 digito in affecti os demissis, interiorē fracturę extantiam
 probē foras compellere conuenit: altera manu foris eā
 excipiente. Rectitudinem uero maxillæ ex eiusdem den
 tium æqualitate deprehendemus. Quod si fractura per
 25 transuersum facta fuerit, primum tensione: deinde retra
 ctione, quam antitasin uocant, partis in contrarium usus
 ministro eam continente, ut dictum est, dirigere aggre
 deris: porro denteis in partē cōfracta diductos, inter se,
 ut Hippocrates præcipit auro deligare, nempe lino ab
 30 auro chrysolino dicto aut chrysonemate: quoniam uero
 huius facultas non omnibus conceditur, lino ualido, aut
 bysso, aut pilo equino, aut id genus aliquo. Verum si
 quidem cum ulcere fractura euenerit specillo tentandū,
 nū quandoq; etiam refractio ossis facta sit, atq; si exigua
 diuisione facta, os unum refractum aut plura reman
 35 serint, idoneo instrumento auferentes, futuris oras

PAULI AEGINETAE

ulceris commitemus, & medicamento cruetis apto ulsi
deligabimus: sin autem citra ulcus contigerit, ceratum
simplex maxillae impositum conueniēter deuinciemus.
fasciae mediū per occiput dispensabitur. habenulae utrin
que per aureis ad summam maxillā, inde rursus ad occi
ciput, mox ad mentum, inde per genas ad sinciput, inde
rursus sub imam occipitiū partem, distribuentur, ubi &
fasciam desinere oportet. Super hanc rursus uinculum
aliud fronti circumdatum, quod epistēma Graeci dicunt,
post caput coniungetur, omnes praedictae faciulae id cir
cum astringent. Alii uero tenuem ferulam, quemadmo
dum alii uasculum profundius parī longitudinis im
positum maxillae, deligant, ut commemoratum est: reliqui
deligatura, quam Graeci dicunt phorbiā, utuntur. At si
utraq; maxilla in summo mento auellatur, qua etiā par
te coeunt, ambabus manibus parum inuicem distanti
bus, rursus adaptato, & denteis adunitos, quomodo di
ximus, deligato: ac congrua usus ligatione tenui ac sori
bili alimento aegrotantem nutrirī iubeto. Nam mandas
re ipsi inimicum est. Si aliquid emotum à figura conues
nienti putaueris, tertio die soluens, iterū illigato, quod
tam diu facies, quam callus fracturam firmarit. firmatur
autem maxilla intra treis potissimum septimanas, quo
niam laxa & medullae plena est. Quod si inflammatio
aliqua superuenerit, ne aduersus hanc quidem, tum for
menta, tum cataplasmata negligere oportet. Quod in
omnibus ex aequo obseruatum abs te cupierim.

DE IUGVLO CON

fracto. Cap. XCIII

Iugulum, quod etiam clavicula dicitur, quum natus
raliter figuratum est, interiore, ipsius extremo, cū pe
ctore committitur: exteriore, cum summi humeri cō
page, seu articulamento adunītur. eoq; si humerum,
aut ipsum sustinens brachium, fracturam quacunque tā
dem parte experiatur, quā humerum suum spectat, ple
rūq; infra interius extremum fertur unā cum brachio

detractum. Præstiterit autem per transversum potius
 quam assulatim, aut arundinis modo claviculam frangi
 quod vulgo receptum est. Nam transversim contracta,
 extensione compressioneq; digitorum prompte in natu-
 ralem figuram reuertitur, cætera eminentias habent, quæ
 ægre possint coaptari. Si igitur per totam ipsius crassitu-
 dinem quocunque modo, ingulum fractum fuerit, duo
 ministri, unus ad humerum eiusdem lateris fractæ clavi-
 culæ manibus circuminectis, brachium ad exteriora si-
 mul & sursum trahens, alter oppositum humerum, aut
 certe cervicem attrahens, retractionem à se, quam Gre-
 ci uocant antitassin, molientur: medicus suis digitis fractu-
 ram diriget, prominentiora pellendo, ima foras attrahē-
 do. Quod si maiorem retractionem à se desideret, orbi-
 culum bonæ magnitudinis ex panniculo, aut lanis, aut
 eiusmodi aliquod corpus alæ subiiciens, cubiti gibbe-
 rum lateri indidē adiget, ac reliqua sicut dictum est, exe-
 quetur: si autem id nequeat, extremum clavicule iuxta
 humerum in alto, situm ad superiora ægrotante resupi-
 nato educet, cervicali quodā mediocri, dorso subiecto,
 ministro humeros duos ad ima deprimente, ut os clavi-
 culæ qd in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturā
 conformabit. Porro si partem aliquam iuguli refractā,
 instabilem, aut etiam pungentem percipiamus, salpello
 in rectum diuisam eandem auferemus, ac reliqua salpris
 excisoriiis, lamina quæ integra tueatur, aut alio scalp-
 pro propter firmitatem claviculæ subiecto, exæquabimur, si
 quidem inflammatione careat, futuris: sin aliter est, lina-
 mentis utemur. & spleniis diuersis præparatis, ad ossis
 eminentis inclinationem: maiora ex eis & crassiora su-
 peraccommodabimus, si inflammatio infestat, oleo im-
 buta: si minus, arida ac mediocri ex lana orbe propter
 alam subiecto, conbenientem inducemus deligaturam,
 per axillas, affectam claviculā, scapulasq; prout res exi-
 git, fasciantes. & si quidem ad ima tetenderit pars clavi-
 culæ humero proxima, latioris habenulæ dimidiū, eius

PAULI AEGINETAE

dem cubiti gibbero subiiciētes, rotum brachiū ex collo suspendemus: altero autem uinculi dimido, manum. quemadmodum in iis sit quibus ex cubito sanguis detractus est. At si uersus superius extremum inclinauerit, quod rarum est brachium suspendi non debet, uerum resupinus aeger decumbit, & tenui nutrietur uictu. si uero opus est, etiam fomentis adiuuabitur, sed pro ratione, usq; dum callus eam consolidet. firmatur autem plurima ex parte clauicula diebus uiginti.

DE SCAPVLIS Cap. XCIII

Scapulae quā latae sunt & mensae figuram repraesentant, non franguntur: iuxta spinam uero fracturam sustinent, nunc compressae, nunc rupturam simplicem expertae, alias etiam refractae. Compressionem itaq; tactu cognoscimus, si caua occurrat, stuporem proximi brachii, & dolorem pulsatilem inducat. Ruptura ex tractus asperitudine & loci dolore deprehenditur: ambo autem ratione qua inflammationem arcemus, curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur. Porro quiescentes scapulae fascia conuenienti adaptantur: si autem pleniora sint & pungant, per sectionem auferemus, & futuris, ut prius dictum est, utemur. Fasciae autem & hic similiter ut in clauicula, iniiciuntur, incubitus oppositi lateris conueniet.

DE PECTORE. Cap. XCV.

Medium pectus, diuiditur imprimaturq;: summū, refringitur. Ruptura itaq; per mediū facta dolor loci & inaequalitas sequitur, & strepitus digitis innixus eliditur: impressionem uero dolor uehemens, spirandi difficultas, tussis, membrana quae costas incingit dispuncta, nonnunquam etiam sanguinis eruptio, partibus con fractae cauitas, & incedendo facilitas. Curationem eam adhibere oportet, quā in scapulis prodidimus. In impressione autē adaptatio Hippocratis adhibebitur. quae ille in clauicula quae foras processerit, usurpat, per incubitum supinum cervicali dorso subiecto, scapulisq; con-

strictis, ita ut costæ utrinque manibus simul contrahantur. Tam uero costis lana obiectis circula rem adhibebis de ligaturam, loris prius in rectum subditis, postea duorum initia inuicem excipiuntur, quæ orbiculares fascias decidere prohibeant.

DE COSTIS. Cap. XCVI

EX costis & spathis dictis, osseæ quidem in omni parte ruptura sustinent: spuria autem, in ea tantum quæ spinæ adiacet, nam hic solum osseam habent naturam: in exteriori parte in cartilaginem degenerantes, contunduntur, nullam fracturam percipiunt. Notæ ipsarum non sunt difficiles, etenim inæqualitas digitis explorantibus occurrit, strepitusque & ad confractum peruersio. Quod si intro spectauerint, dolor uehemens prætorius sequitur, eo qui in costis prouenit grauior, quæ aculei modo membranam costas integram couulneret, ite ægra respiratio, tussis, eruptio sanguinis, subinde committatur, & reliquas utique immutationes digitis licet conformare, at eam quæ intro spectat, nequaquam, quod tendi nequeat. unde alii cibum flatulentum uberemque assumi iubent, quo fractura ex inflatione & tensione foras propellatur, quod necessarium non esse puto. Nihil enim commune ad hoc inter se habent, tum thorax, tum uiscera nutritoria, præter quod inflammatio etiam ex repletionem augeatur. Alii cucurbitulam agglutinant, quæ à ratione & uia curandi alienum non esset, nisi corpora ex contractione congregata, fracturam amplius ad interiora propellerent. Quapropter Soranus hunc in modum scribit: Lanis oleo calido madentibus partes contegantur, & linamentis implicitis intercostale replebitur, ut deligatura æqualis iuxta orbicularem circumductum ueluti in pectore fiat. Omnia uero utin pleuriticis fieri debent, ad magnitudinis proportionem. Porro si magna quædam necessitas compellat, quod membrana costas cingens uehementer compungatur, cutem diuidere conuenit, & fractam costæ partem detegere, de

PAULI AEGINETAE

inde lamina, ne tunica costas tegens cōulheretur, prius
subiecta ossicula quæ pungūt ingeniose excindere ac eis
cere oportet. postquam hoc feceris, ea sane quæ inflam-
matione carent coniunges & cruentorum modo cura-
bis: quæ autem illa affliguntur, linamentis oleo madidis
operis uictum curationemq; adhibens inflammationi
dicatam. Decumbent ægri ea figura quam facilius tu-
lerint.

DE COXARVM ET PETINIS

osibus. Cap. XCVII.

Coxarum aut ilium ossa raro quidem franguntur
sed easdem cum scapulis differentias sustinent.
Franguntur enim in extremis, rumpunturq; in
longitudinem, & per medium finduntur. Comites no-
ræ ipsorum sunt, dolor partem affectam affligens, pun-
ctionis pulsusq; sensus, cruris subitus stupor propter fis-
suram, adaptationem scapulis similem postulant, auers-
santur autem solam ex chirurgia eius quod fractum est,
exemptionē per exteriora corpora, ut quæ si opus sit,
digidis conformentur. deinceps autem etiam aliam cus-
rationem moliri oportet. fomentis utendo, & concaua
ilium linamentis adimplendo, quo deligatura ceu fas-
ciis circularibus superiniectis, & quabilis efficiatur. Eadē
etiam dicenda sunt, de pectinis ossibus nihil, enim pecu-
liarius de ipsis dicere habemus.

DE VERTEBRIS, SPINA DOR-

si, & sacro osse. Cap. XCVIII

Vertebrarum complexus interim sane contusio-
nem raro uero & fracturam experiuntur. pro-
pter quæ contusis spinalis medullæ membra-
nis, uel ipsa etiam medulla, nerui in doloris consortium
adducuntur, & mors præceps subsequitur, magisq; si
cervicis uertebras affectus infestari, unde præfatus peri-
culum, si quidem fieri potest, audebis etiam sectione ossi-
ficulum quod premit eximere: si minus, ratione qua in-
flammatiō propulsatur, ipsas lenies. At si processas uer-
tebrarum

tebrarum aliquis unde spina constat, fuerit refractus, digi-
 gitis tentantibus propte sublabetur, dum refractione mo-
 uetur, rursusq; in locum transponitur. Conuenit autem
 id quod refractum est auferre, cute extrinsecus incisa: su-
 5 turisq; commissa, remedio cruentis idoneo uti. Cæterū
 osse sacro cōfracto, index sinistræ manus digitus in anū
 demittendus est, dextra manu quod cōfractū est, quate-
 nus licet, in naturalē figuram reducere oportet. Si aut ali-
 quid refractū sentiamus, hoc quoq; diuiso, deligaturam
 10 curationemq; congruam adhibebimus.

DE BRACHIO. Cap. XCIX.

IN brachio confracto Hippocrates quidem inten-
 tionem hoc pacto molitus est: Lignum, inquit, ob-
 longum colūnlæ modo per summa fune deliga-
 15 tum, obliquum ex trabe quadam suspendere oportet:
 collocato autem homine in sublimi quodam erectius,
 uel iuxta figuram quæ à recta sessione orthocatheuton
 dicitur manum ipsius super commemoratum lignum
 traducere, ut medium ligni alæ eius transuersim adaptes-
 20 tur, manum aut inflexo iuxta rectum angulum cubito
 minister procumbens continebit, deinde graue aliquid,
 exempli gratia, lapidem aut pondus plumbeum uel
 eiusmodi aliquid ex cubito suspendens, sinensq; pende-
 re sublime, ita fracturam conformabis: uel loco ponde-
 25 ris, famulus ad ima brachium detrahat. Nonnulli uero
 loco colūnlæ gradu scalæ usi sunt. Soranus hunc in
 modū tradit: agro in sedili collocato, uel, quod satius
 est resupinato quo minus molestiæ sentiat, manu fune
 ligata iuxta cōpagem qua ipsa cū brachio coniungitur,
 30 & ex ceruice suspensa, ut angulosa ipsius figura serues-
 tur, ministris duobus iubeamus, huic, supra fracturā, illi,
 infra digitos circūponant, atq; sic tensionem perficiant.
 Quid si ualētioire opus sit tractatione, duos funeis æqua-
 35 leis brachio circundamus, unū, supra fracturā: alterū, in-
 fra, atq; uni famulo sup ægrotantis caput cōsistenti, alte-
 ri iuxta pedes, capita funium tradētes, iubeamus in dis-

PAV. ÆGIN,

LL

PAULI AEGINETAE

versa brachium distendere. At si summus humerus fracturam
 senserit, dimidio uinculi, quod circa dicitur, alae
 subiecto, reliqua partem iuxta caput teneri iubentes, alio
 quod oppositum est retrahente, antitassin, hoc est, a se re-
 tractione uti dictum est, moliemur. quemadmodum sane
 si cubitus contractus fuerit, illi uel iuncturae manus cum
 brachio funis iniicietur. Osibus iam fracturae probe co-
 aptatis, distentio quidem remittetur, sed iuxta Hippocrati-
 cam consuetudinem deligabitur. Porro si fractura infla-
 matione uacet, recensque sit, lineis utendum fasciis oblon-
 gis abunde, circa treis quatuorve digitos latis, aqua ma-
 dentibus, aut etiam posca: si inflammatio adest, lanis tes-
 nuibus mollibusque, oleo imbutis: & si quidem in medio
 brachii fuerit fractura, initium fasciae super fracturam ini-
 ciatur: ubi bis terve illigaueris, sursum fasciam ducere con-
 uenit, ut (quemadmodum inquit) sanguinis influxiones
 excipiantur, atque illic finiatur. Iam uero & secunda fascia
 uti oportet, initium eius similiter supra fracturam inicien-
 do, atque alia eo modo quo in priori: rursus autem su-
 perne deorsum, atque iterum sursum reuocare, illic etiam
 sic terminabitur. Porro constrictio mediocris esto, tum
 nostri sensus, tum ipsius aegrotantis iudicio. At si iuxta
 summam humeri compagem contigerit, priore fascia
 illam & scapulas & pectus comprehendens, ut deligatu-
 ra fiat quam Graeci geranida appellant, perque secundum
 usque ad cubitum dispensabis, ac inde ad supraposita
 recurre, cum summo humero scapulas pectusque com-
 prehensens, primae fascioe similiter. Quod si gibbero
 fractura obuenerit, etiam cubitum colligare expedit, ita
 ut anguli figura conseruetur, similiter in aliis quoque artu-
 bus, nimirum cubito, femore, tibia, cum fractura in parte
 aut etiam iuxta articulum & non in medio membri exis-
 tit, post articulum fasciam inicere expedit. Recentiores
 itaque secundum deligaturam protinus ferulas etiam
 iniiciunt, ut adaptationis figura contineatur, constringen-
 tes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione po-

stulat: ueteres autem, à die septimo ferulas accommo-
darunt, nam intra hunc inflammatione declinante mem-
brum redditur tenuius. At Hippocrates tertio die liga-
menta solui iubet, ne tensio quæpiam, aut motus præ-
ter solitum contactæ particulæ obueniat, aut eius quod
iam infixum fracturæ est, perspiratus prohibeantur, pro-
pter quos non solum noxius pruritus quibusdam acci-
dit, sed etiam erosa à saniei acrimonia nonnunquam cu-
te, exulceratio concitatur. Itaque aquæ temperatæ tan-
tum superfundere ratio est, quantum saniem discutere
sufficit. Post septimum diem, ex maiore interuallo solue-
re conuenit, ceu partes non amplius saniem excernere
desiderent, imo etiam calli obfirmatio hoc modo felici-
us prouenit. Cæterum ferulæ iuxta sequentem ratio-
nem debent iniici. Splenia triplicia oleo imbuta super
fascias circundantur, si igitur membrum crassitudine fue-
rit æquabile, similiter: si inæquale, partibus magis conca-
uis per splenia repletis, æquæ crassitudinis membrum
ferulis accommodandis efficiemus. deinde lana aut
stuppa ferulas mediocriter inuolutas, in orbem fracturæ
circundamus, non minore quàm digiti spatio inuicem distan-
tis, easque moderate constringemus: ita tamen, ut quate-
nus fieri licet articulum propius accedere ferulas prohi-
beamus, præsertim iuxta interiorem flexus partem. ul-
cera siquidem in ipsis nonnunquam & neruorum infla-
mationes pariunt, uerum illic laxiores ipsas esse oportet,
quemadmodum ualētiores, ubi fractura curuatur. Præ-
stiterit autem thoraci etiam brachium mediocriter colli-
gare, ne ipsum loco motum, figuram peruertat. At si quæ-
doque inflammatio fuerit, (eam uero agnosces ex ambi-
te tumore ac rubore, & quod membrum nunc multo
magis quàm prius stringatur) uel si contrafactum mem-
brum distortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamē-
ta laxa, uel e contrario strictiora, quàm par est, inuenian-
tur, solutis ipsis deligatura instauranda est. Resus-
pinari igitur ægrotus debet, ita ut super stomachum

PA VLI ÆGINETÆ

manum contineat: brachio subiicietur molle aliquid pellem super se habens, ut superfusionum influxus excipiat. Superfundetur autem quotidie oleo calido, præsertim quum urget inflammatio, quando etiam cibus tenuis exhiberi debet: postea mediocris, ad calli generationem, quies indicitur usque dum fracta occalluerint, occallescent autem brachium & tibia, diebus circiter quadraginta, post quos ubi solueris fascias, & lauacro usus fueris, emplastris ad fracturas factis persanare conuenit, hæc tractandiratio omnibus aliis prope modum confractis artubus conuenit.

DE CVBITO ET RADIO.

Cap. C.

Cubitus radiusque, interim uterque iuxta eundem locum frangitur, interim alter duntaxat, uel in medio, uel in parte qua gibberum spectat, aut brachiale. Omnium itaque deterrimum est quum ambo eadem parte franguntur, deinde etiam cubitus solus. At radius fractus, aliis facilius curatur, siquidem maior cubito non est, sed illum ipsum subiectum habet, ut ueluti in fideat. Porro si ipsorum alter duntaxat fractus fuerit, in illo maxime intentionem ualidam moliemur: si uterque, similiter intendemus manu anguli modo figurata, ut pollex omnium digitorum altissimus, exiguus digitus humillimus habeatur, sic enim cubitum radio subiici continget. At si ualentiore opus sit intentione, ambobus potissimum confractis, non solum manibus, sed etiam funibus intendere aggrediemur, ut in capite de brachio comprehensum est. Cæterum omnis deligatura, & reliqua præsidia unà cum ferularum iniectione, hic adhibenda sunt, dum callus eos firmarit. Firmatur autem cubitus diebus plurimum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei, quam brachium fractum uendicat, præter ea quæ ipsi subiiciuntur.

DE SVMM A MANV, ET ipsius digitis. Cap. CI.

V Olæ & aduersæ eius partis, & in digitis articulo-
rum ossa, quum laxa fistulosaq; natura sint, con-
tunduntur quidem pierunq; raro autem fran-
guntur. Aegro igitur in alto sedili collocato, medicus
5 in altero quodam æquali aduersus sedebit, priusq; ma-
num disponat: ac tensis per ministrum iis quæ fracta
sunt, duobus digitis ipsa conformabit, pollice & indice
digito prius compressa. deligatura utetur, quo tempore
urget inflammatio. Nam propter laxitatem facile in ip-
10 sis callus amplior concrevit. At si acies digitorum, aut
digitus simpliciter confractus est, si quidem magnus &
pollex appellatus fuerit, post commodam deligationē
ab inferiore parte, ipsum utiq; cum manu ligabis, ne dis-
moueat: si ex aliis quispiam, uel index uel paruus digi-
15 tus, proximo colligabitur: sin aliquis ex mediis, iis qui
utrinq; habentur, uel etiam omnes deinceps ligari una
debent, melius enim conquiescunt, quemadmodum si
etiam ferulis fracti colligentur.

DE FEMORE.

Cap. CII.

20 **E** Adem de femore dicenda sunt, quæ de brachio
prodidimus. peculiariter autem magis femur fra-
ctum, in anteriorem partem & exteriorē promou-
uetur, etenim in his naturaliter dilatatum est. instauratur
autem manibus, funiculis, & antennis æquivalentibus,
25 una, supra fracturā posita: altera, subter. Quod si in par-
te fractura euenerit, idq; iuxta femoris caput, dimidio fa-
sciæ lana circumdato, ne corpora incidat iuxta inguina di-
sponemus, & initia ad caput reducta, famulo ut partem
contineat, trademus: infra autem fracturam fune circum-
30 posito initia ad intentionē alteri ministro exhibebimus.
Quod si ad genu fractura habeatur, funem sanè supra
fracturam iniicimus, initia eius ad eleuationem dispensa-
mus, genu etiam ipsum implicito quodam fune contin-
nemus hanc autem partem restituiamus aegro decumbē-
te, & crure exporrecto, quæ pungunt ossa ut subinde di-
ctum est, eleuata, superius tollemus, reliquam curationē

PAULI AEGINETÆ

in capite de brachio exposuimus. cæterum callo firma-
tur femur quinquaginta circa diebus. At quomodo
reponi debeat, post totius cruris disciplinam, compres-
hensum est.

DE PATELLA. Cap. CIII.

Patella os laxum est ac molle, ualide corporibus
superiore & ima parte comprehensum. frequen-
ter sane contunditur, raro autem frangi solet. susti-
net autem rupturam per crassitudinem, & in tenuia frag-
menta finditur, cum uulnere, uel sine uulnere. Nota ue-
ro conspicua (motus enim sublabitur,) continuitatis, &
cauitas & sonitus. Instauratur autem pars cruris exten-
sa nam tam diu bifariam fissa digitis committitur, donec
fracturæ labra supra sese contingant, & inuicem iungan-
tur: quæ in tenuia fragmenta fissa est, manu cōformatur.
etenim callo non generato, eo quod pars utraq; super
musculos neruosq; cognatos à femore & tibia non re-
trahatur, tamen multa distentio contrahet & functionis
difficultatem affectis inducet. neq; enim laborantibus
ipsis largius genu sustinet, & obambulando impediuntur
præsertim ascensuri, siquidem in æquabili motu actio-
nis difficultas occultatur: in pausatione autem, eo qd nō
inflectatur genu, in cruris initio, & situ deprehēditur. atq;
hic ossiculum pungens eleuatum ubi exemeris, curatio-
nem sequentem admouebas.

DE TIBIA. Cap. CIIII.

Tibia cubito respondens eandem curationem
obtinet, etenim illa duobus ossibus fulta, altero
crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex si-
militudine perone Græcis, quasi fibula, Latinis sura dictū
easdem fracturarum differētiās recipit. in omnem enim
partem prolabitur, quum ambo ossa confracta fuerint:
in treis autem, quum alterum, intra & extra: tibia quidē,
retro: sura, antè. quapropter etiam ipsa similiter resti-
tuitur manibus, aut funiculis superioribus, q̄ fracturæ suo-
res sunt, interim ipsi tibiæ circumdatis, interim femori.

Nam quum genu sit ualidius, articulum integrum per-
tentionem seruabimus. Similiter & inferiore fracturæ
funiculo, ut in cubito dictum est: reliqua ut in capite de
brachio tradidimus.

DE PEDE SUMMO. Cap. CV.

T Alus nequaquā frangi solet, eo quod undequas-
que tibia, sura, & osse quod ob tessaræ similitudi-
nem uocatur cyboides, custodiatur muniaturq;.
At os quod à scalphæ figura dicitur scaphoides, & sus-
pernæ pedis regionis, item pedis digitorum ossa, ip-
sumq; cubicū, similiter iis quæ in uola & opposita eius
parte manusq; digitis sunt, franguntur: quare etiam quæ
de illis diximus, ne eadem repetantur, illinc huc transfer-
re consilium est.

QVOMODO CRVS REPO-
ni debeat. Cap. CVI.

F Emore fracto, aut tibia, non minori cura repositio-
nem ipsius, q̄ reliquam curationem obibis. Nam
partium cōfractarum æqualitas, hac potissimum
probe administrata, conseruatur. Nonnulli igitur canali,
quam solenam Græci dicunt, nūc lignea, nunc fictili mē-
brum fractum, aut etiam crus ipsum reposuerunt: alii ue-
ro sola ea quæ cum uulnere fracta sunt, eo quod hæc
ferulis nequeant constringi, in totum uero solenarum
usum posteriores damnarunt, multis sane de causis, sed
præcipue, quod ipsarum duritia partibus negotium fas-
cesseret. Neque tamen alienum est, artus cum uulnere
fractos ferulis excipere, ut ostendemus. Aeger itaque
resupinabitur, ac indumentum aliquod crassum cruri
æquale, in longitudinem utrobique contractum & in-
uolutum, ut canali per mediam concauitatem oblongam
proportionem respondeat, subiicietur: pellis super
ipsam molliuscula explicabitur, quæ superfusiones ex-
cipiat, deinde in longum crus concauitati huic canale-
referenti, insinuabitur: à lateribus alia uestimenta la-
næ apponentur, ne membrum in latera declinet,

PAULI AEGINETÆ

pedis autem ima pars asserculum rectum panniculo
circundatum, propter mollitiem assumet, ac maioris
securitatis gratia, media fasciarum duarum triumve,
uestimento canalis modo præparato subiicientes, fractum
membrum ipsi leuiter deligabimus. At si æger non
tolerans conetur pedem totum contrahere, conuenit id
facere quod in superiore pedis parte dictum est, deinde
blande cum asserculo deligare, ne inuiti inter dormiens
dum, ut uerisimile est, pedem contrahant. Aliqui uero et
stragula lecti per medium pertundunt, ut ipsi sint immo
biles, & per foramen urina & stercus reddatur, usque dum
callus coalescat.

DE FRACTURIS QUÆ CVM

uulnere incidunt. Cap. CVII.

Fractura cum uulnere facta, si quidem sanguis pro
fundatur, hunc prius sistemus: si inflammatio fue
rit, præsidis in eam efficacibus utemur. Carnibus
contusis, partem affectam scarificabimus, metu, ne in gra
uissimam incidat, sublato: at si illa quoque accesserit, aut
alia quæpiam serpens putredo, conuenienter occurre
mus, habes autem horum singulorum curationem quar
to uolumine explicitam. At si nihil horum adfuerit, ne
que ossa largiter denudata sint, hamulis futurisque; usi, res
medio cruentis apto, his medebimur, sic, ut ossicula res
fracta, ut uerisimile est, & pungentia implentiave primū
auferamus. Quod si magnum aliquod os emineat non
commissum propter magnitudinem, in intensione huic
prospicies. Siquidem Hippocrates femore & brachio
confractis ossa excidentia uniuersim imponere dehorta
tur, periculum his futurum prædicens ex inflamma
tione, quam tensio crearet, uel etiam conuulsione,
ut credibile est, musculorum neruorumque. Tempus
uero nonnunquam administrationem commodam
inuenit. In quocunque igitur osse elapso tractationem
molimur, nequaquam in inflammatione ipsam aggre
diemur, sed primo statim die antequam inflam

tione occupetur: aut nono, inflammatione iam finita.
 Adaptamus uero serula quam Græci mochliscon uo-
 cant, est autem q̄a instrumentum ferreum septem octo
 ue digitos longum mediocriter drassum, ne inter com-
 mouendum inflectatur, acutum in summo latumq̄, &
 leuiter inflexum, cuius acutum extremum superposito
 ossis tuberculo subicientes, iuxta alterum occurrentes
 simul, & mediocri intensione membri facta: inter se sine
 is fracturæ committimus, quod si facere nequeamus,
 scalpris excisoriis obseruas acies habentibus quod emi-
 net auferemus, aut serra subsecabimus, quemadmodū
 in fistulis docuimus: ossiumq̄; asperitudine adæquata,
 & membro directo, linamentis curabimus. Maxime au-
 tem animum adhibere oportet in membris coniunctis,
 aut disiunctis appellatis, altero autem in ipsis osse parti-
 culatim serra absciso, ut membrum incontractum ma-
 neat: etiam intensione accurata utemur. deligatura uero
 hoc modo adhibenda est. Circulares itaq̄ fasciæ. parti-
 bus uulneris utrobique iniici debent: obliquæ uero, per
 ulceris longitudinem, ut iuxta hiatum occlusio ex omni-
 bus fiat. Si sordidum adhuc ulcus est, purgantia adhibe-
 bimus: si purum, quæ carnem inducunt, linteolis illita,
 aliamq̄; comprobata usu materia. Hippocrates pīso
 sera emplastro in linteolis utitur, id autem esse dicunt tes-
 trapharmacum basilicum. Vbi caro increuerit, ferulæ
 inficiuntur, aliqui uero per initia ipsa accommodant, ulce-
 ris locum uitantes, & pro usu urgente ipsas constringen-
 tes, uel rursus remittentes. In quibus autem squama res-
 pletura est, notabimus q̄dem hoc, inde quod copiosus
 humor & tenuis excernatur, caro autem ulceribus uas-
 tua inanisq̄; facta attollatur: deligatura quidem laxiore
 ad curationem utemur, hamulo autem, aut eiusmodi
 quopiam squamam euellentes, iterum ualidiore deliga-
 tura utemur. porro per totum ulceris tempus, medica-
 men aliquod ex iis quæ inflammationem arcent linea-
 mentum continens, uulneri incumbet, ac simplices fa-

PAULI ÆGINETÆ

sciz inuicentur, quæ singulis curationibus solui debent, quum aliæ supra dictæ maneant, ut in capite de brachio expositum est.

SI PRÆTER MODVM FRA

cturis callus obducatur. Cap. CVIII.

Immodici fracturarū calli indecoram omnino speci-
em efficiunt, nonnunquam etiam functiones impe-
diunt, si propter articulum coaluerint. Si igitur recēs
adhuc callus coierit, remediis admodum astringentibus
utemur, fasciis ipsa aprimentes. Nonnunquam uero &
plūbea imposita lamina, id quod requiritur effecimus.
At si lapi sossus solidusq; fuerit incidentes ipsum rades-
mus, id quod eminet scalpris auferentes: si res exigat,
etiam terebris usi.

SI DISTORTVM MEMBRVM

callus firmarit. Cap. CIX.

Quibus membrum distortum, callus firmauerit,
difficultate functionum obeundarum haud
exigua subsequēte, præsertim si in pedibus fue-
rit, repositionis quidem modus non recipiendus est, ut
qui extrema inferat discrimina, uerum si callus nondum
radices egerit, laxatibus superfusionibus, & cataplasma-
tis ex ficis pinguibus & columbarum stercore, aliisq;
medicamentis quæ a callo soluendo porolytica dicun-
tur, utimur. In super per manus frictione, & confractio-
ne hunc dissoluemus. Quod si lapidosus euaserit, calo-
pello superficie diuisa, excisoriis scalpris consortium of-
se liberabimus, deinde fracturæ medebimur, ut superius
à me dictum est.

SI FRACTVRÆ CALLO NON

firmentur. Cap. CX.

Fracturæ nonnullæ sine callo permanent, supra de
finitum naturæ tempus, aut ob continuas resolu-
tiones, aut immodicas superfusiones, aut motum
intempestiuum, aut fasciarum copiam, aut quia totum
corpus alimentum non percipit, in quibus etiam tenuis

ius fieri membrum contingit, itaq; cum alias occasiones
tum corporis inedia tollere conandum est, partim
per calidiora alimenta materiam particulæ distribuens
do, partim cibum subministrando sufficientem, item la-
5 uacra, & reliquas animi uoluptates. Porro notæ eos qui
callo iam firmantur comitantes, hæ inter alias sunt præo-
cipuæ, si fasciolaræ cruorem referant, etiam non oborto
uulnere, quod forsan accidit, calli substantia quando con-
lescit fistulis osiū insplas sanguinis guttas extundente.

DE OSSIBVS LUXATIS.

Cap. CXI.

QUum luxationes fracturis proxime sint, de iis
uerba facere aggrediemur. Luxatio igitur est,
ut summam dicam, quum articulus à proprio
15 sinu, ad insolitum excidit, in qua motus arbitrarius im-
peditur. differentias ipsius alias dicere nō habemus, nisi
eā dūtaxat q̄ ex maioris minorisq; ratione sumitur. quū
enim articulus in totum exciderit, communi generis uo-
cabulo affectus Græcis exarthrema, Latinis luxatio dici-
20 tur: quum autem aliquatenus duntaxat emotus est, aut
usque ad tuberculum è sinu elapsus, pararthrema.

DE MAXILLA INFERIO-

re.

Cap. CXII.

RVSUS à superioribus incipiētes de inferiore ma-
25 xilla dicamus. Nam quum superior sit immo-
bilis, luxatione non periclitatur, inferior aut tota
loco non mouetur, quod capita ipsius superiori maxillæ
firmiter ac tuto insinuata sint: modicā uero peruersio-
nē quā pararthrema uocauimus, subinde experitur, qđ
30 ob musculos qui ipsam continent ex continuo madēdi
loquēdiq; exercitio in mollitiem elanguescenteis, quæ
libet de causa facile laxetur, quod uerbum apud Hippo-
cratem *σκαρτα* dicitur, in quibus sine aliqua difficultate
articulus sponte in proprium locum. reuertitur ue-
35 rum de maxilla in totum luxata, satis est illius uer-
ba exponere, quæ compendiosa, integra & perspicua

sua existunt. Scribit itaq; hunc in modum. Excidit quis
 dem maxilla raro, laxatur autē subinde oris hiatu, quo
 modo etiam aliæ plures musculorum immutationes
 neruorumq; id efficiunt. Clarum itaq; hinc potissimum
 est quodcumq; exciderit. Nam inferior maxilla in an
 teriora propellitur, & ad contraria eius unde prolapsa
 est, peruenit, ossisq; tuberculum iuxta superiorem mas
 xillam tumidius apparet, difficulter egri maxillas com
 mittunt. Talis autem repositio manifesto ipsis congruit.
 alium enim continere caput oportet, alium comprehen
 dentem ab interiore parte & exteriorē digitis iuxta mē
 tum hiantē hominē quantum potest, primum quidem
 maxillam commouere, temporis interuallo huc illuc
 manu diducere, ipsiq; hominē iubere ut laxam maxillā
 habeat, simulq; diducat & concedat, ut potissimum rez
 pente laxetur, tribus figuris simul, mente adhibita. Ra
 tio siquidem est illam ex inuersione in naturalem statu
 tum reducere. Oportet autem inferiorem maxillam po
 steriorem propellere, item maxillas committere neq; hias
 re. Insectio igitur hæc etiam in aliis figuris fieri non po
 tuerit, medicina autem modica sufficiat, splenium appo
 situm ceratum fascia laxiore deligare, tutius autem est, re
 supinato hominē firmare caput ipsius puluinis subies
 ctis, quam plenissimis, ut quam minime cedat. Cæterū
 uulnerati caput aliquis continebit. Si autem utraq; maxil
 la eluxata fuerit, curatio quidem hæc adhibebitur. Com
 mittere autem æquale hi os possunt, etenim prominen
 tiores ipsis maxillæ sunt, rectitudinem autem maxime
 cognosces, dentium & superiorum & inferiorum termi
 nis, quos secundum ordinem confert quam citissime in
 ferere, quomodo autem inferentur, expositum est. Si autē
 periculum de anima non inciderit ex febribus continen
 tibus, & torpido Caro, musculi alterantur, & p̄ter natu
 rā intēduntur, uēter solet his biliōsa deicere, uel syncera
 pauca, & si ētuomant, indiscreta eiiciunt, hi igitur & mo
 riuntur, at hoc potissimū modo iniectionis nos subinde

usi sumus, fomentis prius ex hydrelæo calido per spon-
giam super luxatam genam adhibitis, quum maxime
contumaciter ingressui repugnet, homine humi collo-
cato, post ipsum nos sedentes, quemadmodum ab Hip-
pocrate traditum est, operamur.

DE CLAVICULA ET SUM-
mo humero. Cap. CXIII.

Clavicula in partem internam non excidit, ut
quæ pectori committatur. unde ne mouetur quis-
dem in ipso. At si uiolento quodam ictu & acti
extrinsecus auellatur, quemadmodum fractura ipsius,
instaurari debet. Pars autem quæ humero inseritur, non
admodum, sanè excidit, a bicipiti musculo summoq;
humeri tuberculo prohibita. imo neq; uiolento quodâ
motu clavicula priuatim agitur, nisi propter solam tho-
racis factam separationem. Vnde homo solus inter ani-
mantia clauiculam obtinet: quam si in palæstra, ut ueris-
mile est, perueri contingant, conformatione per ma-
nus dirigitur, & spleniis multiplicibus accommodatis
una cum deligatura decenti, eadem curatione etiam
summus humerus peruersus in propriam sedem reuer-
titur. Est autem osficulum cartilagineum quod clavicu-
lam scapulis colligat, si resiccatis mortuorum cadaueris
bus occultatum, quod loco motum, imaginem imperis-
tis exhibet, brachii caput excidisse. etenim in hoc exte-
rior humeri pars acutior apparet: concauum aut, id uno
de excidit. uerum notis quas deinceps subiungam ipsa
discernentur.

DE HUMERO LUXATO.

Cap. CXIII.

Brachii caput scapularum sinui insertum, excidit
quidem frequenter, uerum neq; in superiorem
partem, ut quod scapularum processus ancoræ
similis impediatur: neq; in posteriorem, propter ipsas sca-
pulas: neq; tamen in anteriorem, ob muscoli bicipitis
tendinem, ipsumque humeri tuberculum. Sed raro qui

PAULI ÆGINETÆ

dem internam internamq; prolabitur, continua ue-
 ro, præsertim macilentioribus, ad ima atq; his sanè faci-
 le & excidit & rursus inseritur: multa autem carne præ-
 ditis contra, raro quidē elabitur sed ægre in sedem suā
 compellitur. Quibusdam itaq; etiam non luxatis, ex
 ictu frequenter elapsi loco membri suspicio oritur, eo
 quod ualida inflammatio subsequatur. Porro quibus in
 imam partem luxatus humerus est, hoc modo agnos-
 ces: affectus humerus si cum sano conferatur multum
 differt, quum exterior eius pars unde excidit concaua
 appareat, ut in tuberculo humeri eluxato diximus,
 quod acutius quā naturaliter esse debet apparet, & bra-
 chii caput elapsum in alam manifesto subsidit, ac manus
 nus huius cubiti gibber à costis magis recesfit, quibus
 quidem costis si ipsum adigas, cum dolore admouetur,
 neq; ægri manum extenso cubito ad aurem possunt re-
 ducere, neq; alium motum multiplicem per eam moliri.
 In pueris itaq; uel in quibus recens nec ampla facta
 est eluxatio, etiam nodo medii digiti flexi eminente me-
 dici manus, uel affecti sanæ, si non puer, sit frequenter
 restituta est, ut inquit Hippocrates. ualentius autem hoc
 modo luxata inseruntur. Homo lotus & supfusionibus
 laxandi uirtute præditis usus resupinari humi debet, &
 pila mediocris uel coracea, uel alia quæpiam non ad-
 modum mollis, alæ accommodabitur, ac sedens medi-
 cus aduersus ægrum, iuxta latur affectum, siquidem dex-
 ter humerus luxatus sit, dextri pedis calcem superponet
 pilæ alæ suppositæ: si sinister, sinistri, ac affectam manum
 prehensam ad pedes trahet, simulq; calcaneo alam in
 diuersum propellet, ita ut aliquis post caput ad alterum
 humerum resistat, ne corpus circum diuellatur. Est &
 alia ratio immitendi, quæ humero subnixo perficitur,
 quod Greci κατὰ πλάγαν dicunt. Adolescens, aut longior
 ægrotante, aut altius consistens iuxta affectum latus,
 ægri indidem collocati alæ suum ipsius humerum subii-
 ciet, & manum eleuatam ad uentrem suum attrahet, ut

reliquum ægri corpus posterius imo maius sublimè pē
 deat. At si æger leuior fuerit, alius quispiam puer leuis
 ex ipso suspendetur. Nam manu ac reliquo corpore in
 contraria detractis ad ima, subiectus alæ humerus faci
 5 le elapsum articulū reponit, atq; hoc etiam spathula q̄
 Græci hyperon dicunt efficitur. Est autem lignū oblō
 gū, rectum, quod in pauimento super aliud quoddā so
 lidum ponitur. huius igitur summum extremum rotundū,
 quod non admodū crassum neq; tamen tenue est,
 10 alæ ægri aut stantis, aut sedentis, subiicietur, iuxta totam
 ipsius longitudinē, ac manu per spathulā porrecta & de
 tracta, reliquo autem corpore contra inferius uergente
 uel sua spē, uel alio quodā trahente restitutio fiet, atq;
 hoc etiam in scalæ gradu fieri debet, quemadmodum
 15 in confractō brachio per tensionē fieri dicebamus, hic
 autē rotundū quoddam corpus super gradum deligas
 tur, quod ægrotantis alæ possit adaptari & brachii cas
 put propellere. Porro si ob uetustatem affectus, aut cor
 poris durtiē, repositio nobis facessat negotium, utemur
 20 etiam ratione quæ per amben appellatam sit. Est autē
 ambe lignum quod longitudinem duorū cubitorū ha
 bet, latitudinem quatuor digitorum, crassitudinem instar
 digiti, alterum extremum rotundū, quod etiam promp
 te in alæ sinum ingreditur, spathulæ lignæ extremo
 25 consimiliter. hoc itaq; extremum panniculo circumdatū
 quo lenius existat, capitulo brachii iuxta alam accom
 modabimus, totam uero manum ad lignum intensam
 cum eo deligabimus, iuxta brachium, cubitū, & eius ex
 tremum. deinde ligno obliquo inter duas columnulas
 30 rectas adaptato, uel rursus supra scalæ gradū manu traie
 cta cū ligno, ut ala p̄ trāuersum gradui accommodetur,
 manū infra trahētes, sinemus in alterā partē reliquū cor
 pus in sublimi pendere. tūc, n. articulus ingreditur.
 Vbi fuerit repositus, mediocris ex lana pila si qdē inflā
 35 mationē pars nō sentiat, sicca, si sentiat, oleo madēs alæ
 iniecta, deligabitur. p̄ hāc autē & humeri & alterius alæ

PAULI AEGINETÆ

iuxta hiatū præsertim fasciæ deligaturis apparentibus, ut
hiatus affectū humerū excedat, brachiū cū costis deliga
re conuenit, ipsumq; cubiti gibberum & summam ma
num ex ceruice deuincire, ne rursus de integro articulus
excidat. Post septimum diem uel tardius ubi fascias dis
solueris, mediocri uti frictione prestat eo quod corpore
solidiore factō, articulus ita firmetur, ut non facile prola
batur. Quod si autem cerebro prolabor, autem huius
modi tatis uitio, aut ob aliam quampiam iam diu factā
elabendi uiam, ad uisionem ueniendum est, sicut supra
comprehendimus. Quum autem uel in antibus in ute
ro aut editis in lucem adhuc increſcētibus, particula fue
rit luxata necdum reposita, in humero quidem carnes
nihil à naturali figura deficiunt, necpenim manus quod
cunque opus perficere impeditur, os autem brachii bre
uius permanet, non auſcens, ac tales nominantur ga
llancones. In femore etiam os incrementum non sentit
& totum crus contabescit, quum enim pondus corporis
ferre nequeat, non exercetur, ac in aliis membris lux
atis manentibus, quæ subiciuntur, omnium iniuriæ ex
posita sunt.

DE CUBITI GIBBERO.

Cap. CXV.

Quanto cubiti gibberi articulus humero magis
uarius creatus est, tanto plus negotii prolapsus
exhibet: & tardius quidē excidit, sed difficilius
reponitur, propter tuberculorum sinuumq; frequētiā.
Nonnunquam igitur solum aliquatenus detorquetur,
quem casum pararthrema dixi, sæpe uero etiam ex to
to in omnem partem prolabitur, præcipue in priorem
& posteriorem, quod facile dignoscitur, eo quod exci
dit oculis & tactui obiecto, ex quocunque prolapsum
sit, & sinu unde excidit apparente. Hæc uero potissimū
sani gibberi inspectio coarguit. Conuenit autem protis
nus membrum reponere priusquam inflammatione
occupetur: siquidem eam expertum, difficulter curatur.

Quædam

Quædam etiam nullam prorsus curationem recipiunt, maxime si in posteriora prolapsa sint. Hæc enim luxatio omnium quæ in cubiti gibbero sunt maxime dolorifica est, & periculosa. Quod si modice articulus in uersus sit, moderata etiam intensio restituitur. sic ut ministri manum exporrectam iuxta brachium cubitumq; contineant, & in aduersa retrahant, medicus autem suæ manus palma quod excessit in suam sedem compellat. Hippocrates autem, in priora luxationem subito manus inflexu instaurat: ut palma ipsius humerum iuxta rectum pulset: in posteriora uero, subita rursus & diutius facta extensione, quoniam luxatio in priorem partem, uiolenta potissimum extensione efficitur, quæ in posteriora flexu similiter uehementi. Quod si luxatio perseueret, etiam ualidam magis intensioem usurpabimus, eiusmodi uero est potissimum quam Hippocrates in brachio con fracto exposuit, ubi columnulam adhibeat. Porro recentiore aliqui hunc in modum adaptant, ministris duobus manum, ut dictum est, intendentibus, ita ut alter sursum ad axillam contineat, alter deorsum iuxta brachiale, medicus aduersus ægrotanti consistens, duabus palmis iuxta articulum, brachium circundat, ac ubi iusserit uestimentum contractum in oblongum uel latam fasciam manibus ipsius simul & ægrotantis brachio circundare, & in exteriora ima; propter summam manum retrahere, ipse deinceps cū tensione constrictas ipsas trahit, donec cubiti articulum excedat. Cæterum manus prius oleo illini debet, ut lubrica fiat & facile medici palmis deducatur. Sic enim prolapsa, si pertrahentium manum ui prematur, in propriam sedem reuertuntur. Postquam sunt reposita, in anguli modum figurata manu expleniis & conuenienti deligatura curationem petemus.

DE BRACHIALI ET DICTIS
luxatis. Cap. CXVI.
PAV. ÆGIN. MM

PAULI AEGINETAE

B Rachialis digitorumq; luxatio nullum facessit negotium, per se, nisi cum ulcere facta fuerit. de hac igitur in capite de luxationibus quæ cum ulcere sunt tractabitur. At sine ulcere luxatis, mediocri intensione, & remediis quæ inflammationem pellunt, medebimur.

DE VERTEBRIS SPINÆ.
Cap. CXVII.

Vertebræ spinæ si ex toto prolabuntur exciduntq; præcipitem mortem inferunt. Medulla siquidem ipsius spinæ uel quamlibet compressione non sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si contundatur, hominem in periculum perducere sufficit. Peruersionibus autem subinde affligitur, nunc in priorem partem distorta, ac uitium lordosin Græci appellant: nunc in posteriorem, & cyphosin à loco gibbato uocant: interim uero in latera, quod scoliosin nuncupant. Quum igitur multæ simul uertebræ in arctissimam peruersæ fuerint, plurium simul peruersio apparet, iuxta circumflexam flexus rotunditatem facta, ac putant nonnulli decepti, ab una uertebra ampliter peruersa id fieri. Nam magna distortio non angulo similis hunc spinæ flexum molitur, quando etiam magis periculum subsequitur. Si igitur introrsum spina est peruersa, restitutionis spes nulla est eo quod per uentrem, antè oppositio fieri nequeat, qui enim in scala sic affectos intendunt, aut cucurbitulas admovent, aut sternutamenta aut tusim aut flatus excitant, quid tandem promouere putati sint, Hippocrates abunde coarguit. Quoniam uero subinde cuiusdam osculi spinæ refractio facta, cauum locum ostendit, quemadmodum in capite de fracturis comprehensum est, aliqui uitium lordosin esse crediderunt, deinde hoc celerius persanato (prompte enim callo firmatur) lordosin curatu facilem existere pronuntiant, & si nullam curationem admittat aut certe diffi-

culter . his etenim urina supprimitur, aluus non respon-
 det, corpus inhorrescit, postea etiā sine uoluntate excre-
 menta prorumpunt . Hæc autem eueniunt, neruis &
 musculis consortii lege lacesitis, ac celeriter ægri mo-
 riuntur: præsertim si superiores & ceruicis uertebra: af-
 fectum fuerint expestæ. Cui uero iam inde à paruulo
 potissimum uertebra: gibbata: protuberant, uitium lon-
 gum esse neq; celeriter mortem sed morbum accersio-
 re, & insanabile Hippocrates prodidit . At quibus res-
 10 cens hic gibber ex casu prouenerit, machinæ quidem
 per scalam & rectam ægri, suspensionem ac uteri inflas-
 tionem adhibitæ, ridiculæ sunt. sola autem Hippocra-
 tis adaptatio sufficiet . Conuenit enim, inquit, lignum,
 magnum quod tanta longitudinem ac latitudinem ha-
 25 beat, ut hominem excipiat, aut scamnum huic æquale
 prope parietem deponere, ac iuxta hunc ita extendere,
 ut in longitudinem pede non amplius absit, & uestimen-
 ta quædam super ipsum explicare, ne hominis corpus
 infringatur, (erit autem hic lotus antequam super li-
 20 gnum scamnum ue, insideat,) deinde loro pectus ipsius
 bis circumdatum, per alas iuxta deorsum uincire, initia
 lori ligno oblongo pistillo simili deligare, atq; hoc sus-
 per pauimentum iuxta ligni aut scamni subiecti extre-
 mum constituere, & ministro post ægri caput stanti ex
 25 superiore parte continendum tradere, ut imo quidem
 extremo contra fixo, altiore supra caput tracto, oppor-
 tuna fiat intensio: altero autem loro pedes simul & su-
 periores malleolorum partes deligantes, & rursus alio,
 30 ea quæ inter coxas & lumbos habentur, cōmissura, hu-
 ius inibi facta, iterum fasciarum extrema coniungemus
 alii autē ligno pistillo respondenti similiter prædicto illi
 gâtes, statuemus in ligni aut scamni extremo pedes spe-
 ctanti pistillum iuxta prioris similitudinem, deinde famu-
 35 lis iubebimus ut per ligna retractionē in diuersa moli-
 antur. Quidam uero a fellis dictis hanc efficiunt. sunt au-
 tem hi axes qui contra rectum lignum uertuntur: utroq;

PAULI ÆGINETÆ

huius magni ligni aut scanni latere iuxta extrema ad pedes caputq; sita lora defiguntur. Quum autem sit intensio ipsa administratur, manus palma gibberum constringemus: si autem usus postulat, etiam super ipsum infidebimus, nullum ueriti periculum. At si ne sic quidem spina istauretur, & æger pressionem ferat, utile est parietem adiacentem in longum canalis modo exculpere è regione gibberi, ut sculptura cubiti longitudinem habeat, neq; altior sit ægrotantis spina, neq; multo humilior imò sculpturam prius præparatam esse oportet. huius enim causa etiam lignum ab initio prope parietem poni maluimus. deinde asseris mediocris alterum finem ad ima comprimemus, donec sensibilibus spina dirigatur, uerum ut inquit Hippocrates, sola intensio citra asserem, rursusq; per asserem sola curatio, id quod requiritur potest efficere. Quod si hoc uerum est, non alienum etiam in lordosi & scoliosi per initia intensiōem prædictam, sine constrictione uidelicet, moliri, post adaptionē, lamina lignea quæ latitudine treis digitos æquet longitudine gibbero respondeat & aliquam ex sanis uertebis comprehendat, loro lineo aut stuppa propter durtiem inuoluta, uertebis ipsis imponi & conuenienter deligari debet. uictus adhibebitur tenuis. At si post hæc quædam gibberi reliquæ remanserint, laxantibus emollientibusq; remediis cum laminæ appressu, per diu utendum est. aliqui uero plumbeam laminam usurparunt.

DE COXA LUXATA.

Cap. CXVIII.

Quum alia corporis ossa interim peruertantur, interim toto loco excidant, coxæ humeriq; articulus solus ei luxationi opportunus non est, quia tota sede promouetur, atq; ex his magis coxæ articulus. quoniam sinum & rotundum & profundum possidet, ad hæc, quod altioribus tuberculis munitus sit, At

si quandoq; articulus ob uim quandam uehementem
 sinu suo exciderit, etiam multæ luxationis iuxta minoris
 maiorisq; rationem differentia: proueniunt, quatuorq;
 modis imo locis coxa luxatur, uel enim in interiorem
 5 partem, uel exteriorē, uel priorem, uel posteriorem,
 prolabitur: uerum intro quidem & extra continue, &
 multo frequentius intro: in anteriora autem & postero-
 ra, rarius. Quibus, itaque in interiorem partem coxa
 prolapsa est, iis crus affectum si cum sano conferas, lon-
 10 gius spectatur, & genu prominentius, & ad inguina crus
 inflectere nequeunt, & iuxta penem tumor manifestus
 occurrit, tanquam femoris capite illic desidente. Quo-
 bus autem in exteriora promota est, iis contraria: notæ
 eueniunt, siquidem crus breuius apparet, & iuxta penē
 15 regio in sinum dehiscit, clunes inturgescunt, & genu inte-
 rius demergitur, crus inflectere possunt. Si in prio-
 rem partem prolapsa est, crus sine dolore genu exten-
 dunt, non autem ad interiorem partem inclinare pos-
 sunt, incedere conantes, urina his supprimitur, inguina in-
 20 tumescunt, nates rugosæ excarnesq; apparent, calci in-
 ter ambulandum innituntur. Porro quibus in postero-
 ra excidit, non aut poplitem, aut genu extendunt, neq;
 inflectere prius quam inguina possunt, atq; his crus bre-
 uius, inguina laxiora apparent, & per nates femoris ca-
 25 put eminet. Quibus sane iam inde à pueritia, aut certe
 longiore temporis spatio articulus prolapsus curæ non
 fuit, etiam præsidium nihil promouerit, membro iam in
 orbem coacto. Quibus autem continenter excidit, hi
 curationem Hippocratis assument, quapropter statim
 30 reponi luxata debent uetustæ siquidem coxæ luxatio-
 nes, nullo modo conulescunt. Communiter itaq; in
 quatuor luxationibus, concinnatio congruet, tum quæ
 conuersione articuli & circumductu fit, tum quæ intensio-
 ne. Si enim affectus recens fuerit, & æger iuuenis, nonnū-
 35 quam femur continentes circumagentesq; huc illuc ar-
 ticulum reposuimus, Quod si interiorem partem luxa-

PAULI REGINETÆ

cio declinauerit, etiam crure solum subito & ualenter
ad inguina quàm intime flexo, id quod requiritur effeci-
mus: sin autem his non cesserit, intensione utendum,
primum per manus adhibita, quæ crus ab inferiore par-
te trahant ac per secur tibiāq; constringant, ex superio-
re autem parte, sub alas corpus circudent. Quod si
etiam ualentior desideretur intensio, funibus contextis
aut implicitis, uel loris crus deligare, omnino quidem
supra malleolum: ut autē genu nihil patiat, hoc quo-
que superius oportet: at pectoris regionem uincire ne-
cesse non est, uerum, ut dictum est, manibus subter alas
comprehendatur, loriq; mollis & ualidi medium iuxta
penem adaptatum in humeros reducemus antèr
inguina & clauiculā: posterius, per summas partes, duo-
q; lori capitula ministro trademus, deinde omnes simul
trahentes, ut aegrotantis corpus eleuetur, intensiōe mo-
lientur. hic quidem intendendi modus communis est
quatuor femoris luxationum differentiis, priuatim au-
tem in singulis modus quo ossa ferra in sedem suam
compelluntur, Græci mochlian dicunt, euariat. Intenso
homine siquidem in interiorem partem articulus exci-
derit, lori iuxta penem siti medium inter femoris caput
ipsamq; penem dispensari conuenit, referri autem lori
rum per inguina adiacentia & clauiculam expedit. At
adolescēs quidam duobus cubitis affectum femur, qua-
crassius est, circumdatum, in exteriora ualenter extrahet.
Atque hic modus inferendi aliis expeditior est, cui si ar-
ticulus non cesserit, aliis quoque utendum, uariis quidē
magis, sed eo efficacioribus. intendi etenim hominem
super lignum grandius aut scamnum oportet, in quo ē
spinæ gibbero uitiatos intendimus. Insculpentur autem
per totum fere oblongæ quædam ceu fossæ, quæ lati-
tudinem altitudinemq; trium digitorum, non maiorem
habeant, disidentes inuicem non magis quàm digi-
tos quaternos, ut ferra iuxta extremum in ipsis resistente,
in quancunq; partem conueniat, restituantur membrum.

Per medium autem lignum aut scamnum, aliud impin-
 gatur lignum pedalis longitudinis, columnulae modo
 crassum, ut sub hoc intenso homine, lignum inter penē
 & femoris caput perueniat. Simul enim corpus iis qui à
 5 pedibus trahunt porrigi prohibebit, eoq; ne usu quidē
 saepe uenit in contraria ex superiore parte intensio: simul
 autem intenso quoque homine ipsum lignum femoris
 caput foras propellet, ac intensio iuxta superius dictum
 modum administrabitur, praesertim pedis. Quod si ne
 10 sic quidem in sedem suā redierit, impactum lignum res-
 ctum auferri debet, ex latere autem huius situs utrinque
 singula ligna infiguntur, tanquam limina, non minus q̄
 pedalis longitudinis. his aliud lignum adaptabitur gra-
 dus scalae modo, ut trium lignorum figura H litteram
 15 repraesentet, nam paulo inferius summis medium lignū
 accommodabitur. Deinde in sanum latus iacente homi-
 ne, sanum quidem crus inter hāc limina subter gradum
 quodammodo ducemus, affectum autem crus ex supe-
 riore parte super hunc ponemus, ut ipsi femoris capiti
 20 accommodetur, substrato prius ei multiplici uestimen-
 to, ne femur contundatur. aliud autem lignum medius
 crur latum tantam habens longitudinem ut à femoris
 capite usq; ad malleolum subiectum pertineat, intrinse-
 cus cruri alligabitur. Vbi iam facta est hāc intensio,
 25 aut per pistillum, ut in gibbero prius diximus, detrahe-
 re ad ima crus cum alligato ligno oportet, ut uiolentia
 hac femoris caput in propriam sedem reuertatur. Cae-
 terum est & alius reponendi modus sine intensione
 per lignum, ab Hippocrate commendatus. Manus
 30 enim, inquit, aegrotantis molliter costis alligare opor-
 tet, & pedes utrosque ualido loro molli per malleos
 los & super genu fasciare, ut quatuor digitorum spa-
 tio inuicem distent: intenso autem affecto crure duos
 bus digitis magis quam alterum hominem suspens-
 35 dere, ut caput cubitos duos à terra absit. Adolescens
 uero aliquis peritus cubitis suis femur affectum com-

PAULI AEGINETAE

prehendens qua breuissimum est, ubi & caput femoris, & ex rheda suspendens hominem facile compellet articulum ingredi. Atque hic reponendi modus aliis quidem simplicior est, ut qui non multo apparatu peragatur, sed ueluti miserabilem ipsum, uulgus abominatur. Porro si in exteriora membrum fuerit luxatum, homo superius intendi debet, lorum autem iuxta penem per oppositas partes ferri conuenit, inguina dico & claviculam: medicum ab exteriori parte introrsum agitare iuxta conuenientem foueam ex iis quæ insculptæ sunt, ministro quodam uestem ad sanum clunem ne cedat, obliiciente. Sin autem in priora promotus est articulus, homine inteso uir quidam ualidus dextræ manus palmam affectis inguinibus imponens, altera comprimet simul ad ima, simul ad genu constringet. At si in posteriora prolapsum est articulamentum, non opus est quidem hominem in altum usque intendi, sed in firmo iacere, quemadmodum etiam si in exteriora articulus exciderit. Sicuti autem in gibbero dicebatur, super lignum aut scamnum homo pronus intendetur, uinculis non per ilia, sed in crure, ut nuper dictum est, porrectis. Iam uero uti conuenit constrictione per asserem adhibita, iuxta clauium regionem, ubi & articulus excidit, atque hæc sane de coxendice ex causa foris adueniente luxata, dicta sint, quoniam uero propter copiam humiditatis, ueluti humerus, sic etiam coxa prolabitur, uestione utendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus.

DE GENU ARTICULO.

Cap. CXIX.

Genu in treis partibus promouetur, interiorem nimis mirum, anteriorem, & iuxta poplitem. in posteriorem enim prolabi opposita patella prohibetur. Eiusdem igitur intensionis utentes modis, interim per manus solas, interim etiam funibus, decenter deligabis

mus, reliquamq; adferemus curationem, hoc spectantes
ut particula diutius immobilis conseruetur.

DE MALLEOLI ARTICVLO,

ubi etiam de pedis digitis agitur.

Cap. CXX.

T Ali articulus si paulum excesit, modica etiam
intensione curatur: si toto loco mutatus est, ue-
hementiore indiget auxilio. Tentandum itaque
& hic per manus ualidiorē intensione uti. Quod si nō
reponitur, homine humi resupinato extensoq; longū
aliquem & ualidum palum inter duo femora iuxta pes-
nem in imam humum rectum defigemus, ut corpus ad-
uersus eum renitens ad pedis intensionem non cedat,
imo prius defigetur, q̄ homo decumbat. Quod si ma-
gnū illud lignum adest, quod pedale aliud lignum, p-
medium habere defixum diximus, super hoc intensio-
nem moliemur. ministro uno femur continente retra-
henteq; alter manibus aut loro pedem trahet, medicus
luxatum manibus diriget, alterumq; pedem alius ad-
ima continebit. A repositione deligari, tuto pes debet,
fasciis ad superiorem pedis partem, aliis ad talum, distri-
butis, cura adhibita ne posterior tendo iuxta calcem cō-
stringatur. In hoc casu usq; ad dies quadraginta in quie-
te homini perseverandum est, nam incedere ante abso-
lutam curationem tentantes, particulam reddunt inutili-
lem. A si quis ex saltu, ut fieri solet, calcis os peruerterit,
uel etiam aliam quampiam inflammationis dispositio-
nem fecerit, blanda quadam intensione, conformatione
fomentis inflammationi contrariis, & fasciis firmis id di-
rigendum est, homine similiter usq; dum consanuerit, in
lectulo perseverante. Cæterum digitorum peruersio ut
in manibus dicebamus, non difficulter moderata tensio-
ne emendatur. In omnibus autem luxatis peruersisq;
postquam instaurata sunt & conquerint, inflammatio-
nem in articulis, ut uerisimile est, remanentem, aut tu-
morem, quæ etiam diu membra à functionibus im-

PAULI AEGINETAE

pediunt, mollientibus remediis perfanabimus, quorum materiem nullus qui in artis operibus uersatur ignorat.

DE LUXATIS CVM VLCE

re. Cap. CXXI.

IN luxatis cum ulcere multa requiritur prudentia. Dum enim hæc inferuntur, extrema pericula, nonnunquam & mortem inferunt. inflammatis enim extensione iis qui adiacent nervis & musculis dolores ualidi, conuulsiones, & febres acute oboriuntur, præsertim in cubiti gibbero, genu, & superpositis partibus. Nam quo principalibus sunt uiciniora, hoc maius periculum concitant. Hippocrates itaque horum repositionem, ualentiorēq, deligaturam omnino auersatur. solis autē quæ inflammationem abigunt leniuntq, præsidis, per initia uti præcipit. Sic enim ipsis superesse forsan licebit. Quod autem ipse in solis digitis consulit, id nos reliqs etiam articulis facere tentabimus, ac inter initia statim quum pars adhuc inflammatione caret, prolapsum articulum mediocri intensione reponemus. quod si iuxta animi institutum euenerit, persistemus, sola ratione quæ inflammationē arcet, utentes: si inflammatio quæpiam, aut conuulsio, aut aliquid prædictorum contigerit, rursus eiicere ipsos necessarium est, si quidē citra uim porrigantur. at si hoc quoque discrimen metuamus, non enim porrigentur forsan inflammata) satius est per initia in maioribus quidem articulis repositione superedere. ubi uero inflammatio declinauerit, (id autem sit post septimum nonumve diem) præfati etiam periculum, quod ex repositione futurum sit, tum quod si non repositum fuerit, claudi omnino superuiuent, conabimur tuto administrationem obire, utentes, propter commoditatem etiam serula. Porro ulceris curationem ut in fracturis cum ulcere dictum est, administrabimus.

DE LUXATIONE CVM

fractura facta. Cap. CXXII.

A T si luxatio sine ulcere cum fractura euenerit, communi intensiōe & per manus conformatiōe utendum est, ut in simplicibus fracturis docuimus: cum ulcere autem rursus, ex fracturis cum exulceratione & luxationibus priuatim expositis, congruam administrationem petemus.

PAVLI ÆGINETÆ

LIBER SEPTIMVS,

Ioanne Guinterio Andernaco medico interprete.

DE TEMPERAMENTIS, QVÆ

per gustatus qualitatesprehenduntur. Cap. I.



DE SENSILIVM CORPORUM temperamento, coniecturam ex odoratu aliquam sumere, haud est securum. Nam in odora, substantiis crassa, quidem sunt, sed non ita constat quo sint calore, & frigiditate prædita: odora uero, & tenuia quodammodo

sunt & calida, sed quatenus id sint, neutiquam ostenditur, quod substantiam habeant inæqualem. Multo adhuc minus ex coloribus exacte quid licet color ligere, cum in singulis calida, frigida, humida & sicca reperiantur. Verum in gustatu omnes similiter particulae corporum gustabilium, ut hoc uocabuli usurpem, linguae obiciuntur, sensumque mouent, ut manifesto ex ipso quoque temperamento eorum viresprehendamus. Quod igitur astringit, contrahere, obturare, densare, repellere, incrassare, atque

PAULI AEGINETAE

ante hæc omnia, refrigerare, siccareq; est idoneum.
 Acidum, incidere, diuidere, extenuare, aperire, & perpur-
 gare citra calefactionem potest. Acre, similem acido
 effectum præstat, extenuando purgandoq; sed acidum
 refrigerando euariat: acre, calefaciendo: præterea illud
 repellit, hoc attrahit, dissipat, *rumpit, crustas inducit.
 Pari modo etiam amarum meatus expurgat, abstergit,
 extenuat, incidit succorum spissitudinem, sine calore ma-
 nifesto. Aquosum frigidum incrassat, cogit, contrahit,
 obturat, mortem stuporemq; inducit. Salsum contrahit,
 stringit, consumit, siccatur, citra insignem caliditatem frigi-
 ditatemve. Dulce laxat, cōcoquit, emollit, rarefacit, oleo-
 sum humectat, emollit & laxat.

DE ORDINE ET INTERVAL

lo temperamentorum. Cap. II.

Moderatum sane medicamentum, ita ut tempe-
 ratura ei respondeat cui admouetur, inde quod
 nec siccet, nec humectet, nec refrigeret, nec cale-
 faciat, ipsum neque siccum, neque humidum, neque frigi-
 dum, neque calidum, nominare conuenit. Quod au-
 tem siccius est, aut humidius, aut calidius, aut frigidius,
 à præpollente appellatur facultate. Præstat autem in
 unoquoque excessu, quatuor, quantum ad usum spectat
 ordines statuiffe: calidum quidem nominâtes in primo
 ordine quod utique nos calefacit, sed non euidenter, ut
 illius rationali quadam demonstratione indigeat. Simili
 ratione, frigidum, & siccum, & humidum, quodcunque
 demonstrationem requirat, nondum actionem ualidam
 euidentemq; sortitum. At quæ manifesto iam siccare
 uel humectare uel calefacere uel refrigerare possunt, ad
 secundum huiusmodi ordinem referuntur. quæ ue-
 hementer iam sed non summe id faciunt, tertio annu-
 merantur. quæ uero sic calefaciunt ut crustas inducant,
 quarti sunt ordinis. similiter quæ refrigerant, ita ut mor-
 tis habitum concilient, hæc quoque ad quartum rele-
 gantur. Porro siccius medicamentum nullum est in

uenire quarti ordinis, si non urat. Nam si quod summe
exiccat, id plane urit: huius notæ sunt, chalcitis, misy &
calx. Teriii uero ordinis siccantium potest aliquod esse
etiam non urens, quemadmodum quæ uehementer a-
stringunt omnia, e quorum numero est omphacinum,
rhus & alumen.

DE PARTICVLARIVM SIM

plicium medicamentorum facultati

bus. Cap. III.

ABROTANVM.

A Brotanum & calefacit & siccatur in tertio absceso
su, digerendi incidendiq; facultate præditum,
modice uero astringit, totiq; corpori cum oleo
inficatum, rigores circuitu remeantes per sanat, stoma-
cho minus amicum est. crematum maiores in siccando
uires acquirit, quàm quod ignem non est expertum. Ca-
pillorum defluuia quas alopecias uocant cū tenui quo-
dam oleo inunctum explet.

AGALLOCHVM.

Agallochum lignum est qd adhuc hitur ex India thiyæ
ligno simile, odoratum. Mansum animæ suauitatem cō-
mendat. Item in suffitum adhibetur. Radix eius pota
denarii pondere, languidum ex humore uentriculum, re-
solutumq; confirmat. Ad hæc iecinorosis, dysentericis,
pleuriticisq; opitulatur.

AGARICVM.

Agaricum radix est ex arborum truncis prognata, coro-
pore fungoso, quæ ex aëria terrestriq; substantia coalue-
rit, uis eius est digerere crassos humores & incidere.
Vnde etiam uiscerum maxime obstructionibus purgā-
do medetur.

AGERATON.

Ageraton uim habet digerendi, & præter id inflamma-
tionem leniter arcet.

AGNVS, QVI VITEX DICITVR,

PAULI AEGINETAE I

Vitex, qui Graece agnus uel lygos appellatur, in tertio ordine tum calefacit tum siccatur, substantia tenuis est, eoq; flatus abolet, castitati conseruandae facere creditur, non modo commanducatus potusq; uerum etiam in cubis tum substratus. Semen ipsius facit iecori obstructo leni; potum. frictus autem uitex minus inflat, & facile digeritur.

AGROSTIS, GRAMEN.

Gramen Parnassi maxime utile est, siccatur, modice refrigerat, tenuis substantiae & subacerae: eoq; uulnera ra cruenta glutinat. decoctum eius uesicae calculos confringit.

ANCHUSAE QUATVOR.

Quatuor sunt anchusae, non eiusdem omnes facultatis. Nam onoclaeae appellatae radix astringendi uim habet & quiddam subamarum, ad lienis renumq; dolores efficax, itidem cum polenta illita erysipelatis succurrit, folia autem minus radice refrigerant desiccantq; hinc ad alui profluuium bibuntur. Quae dicitur lycopsis, astringens quodammodo efficacius, similiter erysipelatis conuenit. Onochelos uero seu Alcibiadios nuncupata medicacior quodammodo, uiperarum moribus succurrit in cibo potuq; & alligato. Quarta omnibus aliis breuior, sine nomine propemodum, maiore quam Alcibiadios, amaritudine donata: latis alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.

ADARCE.

Adarce uelut spuma quaedam est aquae salae in cremis & arundinibus concreta, tantum uero acrimoniae habet & caloris ut extrinsecus cum alis imposta fere urat: intro eam assumere nulli licet.

ADIANTVM.

Andiantum siccatur, extenuatur, & modice discutit, calore ac frigidityte medium est: Alopetiis igitur medetur, tum mores digerit, calculos potu confringit, reiectiones pulmonis desiccatur, alui profluuium sistit.

AIZOON.

Aizoon duplex est, maius & minus: utrunq; refrigerat ex tertio abscessu, deficcatur autem astringitq; mediocriter. Idem ualet erysipelatis, & ad herpetas inflammatio nesq; ex fluxione concitatas conuenit.

AETONYCHON.

De Aetonycho in capite de lapidibus pertractabitur.

ATHERA.

Athera pulticula est sorbilis ezea in tenuissimum polli linem redacta, aut è tritico confecta, infantibus accom modatur. Item cataplasmatibus uice illinitur.

ÆGILOPS.

Ægilops discutiendi facultate prædicta est, unde etiam indurescentibus inflammationibus & ægilopi quæ oculi lorum fistula est, opitulatur.

AEGIROS, POPVLVS NIGRA.

Populus nigra in primo ordine calefacit, modice siccatur, & tenuis est substantiæ, cuius folia cum aceto illita podagricos dolores sopiunt, Quæ uero ex ea distillat resina, floribus calidior miscetur acopis et malagmatis, fructus cum aceto potus comitialibus auxiliatur.

AEDAEON, HOC EST, PVDENDUM,

masculi cerui.

Pudendum cerui masculi tritum atque ex uino potum, uiperarum moribus subuenit, miscetur autem compositis facultatibus.

AETHALE, FVLIGO THVRIS.

Aethale et lygnys in litera L, exponetur.

AETHIOPIS.

Aethiopis similia uerbaasco habet folia, radicis decoctum, potu datur ischiadicis, pleuriticis et sanguinem excreantibus, item faucium asperitates cum melle lenit.

AIMA, SANGVIS.

Sanguis frigidus nullus est, uerum suillus, humidior, et minus calet, humano maxime temperamento similis. Columbarum uero, palumbi & turturis, temperatus quos

PAULI AEGINETA

dammodo, oculorum liuores ex ictu, hyposphagnata dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori cerebri membranæ infusus, in his quorum calua perforata est inflammationem arcet. Noctua sanguis cum uino aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Vespertilionum, uirginum mamillas tuetur, & pilorum incrementa illitum prohibere dicunt. Similiter sanguis ranarum, chamæleontis, & ricinorum qui in canibus herentes inueniuntur, sanguis facit. Galenus autem hæc factum rel experimento falsa esse pronuntiat. Caprarum uero siccitatis nomine aquas tuteum subeuntes cum melle potus iuuat, renumq; calculos conterit. Gallinarum cohortalium sanguinis è cerebri membrana profluuia coercet. Agnus comitalibus prodest: hædinus nuper coagulatus circa hemina dimidium cum pari aceto contra cruetas pectoris excreationes bibitur. Vrsorum, syluestrium caprarum, hyrcorum & taurorum, abscessus maturare fertur. Terrestris crocodili, oculorum claritatem efficit. Equorum admissariorum septicis miscetur facultatibus. At antidotum ex sanguinibus, in lethalia medicamenta efficax est. Item anatis, hædi & anseris, in antidota miscetur.

AER A, LOLIUM.

Lolium calore & siccitate ad tertium ferè ordinem pertingit, iridi facultate simile.

ACACALIS.

Acacalis fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cuius dilutum collyriis claritati oculorum efficacibus miscetur.

ACACIA.

Acacia tertii quidem desiccantium ordinis est, primi uero refrigerantium, at si elota fuerit, secundi. Est autem acerba & terrestris.

ACALYPHE, QVÆ VRTI

ca latinis dicitur.

Vrtica & fructus & folia tenuem habent substantiam, citraq;

LIBER SEPTIMVS. 281

citraq; rosionem siccant, tumores discutiunt, abstergunt, uentrem subducunt, mediocriter flatulenta, quare etiam ad uenerem incitant.

ACANTHVS.

5 Acanthum alii à nigro colore foliorum melamphyllō appellant, alii præderotē, uis eius est discutere & siccare.

ACANTHIUM.

Acanthium tenui calidaq; natura præditum, conuulsis auxiliatur.

10 ACANTHA LEVCE, QVAE

Spina alba Latinis nuncupatur.

Spina alba radicem siccantem & modice astringentem ob tinet, eoq; & stomachicis, & sanguinē expuentibus, dentiumq; doloribus succurrit: semen tenue calidumq;

15 est, qua ui conuulsioni quoque medetur.

ACANTHA, ID EST, SPINA

ægyptia, uel arabica.

20 Spina Aegyptia, secundum alios Arabica, astringit siccantq; impenſe, unde & sanguinem, & alias defluxiones retinet.

ACINVS.

Aciaus ocimo similis, mediocres astringendi uires habet, ideoq; aluum & menses pota sistit, illita uero pænos & sacros ignes perſanat.

ACONITVM.

30 Aconitum, quod quidem pardalianches dicitur, ex eo dentem lethalemq; uim habet, quam ob causam intro non assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas ex eo di oporteat, uti licet quod uero à lupis lycoctinon dicitur, simileis priori uireis sortitum, priuatim lupos, ut illo lud pantheras enecat.

ACORON.

40 Acoron in tertio abscessu calefacit & deficcet, radice ipsius ad ciendam urinam, lienemque induratum uti mur: cæterum membranæ oculorum, ob cornus similitudinem ceratoidis dictæ, crassitiem extenuat.

PAV. AEGIN.

NN

PAULI AEGINE TAE

ACRIDES, LOCUSTAE.

Locustae urinae angustis praesertimque mulierum, suffitu
profunt. At quae alis caret, contra scorpionis morsus cum
uino salutariter bibitur.

ACTE, HOC EST, SAMBUCUS.

Sambucus, & chamæacte, id est, ebulus.
Sambucus, & magnus, & ebulus, qui chamæacte dici
tur, quasi humilis sambucus, uterque desiccandi faculta
tem obtinet, modice digerit & conglutinat, potus autem
& manducatus, aquam per alium educit.

ALS, SAL.

Sal quilibet uim habet uehementer siccam & astringen
tem, unde quicquid in corporibus humidum est, id oem
depascit, reliquum astringitione confirmat, leuiterque contra
hit, *qua ratione ad fassamenta omnia adhibetur, putre
dinemque arcet: crematus uero sal magis discutit.

ALTHAEA.

Oribasi
us unde
carnes eo
conditas à
putredine
conferuat.
*Nō ma
le adde
tur pro
prie.

Althæa seu ebiscus species est maluae syluestris, uis eius
discutit, laxat inflammationem abigit, lenit, & phymata
concoquit, radix autem & semen reliqua sane intensa ha
bet, uerum *exterit uittilignes abstergitque, praecipue autem
semen calculos quoque confringit.

ALIMON.

Alimon dissimilariū partium est, salsum gustu & leui
ter astringens, maxima ipsius pars calore temperata
cum humiditate insuperabili est, & lactis ubertatem
conciat.

ALCEA.

*Græce
est ἀλγες
nimirum
depraua
rum, pro
ἀλγες, id
est ruptu
ris. sic eni
habet Dio
scorides.

Alcea syluestris maluae & hæc genus est, in uino pota
intestinaorum torminibus & *erosionibus medetur, mul
to magis ipsius radix.

ALCYONIUM.

Alcyonii genera omnia quidem abstergunt, discutiuntque,
acri qualitate praedita, sed milesium (est autem uermis
culum purpureumque) ceteris praestat: quare combus
tum, pilorum defluuia, quae alopeciae dicuntur, impetit.

LIBER SEPTIMVS. 282

genes,utiliginesq; abstergit. Porro,quod in superficie
leuiorem habet & uehementer acris est, non mo-
do abstergit, uerumetiam excoriat. Postremo,
quod lanis succidis responderet, omnium est, imbes-
cillum.

ALME, QVÆ MVRIA
DICITVR.

Muria nulli alteri mixta substantiæ, similes habet salui-
res, sed imbecilliores aqua temperata: at salforum pi-
scium oliuarumq; colymbadum muria ualentius abste-
git, contra intestinorum tormina & coxendicum dolo-
res clystere iniicitur.

ALOE.

Aloe calefacit in primo, siccatur in tertio ordine, stomas-
cho etiam amica est, abstergit dissipatq; aluum subdu-
cit, lota uero minus detergit, sed stomacho gravior
est, inflammationem prohibet, & ulceribus cicatricem
inducit, præsertim sedem & naturalia infestantibus.

ALOS ANTHOS, ID EST,
salis flos.

Flos salis liquidum est medicamentum sale concrema-
to tenuius, acris, & satis digerens.

ALOS ACHNE, ID EST,
salis spuma.

Salis spuma lanugo salis spumosa est, tenuior quidem
illo magisq; discutiens, sed minus contrahit.

ALSINE, ID EST, AV-
cula muris.

Alsine, quam alii muris auriculā uocant, uim habet hel-
xinæ similem quæ refrigerat humidatq; quapropter ad
feruentes inflammationes conuenit.

ALYPON.

Alypi semen bilem atrem per inferiora purgat pari epi-
thymo mensura sumptum cum sale & aceto, uerunta-
men intestina leniter exulcerat.

ALYSSON.

NN ii

PAULI AEGINETAE

Alysson quod à cane rabido morsos iuuat, sic appellatum est, cæterum siccatoria, discussoria, absterforiaq; uipræditum, renum meatus aperit, ephelidem, quæ aspera discolorq; cutis est, exterit.

ALOPEX, ID EST, VULPES.

Vulpes uua aut mortua tota in oleo decocta, discutienti uim oleo concillat, adeo ut humores alte fixos in cutem extrahat, hinc articulares in folio eo repleto diutius immorati, incipientem quidem affectum finierunt inueteratum uero moderationem reddidere.

AMARACVS.

Amaracus tertio in ordine calefacit, secundo desiccatur.

AMARANTVS, QVOD EST

centarium minus.

Amarantus extenuat, incidit, mensis cum uino potus educit, sanguinis grumos dissoluit cū mulso, omneisq; fluxiones desiccatur, stomacho inimicus.

AMBROSIA, QVÆ ROMA

nis caper syluaticus dicitur.

Ambrosia emplastri modo imposita uim habet astringendi, reprimendi, retundendiq;.

AMI.

Ami ad tertium calefacientium siccantiumq; ordinem refertur, tenue, discutiens, & urinæ mouendæ efficax, semen ipsius longe utilissimum est.

AMIA NTVS LAPIS.

Amiantus lapis in Cypro nascitur alumini scisso similis, qui in ignem coniectus accenditur quidem inflammaturq; sed non comburitur, utuntur eo nonnulli in descantibus psilothris.

AMMOS, ID EST, ARENA.

Arena litorum maris affatim desiccatur, cædens feruensq; sole aquas subter cutem exiccat, corporibus hydropicorum in ea coopertis: torretur eadem ad sicca fomenta in salis & milli uicem.

LIBER SEPTIMVS. 283

AMMONIACVM THYMIAMA,

quod Latinis ammoniacum suffimen,
& ammoniaci gutta dicitur.

Ammoniacum thymiaa, liquor est tanta molliendi
5 uirtute præditus, ut scirros & tophos discutiat.

AMVRCA.

Amurca secundi calefacientium siccantiumq; ordinis
est, eiusq; intensi, sicca enim in aridis corporibus ulcera
curat, in reliquis intendit irritatq;.

10 AMPELOPRASVM, HOC

est, agreste porrum.

Ampeloprasum, seu porrum syluestre acerrimum est ca
lidissimumq; in summo ordine, quamobrem etiam
exulcerat, inciditq; uiscerum meatus recludit, stomacho

15 inimicum.

AMPELOS AGRIA, ID EST,

uitis syluestris, quæ Latinis labrus
sca quoque dicitur.

Vitis syluestris racemi & germina ipsa absterge di faculo
20 tate pollent, item nonnihil astringens obtinent.

AMPELOS HEMEROS, ID

est, uitis sativa.

Vitis sativæ facultas respondet sylvestri, sed imbecilio
rior est.

25 AMPELOS LEVCE, ID EST,

uitis alba, quæ & bryonia dicitur.

Vitis albæ, quam & bryoniam & psilothron appellant,
germina sanè ceu stomacho grata eduntur, urinæq; cien
dæ sunt, radix abstergit, tenuis natura & mediocriter ca
30 lida, unde fit ut lienes etiam potu consumat, extrinsecus
autem cum fide illita scabiei & lepræ medetur.

AMPELOS MELÆNA, ID

est, uitis nigra.

Vitis nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori
35 consimilis est, nisi quod inefficacior.

AMYGDALA.

NN lil

*Impres
sum exē
plar κα
κοί habet
pro ε λ και

PAULI ÆGINE TÆ

Amygdala quæ quidem amara sunt extenuant, viscosos crassosq; humores altius hærentes meatus recludendo educunt, tum in cutem erumpentes abstergunt: arbor eandem vim repræsentat: at dulcia amygdala moderato calore donata sunt.

AMYLON.

Amylon ex puro tritico aqua sub caniculæ æstu macerato conficitur, quæ (aquam dico) quinquies in die mutatur: quum autem tenerrimum euaserit, colo traiescit aqua quàm superfuderis furfures secernere siccasque ad solem oportet protinus ante quàm accescat. Cæterum vis eius est refrigerare mediocriter, & siccare, & acria lenire.

AMOMVM.

Amomum acoro uirtute respondet, sed illud quidem ficcius, hoc autem maturat expeditius.

ANAGALLIS.

Anagallis utraque vim habet abunde abstergentem subcalidam & attractricem nonnullam, ut etiam aculeos euellat, item succus ipse naribus instillatus caput purgar.

ANAGYRIS.

Anagyris frutex est grauis odoris acrisq; calefacit & discutit, semen tenuius, & uomitui ciendo est.

ANDRACHNE, HOC EST,

portulaca.

Portulaca tertio quidem abscessu refrigerat, secundo autem humectat, qua de re etiam causone laborantes uentriculo imposita, iuuat, & fluxiones repellit, lentore suo dentium stuporem ex acidis contractum corrigit: ob astrictionem, & intestinorum tormina, & sanguinis profluvia coerces.

ANDROSÆMON, ID EST,

humani sanguinis herba.

Androsæmi duplex genus est, alterum ascyrrhon uel ascyrrhoides nominatur specie hyperici alterum dionysii

LIBER SEPTIMVS. 284

fructus ipsorum purgat, folia aut magis deficcant.

ANDROSARCES.

Androsarces amara acrisq; herba est, uis eius est discutere & deficcare: potu tum ipsa, tum fructus ipsius urinam promouet.

ANEMONÆ.

Anemonæ omnes uim habent acrem absterforiamq;, item extrahendi & oris uasorum recludendis idoneam, qua pituitam per os purgant, lepras tollunt appositu, & lactis faciunt ubertatem.

ANETHVM.

Anethum calefacit in secundo ordine intenso, siccatur paulo remissius, quod in oleo excoctum digerit, dolorem sopit, somnū conciliat, & crudos tumores maturat, uisū tertii calefacientiu siccantiumq; ordinis efficitur, humentibus ulceribus utiliter illinitur: uiride quoniā humidius minusq; calidum est, non ita maturat.

ANTHYLLIS.

Anthyllis duplex quidem est, sed utraq; ulcera perficit, quæ chamepityi respondet, tenuior est, quare etiam comitialibus competit, cæterum efficacius eadem abstergit.

ANISVM.

Anisi semen acrius est, in tertio abscessu calefaciens siccansq;, hinc utiq; & urinam mouet & flatus discutit.

ANTIRRHINON VEL

anarrhinon.

Antirrhinon siue anarrhinon per similem inguinariæ uim obtinet sed minus efficaciem, atq; ex illo hoc quoque cognosces.

ANONIS VEL ONONIS.

Anonis siue ononis calida facultate est, p̄sertimq; eius radix cuius succus cum uino potus urinam ducit, calculos conterit, crustas rumpit & dentes mitigat.

APARINE.

Aparine, quam alii philantropon, alii omphacocarpon

NN iiii

PAULI ÆGINETÆ

appellant, modice abstergit & desiccatur, item tenuis quipiam in se continet.

APIOS, QVAM LATINI PI-
rum domesticam appellant.

Apios temperatura inæqualis est, terrene aliud sortita, aliud aquosum, ob quod manducata stomachum iuuat sitimq; arcet, illita uero siccatur refrigeratq; mediocriter.

APOCYNON VEL CYNON-
crambe, id est, canina brassica.

Apocynon ceu cynocrambe, dicitur autem & cynomeron quod celerrime canes enecet, eademq; ui maleficum & lethalis homini est, fædi admodum odoris est, & calida citra siccitatem, unde etiam digerendi facultatem illita repræsentat.

APOCHYMA VEL ZOPISSA
Apochyma pix est uetus quæ à nauigiis, deraditur, tumores diffundit, siccatur & discutitur.

ARACHNE, ID EST, ARANEVS.
Araneus in emplastrum emollitus impositusq; fronti et temporibus tertianarum febrium circuitus finit, ut Dioscorides memoriæ mandauit, tela ipsius applicata sanguinis fluores sistit, & ulcera in summa cute ab inflammationibus tuetur.

ARGEMONE.
Argemonæ facultas est abstergere simul & discutere.

ARISARVM.
Arisarum multo breuius est aro, acriusq; radicem oliuæ magnitudine obtinet.

ARISTOLOCHIA, QVOD
latini malum terræ dicunt.

Aristolochia omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & subacris, ad medicinas utilissima, at rotunda, tenuior & in omnibus efficacior est, clematidis odorata quidem sed imbecillior, longa uero præter alia, media harum est sed non minus calida, quam rotunda.

LIBER SEPTIMVS. 185

ARCEVTHOS, HOC EST, IVONIPERUS.

Iuniperus calefacit & ficit in tertio ordine, fructus autem calefacit quidē similiter, sed in primo gradu ficit.

ARCION.

Arcion siue prosopites folia habet cucurbitis maiora, duriora q; discutit quidem ficit & astringit, quapropter & folia ipsius uetusta ulcera persanant.

ARCTION.

Arction uerbasco simile est, radicem habet teneram, cādidam, & dulcem, uis eius est tenuis, siccans, & medio criter astringens.

ARMENIACVM.

Armeniacus lapis uim habet absterforiam simul cum modica acrimonia & minore astringēte, hinc etiam ocularis facultatibus miscetur, & alendis palpebrarum pilis usum habet.

ARNABO.

Arnabo ex aromatis habetur, ob quod unguentis potissimum temperatur, calida sicca q; potentia præditum in tertio ordinæ, casie & capersio simile, unde Posidonius ubi cinamomi copia non datur, hoc utendum esse censet.

ARNOGLOSSVM, ID EST,

plantago.

Plantago refrigerat pariter & deficcat in abscessu secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam astringētionis nonnihil adfit, quo nomine ad maligna ulcera, fluxiones, putredines q; accommodata est, temperamenti moderatione, sanguinis quoq; profluvia cohibet & plurimis congruit, etenim siccitatis quæ nequaquam rodit compos est, & frigiditatis quæ nondum stuporē inducit.

ARON.

Aron calore & siccitate primi est ordinis, ex ter estri calida et astringente substantia et hoc generatum, radices

PAULI ÆGINETÆ
ipſius calidiores ſunt, dracunculo inferiores.
ARSENICVM, QVOD AVRI
pigmentum Latine dicitur.

Arsenici uis eſt cauſtica, utuntur eo & in pilis abolendis,
quod ſi cui diutius adhæſerit, eam ipſam depaſcit, uſtū
uero tenuius redditur.

ARTEMISIAE.
Artemiſia utraq; ſecundo in ordine calefacit, ſiccatur in
primo, tenuis adeo ſubſtantia eſt ut renum calculos
comminuat, & uteri fomentis recte accommodetur.

ARTOS, ID EST, PANIS.
Panis illitus intenſius digerit quam triticum, ceu & ſalis
& fermenti particeps. Nam ad extrahendum ea quæ al
te hærent, fermentum idoneum eſt.

ASARVM.
Aſarum ſimilem acoro uirtutem habet, ſed magis in
tenſam.

ASBOLE, HOC EST, FVLIO
GO PICTORVM.

Fuligo qua pictores utuntur: ex uitralis officinis ſumit
tur, uim habet digerentem, adeoq; acrem, ut & urat &
exedat, cæterum aduſta cum roſaceo cerato ad cicatri
cem perducit.

* Dioſco
rides κα
τα γματα
hoc eſt
rupta.
ASCALABOTES, ID EST, STELLIO
transmarinus.

Aſcalabotes animal ad reliqua ſanè inutile eſt, ſed ſcor
pionum ictibus impoſitum opitulari ipſum tradunt:
miſcetur etiam uehementibus medicinis.

ASCLEPIAS.
Aſclepias calida, ſicca, & tenuis ſubſtantia, torminibus
cum uino pota competit, uenenatorum autem morſi
bus & maleficis mammarum muliebriumq; locorum
uitiis illinitur.

ASCYRRHON.
Aſcyrrhon in androſæmo expoſitum eſt.

ASPALATHVS.

Aspalathus dissimili constat uirtute acri & astringente,
& utraq; siccante, idcirco & putredini & fluxionibus uti
lis est.

ASPARAGVS.

- 5 Asparagus petraeus, aut myacanthinus abstergit utique,
sed calore & frigidityte medius est, renes & iecur ob
structa recludit, praesertimq; radices & semen. Item den
tium doloribus medetur.

ASPLENON.

- 10 Asplenon tenue quidem est uirtute, non tamen calidum,
hac utique ratione & calculos confringit, & lienes con
sumit.

ASTAPHIS, ID EST, VVA

passa, quae staphis etiam dicitur.

- 15 Astaphis domestica concoquit simul & astringit, & leui
ter discutit, syluestris autem acris adeo est, ut pituita per
os educat, & uehementer abstergat.

ASTER ATTICVS, SIVE

inguinalis herba.

- 20 Aster atticus, quam alii herbam inguinalem uocant, ob
hoc ipsum quod non tantum emplastri modo imposi
ta, uerum adalligata etiam bubonibus prodesse creditur
mixtae est uirtutis, digerentis & refrigeratoariae.

ASTRAGALVS.

- 25 Astragalus frutex est exiguus cuius radices astringunt,
iple non ignauiter desiccatur, ulcera itaq; uetusta ad cicat
ricem perducit, & aluum fluentem radix in uino pota si
stet: plurimus in Pheneo Arcadiae nascitur.

ASPHALTVS, BITVMEN.

- 30 Bitumen siccatur calefacitq; in ordine secundo, quare ul
cera cruenta glutinat.

ASPHODELVS, QVAE HA

stula regia dicitur Latinis

- 35 Asphodeli radix uim habet detergentem discutienteq;
concrematae autem ipsius cinis calidior, siccior & tenui
or euadit, quo fit ut pilorum defluuiis medeatur.

ATRACYLIS, QVAM RO

mani orcitunicam dicunt.

PAULI ÆGINE TÆ

Atractylis seu cnicum sylvestre ex spinosorum genere
habetur, ui siccante et mediocriter calida.

ATRIPLEX.

Atriplex humectat sanè i secūdo, refrigerat in primo or
dine, qua de causa uentrem quoq; emollit: semen ipsi
us ui pollet absterforia unde, ictericis ex iocinoris ob
structione accommodatum est.

APHACE.

Aphace lenticulæ modo astringit, sed manducata agri
us concoquitur, ualentius siccatur, mediocriter calefacit.

APHRONITRVM.

Aphronitri uis est discutere et abstergere, ut non solum
ordida exerat, sed etiam pruritus quippe saniem dis
sipat et medetur, potum uero stomacho nocet.

Oribasius
Gale-
musq; ob
adiiunt.

APROS, ID EST, SPV

MA NITRI.

Spuma nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed
tenulior substantia, ob quod et leuis, farinæ modo
existit.

ACHRAS, QVOD PIRVM

agreste dicitur.

Picum agreste eandem piro domestico uirtutem habet,
sed magis intensam, quapropter, magnis uulneribus glu
tinandis est.

ABSINTHIUM.

Absinthium calidum primo abscessu est, siccum tertio
astringenti, amara & acri simul donatum qualitate: qua
biliosos in uentriculo humores per aluum & urinas ina
nit, quibus autem pituita redundat, hos propter astrin
gentionem nihil iuuat: succus ipsius, herba multo cali
dior est.

Enumeratio eorum quæ à B incipiunt.

BALANVS MYREPSICA,

hoc est, glans unguentaria.

Quæ intram unguentariam glandem ceu carnosa sunt,

abstergerendi incidendiq; cum astringione uim habent,
eamq; ob causam denarii unius pondere cum mulla
pota, facile uomitiones cient, & inferiorem uentrem
subducunt, cum posca uero laxandis extis accommo-
data sunt, item cutis uitia cum aceto peruncta exterunt.
Cortex alioquin egregia astringendi uirtute pollet.

BACCARIS.

Baccharis odorata est herba similis cinamomo, coro-
naria et acris: huius radicis decoctum meatus obstruo-
stos aperit, urinam et menseis citat, folia ipsius quum
sint astringentia, fluxionibus opitulantur.

BALAUSTIVM.

Balaustium syluestris punice flos est, ualide astringens,
sicca & frigida facultate præditum, itaque summæ cu-
tis ulcera ad cicatricem perducit, & destillationes con-
hibet.

BALSAMVM.

Balsami, quod ueluti lignum est, siccatur & calefacit in se-
cundo ordine, subtilemq; habet substantiam, liquor au-
tem multo tenuior est, fructus proxime hunc uirtute ac-
cedit, sed minus tenuis est.

BALLOTE, MARRVBIVM

NIGRVM.

Ballote quod alii marrubium nigrum dicunt, acris est
& absterforiæ facultatis, impositum cum sale rabidi ca-
nis moribus medetur.

BATVS, RVBVS.

Bati fructicosum, abunde abstringit & siccatur, qua de cau-
sa & uulnera committit, & defluxiones sistit, radix au-
tem præter astringentem, non parum etiam subtilis est,
unde renum calculos confringere est idonea. fructus si
maturus est, magis calefacit, simulq; mediocriter astrin-
git, ac ideo cibo idoneus est, immaturus autem et acro-
bus est et ualide siccatur, præsertim retorridus, Eadem et
am flos efficit.

PAULI ÆGINETÆ
BATRACHION, RANVNO

culus herba.

Ranunculi quatuor sunt genera, omnia excellenter calida, sicca, acris, urentia, adeo ut ulcus cum dolore exciserent, quibus si modice utaris, cutis vitia tantum exterunt, radix autem arida sternutamentis ciendis est medicamentum.

BATRACHI, RANÆ.

Ranæ aduersus virulentorum morsus in iusculo coactæ eduntur. Crematarum ranarum cinis maxime siccanans redditus, sanguinis eruptiones sistit, & capillorum defluuiis cum pice liquida medetur.

BDELLIUM.

Bdellium tū Scythicum tum Arabicum scirros emollit, præsertimque recentes, Arabicum uero urinæ ciendæ est, calculos comminuit maturatque.

BETONICA.

Betonica herba est ramulis exilibus pulegio similibus sed tenuioribus, & propemodum si gustes, nullam qualitatem referentibus. Nascitur potissimum locis petrosiss, qua & in renum medicinis utuntur. Est autem apud Romanos alia quædam betonica dicta, quam Dioscorides nominat cestron, alii uero psychrotrophon, eo quod frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta habet, præter actionem: at ultra quod urinam ciet, etiam aliis multis benefacit. potissimumque radix ipsius, cum hydromelite pota uomitionem mouet, folia autem aliquam subducunt.

BECCIVM, TVSSILAGO.

Tussilago: quæ Græcis bechion siue bechicon inde dicitur, quod tussis recta cervice spirantes suffitu iuuat, constat ex calida aquosaque substantia.

BLITVM.

Blitum esculentum olus est, humidum frigidumque in abscessu secundo.

BVLBVS

LIBER SEPTIMVS. 288

Bulbus esculētus amari simul et astringentis, modice cō-
pos est, siccat glutinatq; uulnera, et abstergit. Qui aut uo-
mitum cit, multo calidiorem uim repræsentat.

BOTRYS.

Botrys, quam alii ambrosiam, alii artemisiam dicunt
planta est insigniter odorata, hæc cum uino pota, subre-
cta ceruicem spirantibus quos orthopnoicos appella-
lant, succurrit.

BVBONIVM, INGVINA-
LIS HERBA.

Bubonium in Attico aslere dictum est.

BVGLOSSVM, LINGVA BVBVLA.

Buglossum humidū calidumq; temperamento est eaq;
ob causam uino iniectum lætitiā animi cōciliare dicitur

BVNIVM.

Buniū qd alii arctiō appellāt, calidū est, urinq; et mēsis
educēdis accōmodatū, huic respōdet et pseudobuniū.

BVPRESTIS.

Buprestis animalculum est cantharidi simile, reponitur
itaque sicut et illa.

BVTYRVM.

Butyrum maturat digeritq; mediocriter in teneris cor-
poribus, bubones igitur et parotides iuuat, gingiuas ex-
tenuat, et præsertim in infantibus * dentientibus, item
humores ex inflammatione pectori infarctos, linctum

* Oribasi-
us: infan-
tiū denti-
tiones si
gingiæ
eo illinan-
tur, sine
dolore p-
mouet.

BVPHTHALMON, QVASI
dicas bouis oculum.

Buphthalmon similem habet chamæmelo florem, sed
multo maiorem acrioremq; ideo et discutientem, adeo
ut cerato mixtum durities remolliat.

BRATHY, HERBA SABINA

Sabina cupresso similis calefacit siccatq; in tertio ordi-
ne, tenuissimaq; est, extenuat & digerit pota, tum in pus-
tredines cupresso similiter efficax est.

BRITANNICA.

PAVLI ÆGINETÆ

Britannica astringit & conglutinat, syluestri lapathio specie similis, succus ipsius putredines os infestantes perosanat.

EROMVS, VRENA.

Auena similem hordeo obtinet facultatem, siccatur autē & modice citra corrosionem discutitur, iam & nonnullius astringentis compos est, unde & alui profluuiis subuenit.

BRYON THALASSION.

Bryon thalassion refrigerat simul & astringit, eoq; feruentibus inflammationes illitum adiuuat.

BRYON.

Bryon, quod alii sphlanchnon dicunt, in quercubus & populis albis, piceisq; inuenitur, distrahendi simul & molliendi uim moderatam obtinet, potissimum quod cedris adharet.

BRYONIA.

Bryonia dicta est uitis alba.

INITIVM LITERÆ G.

GALA, LAC.

Lac omne tribus constat substantiis, caseosa, serosa, & pingui, quam copiosissimam bubulum obtinet, unde et butyrum efficitur. Serum ipsius uim habet abstergerendi, unde & aluum subducit, si ipsum per decoctionem secernas, id quod caseum refert & crassum est, magis obstruit, atque ideo acrimoniam obtundit: coctum uero lac aut marinis calculis ignitis in ipsum iniectis, aut alio quodam modo, praesens fit remedium dysenteriae, & acrium in uentrem defluxionum. Cæterum lac totum ad acres oculorum fluores aliasq; acrimonias conducit. At temperatissimum lac, muliebre est, mox caprillū, hinc asininum, ouillumq; postremo uaccinum.

GALE, MVSTELA.

Mustelæ concremata cinis abunde digerit, ex aceto igitur illitus podagricos, & articulares dolores: iuuat inane refect

refacta autem inueterataque mustela comitialibus auxiliatur.

GALION.

Galion à coagulando lacte dictum est, aparinae simile, siccandi uim, mediocremq; acrimoniā habet: flos eius ad sanguinis ex naribus eruptiones & ambusta cōgruit.

GALOPSIS, VEL GALIOPSIS.

Galopsis, quam alii galibdolon appellant, urticae similis herba est, uerum maiorem habet *leuorem & odorem grauem, scirrosos tumores dissipat & emollit, item ad ulcera serpentia facit emplastri modo imposita.

*Dioscorides hoc ad folia refert.

GARVM.

Garum calefacit exiccatq;, ac ideo aduersus ulcera putrida extrinsecus eo utuntur, praeterea contra intestinorum tormina & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniicitur.

GENTIANA.

Gentiana radix efficax admodum est extenuare, perpurigare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

GERANIVM.

Geranium id quod foliis respondet anemonae, radicem habet esculentam, quae cum uino denarii modo pota uteri inflationes dissoluit, altera geranii species ad medicinam inutilis est.

GE, TERRA.

Omnis terra deficcet: quae uero alterius substantiae expers est, etiam sine morsu id facit, at si ignea quaedam ipsi qualitas admixta sit, lotionem hanc quoque deponit. Inter cultas igitur terras quaelibet pinguis omnium partium cularum quae siccati postulant, curationi accommodata est: Aegyptio igitur luto utuntur contra aquas cutem subeuntes, & lienes induratos, item ad fungosos, laxosq; tumores euidenter proficit. Ex terris medicatis lemnia rubrica, quae sphragis dicitur, siccatur pariter & astringit mediocriter, contra lethalia medicamenta praesentis antidoti uires habet, ulceribus malignis cum aceto aut uino

PAV. AEGIN.

OO

PAULI ÆGINETÆ

medetur, sanguinis profusionem quamlibet sistit, intesti-
norum tormina finit, & depascentem dysenteriam inte-
stino malsa prius, deinde muria per clysterem eloto, per-
sanat. Synopsis rubrica uehementior quam lemnia, em-
plastice miscetur medicinis, & pota lumbricos intere-
mit, sed multo lenior est samia, ceu glutinans & uiscosa,
quare utendū ea est in his quæ leniri oporteat: omneis
sanguinis excreationes, quacunque parte erumpat, com-
pescit. Selenusia & chia maiore abstergendi uirtute pol-
let, ideoque mulieribus ad nitorem cutis & laeuorem in
facie utilis est, ulceribus carnem & cicatricem inducit,
præsertim ambustis. Cimolia mixtæ facultatis est refri-
gerantis discutientisque, idque simplex & illota, lota uero
magis refrigerat, & ambustis ex posca medetur. Ampe-
litis à uineis appellata est, quod innascentes ipsis uer-
mes enecet, siccat & discutit egregie citra erosionem.
Cretica aeria est, & sine morfu abstergit. Erethrias eui-
denter astringit, concremata uero sine rosione deficcet,
præstantior uero est cinerea. Pnigitis similes cimoliae ui-
res repræsentat, sed colore nigrescit. Armenia, quam et
bolum nominant, summe deficcet, unde intestinorum
torminibus, alui profluuiis, sputo cruento, tabi, spiritus
difficultati ex humiditate, ulceribus humidis & pestilen-
tialibus uitiis strenue opitulatur. Cæterum cum uino te-
nui diluto bibitur: si febris adsit, cum aqua. Alana autem
gleba armenia uim obtinet. Ochra uim habet discuti-
endi exedendi que, reprimat igitur supercrescentia ulcera &
caua cum cerato mixto replet.

GERAS, SENECTVS ANGVIS.

Senectus anguis affatim siccat: aceto igitur subferues-
cit, dentium doloribus medetur. Aspidis exuium cum
melle tritum delitumque, oculorum aciem maxime
iuuat.

GES ENTERA, TERRÆ

intestina, seu uermes terreni.

Lumbrici terræ de uerminuorum uulneribus impositi,

repente euestigio mirabile adferunt præsidium.

GIGARTA, NVCLEI ACI
norum uuæ.

5 Nuclei acinorum uuæ deficcant ordine secundo, refri-
gerant primo. quum itaq; abunde sint *acerbi omnibus
alui uitiis fluidis, conueniunt.

GINGIDIVM.

10 Gingidium calorem non adeo manifestū sortitum est,
cæterum siccatur in abscessu tertio, & astringit, qua de cau-
sa & stomacho utile est.

GLAUCIVM.

Glaucium astringit, sed ita ut etiam non nihil gustanti sit
ingratum, manifeste refrigerat, eaq; ui sacris ignibus nō
ualidis succurrit.

GLAUX.

15 Glaux herba calida & humida temperamento est, unde
ad lac generandum efficax est.

GLECHNON, PVLEGIVM.

20 Pulegium calefacit, & extenuat uehementer, unde si illis
natur ruborem excitat, & crassos uiscososq; humores
è thorace & pulmone emolitur.

GLOEOS, SORDES BAL-
NEORVM.

25 Sordes balneorum calefaciunt modice, emolliunt, disci-
tiunt, rhagadibus & condylomatis accommodatæ.

GLYCYRIZA, DVLCIS
RADICVLA.

30 Glycyrriza tepidi humidiq; temperamenti est, alicuius
etiam astrictiōis particeps, eoq; nō modo fauces exas-
peratas læuigat, sed etiam uesicæ scabiei medetur eadē
sitim arcet.

GLYCYSIDE, PÆONIA.

35 Glycyside quam alii pentameron, nonnulli pæoni-
am uocant, radicem habet acrem & leuiter subama-
ram & siccantem, cui etiam astrictiōis nonnihil in-
est, quapropter menseis ciet, renes & iecur purgat

*Græcū
↓υχρ' ha
bet, quod
est frigi-
di, pro
spuφρα,
hoc est
acerbi, sic
enim Ga-
lenus ui-
detur les-
gere.

PAULI AEGINETÆ

instar amygdalæ pota cum uino: at si hoc austerum fuerit, alui quoque fluores coercet, ad alligata uero puero morbum comitalem abigit.

GNAPHALIVM, CENTVN CVLVS.

Centunculus dictus est gnaphalium. quod foliis ipsius teneris loco tomenti, gnaphalon dicitur, utamur. sunt autem calida & modice astringentia, atque hinc ad intestinorum tormina cum uino austero bibuntur.

CONGYLIS, RAPVM.

Rapi & radix & semen flatulenta & semini creādo sunt, ueneremq; excitant.

GORDYLON.

Gordylon alii seseli appellant, calidum est, urinæ & menibus educendis habile, radix ipsius cum melle linctā, quæ in thorace hærent, educit.

GYRIS, POLLEN FARI NACEVS.

Pollen uirtute respondet amylo, sed calidior est.

GYPSVM.

Gypsum uim habet siccantem opplentemq; , propter quam ad sanguinis ex naribus eruptionem conuenit temperatum cum candido oui liquore, uisum uim opplendi non similiter retinet, uerum magis siccat & repellit præsertim cum posca.

QVÆ AD INCIPIVNT. DADES, TEDÆ.

Tedæ acce quiddam habent, item uim concoquendi, & abstergerendi nonnullam, unde aceto incoctæ dentium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt, mixtæ etiam eclegmatis faciles è thorace excreatus reddunt.

DAMASCENA.

Damascena, quum ad pruna uentum erit, exponam.

DAMASONIVM.

Damasonium absterforiam quandam uim obtinet, qua

LIBER SEPTIMVS. 297

calculos conterit, & *aqua in uentre collectas educit.

DAUCVS.

15 Daucum, quod & staphylinon dicitur, duplex est, cuius radix flatulenta est, & uenerem mouet. Syluestris dauci semen minime flatus creat, sed urinam & menseis citat, quemadmodum & herba ipsa.

DAPHNE, LAURVS ARBOR.

10 Lauri arboris folia siccant & calefaciunt insigniter, magis quoque fructus: radice cortex amarus & leuiter astringens calculos comminuit, & iecinorosis opitulatur cum uino odorato triobolarum pondere potus.

DAPHNE HERBA, LAURUS, alexandrina.

15 Daphne herba, quæ & Alexandrina dicitur, calida, acris, & subamara est, idcirco menseis & urinas commouet: laureola uero, quæ daphnoides græce nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas humilem laurum, quæ & ipsa commenducatur.

DERMA, PELLIS.

20 Pellis ouina recens detracta, calens adhuc iis qui flagris cæsi sunt circumposita, mirifice auxiliatur. At hipoppositami pellis combusta & cum aqua læuis imposita phymata discutit. At uiperæ pellis detrita imposita quoque, pilorum defluuia mirabiliter reficit.

35 DERMATA, HOC EST, PELLIS

les seu coria ueterum calceamentorum.

30 Coria ueterum calceamentorum crematorum cinerem reddunt siccatorium, unde ex calceis pedum attritibus nondum inflammatis, ambustis intertriginibus, & tuberculis medentur.

DICTAMNON.

Dictamnium tenuius est uirtute pulegio, cætera simile, quod autem uocatur pseudo dictamnion imbecillius est.

DIONYSIAS.

35 Dionysias dicta est in androsamo.

DIPHRYGES.

*Græce habetur & quod est urinas nimirum pro uide hoc est aquas.

PAULI AEGINETA

Diphryges mixta est facultatis: habet enim quippiam
astringens & mediocriter acra, ideoq; malignis ulceris
bus praesens est remedium.

DIPSACOS, QVOD LAM

brum ueneris dicitur.

Dipsaci spinæ radix in secundo ordine desiccata, nonnul
lam uero abstergendi uim simul obtinet.

DORYCNION.

Dorycnion simile temperamento est papaueri & man
dragoræ, immodice refrigerans: si quidem modicum
torporem inducit: copiosius assumptum interimit.

DRACUNTIVM, DRA

CVNCVLVS.

Dracuntium simile quiddam aro habet, sed eo acrius,
amarius, calidius, tenuiusq; est. Item astringentis nonni
hil habet coniunctum. Radix ipsius pota uiscera purgat
& perulaculum seu malignorum ulcerum excellentis
simum est remedium: folia respondent: fructus ualens
tior est.

DRYOPTERIS, FILICVLA.

Fillicula dulcis, acris, & leuiter amara est: radix acerba
est, cæterum uim habet exedentem, qua & pilos abolet.

Drys. QVERCVS.

Quercus & folia & fructus siccante & tepida ui pollêt,
quamobrem uulnera recentia glutinant, inflammationis
bus incipientibus medentur: at quod sub glandis corio
& circa fructus carnem membranæ simile includitur, ua
lentius astringit: eoq; ad fluxum muliebrem, aliosq; flui
dos morbos exhibetur.

QVÆ AB E INCIPIVNT.

EBENVS.

Ebeni ligni uis est excafactoria, deterforia & subtilis,
quapropter quæ pupillas obscurat abstergere creditur,
aliisq; oculariis miscetur medicinis.

ENCEPHALOS, CEREBRVM.

Cerebrum leporis coctum confricatum, comestumq;
infantium dentitionibus utile esse fertur: nonnulli uero
tremoribus succurrere manducatum, literis prodiderunt.

- At galli cerebrum cū uino potum ad uenenatos mor-
sus efficac esse Dioscorides pronuntiat, et sanguinis è ce-
rebri membranis eruptionem cohibere. Cameli cere-
brum Galeno auctore siccum cum aceto potum, comi-
tiales persanat. Idem facit mustelæ cerebrum. Hirundi-
num cum melle in oculorum suffusiones efficac est.
10 Cerebrum ouillum similiter præparatum infantium de-
titionibus exacte opitulatur.

ELÆA, OLEA.

- Oleæ ramusculi quantum astringunt tantum etiam res-
frigerant, fructus qui exacte ematuruit, moderate calis-
15 dus est, immaturus maiorem tum astringendi tum refri-
gerandi uim repræsentat.

ELÆA, HOC EST OLEA,
æthiopica.

- Oleæ æthiopica lachryma ammoniaco tenui similis, ui-
res habet extensorias, quare ad cicatrices, albugines, he-
betudinesq; oculorum ea utuntur, et ad dentium dolo-
res, si cauis ipsorum iniiciatur, efficac est: nonnulli uero
sylvaticam esse hanc oleam asserunt.

ELÆON, OLEV M.

- Oleum ex oliuis drupis dulce calidumq; mediocriter
est magis humectans: at quod immaturis oliuis expri-
mitur, Græci omotribes appellant, astrictionis particeps
est tantæ quantæ etiam frigiditatis. Elotum uero oleum
morsu ac rosione caret, uetus quanto diutius reserua-
30 tum tanto acrius calefacit discutitq; præsertim si iam in-
de ab initio tenue extiterit: iudicatur autem id, si purū sit,
pellucidum: si paucum magnam corporis partem inun-
gat, & ex facili cutem penetret cōbibaturq;: huiusmodi
nimirū est Sabinū: quod aut ex agresti olea funditur, ab-
35 stergit simul et astringit, squalidissimumq; id est in omni
oleorum genere, ricinum uero æquales ueteri ui-

PAVLI ÆGINETÆ

res obtinet: reliqua uero nempe sesaminum 'aut raphaninum & quæ eius sunt generis, pro substantiis ex quibus constant, uires quoque diuersas præ se ferunt.

ELAEOMELI, OLEOMEL.

Oleum in Syria ex trunco quodam arboris emanat crassius melle & dulcius, quod instar duorum cyathorum potum cum aquæ hemina, crudos humores biliososq; ex alio educit: qui uero id bibunt, torpescunt, quod extimescendum non est, sed excitari ipsi debent.

ELATERIVM.

Elaterium succus syluestris cucumeris fructus appellatur, in secundo ordine, calefaciens, quod mensis pro uocat, foetus appositum propter sumnam amaritudinem necat, euacuationem etiam ex naribus cum lacte instillatum molitur: ab inferioribus partibus inditum, pituitam nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

ELATE, ABIES.

Abies arbor calefacit siccaturq; nigrae populo similiter: de resina ipsius in resinarum sermone agemus.

ELATINE.

Elatine herba est parietariae similis, mediocri frigiditate & astringione donata.

ELAPHOBOSCVS.

Elaphoboscus uirtutis est calefactoria & sicce in secundo abscellu substantia tenuis,

ELELISPHACVS, SALVIA.

Salvia euidenter calefacit & leuiter astringit.

HELENIVM, INVLA

CAMPANA.

Helenium calidum est & siccum cum excrementitia humiditate, quare & eclegmatis temperatum infarctos thoraci humores educit, ac particula ex eo ruborem contrahunt.

ELEOSELINON, PALV

STRE APIVM.

Eleoselinon in aquosis natis locis idem potest quod

LIBER SEPTIMVS.

293

hortense apium, licet maius ipso existat.

ELEPHANTVS

Elephanti ex ungue ramenta si illinantur, reduuis pro sunt: item ossium dentiumq; ipsius quum sint siccae facultatis & absterforia, huiusmodi miscentur medicamentis.

HELCSMA, ARGENTI

recrementum.

Helcysma argenti est excrementum, uiribus plumbagioni respondens: quippe astringit simul atq; extrahit, quo fit ut emplastris fuscis & iis quae cicatricem ducunt, ad miscatur.

HELLEBORVS, VERATRVM.

Veratrum utrunq; calefacit & desiccatur in tertio abscessu, item acre est & absterforium, unde etiam ad leprosa cutis uitia conuenit: nigrum uero, si fistulis inseratur tribus diebus callum exierit.

HELICHRYSO.

Helichryson alii chrysanthos, alii amaranthum appellant, coronarius est frutex, coma aurum referente, quae cum uino pota urinae angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est, mensis educit, sanguinem coactum ex mulso pota dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

HELXINE, PARIETARIA.

Helxinem alii perdicium, alii parthenium, quidam sideritum, quidam heracliam nuncupant, uis eius est abstergere, ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

HELXINE.

Helxine quae & cisampelus dicitur, uim habet discutiendi.

ELYMVS, QVÆ ET MELI

ne dicitur Latinis panicum.

Panicum simile est milio, siccans refrigeransq; extrinsecus illitum, cæterum & alui fluores desiccatur.

EMPETRON.

PAULI AEGINETAE

Empetron, quod ab aliis prasoides nominatur, pituitam & bilem purgat, est etiam salsum, quare absterisionibus accommodatur.

EPITHYMV M.

Epithymum in tertio abscessu siccat & calefacit, thymo s efficacius.

EPIMEDI V M.

Epimedi uirtus est mediocriter frigida cum humiditate aquosa, quod si illinatur, mammas rectas conseruat, dicitur etiam sterilitatem potu facere.

EPIMELIS.

Epimelis, quæ etiam ab Italicis rusticis uocatur unedo, malus est syluestris, cuius fructus acerbus & stomacho inimicus est, capitiq; dolorem mouet.

EPIPACTIS.

Epipactis, quæ & elleborine appellatur, aduersus uenena & iocinoris affectus bibitur.

EREBINTHVS, CICER.

Cicer consuetum legumen flatus creat, ualentis materiam, aluum facilem reddit, urinam mouet, lacti seminiq; generando accommodatum, idem mensis elicit: at crios appellatum, hoc est arletinum, aliis magis urinæ cienda est, decoctum ipsius præsertim nigri calculos quosque in renibus conterit, quod orobæum ab eruo uocatur, calidius his est & subamarum. Syluestria quouis modo domesticis sunt ualidiora.

ERIA, HOC EST, LANÆ SORDIDÆ.

Lanæ sordidæ respirationibus utiles sunt, nam pinguedo ipsarum, quam celsypon Græci appellant, butyri modo concoquit: at quæ sordibus carent materiam rationem duntaxat obtinent: concrematae uim habent acré calidam, siccam simul et tenuem, ut etiam flaccidas cum humiditate: ulcerum carnes protinus absument.

ERICE

Erice ui pollet discutiente citra rosionē, sed flore ipsius

LIBER SEPTIMVS

294

potissimum, & foliis utendum est.

ERINOS, QVOD LATINE

ocimum aquaticum dicitur,

Erinos aquatica herba est, cuius seminis denarii duo cū mellis denariis quatuor illiti, oculorum fluxiones sistunt, succus aurium doloribus benefacit.

HERMODACTYLVS.

Hermodactyli radix et per se, et ipsius decoctum uim habet purgandi priuatim et arthriticis tunc quum humores defluunt exhibetur, uerum stomacho nimis quā aduersatur.

HERPILLVM, SERPILLVM.

Serpillum calefacit, ut et urinam et menstrua commoueat.

ERYTHRODANON, QVAM

romani rubiam pasfluam uocant.

Erythrodanon rubra tinctorum radix est acerba amaraq; lienem, iecur et renes ita purgat, ut cruenta quoque per urinam et menses euocet: ac cutis uitia rancida abstergit.

ERYSIMON.

Erysimi semen igneum calefactoriumq; est, nasturcio similiter, quare infermento tostum, thoracem purgat in eclegmatis assumptum, duritiasq; emollit, et cacos caneros illitu adiuuat.

EVZOMON, ERUCA.

Eruca et ipsa priori similis temperamento, flatulenta est, ob quod ad uenerem instigat, semen ipsius urinam quoque mouet. Cæterum siluestris domestica ualentior est.

EVPATORIVM.

Eupatorium tenuem uim et incidentem sine conspicuo calore habet, quia iecur obstructum expurgat, est et nonnullius astrictionis particeps.

EUPHORBIVM.

PAULI AEGINETAE

Euphorbium adurentem uim sortitum est subtilemque
aliis liquoribus similiter.

EPHEMERON.

[Additū
ex Gale-
no.]

Ephemeron non uenenum illud sed quod iris syluatica
nominatur, mistæ potestatis, est, & repellentis & discus-
tientis per halitum. 1

ECHIDNA, ID EST VIPERA.

Viperæ carnes calidæ & sicce temperatura euidenter
existunt, quæ corpus totum per cutem expurgant, hinc
multi quos elephantia male habebat, esu potuue ipsa-
rum conseruerunt: quæ in maritimis aliisque locis aridis
degrunt, magis ad sitim faciendam sunt efficaces. 10

ECHINVS, HERBA.

Echinus herba quædā acerba est, quæ repellat & siccet.

ECHINVS, ERINACEVS.

Erinacei terrestres fel, pilos defluentes glutinat, caro eius
inueterata ualide discutit exicatque: pota igitur elephan-
ticis, malo habitu peditis, & aliis plurimis auxiliatur:
pellis ipsius concremata uehementius siccet & digerit
capillorum defluuia cum pice liquida peruncta sanat. 10
Marini erinacei quod esui idoneum est, urinam citat, &
aluum reddit facilem: testa cremata, terrestri respondet.

ECHION.

Echion alii doriada, nonnulli alcibiadion uocant, spino-
sa herba est, quæ non modo à serpente commorsis cū
uino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti
non patitur. 25

HESPEMA, SAPA, SEV PASSVM.

Hespema mustum decoctum, quod alii siraxon appella-
nt, calefacit modice & concoquit, est autem medica-
mentum et emplasticum, et rosionis expers. 30

QVÆ A Z INCIPIVNT.

ZE A.

Zea tritico uiribus respondet, medium inter calorem 35

LIBER SEPTIMVS.

295

et siccitatem obtinens, leuiter exiccat, nec non obstruit.

ZINGIBER.

Zingiberis radix impense quidem calefacit, sed non primo statim occurſu, quod ineuictæ cuiusdam et crassioris humiditatis particeps sit, propter quam etiam facile perforatur, firmam autem conseruat caliditatem.

ZYTHVS.

Zythus conpositæ est substantiæ, etenim acris est, cœu ex putredine procreatus, et frigidus, ex qualitate acida, eoq; prauis succi habetur.

ZYME, FERMENTVM.

Fermentum et ipsum cōtrariis cōstat qualitatibus, quippe acoris cuiusdam frigidi, ac è putredine nati caloris, tum eius qui ex salis et farinæ natura contrahitur, compositus est: quare non mediocriter calefacit atque discutit.

ZOMOS, PISCIVM IUS.

Recentium piscium ius esculentum aluum et per se et cum uino potum deiicit, priuatim uero in hunc usum conficitur ex phycidibus, scorpionibus iulidibus, pericis, et saxatilibus aliis teneris nec uirus olentibus: coquuntur in aqua, oleo, anetho, et sale. Item eorum quæ testaceæ cutē integuntur, tellinarum, hiatularum, conchularum, et ueteris galli cum sale diutissime ex cocti iusculum, uentrem subducit, e contrario gallinæ ius comprimat.

QVÆ AB H INCIPIVNT,

quod latini in e longum uertunt.

HEDYOSMVS, MENTA.

Menta in tertio ordine calida, tenuis, acris cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in uenerem incitat: sed amari quoque non nihil obtinet quo lumbricos enecat. Quæ uero acerba est, recentes sanguinis eruptiones coerces.

HEDYSARVM.

Hedysarum aut pelecinos amarum est, leuiterq; astringit, unde potum stomacho gratum redditur, cæterum

PAULI ÆGINETÆ

uiscera obstructa repurgat.

HELIOTROPIVM.

Heliotropium maius, quod et scorpiurum uocant, calidam, siccam, et abstergentem uim præ se fert, cuius decoctum potu educit pituitam, bilemque; illitu fructus ipsius myrmecias et huius notæ uitia perficit. Minus autem heliotropium et hæc abolet et lumbricos interimit, si cum fructu, nitro, hissopo et cardamomo bibatur.

HELECTRVM.

Electrum populi albæ lachrymam dicunt, quæ iuxta amnem Eridanum destillat, et in spissitudinem coit, aureo colore, quod si laeuigatum bibatur stomachi, et alui fluxiones et sanguinem compescit.

HEMEROCALES.

Hemerocallis radix uiribus lilio respondet, similiter illi ambustis opitulatur.

HEMIONITIS.

Hemionitis astringens simul et amara est, idcirco lienis cum aceto pota succurrit.

HEPAR, IECVR.

Iecur rabidi canis tostum assumptumque, iis qui ab eo commorfi sunt subuenire fertur. Caprilli iecoris tosti humor tenuis, sanies uel lusciosos iuuare instillata, uaporque eius decocti oculis recipi iubetur. Idem iecur assum manducatum, comitiales coarguit. Idem prestare et hircinum ferunt. Ad hæc lacertæ iecur dentibus corrosis impositum, dolorem sopit. Item lupinum, medicamini hepatico quod constat eupatorio iniicitur. Asininum tostum comitiales, si ieiuni id manducent, adiuuat. Apri iecur recens in arefactum tritumque cum uino, ad serpentium morsus bibitur. At mergi hepar siccum epotum, calculos elicit.

ERIGERV M, SENECIO

HERBA.

Senecio mixtas habet uires, refrigerat et modice discutit,

LIBER SEPTIMVS.

296

ERYNGIVM.

Eryngium calefacit quidem non manifesto, siccitatis autem haud obscure nec modice particeps.

QVÆ A TH INCIPIVNT.

THALASSION HYDOR

aqua marina.

Aqua marina acris calfactoria mediocriter, desiccans, et pota stomacho contraria est, uentrem turbat, pituitum tamque educit, si calida superfundatur, extrahit et digerit.

THALIETRV M.

Thalietrum siccandi uim sine rosione habet, hinc ulcera inueterata cicatrice obducit.

THAPSIA.

Thapsia acris est, et ualenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractumque eadem discutit.

THEION, SVLFVR.

Sulfur trahendi et ipsum uim obtinet, calidum et substantia tenue, ut aduersus pleraque uirulenta animalia resistat, praesertim turturem marinum, draconemque: uel sic cum inspersum, uel saluæ quoque mistum, uel urinæ pueri, uel oleo, uel melli: item scabiosa corporis uirum mirifice per sanat.

THERMOS LVPINVM.

Lupinum: esculentum quidem obstruendi uiribus pollet: amarum, abstergit, dissipat, et sine morfu desiccatur, lumbricos occidit illitum et potum, uiscera purgat cum ruta et pipere, potu etiam cutis uitia extergit, tumores dissipat, cum oxymelite illitum: syluestre autem amarum est omni ex parte satiuo ualentius.

THELYPTERIS.

Thelypteris, quam nonnulli nympheam uel ptellin appellant, filici similis facultate, quæ cum uino pota latos et teretes uentris lumbricos interimit, foetum in utero corrumpit: folia ipsius manducata aluum emolliunt.

THLASPI.

Thlaspi semine est uiribus acre, ut intestinos abscessu potu

PAULI AEGINETAE

rumpat, menseis prouocet: ab inferioribus partibus inie-
ctum coxarum dolores finit, cruenta uacuat, ac alioquin
supra infraq; biliosa instar acetabuli potum, expurgat.

THRIDAX, LACTUCA

Lactuca olus est non summe frigidum humidum ue,
sed pro fontanae aquae temperamento, quapropter calidis
inflammationibus conuenit, praeterea sitim potu res-
tinguit, & geniturae fluorem cohibet: Syluestris lactus-
ca hac minus & refrigerat & humectat, uerum succulen-
tior existit.

THYMVS.

Thymus in tertio ordine calefacit & deficcet, glutinosos
crassosq; humores incidit.

THYMBRA.

Thymbra agrestis quidem eadem quae thymus praestat
hortensis autem in omnibus quidem imbecillior, sed
ad cibum laudatior.

THYMELEA.

Thymelaea, unde granum cnidium fit, simileis ei uireis
obtinet.

QVAE AB I INCIPIVNT.

IDAEA RADIX.

Idaea radix gustu acerba & uiribus, sanguinis eruptionibus
& rehumaticis affectibus, tum pota, tum extrinsecus
imposita accommodatur.

HIDROS, SVDOR.

Sudor per se contrahere efficax est, miscetur autem in
palæstris exercitantium sordibus, quibus astringendi uis
duntaxat inest, ac redditur totum discussorium. Mam-
mis igitur inflammatione tentatis efficax est remedium
& feruori ipsarum restinguendo: bene facit etiam bus-
bonibus: at si fuerint sicciores, cum cyprino, aut rosaceo
emolliri debent.

IXOS, VISCVM.

Viscum calefacit cum acrimonia, humores ex alto uali-
de elicit,

LIBER SEPTIMVS.

297

de elicit, & thapsia modo discutit, hac tamen multo est ignauius.

ION, VIOLA.

Viola folia aquea frigidaq; substantia præpollenti constant.

IOS, ÆRVGO.

Aerugo acrem gustu qualitatē præ se fert, item digerit, consumit, inciditq; nō teneram modo, sed duram quodque carnem: at si momentū ipsius cerato copiosiori miscas, medicamentū fiet qđ citra rosionem abstergat.

HIPPOCAMPVS.

Hippocampus marinum animal est, cuius concrematis cinis cum liquida pice pilorum defluuia, Græci uocant alopecias, explet.

HIPPOLAPATHVM, GRANDIS RVMEX.

Hippolapathum in palustribus locis nascitur, lapathum consimile.

HIPPOMARATHRON.

Hippomarathrum cachryi proximum, magis quā marathrum desiccatur, unde & aluum fluentem sistit, & calculos confringit, menseisq; mouet: semē ipsius coriandro respondet, sed illo imbecillius est.

HIPPOPOTAMVS.

Hippopotami, quod est equi fluuiatilis testiculus aridus potus ad serpentium morsus efficax est.

HIPPOSELINON.

Hipposelinon cum apio domestico uirtute conuenit, nisi esset imbecillus.

HIPPVRIS, CAUDA EQVINA.

Hippuris astringentem cum amaritudine qualitatē possidet, eoq; ualenter simul & sine morfu desiccatur, ac uulnere maxima committit, Intestinorum ramicibus opitulatur, & uitiis fluore infestatis cū uino pota medetur.

HIPPOPHÆS, LAPPAGO.

Hippophæ, quod alii hippophyes uocant, quo uellets

PAV. ÆGIN.

PP

PAULI ÆGINE TÆ

expoliunt surculosus frutex est, è cuius radice thapsiæ modo liquor colligitur, qui cū erui farina instar denarii datus, bilē ac pituitā purgat: item totus ipse frutex siccat⁹ tus ad purgationes accommodatur.

IRIS.

Iris affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantia, *tusi utilis, humores in pectore contumaces extenuat, torminibus medetur, sordida ulcera purgat, cum mulsa pota aluum inanit.

ISATIS.

Isatis domestica qua tinctorum utuntur, siccandi uireis & astringendi habet, his etiam magna uulnera in duris glutinat corporibus, sanguinem erumpentem compefcit, laxos tumores discutit, ac omnibus malignis ulceribus resistit. Syluestris autē quum magis rodat, magisq; ideo siccet, ualentius aduersus humanas putredines pugnat, ad cætera deterior, ut quæ immoderatus mordeat: cæterum ob uirium uehementiam lienosis quoque utiliter adhibetur.

ISOPYRON, AUT PHASIOLVM.

Isopyrum phasiolumve semen amarū ac modice acerbum occupat, ob quod crassos glutinososq; humores & abstergit & incidit, sic ut corpora contrahat stringatq; hinc etiam quæ alte desident expurgat, excreationibus sanguinis non efficax.

ITEA, SALIX.

Salicis & folia & flos facultate constant quæ citra roscum nem siccet, tum quæ nonnihil etiam astringat, cortex autem paulo siccior est, cuius perusti cinis ex iis habetur quæ uehementer exciccent, quippe clauos & myrmecias, cum aceto exterit.

ICHTHYOCOLLA, GLV.

ten piscium.

Ichthyocollæ uis est opplere & siccare, recte miscetur emplastris glutinantibus, & iis quæ ad lepras, & irrugas

Impres-
sum exē-
plar pñfi
pro Bñfi.

LIBER SEPTIMVS.

298

tionem leuioremq; uultus conficiuntur.

QVÆ A C INCIPIVNT.

CANCANVS.

Cancani radix modice siccat, & sine morfu, illitionibus
5 accommodata, quare cum uino subacta tragacanthæ &
dulcis radicula modo, linctaq; arteriæ scabritiæ iuuat.

CANCAMVM.

Cancamum lachryma est arboris in Arabia, myrrhæ si-
milis, odore grato, qua etiam ad suffitum utuntur, uis
10 eius est obesos extenuare, abstergere, & aperire ob-
structa.

CADMIA.

Cadmia utraq; siccat, sed quæ botryitis quasi acinosa
appellatur *crassioris est substantiæ, placitis autem di- *Galenus
15 sta, tenuioris. Cæterum concremata cadmia sine morfu botryitin
desiccatur, abstergit, concava ulcera explet, oculisq; & toti tenuiorē,
corpori utiliter adhibetur: at humida maxime ulcera in placitin
corporibus molliuscule, eiusmodi cadmia sanat, in du- crassiorē
rioribus efficacium magis usus est. ponit.

CACALIA.

20 Cacalia uiribus & usu cum cancano conuenit.

CALAMAGROSTIS, GRA-

men arundinaceum.

Calamagrostis siccat, hinc succus decoctumq; radicem
25 ipsius oculariis miscetur medicinis, semen urinam cit,
& stomacho benefacit.

CALAMINTHA, NEPITA.

Nepita tertio ordine calida & sicca temperamento est,
tenuis acrisq; menta longe ualentior, siquidem est ue-
30 lutis syluestris menta: facile igitur quæ alte hærent ad
se trahit, sudores mouet, totum corpus digerit, ac
rigores febrium qui circuitu remeant, finit, extrin-
secus cum oleo infricata strenue. quinetiam coxarum
dolores soluit, & uitiosos humores in cutem erumpen-
35 tes abstergit.

CALAMVS.

PP ii

PAULI ÆGINETÆ

Calamus odoratus in secundo ordine calefacit & sicc
cat, inest ei quippiam & subtile & astringens, urinam ita
que citat, & stomachicis, tum quæ utero & iecinori fa
ciunt medicinis temperatur. Calamus autem phragmis
tes extergit, folia ipsius uiridia mediocriter refrigerant,
cortex crematus calefacit siccatur; in tertio abscessu: ra
dicem cum bulbis illitam spicula & aculeos extrahere
asserunt.

CAMPÆ, ERVCÆ OLERVVM.

Erucae olerum cum oleo inunctæ, tutos à uirulentorū
animalium moribus conseruare dicuntur.

CANTHARIDES.

Cantharides quæ in tritico reperiuntur luteis transuersi
sim cingulis inuolutæ, aceti feruescentis uapore suffoca
tæ, ad plurima utiles redduntur, quippe ungues scabros
tum cerato eiiciunt, clauis scabiosisq; affectibus opitu
lantur, iam uero & exedentem urentemq; uim habent:
nonnulli uero etiam medicamenti urinam prouocanti
bus momentum ex ipsis admistum exhibuerunt.

CANNABIS.

Cannabis semen flatus discutit, itaq; siccatur & genitura
exarefaciat succus ipsius uiridis ad aurium dolores ex
obstructione creatos efficax est.

CANOPON.

Canopon sambuci flos est, de quo prius dictum est.

CAPNION, SECVNDVM

alios capnos, fumaría.

Fumaría inde nomen sortita est quòd succus ipsius co
piosas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritas
tem acris amaraq; est, unde urinas biliosas liberaliter p
uocat, iecinoris obstructioni languoriq; medetur, stoma
chum confirmat & aluum emollit.

CAPPARIS.

Capparis radix extergit, probe purgat, incidit, discutitq;
tum amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate cōtrahit,
stringit, & dēsat, quapropter lienes induratos & pota &

LIBER SEPTIMVS.

299

extrinsecus imposita, iuuat menseis promouet, pituita p
os educit maligna ulcera sanat, dentium dolores sopit,
tumores digerit, & uirilignes, quas alphos dicunt, auriu
uermes enecat: folia autem & fructus similem quidem,
5 sed imbecillorem uim possident.

CARDAMVM, NASTVRTIVM.

Nasturtii semen sinapis modo urit, unde etiam illitu cu
tem exasperat: ceteru crassos humores, cu aliis potum
incidit, herba uero arida uiribus respondet, humida mo
10 deratior, ideoq; crudam ipsam assumunt.

CARDAMOMVM.

Cardamomum acre quidem & ipsum est, uerum nastur
tio inualidius: compos est etiam nonnullius amaritudi
nis, qua lumbricos interemit, & scabiem cum aceto
15 exerit.

CARIS.

Caris in pollinem detrita & cum radice bryoniae pota,
lumbricos occidit.

CANCRI.

20 Cancrorum concrematorum cinis, fluuiatilium sane sic
cat, erinaceorum & cochlearum modo, at totius substā
tiae proprietate, canis rabidi morsibus potu mirabiliter
efficax est: marinoru cinis eximia donatus siccitate his
quidem non conuenit, sed iis qui magis siccari desides
25 rant, proficit, fluuiatilis cancer tritus si illinatur, spicula &
aculeos eiicit.

CAROS.

Carisemen & siccatur & calefacit in tertio fere gradu, flas
tus digerit, urinam mouet, idq; non semen duntaxat, sed
30 etiam tota planta.

CARPESIVM.

Carpesium odoratum est & tenue. uiscera obstructioni
bus liberat, urinas mouet, et renes calculo laborantes
purgat.

CARYA, NVCES.

35 Nucis arboris coliculi aliqd habent qd astringat, plura

PP iii

PAULI AEGINETAE

num iuglandum calyx puluinus, succus itaq; eorum decoctus cū melle, stomaticū fit medicamentū: interius inde putamen carinatum ustum extenuandi uim acqrit, & sine rosione siccatur, quod in eo clauditur edendo aptū natura oleosum, facile bilem auget, confectūq; ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines, quas sepedonas dicunt, discutendi uim obtinet. Flaccescentes itidem uetustate nucis mēbranæ, cutis uitia abstergunt. At auelanæ, quas & ponticas uocant & leptocarya, frigidiores sunt & austeræ, in cæteris, iuglandibus æquales.

CARYOPHYLLON.

Caryophyllon, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam quæ nomine prætenditur, sed ex India ueluti flores cuiusdam arboris festucacei & nigri sunt, longitudine pollicari propemodum, odorati, acres, subas mari, calidi & sicci in tertio ordine: qui multiplicis usus sunt, tum in faciei medicamentis, tum in aliis.

CASSAMVM.

Cassamum hoc nonnulli balsami fructum esse dicunt, de quo supra egimus.

CASSIA.

Cassia calefacit & siccatur in tertio fere abscessu, tenuis abunde, acris & modice astringens: incidit igitur simul & discutit, roburq; instrumentis adiicit, postremo & mēleis euocat.

CASTORIVM.

Castorium calefacit siccaturq; cum extenuandi uiribus eximis, quibus præter alias actiones, etiam neruorum qui ex copia humorum male habent, affectibus, congruit, & refrigeratos facile excalfacit, & extrinsecus applicatum & potui datum, idq; ita, ut nullam aliam offendat particulam etiam si mediocriter febris affligat, quæ admodum in torporibus & lethargis: sed mensibus reuertentis proficit, & secundas expellit, at in cerebri & pulmonis uitis etiam suffusus castorii inspiratu haustus, præclare opitulatur.

LIBER SEPTIMVS, 300
CAUCALIS.

Caucalin alii daucum syluestrem appellant, quod daus
ei modo calefaciat, siccet, urinam moueat, & salsamen
to ad repositionem condatur.

5 CENCHROS, MILIVM.

Milium refrigerat in primo abscessu, siccet in secundo,
habet etiam modicam extenuandi facultatem: extrinse
cus igitur in sacculis ad fouendum adhibitum, & illitū,
desiccare consuevit.

10 CEDRVS.

Cedrus & frutex iunipero similis, & arbor est: ambo ca
lefaciunt siccantq; in tertio ordine. cōfectum ex eis oleū
quod cedrazam, seu liquorem cedrinum appellant, ē
quartum attingit, subtilis admodum substantiæ. hinc te
15 neras carnes expedite & citra dolorem exedit, duras au
tem præsertimq; demortuas siccet & à putredine asse
rit, pediculos, pulices ascaridas, & aurium uermis inter
ficet, aliaq; plura facit.

CENTAVRIVM.

20 Centaurii maioris radix acris, calida, & terrea astrictio
nis compos est, menseis itaq; promouet, foetus corrup
pit, mortuos eicit, uulnera glutinat, sanguinem spuenti
bus, & reliquis pectoris uitis præsens est remedium.

Minoris centaurii radix inefficax est, coliculi ualide &
25 citra morsum *siccant, unde non solum ad quæ maius
centaurium ualet, sed etiam coxendice laborantibus, ip
sius decoctum inferius iniectum biliosa uacuat, nonnū
quam et cruenta, quum plus proficit.

CERAS, CORNV.

30 Cornu caprillum hircinumq; concrematum denteis ni
tidos reddit, gingiuas humenteis compescit. Cerui cor
nu cum uino maceratum tritumq; deinde circumlitum
mobileis sistit denteis, crematum: mox lotum, intestinos
rum torminibus coeliacis, sanguinem expuentibus, et
35 felle suffusis, duorum cochlearium instar auxiliatur: mis
cetetur etiam oculariis medicinis. Taurinum cornu cum.

*Impres
sum exē
plar, cale
faciunt.
Galenus
scripto
consentiū

PAULI AEGINETAE

aqua, potum, sanguinis eruptiones cohibet.

CERASIA.

Cerasia dulcia quidem citius dilabuntur, austera stomacho utiliora sunt, acida uero, ob incidendi uim quam habent pituitosis excrementosisque stomachis profunt, gumi uero cerasi arboris fauceis exasperatas leuigat, & caliculo laborantibus cum uino potum succurrit.

CERATONIA ARBOR.

*Galenus
astringen
di. Ceratoniae fructus qui ceratia dicuntur, siccandi et *refrigerandi uirtutis, nonnullius est dulcedinis particeps est.

CEPHALE CAPITA.

Menarum salutarum capita cremata, uim siccandi non admodum acrem acquirunt, hinc sedis rimas et guttur diu induratum sanant, Smaridis caput totum combustum ad pilorum defluuia cum adipe urfino proficit. Idem praestat etiam muris caput crematum cum melle. Milui aridum sine plumbis, modo qui tribus digitis comprehendiqueat, cum aqua potum anni dolores finit. Lacerta uero caput aculeos educere tradunt, myrmecias, uerucas, et clauos exterere.

CECIS, GALLA.

Galla omphacitis, id est, immatura medicamentum est affatim astringens, eamque ob causam siccatur, fluxiones repellit contrahitque, laxa stringit, et partes imbecillas firmat, fluidisque omnibus affectionibus accommodata est: ponitur autem in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium. Altera quae flauo colore inanis magnaque est, non tantam in siccando et astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes et procidentias excocta iuuat: gallae uero combustae et aceto restinctae, sanguini supprimendosunt.

CEPÆA.

Cepæa portulacæ similis est, folia ipsius contra uescicæ scabies utiliter bibuntur, radix cum asparago, quem mycanthinum appellant, pota, urinae stillicidia, quæ opples

LIBER SEPTIMVS.

301

CERA.

Cera quum temperata sit, reliquorum medicamentorum materia efficitur, ipsa uero per se ex iis est, quæ leuiter abstergunt, nam & digerentem & calidam uim exiguam obtinet.

CERICES, BVCCINA,

Buccinorum testa concremata excellenter deficcet contra rosionem, unde ulceribus maleficis accommodatur, at in iis quæ putredinem experiuntur, cum aceto, aut uino, aut oxymelite ipsis utendum est, oleum in quo ueluti caro ipsorum adhuc uiuentium ex cocta sit, aurium dolores si instilletur, discutit.

CICI, RICINVM.

Ricini fructus quemadmodum purgat, abstergit, digerit, sic etiam folium, sed imbecillius: de oleo tractatum est.

CINNABARIS.

Cinnabaris acris mediocriter uires habet, item non nihil astringentes.

CINNAMOMVM.

Cinnamomi uis est summe tenuis, non item æque calida, sed tertii ordinis, nihil autem ex iis quæ parem ipsi calorem referunt adeo siccat propter substantiæ tenuitatem. Cinnamomis autem ueluti inualidum quoddam cinnamomum est, quod nonnulli pseudocinnamomum uocant.

CIRCAEA.

Circææ radix calida est & odorata, quæ cum uino posita sceminarum locos purgat: semen in sorbitione sumptum lac generat.

CISSERIS, PVMEY.

Pumex absterforius est præsertim dentium, non modo uiribus, sed etiam scabritie, conicitur autem in medicamenta quæ carni ulceribus inducendæ sunt, item in ea quæ cutis labes exterunt. Crematus tenuior quidem sed mordax redditur: lotus, id quod mordet, deponit.

CISTOS.

PAULI ÆGINETÆ

Cistos aut cissaros frutex est astringens & modice frigida uirtute, folia ipsius & germina adeo siccant, ut etiam uulnera conglutinent: at Hores quum in secundo fere gradu sicciores sint, intestinorum torminibus, alijsq; fluidis uitijs accommodati sunt: extrinsecus illiti, putrida ulcera compescunt.

CISSOS, HEDERA.

Hedera contrariis constat uiribus, ut quæ astringat & refrigeret. Item acris est & callida, aqueæ substantiæ & tepidæ quum uiridis est: particeps: cuius folia uino incotta uulneribus glutinandis, ambustis & lienosis salutariter adhibetur, succus ipsorum naribus ad pituitam educendam infunditur, item diurnis aurium defluxionibus succurrit: lachryma hederæ, ut quæ acrior sit pediculos enecat, & pilos abolet.

CITRIVM, QVODET MALUM medicum dicitur.

Citrii medium acidum aut qualitatibus expers est, in quo semen tertii refrigerantium siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo quidem abscessu, sed non item refrigerat, acris uirtute præditus: caro ipsius crassiusculi succi est, pituitæ generandæ apta, & frigida: semen digerit, & in secundo ordine desiccatur, folia arbori siccandi discutienti, uim representat.

CICHORIVM, INTYBUS SYLVESTRIS.

Cichorium picrisue tanquam syluatica seris est, refrigerans siccansq; in primo abscessu: habet etiam uim astringendi, quæ ad hepaticas dysenterias conuenit.

CLEMATIS.

Clematis quibusdam daphnoides, alijs myrsinoides, nonnullis polygonoides, sarmenta habet oblonga, crassiusculine iunci quem holoschoenum dicunt, folium uero lauri, siccandi uirtute pollet, quæ alui fluores, quam diarrhæam dicunt intestinorum tormina, & dentium dolores finit: contra uenenatorum morsus recte imponitur.

LIBER SEPTIMVS

302

CLEMATIS ALTERA

Clematis altera arboribus similis hederæ modo circum uoluitur, acris & caustica facultate donata, huius fructus cum aqua potus, pituitam & bilem per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas illinuntur.

CLINOPODION.

Clinopodii uis est calida sicca q̄, nondum uero adurēs, sed tertii fere ordinis.

CNECVS.

Cneci semine ad purgandam aluum duntaxat utimur si quis extrinsecus eo utatur, tertii siccantiū ordinis erit.

CONCHYLIA.

Conchilia buccinis facultate proxima sunt.

COELIA, VENTER.

Venter mergi, aut recens coctus, aut inarefactus, esu stomacho utilis esse dicitur: similiter etiam gallinarum interior alui membra sicca potui data: uerum Galenus experimento falsum utrumque se inuenisse scribit. Palubi uero auis uentrem paulatim potum calculos per urinam eliminare, testis est Dioscorides. Mustelæ aluius pota contra quælibet uenenata amuletum dicitur.

COCCOS CNIDIOS, GRANVM GNIDIUM.

Granum gnidium fructus est thymelææ, non chameleæ ut quidam opinati sunt acris & adurente facultate præditus, purgat autem per aluum cum aqua potus.

COCCOS BAPHICOS, GRANVM TINCTORIVM.

Granum tinctorum leniter siccatur, unde magis uulneribus, & neruorum itidem cum aceto aut oxymelite, laxi gatum, commode imponitur.

COCCYMELÆA, PRVNVS

Pruni fructus uentrem subducit, recens magis, aridus minus: decocto ipsius faucium & gutturis inflammationes utiliter colluuntur. Gummi quod ex arbore destillat, inciendi uim extenuandi q̄ testatur, ob quod nonnulli

PAULI ÆGINE TÆ

li frangendis uesicæ calculis esse cū uino potū affirmāte
ex aceto, puerorum impetigines persanare. Syluestrium
prunorum bacca euidenter astringunt, uentremq; repris-
munt. Nominatur hæc planta in Asia prunnum, dome-
stica uero pruna apparent, quæ Damascena appellan-
tur, quemadmodum Galenus memoriæ mandauit. 9

COLLA, GLUTINVM

Gluten quod ex simila & polline conficitur, emplastica
uim & concoctricem repræsentat.

COLOCYNTHA, CUCURBITA. 10

Cucurbita humidi frigidiq; in secundo abscessu tempe-
ramenti est, unde tota si imponatur, calidas refrigerat in
flammationes.

COLOCYNTHIS, CUCUR-
BITA SYLVESTRIS. 15

Cucurbita sylvestris ualidam purgandi uim obtinet: uiri-
dis ipsius succus infricatus coxendicū doloribus aus-
xiliatur.

COMAROS, ARBVTVS.

Arbutus & arbor & fructus acerbæ qualitatis est, uocant
eum memycelon: cæterum stomacho aduersatur, & ca-
pitis dolorem facit. 20

COMMI, GUMMI.

Gummi siccante ui & emplastica pollet, & nimirū aspe-
ritatibus medetur. 25

CONIA, LIXIUIVM.

Lixiuum ueluti cineris lotium nominatur, omnium ma-
xime absterforium & siccans est, quod ex fici & tithimal-
li cinere præparatur, ac fere iam exedens, quod si calx
etiam cinerī addatur, lixiuium redditur adurens: quod
iam protofæcton, quasi dicas, quod primum destillaue-
rit, nuncupant eluentibus potissimum medicinis accom-
modatur. Antecellit autem omnibus uehementia, quod
ex sola calce conficitur. 30

CONISA, CUNILA. 35

Cunila utraq; siccatur & calefacit in tertio ordine, hinc

etiam oleum in quo decoquitur rigores febrium circuf
tu remeantes difcutit: flores idem præftant, quorum de
coctum menfeis citat, & foetus extrahit: q̄ uero in humi
dis regionibus nafcitur, odore grauior & inefficacior eft

COPROS, STERCVS.

- 5 Stercus quodlibet calefacit, maxime fíccat & digerit: ua
riat autem pro animantis quod ipfum reddit tempera
mento, & uíctus ratione. itaque canum quum offa uo
rauerint fimus inarefactus tormina inteftinorum cum
10 fíffo lacte, quod Græci fchifton uocant potus, sanat:
idem uetufta ulcera reficit, fi medicamenti in ea efficaci
bus mifceatur. Hoc anginae, tonfillarumq; inflammatio
nes cum melle inunguntur. At infantium qui fimpliciter
nutriti fuerint ftercus huic malo magis prodeft. Lupo
15 rum quod candidius infruticibus reperitur, coli dolorio
bus ftrenue fuccurrit, non potum modo, fed corpori
etiam adalligatum: alligetur autem ex lana ouis à lupo
eneftæ, aut pelle ceruina. Caprillum ftercus acrius ma
gisq; digerens, fcirrosos tumores iilitum difcutit, præ
20 fertim in duris corporibus: crematum uero ualentius
abftergit exenuatque Bubulum extrahendi quandam
uim obtinet, ideoq; *uesparum & apium íctibus mede
tur: quinetiam toti corpori in fole oblitum aquas inter
cutem præclare iuuat. Columbarum fylueftrium, quas
25 palumbes latini dicunt, aliis longe acrius cum nafurtii
femine cutem exulcerat. Auium cohortalium ex oxy
melite, aut aceto, aut mulfo potum, uomitione ftanguo
lantes fungos educit, præfensq; eft remedium hoc quo
que colico dolore conflíctantibus potui quidam exhi
30 bebant. Nonnulli uero & ciconiarum fimum recta cer
uice fpirantibus potum auxiliari afserunt. Murium fu
mus reliquis abftergit efficacius, eoq; pilorum deflu
uia curat, & infantium fedi appofitus, ad excretionem
proritat. Sturnorum qui oryza pafli fuerint, abftergendi
35 exterendiq; uim præ fe fert, qua cutis afperitates, quas
ephelidas Græci uocant, exterit. Terreftrium crocodilo

* Oribe
fius addit
crabronū

*Nimirū
Nili.

PAULI AEGINETÆ

rum finus utiligines, quas alphas dicunt, extergit: quæ
admodum *fluuitialium, oculorum albugines extenua
re creditur.

CORALLIVM.

Corallium ueluti arborea planta est in lapidis duritiem
coalescens, crescit non in terra, sed in alto maris, colore
rubrum, lapidi simile, siccandi ualidam, astringendi me-
diocrem uim possidet ideoq; cruentis sputis & intesti-
norum torminibus utile.

CORIS ANIMAL CIMEX.

Cimex acri uirtute pollet. Scribunt igitur quidam cum
aceto potum hirudines elicere.

CORIS HERBA.

Coris herba, quam alii uocant hypericon, acris est &
odorata, semen eius ad urinam & menseis ciendos bi-
bitur: succurrit & phalangiorum moribus: item ad opi-
sthotonon cum oleo inungitur.

CORIANVM SEV CORI

um. coriandrum.

Coriandrum ex contrariis uiribus compositum est, ten-
uis substantiæ, terrenæ, amaræ aquosæ autem humiditas
tis tepidæ particeps, habetq; modicam uim astringendi
quapropter inflammationibus, erysipelatis non admo-
dum feruentibus conuenit, tumores molliusculos cum
quodam in id efficaci discutit. Semen modice quidem
cum passo bibitum, lubricos pellit liberalius autem sum-
ptum mentem tentat.

CORYDOS AUT CORYDAL

lus galerita siue alauda.

Alauda auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitula-
tur: assumi autem continue & sæpe cum ipso iure
debet.

CORONOPVS, PES COR

NICIS.

Coronopodis radix & ipsa ad colicos cruciatus profi-
cere manducata creditur.

LIBER SEPTIMVS.

304

COSTVS.

Costus modicum quidem amaritudinis, plurimum uero acris & calidæ qualitatis habet, unde in quibus uel calefacere particulam quampiam cogites, uel ex alto in summum humorem aliquem elicere, ad costum confugis endum est: urinam igitur et menseis ducit lumbricos enecat. Quum uero & flatulenti cuiusdam particeps sit, uenerem cum mulso potu stimulat, coxendicum doloribus, resolutis, febrium rigoribus ante accessiones, cum oleo infricatus, conducit.

COTILEDON, ACETABVLVM.

Acetabulum refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat: folia ipsius cum radice manducata calculos comminuerent & urinam ciere creduntur.

COCHLEA.

Cocleæ concrematæ impense siccant, & mediocriter calefaciunt, conferunt intestinorum torminibus, in quibus ulcera nondum computrescunt, si misceantur harum partes quatuor, piperis albi pars una, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si totæ in polinem coactæ uentri imponantur, aquam subter cutem exinaniunt, prosunt item articulariis doloribus applicatæ, quoad sua sponte deciderint: in uniuersum humorem alte insertum ualide desiccant.

CRANIA, CORNVS.

Corni arbori fructus acerbus, si edatur ualide uentrem astringit, folia autem & germina acerbitate uehementer siccant, adeo, ut maximis durorum corporum uulneribus glutinandis sint.

CRAMBE, BRASSICA.

Brassica quæ edendo est siccat, & manducata et à foris imposita, non tamen acrem conspicue uim ostendit, eoq; uulnera glutinat: et dolosa malignaq; ulcera, actus mores solui contumaces persanat: habet etiam nonnihil absterforium, quo lepras exterit, Semen ipsius pos-

PAULI AEGINETÆ

tum lumbricos occidit, præsertim Aegyptiæ caulium
crematorum cinis adurente ui cõstat, cum adipe longis
laterum doloribus utilis. Syluestris, autem brassica
satiua in omnibus ualidior est, unde nec intra corpus ci-
tra noxam sumitur. Marina, subsalsa leuiterq; amara, 5
aluum soluit.

CRATÆOGONOS.

Cratæogoni herbæ semen & acre gustanti depræhendi-
tur & frigidum, milio simile.

CRETHMON.

Crethmon falsum est simul & amarum, sed modice,
quare & uis ipsius est abstersoria & desiccans.

CRITHE, HORDEVM

Hordeum refrigerat siccâtq; in primo abscessu, uerum
nonnihil etiam extergit: ceterum fabarum lomento sic-
citate præcellit, minus flatulentum est polenta hordeo
multo magis siccât ptisana præter quod largius humes-
cat, etiam abstergit uehementius.

CRIMNON.

Quod in tritici & zæ farina crassius est, crimnon ap-
pellatur, ualidius nutriens quàm polenta: ægilius autem
conficitur crimnon poltos, seu poltarion, quod Roma-
ni puliculam appellant.

CRINON, LILIVM.

Lilii flos temperamento mixtus est, ex tenui substantia,
terrestri & nonnulla aquosa temperata: quapropter oleū
quoque ex eo confectum, discutiendi uiridis, molliens
diq; repræsentat, uulux inflammationibus accommo-
datum. Radix ac folia siccant, abstergant, discutiuntq;
mediocriter, quo fit ut ambustis conferant: succus ipso-
rum & neruorum uulneribus cum oxymelite prodest.

CROCODILION.

Crocodilii semen & succus calidam, siccam & discutien-
tem uim præ se fert, urinas itaque & menses mouet: ra-
dix excreationes è pectore iuuat, item sanguinem per
nareis ducit.

Crocus

CROCVS.

Crocus ad secundum calefacientium ordinem primum siccantium refertur, astringit et concoquit.

CROMMION, CEP A.

- 5 Cepa ex quarto calefacientium ordine habetur, substantiæ crassioris, quam obrem hæmorrhoidas appositum aperit: item abstergit: vitiligines, alphas dictas, cum aceto exterit, defluos capillos ocyus alcyonio restituit, succus oculis suffusus aut crassi humoris vitio hebetibus auxiliatur.

CYAMOS: FABA.

Faba non multum à medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando: caro ipsius nonnullius etiā absterforiæ qualitatis est, excreationibus è thorace & pulmonibus utilis: quum autem cortex fabæ nonnihil quoque astringat, tota ipsa imposita decocta coeliacis & dysentericis conducit, illita uero inflammationibus & tumoribus medetur, lac in mammis extinguit.

CYANOS.

- 10 Cyanos acrem habet vim detrahendi, & discutiendi maiorem quàm cinnaberis: astrictionis quoque particeps est.

CYCLAMINVS.

- Cyclaminus varias uireis habet: etenim extergit, incidit, aperit, attrahit, & dissipat: succus itaque ipsius hæmorrhoidas sedi admotus aperit, duritias cum aliis discutit: cum melle suffusus proficit, per nareis purgat, abdomini inunctus aluum subducit, foetus corrumpit: radix autem tota succo quidem est imbecillior, sed & ipsa uehemens adeo est, ut cum mulla instar trium drachmarum pota, interanea expurget: cæterum cutis vitia exterit. Altera cyclaminus, quam etiam cissanthemon uocant, radice donata inutili, semen habet efficax, ut potum priori similia faciat.

CYMINVM, CVMINVM

- 35 Cuminum in tertio ordine calefacit, urinam mouet, & flatus discutit.

PAV. ÆGIN,

QQ

PAULI ÆGINETÆ
CYNOSBATUS, RVBVS
CANINVS.

Rubi canini fructus non infrenue astringit: folia id præstant mediocriter, at quod in fructu lanæ speciē præ se fert, cū arteriæ inimicum cauēri debet.

CYPARISSVS, CVPRESSVS.

Cupressi galbuli & turiones siccandi uiribus pollent, nullo calore conspicuo: quapropter uulnera magna in duris corporibus conglutinant, & in flaccidis putridisq; ulceribus in alto fixas humiditates, citra noxam depascuntur, intestinorumq; ramicibus opitulantur.

CYPERVS, IUNCVS QVADRATUS

dratus seu angulosus.

Iuncus quadratus calefacit siccaturq; citra morsum, hinc etiam humidioribus ulceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris ulcera per sanat: habet & uim quandam incisoriam, qua calculos comminuit, urinam & menstrua promouet.

CYPROS.

Cypri folia & surculi mixtis constāt uiribus, discutiente & astringente, tum ea quæ sine offendiculo & morfu siccet: idēq; decoctum ipsorū ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Item oris eruptiones, quas aphthas uocant, ipsa arbor commanducata per sanat: item medicinis leni dicatis miscetur.

CYTISVS.

Cytisi folia discutientis leniter, & tepidæ naturæ sunt, quemadmodum et maluæ.

CONIVM, CICVTA.

Cicutæ uires summe refrigeratorias esse omnibus constat.

CONOS, PINVS.

Pini cortex & folia piceæ uiribus respondent, sed aciora efficacioraq; sunt: fructus, quem etiam strobilon appellant, uiridis, amarum quiddam & acre, cum humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad faciliē excre-

tum accommodatur: esculentus in aqua maceratus ut acrimoniam exuat, temperatus redditur, rosionis expers, opplens unguine suo obstruensque, ut etiam asperitates leuiget.

QVÆ AB L ORDIVNTVR.

LAGOPVS.

Lagopus sicca facultatis est, qua alui fluores deficcat.

LADANON.

Ladanon ex cistho I cyprio frutice ladone dicto, nascitur, quem caprae pascentes barbis & foemoribus quod pinguius & liquori simile est, ab eo auferunt, idque collectum ladanon est medicamen praestantissimum, in secundo fere abscessu calidum, natura tenue, emolliens mediocriter, discutiens & maturans, eoque uteri affectionibus peculiariter conuenit: habet praeterea nonnullas astringendi uireis, quibus defluos capillos confirmet.

LATHYRIS.

Lathyrin & ipsam tithymali speciem esse dicunt, quod eius succus, illius modo purget, semen autem huius precipuam purgandi uim habet.

LAPSA NA.

Lapsana manducata stomacho nocet, illita uero nonnihil abstergit discutitque.

LAPATHVM, RVMEX.

Rumex mediocriter discutit, acuta rumex, quae oxylapathum dicitur praeter id etiam pauxillum repellit: semen autem praesertim oxylapathi, astringens alui profluuia, diarrhoeas dicunt, & intestinorum tormina persanat, folia uero semini contraria faciunt: haec etenim comesta aluum mouent, illud potum ipsam comprimit.

LEMONI VM.

Lemonii fructus austerus cum uino coeli acis, dysentericis, & sanguinem spuentibus datur, item ad fluorem muliebrem acetabuli mensura.

LICHEN HERBA.

PAULI ÆGINETÆ

Lichen herba in petris nascens muscum repræsentat, uis ei est extendo purgare mediocriter siccare, & refrigerare: impetigines sanat, inflammationes arcet, & ut Dioscoridis uerbis utar, sanguinis eruptiones sistit.

LICHENES EQVORVM.

Lichenes equorum triti cum aceto, comitialibus, et omnium uenenatorum moribus mederiferuntur.

LEONTOPETALON.

Inflaura
tum ex
Galeno.

Leontopetaliradix & sicca ꝛ & calfacientis ꝛ in tertio ordine facultatis est, nec non discussoria.

LEPIDION.

Lepidion, quam & hiberiada uocant ex tertio calefacientium gradu est, nasturtio proximum uiribus, minus autem eo desiccatur.

LEPIS, SQVAMA.

Squama omnis ualide siccatur, astringit, nec ignauiter mordet, sed æris amplius siccatur, extenuaturq;: cui nonnihil æruginis adest, magisq; ea quæ ex Cypriis clauis raditur, quam propterea etiam helitim quasi claualem appellant. At ferri squama liberalius astringit, atque hac magis stomomatis, quapropter ad contumacia malignave ulcera præstantior est, sed æris, carnem magis purgat & consumit.

LEVCACANTHVM.

Leucacanthi, quod alii polygonatum, alii ischiada uocant, radix incidit quidem, & in tertio ordine siccatur, in primo autem calefacit.

LEVCAS.

Leucas calefacit siccaturq; in tertio ordine, acrimonia uero præpollet.

LEVCOION, VIOLA ALBA

Alba uiolæ totus frutex abstergendi extenuandiq; uiribus possidet magis autem flores, & ex eis, sicciore: idcirco & mensis stimulant, foetus corrumpunt expelluntq;: ac si quis aquæ mistura uim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim uteri: ra

LIBER SEPTIMVS. 307

dices eadem præstant, crassiore magisq; terrestri natura præditæ: ex aceto inflammationibus in scirrum coalescentibus imponuntur.

LEVCE, POPVLVS ALBA.

Populus alba aquosa, repida terrestriq; constat substantia uiribus absterforiis.

LIBANOTIDES.

Libanotides tres numerantur, una sterilis, duæ fructum ferentes, uires illis extergendi, incidendi, discutiendi: & emolliendi, succus earum oculis ex humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur, coronariæ uero libanotidis decoctæ ius, regio morbo laborantibus recte bibitur.

LIBANOTOS, LACHRYMA THURIS.

Lachryma thuris in secundo ordine calefacit, in primo siccatur, habet et modicam quandam uim leuiter astringentem: cortex ipsius manifesto astringit, siccaturq; in secundo abscessu absolute, crassior thure et minus acris: hinc sanguinem spuentibus, dysentericis, coeliacis, et stomachicis, tum foris impositus, tum intro assumptus, salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccaturq; tertio in abscessu atque nonnihil extergit: quo circa oculorum ulcera etiam purgat et explet.

LIGNIS, FVLIGO.

Fuligo specierum quarundam concrementarum, nempe lachrymæ thuris, myrrhæ, terebinthi, styracis, picis liquidæ, cedri, ueluti puluis quidam est, qui Græcis æthale dicitur cum fumo ascendens. obtinet quidem siccantem et terrestrem tenuemq; substantiam, particulares autem ipsius differentiæ iuxta materiæ combustæ rationem fiunt. Utuntur ea potissimum in medicinis oculariis, et ad honestandas palpebras accommodatis, at thuris fuligo omnibus est utilior, ut quæ mitior: contra piceæ, plini, et tede ualentior est, quo fit ut ad glabrescentes palpebras aliis subnascentibus, distillantes et erosos oculos

PAULI AEGINETAE

rum angulos, illachrymantesq; recte adhibeatur.

LIGUSTICVM, LIGUSTICVM.

Ligustici & radix & semen adeo calefaciunt ut menses citent, flatibusq; probe discutiant.

LITHARGYROS, ARGENTI SPUMA.

Argenti spuma medii inter metallica ordinis est, eoq; ceu materie ipsa aliis medicinis mista subinde utimur, siccatur tamen mediocriter, abstergit & astringit: inde febrium attritus per sanat.

LITHI, LAPIDES.

Lapides omnes terrae modo desiccant, sed hematites astringit & abunde siccatur, quare etiam oculorum asperitates ex terit, quum quidem inflammatione carent, ex aqua: quum uero illa tentantur, ex ouo: ceterum ad spurta cruenta bibitur utiliter, ulcera supercrescentia compescit. Schistos lapis superiori quidem consimilis est, sed imbecillior, mox galactites, id est, lactarius sequitur. Melitites cuiusdam etiam caloris compos est. Morochthus quem alii a candore lactis, leucographida uocant, quopraedictis omnibus mitior est (nullas enim habet uireis efficaciores) eo moderatior, magisque dolorem lenit, eamque ob causam in teneris corporibus cum cerato ad cicatricem ulceribus obducendam eo utuntur. Iaspis qui subuiridi colore est quum efficacior sit, oculorum cicatrices & pterygia extenuat: uiridis autem iaspis adal ligatus & in anulo gestatus cibum in stomacho non continetibus confert. Iudaicus dictus renum calculos conterit, unde etiam recentiores tecolithon appellant. Pyrites ualide discutit tumores, sanguinemque in grumos concretum: cuius quum facultas non est, molari utuntur. Phrygius praeter quod ualenter desiccatur, nonnihil etiam astringit roditque, unde & repellere & digerere potest, eoque ocularis miscetur remediis. Ageratus astringendi discutiendi que, uirtutis compos, gutturis inflammationem curat. Asiae petrae flos tam subtilem naturam

LIBER SEPTIMVS. 308

habet, ut humentes & flaccidas carnes citra rofionem absumat. Gagates affatim ficcans inflationibus præsertim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heraclium lapidem uocant, æquales hæmatiti uireis repræsentat.

- 5 Arabicus ebori similis, ficcandi repurgandiq; uireis habet. Alabastræ combusti cinerem stomachicis nonnulli bibendum exhibent. Smyris extergit, dentifriciis accommodatus. Qui in spongiis inueniuntur lapilli, res num calculos frangunt. Similes his uireis habent qui in 10 Argæo Cappadocię monte nascuntur. Similiter & ophites dictus, qui adalligatus contra uiperarum morsus confert. Ostracites, hoc est, crustaceus, & geodes à terra quam intra se complectitur appellatus, abunde siccare feruntur, ideoq; inflammatis tumoribus mederi. 15 Naxiæ cotis detrimentum uirginum mammis & puerorum testiculis utile est, ne nimium crescant. Quod uero ex olearia cote detritum fuerit absterforia uidosum alopecias explet. Hieracitin & Indicum lapidem alligatum contra hemorrhoidas ualere perhibent. 20 Sapphyrus potus, scorpionum ictibus aduersatur. Aphroselenes, comitialibus potui datur. Armoniæcus, inferiorem uentrem purgat, sed stomacho nocet.

LITHOSPERMON.

- 25 Lithospermon, quod alii diosporon, alii heraclion uocant, herbæ ætonichi dictæ semen est lapideum, album, quod cum uino albo potum calculos frangit, & urinas eiicit.

LINOSPERMON, LINI SEMEN.

30 Lini semen ex primo gradu calidum est, inter humectantia siccantiaq; medium. manducatum flatibus creandis est, uel si frictum fuerit.

LINOZOSTIS, HERBA MERCVRIALIS.

35 Herba mercurialis aluum liberaliter subducit, illita

QQ iiii

PAULI AEGINETAE

[Hæc in
Græco
exemplari
superiori
medica-
mēto per
perā ascri-
pta erant

discutit. Sciendumq; est eius semen infricatum corpo-
ris excrescentias præter naturam, quas uulgus uocat nar-
phia, abolere, sicut experientia comprobatum est. Sed
uiride semen esse oportet, et frequenter ipsum tubercu-
lis illis infricare.]

LITRVM, NITRVM.

Litrum medium inter aphronitrum et salem uirtute est,
crematum magis extenuat discutitq;, et si intro sumatur,
crassos uiscososq; humores plus cæteris incidit et exte-
nuat. Chalastrum uero (est autem Chalastra Thessaliæ
locus) acrius siccantiusq; est, quare ad capitis destillatio-
nes et articulares cruciatus eo utuntur.

LONCHITIS.

Lonchitidis, cui semen triangulum est lanceæ simile, ra-
dix dauco æqualis, urinam mouet; eius uero quæ scolo-
pendrio respondet, folia uiridia uulnera glutinant, sicca
uero cum aceto pota lienibus induratis medentur.

LYCOPSIS.

Lycopsis radix quum sit astrictoria, cum polenta illita sa-
cris ignibus auctore Dioscoride conuenit; si leuis cum
oleo inungatur, sudores elicit.

LYCIVM.

Lycium ex diuersis genere substantiis constat, calida, tea-
nui et discutiēte, terrestri uero frigida et leuiter astringen-
te, ut in secundo abscessu deficcet, calefaciendo refrige-
randoq; medium est, hac de causa ceu absterfio in
oculis obscuratis eo utuntur: tanquam astringenti, in cœ-
liacis, torminibus intestinorum, et maleficis ulceribus:
at contra inflammationes, ut discutienti cæterum pri-
mas obtinet Indicum.

LYSIMACHIVM.

Lysimachium uim habet excellenter astrictoriam, qua
et uulnera glutinat et sanguinem compescit, tum ipsum
tum ipsius succus, intestinorum tormina et potum et ab
inferioribus partibus iniectum sanat.

LYCHNIS.

LIBER SEPTIMVS.

309

Lychnidos coronariæ semen calidum est & siccum in secundo abscessu, eoq; absoluto.

LOTVS HERBA.

Lotus domestica, quam nonnulli triphyllon appellant, absterforias uireis obtinet & modice siccanteis, calore temperata est. At sylvestris loti semen ad secundum calescentium ordinem refertur, habet autem nonnihil etiam absterforium. Aegyptiæ semen in panes quoque effingitur.

LOTVS ARBOR.

Lotus arbor extenuat, siccatur & mediocriter astringit, quae de causa ad fluxum muliebrem, alui fluores potum cum uino aut aqua, aut etiam in aluum data salutaris est, pilos defluos confirmat.

QVÆ AB M AVSPICANTVR.

MACER.

Macer cortex est qui ex India importatur, tertio ordine siccatur, inter calorem & frigiditatem medium obtinet: est etiam astringens tenuisq; unde coeliacis & intestinorum torminibus auxiliarius habetur.

MALOBATHRON.

Malobathri folium æquales spicæ nardi uireis representat.

MALACHE, MALVA.

Malua sylvestris mediocriter discutit & emollit: hortensis autem, ceu humidior etiam imbecillior est: semen tanto uiribus præstat, quanto & siccus est.

MAMIRAS.

Mamiras uelut radícula herbæ cuiusdam est ceu geniculis frequentibus nodosis, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate prædita.

MANDRAGORAS, MANDRAGORA.

Mandragora tertii refrigerantium ordinis est: mala ipsius caliditatem quampiam & humiditatem referunt, un-

PAULI AEGINETA

de soporem grauem homini possunt accerfire:at radi
cis cortex uehementissimus,non refrigerat modo sed
etiam fccat.*interior eius pars imbecillior est.

*Græce
habebat

πὸ δὲ δὲ v

δ'ρὸν αὐτῶν

τῆς. i. ar

boripfius

pro πὸ δὲ

αὐτῶν. sic

n. Cale

nus & O

ribafius

habent.

MANNA THVRIS

Manna thuris simileis thuri uireis habet, fed remiffas &
lenfum astringentes.

MARATHRON, FOENI

CVLVM.

Foeniculum calefacit in tertio ordine, in primo fccat.
hinc etiam lacti generando est, & suffufis auxiliatur.

MASTICHE.

Mastiche, Chia quidem calefacit fccatq; in primo ab
fcessu, cæterum compositæ est facultatis, astrictoriæ si
mul & emollientis: hanc ob rationem stomachi uentris,
intestinatorum & iocinoris inflammationibus recte ac
commodatur. Aegyptia, nigriore colore quodam mo
do, fccat magis & discutit, minus astringit, hinc furuncu
los quoque dissipat.

MELAN, ATRAMENTVM

INDICVM.

*Impres

sum exē

plar & u

χ' v πρὸν. ue

rum cēs

Dioscori

dis codi

ces sv φ' v

πρὸν hñt.

Atramentum Indicum authore Dioscoride in genere
leniter *astringentium est, quæ inflammationes laxosq;
tumores, œdemata uocant, rumpunt, ulceraq; purgant.

MELANTERIA, CRETA

SVTORIA.

Creta sutoria impense astringit extenuatq;.

MELAN, ATRAMENTVM

scriptorium.

Atramentum quo scribimus abunde & ipsum defccat,
solutum uero posca ambustis si illinatur, præfenti est
remedio.

MELANTHION, NIGELLA.

Nigella in tertio ordine calefacit & defccat, est etiam
tenui natura prædita, unde destillationibus in nareis, ol
factu prodest, intus assumpta discutiendis flatibus singu
laris est: quia etiam amari particcs deprehenditur, quo lū

LIBER SEPTIMVS.

310

bricos interficit: abstergit & incidit, hinc quoque recta
cervice spirantibus commode exhibetur, item lepras ex
terit, myrmecias eiicit, & menstrua incitat.

MELI, MEL.

- 5 Mel calfacit & siccatur ordine secundo, abstergitq; insigni
ter: coctum minus quidem acre redditur, deterlorium
& uentri subducendo accommodatum, uerum magis
nutrit. Amarum mel, sicut & id quod in Sardinia fit, mi
stas habet uireis, terrestre & calida. At mel sachar quod
10 ex felici Arabia conuehitur, minus dulce nostro est, sed
æqualis uireis obtinet, præter quod nec stomacho no
ceat, nec sitim faciat, quemadmodum hoc nostras.

MELIA, FRAXINVS.

- Fraxinus nota arbor est, folia eius pota uiperarum morbi
15 bus succurrunt: cortex crematus, illitusq; ex aqua lepras
separat, ligni uero rameta si bibantur, lethalia esse ferunt.

MELILOTOS, SERTULA CAMPANA.

- Sertula campana diuersis facultatibus pollet: astringen
20 di, discutiendi & concoquendi.

MELISSOPHYLLON, APIASTRUM.

Apiastrum uiribus marrubio per omnia responder.

MEMÆCYLOS.

Memæcylos* arbuti fructus, in litera C comprehensus est.

- 25 MESPILA.

Mespila, aliis tricocca quasi trigrania uocant, fructus est as
fatim acerbis, & uix esculentus, aluumq; continens: ger
mina foliaq; mespili impense acerba sunt,

MEDION.

- 30 Medii radix uireis semini contrarias præ se fert, quippe
austera est & fluxiones comprimit, ideoq; muliebrem
fluxum sistit: semen quum tenuis incidentisq; sit facul
tatis, mensis quoque proritat,

MECON, PAPAVER.

- 35 Papauer multiplex est: hortensis quæ, quod etiam thyl a
citiu ceu utricularium uocant, semen est esculentum, si cū

*Male est
in græco
κραινας,
hoc est
corni p
κομαίρα.
quod est
arbuti.

PAULI ÆGINE TÆ

pane assumatur, mediocriter somnum concilians. At
rhoeas appellatum, inde quod semen ipsius celeriter de
fluat, ualidius ipsum hortensi est: manducatur itaque nō
per se, sed momētum copiosiori melli mixtum. Quod
ueluti decidens, ac depresso calyce est, nigrum semen
habet & medicatum, nimis quam frigidum. Quod pro
lixiore & proceriore constat calyce, medicatius uniuersū
sis est, quapropter stuporem inducit quousque interis
mat. Nam & ipsum & eius lachryma, quam per excel
lentiam opion nuncupant, quarto refrigerantium ab
fcessui ascribuntur. Cornutum papauer astringendi uis
reis sortitur, ideoq; radices ipsius decoctum potu iocis
norosis auxiliatur: folia aut & flores perquam sordida
ulcera expurgant, crustasq; tollunt. Heracilion & aphro
des id est spumofum papauer dictum, semen habet pi
uitæ purgandæ accommodatum.

MELA, MALA.

Malis omnibus frigida & excrementicia inest humiditas:
& quæ in eorum censu tenera & aquosa sunt, frigidi
tate cæteris & humiditate præstant: dulcia aquosa qui
dem, non tamen manifeste frigida sunt: austera dulcibus
quidem frigidiora, sed minus humida: acida frigida qui
dem & ipsa, uerum incidendi humores uentriculo inhe
rentes uim testantur: acerba cuiusmodi cotonea & strus
thia sunt, frigido & terrestri donata tempeamento, uen
trem suppressunt, uulnera glutinant pari modo folia, suc
ci, & cortices arborum inter se differunt.

MELEA, MALVS PERSICA.

Mali Persicæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoq;
concisa tritaq; umbilico imposita lumbricos enecant:
fructus autem ipsius, nempe Persicum hoc esculentum
in secundo ordine frigidum humidumq; existit.

MELEA, MALVS ARME

NIAACA.

Mali armeniacæ fructus, quæ nunc uocant mala præco
cia, consimiles Persicis uireis refert.

LIBER SEPTIMVS.
MEON.

311

Mei radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo siccant, ideoq; urinam & menses cient: liberalius meon assumptum, capitis facit dolores.

MILAX.

Milax tam lævis quam aspera, arbores amplexa, calidam acremq; facultatem possidet.

MISY.

Misy medicamentum est ex iis quæ crustam faciunt & adurunt, ualenterq; astringunt, minus autem quam chalcitis erodit, quoniam tenuius ea est: cæterum chalcitis & fori uetustate in misy mutantur, à superficie incipiente statim mutatione.

MOLYBDAENA, PLUMBAGO.

Plumbago argenti spumæ uireis habet, à medio temperamento ad frigidius digressa.

MOLYBDS, PLUMBVM.

Plumbum refrigeratoriæ uirtutis est, habet et humidæ substantiæ plurimum, quod ex frigore coaluerit. Tritum igitur in eo aut uino, aut immaturo oleo, aut quoddam succo refrigerante, ad naturalium et sedis ulcerosas inflammationes excellentissimum erit remedium: lamina uero plumbea super lumbos gestata, ueneris insomnia cohibet. Item bractea tenuis ganglio imposita, ipsam dissipat. Concrematum plumbum ualidius quidem siccatur, sed et acrimoniæ nonnihil obtinet: si eluantur, tum sine rosione siccatur, tum maleficis ulceribus præsentaneum est remedium.

MORÆA, MORVS.

Mori fructus maturus quidem aluum subducit et medicamentis stomachicis aliis quæ moderatam requirunt astringentem utiliter miscetur, immaturus ubi exaruerit, perquam obstruens fit medicamentum: cortex autem radicis arboris etiam amaritudinis cuiusdam particeps instauratur. * Græce est σωμαχά, κοῖς π 50, ματικοῖς,
purgare potest, eoq; latos lumbricos occidit: foliorum rû ex casibus autem surculorumq; uis, subducentium et compimen leue.

PAVLI AEGINETÆ

tum media quodammodo existit.

MYAGROS.

Myagri semen pingue est. quod in eo oleosum habetur, opplendi uireis representat.

MYACES, MYTVLI.

Mytuli combusti, eundem cum buccinis effectum præstant, proprie uero eloti palpebrarum asperitatem & albugines cum melle exterunt, caro ipsorum canum moribus utiliter imponitur.

MYARON.

Myaron, quam alii melampycon appellant, herba ferulacea est & pinguis, uidetur autem ipsius pinguitudo corporis asperitates laxigare.

MYELOS, MEDVLLA.

Medulla facultatis est quæ indurata ac in scirrum con- crescentia corpora emollit. Laudatissima est ceruina, mox uitulina, taurina, hircynaq; acrior est, magisq; siccatur & quæ in artubus continetur pinguior est magisq; emollit: quæ de spina elicitur, durior squalidiorq; est.

MYCETES, FUNGI.

Fungi frigidi & humidi admodum temperamento sunt, nonnulli ipsorum manducati, etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putride qualitatis participi.

MYOSOTE, MYRIS AV

RICVLA.

Muris auricula dicta est asine.

MYXA.

Myxa arboris fructus est minor quidem prunis, facultate uero consimilis.

MYRICA, TAMARIX.

Tamarix incidit extergitq; ita ut manifeste non siccet, sed astringentem quoque nonnullam obtineat, qua de causa decoctum ipsius potum lienes adiuuat, item dentium doloribus medetur: fructus autem & cortex ipsius

LIBER SEPTIMVS.

312

gallæ uirtute proximus est : cinis arboris uehementius exiccat.

MYRIOPHYLLON, MILLEFOLIUM.

5 Millefolium tantam siccandi uim possidet, ut uulnera conglutinet.

MYRRHA, VEL MYRRHIS.

Myrrha in secundo ordine calefacit, ac nonnihil etiam extenuat, radix ipsius odorata dulcisq; est, mēsisbus moruendis, & humoribus è thorace & pulmone repurgandis idonea.

10

MYRRHINE, SEV MYRSINE, MYRTVS.

15 Myrtus ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua ualenter siccatur: at myrtula trunco et ramis ipsius adnascens tumida, maiore uim in astringendo et siccando scatet, iam uero et folia aridiora uiribus magis siccant: item fructus succusq; tum foris applicatus, tum intus assumptus, persimileis uireis præ se fert.

20

MOLY.

Moly, quod nonnulli rutam syluestrem, alii armanam dicunt, Syrii besafam, tertio calefacientium ordini annumeratur, suastantia tenue, hinc crassos humores uiscososq; incidit, discutit et urinam promouet.

25

QVÆ AB NINCIPIVNT. NAOCANTHON.

30 Naocanthon, sunt qui nacaphthon dicunt, Indicum est odoramentum, quod ad astrictos foeminarum locos suffitu uaporetur.

NAPY, SINAPI.

Sinapi calefacit siccaturq; in quarto abscessu.

NARDOSTACHIS, SPICA

NARDI.

35 Spicæ nardi radix calefacit i primo, siccatur in secundo ordine

PAULI AEGINETÆ

particeps est etiam astringentis cuiusdam qualitatis, acris et subamaræ, iocinori prodest et stomacho, extrinsecus admota et ebibita, urinam mouet et interaneorum fluxiones desiccatur: sed Indica ualentior est quàm Syriaca et nigrior.

NARDVS GALLICA.

Nardus gallica superiori uireis habet æqualeis, sed imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam, calidior enim est quàm illa, minusq; astringit.

NARDVS MONTANA.

Nardus montana, quæ nonnullis thylacitis, pyritisq; dicitur, commemoratis est infirmior.

NARTEX, FERULA.

Ferulæ semen extenuat calfacitq;: medulla ipsius uiridis adhuc, astringit, eoq; sanguinem spuentibus et coeliacis accommodata est.

NARCE, TORPEDO MARINA

Torpedo marina uiuens capiti imposita dolores eius arcet, idq; forsan eodem illo torpore quem membris eâ contingentibus inducit: oleum in quo uiua decocta fuerit, ad acriores articulorum cruciatus leniendos inungitur: eadem torpedo anum procidentem coercere appositâ fertur.

NARCISSVS.

Narcissi radix adeo desiccatur ut maximis uulneribus sit glutinandis, imo etiam tendinum præcisionibus confert, cæterum abstergendi et attrahendi uim quandam habet.

NEVRAS, SEV POTERION.

Neuras, quod ali poterion uocant, sine rosione desiccatur, ut et ipsa neruos præcisos iungit: radices autem potissimum hunc effectum præstant, & impositæ, et potæ.

NERION, AVT RODO
DAPNE.

Nerion extrinsecus illicitum uim refert discussoriam: si
intus

LIBER SEPTIMVS.

Intus assumatur, occidit.

N Y M P H Æ A.

Nymphæa uireis habet sine rosione siccas, quibus & uē-
trem reprimat, & genituram arefacit: uerum alba radice
donata ualentior est, eoq; fluxum muliebrem cum ui-
no nigro & austero pota per sanat: quæ nigram refert,
deterforia quoque ui nonnulla pollet, eaq; uiliginēs, al-
phos dictas cum aqua exterit: pilorum defluuia cum pi-
ce liquida illita replet.

Q V Æ A B X O R D I V N T V R.

XANTHION, AUT PHAS- GANION.

Xanthion phasganiumve fructum fert discutiendi uirio-
bus præditum.

XIRIS, AUT XIRIS.

Xiris natura tenuis est, discussorie, & extrahentis, ac ni-
mirum siccatoriae, præcipue semen, quod & urinam cit-
& leni indurato medetur.

XIPHION, GLADIOLVS.

Gladioli radix trahit: discutit, & siccatur.

Q V Æ I N I T I V M H A B E N T A B O.

O E, SORBUS.

Sorbus arbor cuius fructus oa, à nonnullis & dicitur,
astringendi uim obtinet, sed minorem mespilo.

O T H O N N A.

Othonnam, alii herbæ esse succum in Arabia ad Aegy-
ptum nascentis asserunt, alii lapidem Aegyptium: deter-
git autem eroditq; omnia quæ claritati oculorum offi-
ciunt, extersens.

O E N A N T H E, L A B R V S C Æ VITIS FLOS.

Oenanthe syluestris uitis flos est, usus plurimi, quoniam
insigniter astringit, stomachumq; & aluum maxime fire-
mat: Dioscorides autem aliam describit oenanthem cō-

PAV. ÆGIN,

RR

PAULI AEGINETAE

trariis donatam uiribus, unde secundas eam eiicere, & urinæ stillicidio, morboq; regio mederi tradit.

OENOS, VINVM.

Vinum calore & siccitate insita, secūdi ordinis est: quod admodum uetustum est, tertii: Mustum uero primi.

OESYPVS, LANÆ PINGVEDO.

Oesypus in sermone de lanis explicata est.

OLYNTHI, GROSSI.

Grossi acrem & discussoriam uim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur, cocti igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos exterunt.

OLOSTEVM.

Olosteum siccatur astringitque, hinc eo ad rupta utuntur.

OMPHACIUM.

Omphaciū succus est uuæ immaturæ, astringens egregia & siccans in tertio abscessu: eoque fluidis affectibus & præsertim stomachicis, accommodatur.

ONAGRA.

Onagra, quam nonnulli onotheram, alio onothurin dicunt, frutex est arboreus, cuius radix illita, ferocientia ulcera mitiga-

ONOMA.

Onoma, uel onomis, uel phlomitidis, uel ononis, acrem amaramq; uim obtinet, eamq; ob causam folia eius cum uino pota, foetus occidunt expelluntq;.

ONOBRYCHIS.

Onobrychis uel rarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phymata dicuntur, dissipat, urinæ stillicidio medetur, & sudores prouocat.

ONI, ASINI SEU MVL-

TIPEDÆ.

Multipedæ quæ in humidis locis agunt, & tactæ in orbem se conduplicant, discutiunt siccantq; potæ cum uino urinæ angustis & arquato medentur, anginæ itidem cum melle iisdem illinuntur. Item detritæ cum rosaceo calfactæq; in mali punici cortice, auribus dolentibus sa-

LIBER SEPTIMVS.

314

lutariter instillantur.

ONYCHES, CONCHYLÆ INDICÆ.

Onyches conchyliorum Indicorum opercula sunt, quæ
suffitu strangulatione uuluarum concidentibus foeminas
excitant, item comitiales: potæ aluum turbant.

ONONIS.

Ononis radice constat quæ in tertio fere gradu calefacit
cortex ipsius extergit, & incidit, unde etiam calculos
conterit.

OXOS, ACETVM.

Acetum mixtæ est naturæ frigida & calida, sed utriusque
tenuis, frigida tamen calida excellit, cæteræ in .iii. ordine siccant.

OXIACANTHOS.

Oxyacanthus arbor piro syluestri & figura & uiribus æ
qualis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed frus
tilus ipsius myrti baccis respondet.

* OPIVM.

Liquores, & Cyrenæicus, & Medicus, & Syriacus per
excellentiā opium dicuntur, calidi naturæ, & perspiran-
tu discutientes insigniter: uerum Cyrenæicus cæteris est
calidior tenuiorque.

* Galenus
impressus
habet o
m's. Pau-
lus & Ori-
basius q
m'.

ORIGANVM.

Omnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, et
calefaciendi uiribus in tertio abscessu ostendunt.

OREOSELINVM, APIVM

MONTANVM.

Apium montanum uiribus domestico æquale est, sed
imbecillius.

OROBANCHE.

Orobanche sicco & frigido temperamento est, iuxta pri-
mum ordinem.

OROBOS, ERVVM.

Eruum calefacit in primo gradu, siccant in secundo, amarum
est, quapropter incidit, detergit, obstrueta aperit: libera-
lius sumptum, sanguinem per urinam expellit.

ORMINON.

RR ii

PAULI AEGINETÆ

Orminon marrubio specie simile est: calidum mediocriter siccum & abstergens, uenerem igitur stimulat, & oculorum crassities cum melle repurgat, tumores laxos discutit, & extrahit aculeos. Syluestre domestico est ualentius.

ORYZA.

Oryza uim quandam astrictoriam præ se fert: qua etiã uentrem mediocriter cohibet.

ORCHIS HERBA.

Orchis herba (nominatur aut cynosorchis, id est, testiculus canis) radicem habet bulbosam & duplicem: uis aut maioris, humida & calida, eoq; ueneri incitanda est: minoris, calida & sicca, contra igitur uenerem coercet.

ORCHIS, SERAPIAS.

Orchis, quæ & Serapias dicitur, aliis triorchis, priore ualentius desiccatur, quare laxos tumores dissipat, ulcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarescens autem magis siccatur. Quoniam uero substringere idonea est, aluum quoque cum uino pota retinet.

OSYRIS.

Osyris, ex qua medicamenta ad exterendam leuigandamq; cutem, Græci coremata uocant, fieri solent, amara est, & iecoris laxandi uireis habet.

OSTA, OSSA.

Ossa concremata uehementer discutiunt siccantq;: præsertim id facere dicuntur humana: atqui suillus talus contusus, inflationibus & circa umbilicum torminibus mederi dicitur. quinetiam ossa cremata si potui quis exhibeat, morbum comitalem & articulares dolores abigunt. Bubulus talus uisus, mobileis firmare denteis prædicatur: cum melle potus, teretes lumbricos educit: cum oxymelite, lienem consumit, & uertigines, quas uocant leucas, illitus abolet, item ad uenerem commendatur: femora bouis cremata potu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compescunt.

OSTRACA, TESTÆ.

LIBER SEPTIMVS.

319

Testæ fornacium tritæ siccant exterguntq; , hinc dentis
friculis accommodantur, illæ cum aceto prurigini, pustu-
lis, quæ appellantur exanthemata, & podagræ conferunt:
cerato exceptæ, strumas discutunt.

O S T R E A.

Ostreorum testa cremata æqualē buccinis uim, sed mi-
nus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes, &
dentibus nitorem conciliat: elota rosionem amittit, ad
carnem cicatricemq; humidis ulceribus inducendam
accommodata.

O V R O N, V R I N A.

Urina quælibet calida est & acris, sed humana omniū
aliorum animalium exceptis maialibus, infirmior est.
cæterum uehementer abstergit, quapropter nonnulli
potione eius in peste usi, mortem euaserunt: eadem leo-
pras, ulcera putredinem experta, capitisq; manantia ul-
cera, quæ uocantur achores, & furfures persanat. Item
pedum attritus nondum inflammatione occupatos. At
impubis pueri urina omniū efficacissima est, unde etiā
chrysocola conficitur. Mulorum articularibus dolori-
bus congruit. Caprarum et chamelorum aluum delicit
ideoq; contra aquam subtercutem bibitur.

Q V Æ A P I N C I P I V N T.

P A N C R A T I O N.

Pancration et specie et uiris scyllæ simile est, uenum imo
becillius.

P A L I V R O N.

Paliuri folia & radix astringunt, eoq; aluum fluentē si-
stunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis cali-
da discutunt. Semen eius tam uehementi incisoria uiro-
tute ualet, ut et calculos conterat, et excreationibus è pe-
ctore auxilietur.

P A N A C E S.

Panaces Herculeum est, ex quo opopanax dictus con-
ficitur, in tertio ordine calefaciens, in secundo siccans,
& molliens, discutiensq;: radice cortex liquore imbecilis

RR iii

PAULI ÆGINETÆ

lior. habet non nihil & abstergens, & carni ducenda idd
neum: semen ipsius menseis quoque citat. Asclepion pa
naces & Chironium priori calidiora sunt, hinc floribus
ipsorum & semine ad malefica ulcera & phymata uo
tuntur.

PAPYRVS.

Papyrus ignem non experta, materia quædam efficitur
usta, siccat chartæ crematæ modo, uerum papyri cinis
uiribus inferior est.

PARONYCHIA.

Paronychia inde nomen accepit, q̄ digitorum reduuiss
quæ dicuntur paronychix, medeatur, uis eius est extenua
re & siccare, idq; citra rosionem.

PENTAPHYLLON, Q VIN QVEFOLIUM.

Quinquefolium in tertio ordine desiccatur, minime acre,
eoq; in multos usus accommodatur.

PEPLON HERBA.

Peplon nonnulli papauer spumeum dicunt: & hic frus
tex liquorem habet & tithymalorum modo purgat.

PEPLION.

Peplion quoque liquorē habet, & magna ex parte ma
ritimis locis nascitur, cetera quidem inutile, semen autē
ipsius feruidi saporis, peplo consimiliter expurgat.

PEPERI, PIPER.

Piperis radix, costi uireis refert: fructus nuper quidem
germinantis arboris, oblongum est piper, humidius na
tura & calidum: fructus ueluti acerbus immaturusq; al
bum est piper, nigro acrius, ut quod impendio magis af
satum sit: utrunque uero & calefacit & desiccatur.

PEPON.

Pepon abstergendi facultate efficax est, inde ueluti caro
ipsius ephelidas & consimilia faciei uitia exterit, semen
renes obstructione liberat.

PERICLYMENON.

Periclymeni folia et semen incidendi simul & calefaciē

LIBER SEPTIMVS. 316

di uiteis obtinent, quapropter urinam cruentam excernunt, ad *quatuor dies pota: Litem genituram uiri siccant, 1 quadraginta diebus in potione assumpta: lienosos & ægre spirantes adiuuant.

PERISTEREON, VERBENACA.

Verbenaca adeo deficcet astringitq; ut uulneribus glutinandis, & sanguinis eruptioni sistendæ sit.

PERSÆA SEV PERSICA.

Persæa arbor est Ægypti, cuius folia & siccant & astringunt, eoque sanguinis eruptionem compescunt.

PETASITES.

Petasites tertio siccantium ordini ascribitur, unde ad maleficia & phagedænica ulcera eam usurpant.

PETROSELINON.

Petroselini semen calidum siccumq; est in tertio abscessu, ui incisoria præditum, urinam ciet, menseisq; trahit, flatibus discutiendis accommodatissimum.

PEUCEDANVM.

Peucedani liquore & succo affatim calefacienti, discutienti, extenuantiq; utimur, tum naribus admoto, tum in potione assumpto, ad pulmonum & pectoris uitia ex humorum crassitudine contracta: item ad lienem induratum: dentibus autem perforatis impositus, dolorē p̄tinus sopit, neruorūq; affectibus idoneus est: radix squamas ostium separat, maleficis ulceribus succurrit, in tertio ordine & calefaciens & deficcans.

PEUCE, TED A.

Teda arbor piceæ uiribus respōdet, sed moderatior est.

PEGANVM, R V T A.

Ruta syluestris ad quartum calefacientiū siccantiūq; ordinem refertur: satiuā ad tertiu, cuius uis est crassos lentosq; humores incidere, & dissipare, urinam mouere, attenuare, & flatūs discutere, unde & uenerem coercet.

PISSA, PIX.

Pix arida qdē in secūdo abscessu deficcet, minus calefacit: si qdā ecōtrario, imō etiam extergit, maturat, discutit,

R R iiii

*Græce

τάρρα

κρίτα, ma

le προπ

ταρα sic

.n. habet

uetusta

trāslatio

Galenī.

In im-

presso de

sideratur.

PAULI AEGINETAE

acrisq; est: eamque ob causam unguetis scabros educit, impetigines exterit, tumores maturat. Valentior autem est liquida, ut etiam suspiriosis et purulenta ex creantibus, lineta subueniat: sed arida uulneribus magis glutinandis est.

PISSELLÆON, OLEVM PICINUM, seu picis flos.

Picinum oleū, ex liquida fit pice: qua natura tenuius est.

PISTACIA.

Pistacionum fructus esus stomacho mediocriter conducit, iecur obstructum laxat, præcipue summi et odorati eorum operimenti ex uino decoctum, profunt etiam contra serpentium morsus.

Græce est
λεπιδωρύχου
λεπιδωρύχου
tatur ita
a Diosco.
ridis in
terprete.

PITYIDES.

Pityides fructus sunt picearum. mistæ facultatis, astrictioræ et acris, quam ob rem reiectionibus è pectore opitulantur.

PITYOCAMPÆ, PICEARVM

ERVCAE.

Picearum erucæ eiusdem sunt uirtutis cum cantharide et buprestis.

PITYOS PHLOEIS, PICEÆ

CORTEX.

Piceæ cortex astringendi uim eximiam possidet, qua in tertrigines et ambusta illitus persanat, uentrem potus reprimat: folia etiam uulnera conglutinant.

PITYVSA.

Pityusam quoque nonnulli tithymalli speciem asserunt, quoniam et liquorem habet, et purgat illi similiter.

PLATANVS.

Platanus ui humidior et frigidior pollet, eaq; de causa folia uiridia ad inflammationes nascentis proficiunt cortex et pilulæ quoniam maiorem siccandi potentiam habent, in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanant. Cortex autem crematus siccat uehementius et abstergit, eoq; lepras pellit, et humi

dis ulceribus medetur.

PNEVMON, PVLMO.

Pulmo agnus suillusq; attritus pedū ex calceis cura
re creditur: uulpinus sale inueteratus si bibatur, suspirios
sis proficit: marinus recens detritus podagris et pernionibus
commode illinitur.

POLEMONIVM.

Polemonium, quod aliis phileterion dicitur, tenue est,
et siccandi uiribus donatum, inde nonnulli contra coxę
dicis dolores, intestinorum tormina, lienem induratum,
radicem eius cum uino propinant.

POLIVM.

Polium minus, quo et in antidotis utimur, tertii calefacientium
siccantiumq; ordinis est, itaque omnia uiscera
laxat, urinam mensesq; trahit: uiride adhuc, magna glutinat
uulnera, aridum maleficis inspersum ulceribus proficit.

POLYGALON.

Polygalon folia habet gustu mediocriter acerba: potū,
lac quoque generare putatur, calidi humidiq; temperamenti
compos.

POLYGONATON.

Polygonatum uarię particeps est facultatis, astrictorię,
acris, amarę, & cuiusdam gustu ingrati, quę uerbis nequeat
exprimi: quapropter in multipliceis usus haud est accommodatum:
radicem ipsius nonnulli ad faciei labeas, quas ptilos dicunt Gręci,
abstergendas illinunt.

POLYGONON, SANGVINARIA.

Sanguinaria habet sane uim quandam astringendi, sed
humiditas in secundo ordine frigida in ea ppollet: stomachi
feruori frigida inspergitur utiliter, sacris ignibus, inflammationibusq;
calidis illinitur, ac talis quum sit, fluxiones repellit, atque hac
ratione siccatoria esse putatur: foramina autem mas uehementior est.

POLYCNEMON.

Polycnemon in secundo ordine calefacit & deficcatur.

PAULI ÆGINETÆ

eoque uulnera glutinat.

POLYPODION, FILICVLA.

Polypodium siccat abunde citra morsum: potum, inferius purgationem molitur.

POMPHOLYX.

Pompholyx sine rosione siccat, ideoque cancris ulceribus aliisque maleficis opitulatur, item cum oculariis medicinis miscetur.

PORPHYRÆ, PURPURÆ.

Purpuræ crematæ testis æqualem uim sortitæ sunt, opuscula ipsarum cum oleo incocta pilos fluidos confirmant, cum aceto pota lienes tumidos sanant, suffitu foeminas locorum strangulatu concidentes excitant, secundasque eliciunt.

POTAMOGETON.

Potamogeton refrigerat & astringit, sanguinali herbæ consimiliter, iisdem uirtutibus præditum.

POTERION.

Poterii, quod alii phrynion dicunt, radices concisæ neruos præsectos & uulnera cōglutinant, decoctum ipsius epotum neruorum affectionibus auxiliatur.

PRASION, MARRUBIUM.

Marrubium in secundo ordine calefacit, amplius autem siccat, iecur lienemque laxat, excreationes è thorace & pulmonibus, mensisque promouet: illitum extergit, discutitque, præcipua extensoria incisoriaque ui præditum.

PRASON, PORRUM.

Porrum mali succi est & acris, ut autem Dioscorides memoratæ prodidit, grauiam facit insomnia, aluumque bonam, urinam, ciet, & extenuat: habet & abstergendam uim aliquam pectoris excreationes elicit. cæterum semen eius potius sanæ incoctum nephriticis temperatur medicinis, folia etiam nonnihil astringunt, ac eam ob causam succus ipsorum sanguinem supprimit.

PRINOS ILEX.

Ilex simileis quercui uireis hæt, sed multo ea est ualidior

LIBER SEPTIMVS.

318

PROPOLIS.

Propolis calefacit quidem in secundo abscessu, abster-
git autem mediocriter, tenuis que naturæ est, & meatuū
apertoria.

PTARMICE.

Ptarmicæ folia sternutamenta mouent, totus autem
frutex uiridis sugillata, liuoresque alios difficit, est eo-
nim herba calida & sicca, uiridis secundi ordinis, arida
terti.

PTELEA, VLMVS.

Vlmus ficare ualent & abstergere, eoque uulnera glu-
tinare, cortex autem magis, si recens fasciolæ modo uul-
neribus circumuoluatur, cum aceto lepras quoque tole-
lit: radices idem præstant, si ossa fracta quæ solidari to-
phacia cicatrice quam poron dicunt, desiderant, decocti
ipsarum iure perfundantur.

PTERIS, FILIX.

Filix uim siccandi & amaram repræsentat, eaque foetus
corrumpit, latusq; lubricos enecat, instar quatuor drach-
marum cum mulla pota: quoniam uero modice constrin-
git, ulcera citra rofionem desiccare potest.

PYCNOCOMON.

Pycnocomon discutiente ui acriq; donatū est, folia igitur
panos & furunculos dissipant, semē pterea infixæ corpo-
ri extrahit, radix flauam bilem purgat.

PYRETHRVM.

Pyrethri radix adurentē potestatem occupat, dentium q;
frigori patuerunt dolores lenit, item ad febrium rigores
ante accessionem infricatur cum oleo, adhæc iis quorū
corpora ex perfrictione stupent, & resoluta sunt, efficacis-
sime adhibetur.

PYROS, TRITICVM.

Triticum in primo ordine calefacit, uerum siccando hu-
mectandoq; medium est, nonnihil etiam glutinosum, &
obstruendi efficax obtinet.

PYTIA, COAGVLVM.

PAULI ÆGINETÆ

Coagulum omne naturæ acris est, tenuis, discutientis, & nimirum siccantis, sed leporinum comitialeis sanare. cū aceto potum, literis mandarunt: fluoremq; muliebrem emendat, lac in uentre concretum soluit: similiter etiam cruentas è thorace excreationes cohibere ipsum tradūt: equinum uero coagulum coeliacis & intestinorum torminibus prodesse: phocæ, castorii uireis præ se ferre.

QVÆ AB R INCIPIVNT.

RHACOS, ATTRITÆ VE

ris fragmentum.

Attritarum è lana uestium fragmenta concremata, similibus eidem lanæ uireis repræsentant. Linei autem panniculi quum adhuc uruntur, tenuem ex se fumum reddūt, qui etiam destillationes discutiat, & uulnæ sursum rescurrenti salutaris sit: cremati iam ad lanæ uirtutem accedunt.

RHAMNVS.

Rhamnus siccatur in secundo, refrigeratur in primo abscessu, quare herpetibus & erysipelatis non admodum calidis medetur, sed teneris eius foliis utendum est.

RAPHANVS, RADICVLA.

Deest in impresso Radicula in tertio abscessu calefacit, in secundo siccatur: syluestris efficacior est. In ambobus, semen utriusque planta ipsa uehementius, itaque sugillata aliosq; liuores difficit.

RHEON, RHA.

Rheon, quod alii rha dicunt compositum est ex terrestri frigida & tenui substantia, aereaq; calida & leniter acris eamq; ob causam conuulsis, ruptis, recta ceruice spirantibus opitulatur: quod discutiendi uim habet, liuores emendat quod astrictoriam, cruentas excreationes, coeliacos, & intestinorum tormina sanat, utraque uero facultate, iocinorosos iuuat.

RHETINÆ, RESINÆ.

LIBER SEPTIMVS.

319

Resinæ omnes & calefaciunt & desiccant, uerum terebinthina principatum obtinet, discutientis naturæ, emollientis, tenuis & absterforiæ, eaq; scabiem corrigit: & latrix huiusmodi est. Quæ uero è teda destillauerit, atque hac magis adhuc pinea, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit, medium inter ipsas locum tenet, & quæ de picea, & quæ de abiete raditur.

RHODA ROSÆ.

Rosæ mixta constant substantia, aquosa scilicet, calida astringenti & amara: flos autem ipsarum magis adhuc astringit, eoq; desiccatur.

RHODIA RADIX.

Rhodia radix calefacit in secundo abscessu, tenui & discutiente ui prædita.

15 RHOEAE SIVE RHOE, MALUM PUNICUM.

Malum punicum omne astringendi uireis eximias habet, quibus refrigerat siccantq; uerum dulce aliis minus: austerum magis refrigerat siccantq; est & stomacho acidum refrigerat quoque, & maiorem quandam incipiendi uirtutem repræsentat uerum acini succo magis astringunt siccantq; : efficacius his adhuc malicorium quod sidion Græci uocant: huic uirtute respondet mali flos qui cytinus appellatur.

25 RHVS.

Rhu coriariæ à medicis dictæ fructus præcipue & succus magno in usu sunt, quum illa astringendi siccantq; uim ex tertio ordine habeat, detergendi è secundo.

30 RHYPOS, SORDES.

Sordes ex statuis æreis, aut uasis in quibus multum olei inherescit, detractæ sic ut nonnihil æruginis admixtum sit discutiendi uireis habent, siccantq; mediocriter & emolliendi, eisq; immatura phymata discutunt. At de sordibus quæ in palestris habentur, quas nonnulli etiam patos uocant, in sudore dictum est, Aurium sordiculæ reduuiri mederi dicuntur.

PAULI AEGINETAE
QUAE AB S INCIPIVNT.
SAGAPENVUM.

Sagapenum, ceu ferulae liquor est, calidus & tenuis, cui
& absterforia quaedam vis inest, qua & oculorum cicatr-
icibus & suffusionibus prodest.

SALAMANDRA.

Salamandra ista cinerem nonnulli medicinis exedenti-
bus, tum iis quae ad lepram & scabiem componuntur,
admiscent.

SAMPSUCHVM.

Sampsuchum calefacit, siccaturq; in tertio abscessu: est et
tenuis naturae & discussoriae.

SANDARACHA.

Sandaracha adurentis est facultatis, quemadmodum &
auripigmentum.

SANDYX, VEL SIRICVM.

Sandyx aut siricum, extenuat & siccatur, non tamen ca-
lefacit.

SAPROTES CARIES LI-
GNORVM.

Lignorum caries, leorum maxime, quae mediocriter
astringunt: qualis Iulmus est, humentia purgat ulcera &
SAPRO.

In im-
presso de
sideratur.

Sapo, abstergendi vim habet.

SARCOCOLLA.

Sarcocolla, persicae arboris lachryma est: opplendi & ci-
tra rosionem siccandi uireis sortita, atq; ideo uulneribus
est glutinandis.

SARXIPHAGES, SAXIFRAGA.

Saxifraga urinam mouet, & calculos conterit.

SATIRION, TRIFOLIUM.

Satyrion, aut triphyllon humidum est temperamenti & cali-
di, item flatuosum: unde ueneris appetentiam facit: non
nulli opisthotonis cum uino austero potum, salutare esse
se tradunt. Galenus in commentario de theriaca, trifoli-
um ait hyacintho simile esse: quum acre inturgescens se

LIBER SEPTIMVS.

320

men syluestri cnico æquale habet: decocti ipsius ius su-
perfusum, phalangii aut uiperæ morsus sanare: sano idē
potui datum, similem animalium horum ictibus affectū
conciliare.

S AV R A, L A C E R T A.

Lacertæ iecur & caput, suo loco exposita sunt: totum
autem caput dissectum impositumq; scorpionum icti-
bus medetur.

S E L I N O N, A P I V M.

Apium tanti caloris est, ut & urinas & menseis eliciat: ce-
terum flatus discutit, præsertimq; eius semen.

S E R I S, I N T I B V M.

Seris, subamarum olus est: admodum refrigerans hu-
mectansq; habet et nonnihil astringentis.

S E R I P H I V M.

Seriphium calefacit quidem in secundo, siccatur autem in
primo ordine, consimile absinthio, minus tamen eo as-
tringit, magis calefacit, animalia ventris occidit, medio-
criter stomacho aduersatur.

S E S E L I.

Seselis radix, magisq; semen insigniter calefacit, tenuisq;
substantiæ est, urinam quoque ciet, comitialibus & recta
cervice spirantibus accommodatum.

S E P I Æ T E S T A.

Sepiæ testa persimilis est ostreo, quod ad uireis attinet,
sed tenuior substantia & abstergens, eoq; in cinerē redac-
ta, ungueis cum sale fosfitio extenuat: ignem non expō-
ta si infricetur, ficius exheret, & cutis labes abstergit.

S E S A M O I D E S.

Sesamoidis albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

S E S A M V M.

Sesamum nō parū lētoris, pinguisq; obtinet idcirco op-
plere, mollire, & mediocriter calefacere idoneū est.

S E P S.

Seps, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in ui-
no pota, propriis moribus succurrit.

P AVLI AGINE TÆ

SIALON, SALIVA.

Saliua hominis ieiuni maxime discutit & abstergit, eoq;
infantium impetigines illita exterit, & furunculos cum
tritico, nimirum manso imposita, maturat, & sugillata de
let, feris hominem occidentibus maxime aduersatur.

SIDERITIS.

Sideritis Heraclia & helxine dicta est. Achillea autem si
deritis illi quidem consimilis est, sed magis astringit,
eoq; fluidis affectibus accommodata.

SIDEROS, FERRVM

Ferrum aqua restinctum subinde, uehementem desico
candi uim aquæ conciliat, quæ pota lienosis condu
cit: uinum autem in quo id restinctum est, coeliacis, in
testinorum torminibus cholericis, stomacho resolutis
auxiliatur.

SICYOS, CVCVMIS.

Cucumis esculentus quidem uridis, refrigerat hume
tantq; in secundo ordine, caro ipsius feruidas solatur
inflammationes, semen abstergendi incidendiq; uirtute
præditum, urinas mouet, et corpus nitidum efficit ari
dus siccant in primo ordine, uehementiusq; abstergit, et
semen, et radix.

SICYOS AGRIOS, CVCV

mis syluestris.

Cucumeris syluatici seminis succus, elaterium dictus est,
qui autem è radice et foliis premitur, elaterio similis est,
sed imbecillior: radix detergit, dissipat, emollit: succus
siccandi uireis habet.

SILYBON.

Silybon spinosus frutex est, albo chamaeleonti persimio
lis, esui accommodatus: radicis liquor denarii pondere
cum mulla potus: uomitiones excitat.

SILVRVS.

Silurus salsus si edatur, fauceis humidus expurgat: appli
catus corpori, surculos educit.

Silphe

LIBER SEPTIMVS. 322

SILPHE, BLATTA QVÆ
in pistrinis inuenitur.

Blattæ quæ in pistrinis inueniuntur, interanea decocta con-
tritaq; aurium dolores perfanant.

SILPHIVM, LASERPITIVM.

Laserpitium probe calefacit, flatulentum est etiam &
concoctu peruicax: à foris corpori applicatum, effica-
cius deprehenditur, magisque liquor ipsius, extrahendi
potens, item & superexcrementia amoliendi.

SINON.

Sinon calidus & subamarus est, urinam mouet, cōco-
ctionem adiuuat, & menseis educit, & uiscera obstru-
cta aperit.

[In fimo
presso o-
missum est.]

SION.

Sion calidum, urinam citat, & discutit, renum calculos
frangit, menseis euocat.

SISARVM, SISER.

Siferis radix cocta stomacho utilis est & urinæ ciendæ,
calida in tertio ordine: semen tenue est, discussorium, ua-
lidumque, idcirco iis quos singultus & tormina male
habent, cum uino exhibetur.

SISYMBRIVM.

Sisymbrium sunt qui cardaminem uocant cardamo, hoc
est, nasturtio assimilatum: aridum quidem calefacit sicc-
catque in primo abscessu: humidum autem in se-
cundo.

SCAMMONIA.

Scammonia calfacit, digerit, & biliosa extergit, magisque
eius liquor, qui iam & phymata dissipat, foetus appositus
tu corrumpit, lepras extergit, diuturno capitis dolori cum
oxyrhodino utiliter respergitur: radix autem tum ip-
sa, tum decoctum eius potum, purgat: cum aceto au-
tem & farina hordeacea decocta, coxendicum dolori-
bus illinitur.

SCANDIX.

Scandix syluestre olus est, calefaciens siccansque in se-
cundo.

PAV. ÆGIN.

SS

PAULI AEGINETAE

cundo gradu, urinam propellit, & uiscera obstructione liberat.

SCINCOS, TERRESTRIS
crocodilus.

Scinci carnes renibus proximæ, naturalibus arrigendis bibuntur, rursus semen lactucæ cum aqua potum, eadē contraria uirium lege uidetur remittere: item lentis decoctum cum melle.

SCYLLA.

Scylla incidit, & calefacit & desiccatur in secundo ordine: præstat autem eam assam [aut] elixam sumere.

SCOLOPENDRA MARINA.
Scolopendra marina in oleo elixa inuncta; pilos abolet, uita etiam pruritus excitat.

Deest in
græ. ex
plari im
presso.

SCOLOPENDRION.

Scolopendron asplenon est.

SCOLYMON, CARDVVS.

Cardius calefacit, siccaturque in ordine secundo, radix eius cum uino decocta, urinas foetidi odoris liberaliter educit, & alarum totiusque corporis graueolentias corrigit.

SCORDION, TRIXAGO

palustris.
Scordium uariis pollet facultatibus, ut quod amarum, acerbum, & acre sit, purgat igitur simul & calefacit uiscera, urinas & menstrua concitat, & refrigerata omnia excalefacit, uulnera glutinat, repurgat; aridum illud cicatricem inducit.

SCORODON, ALLIUM.

Allium calefacit siccaturque in quarto abscessu: at syluestre allium quod ophioscorodon, quasi anguinum allium, & agrioscoridon dicitur, domestico ualentius est.

SCORODOPRASON.

Scorodoprason porri & alii mixtas habet uiribus & gustatum.

SCORPIOIDES.

LIBER SEPTIMVS. 323

Scorpioides excalfacit abscessu tertio, siccatur secundo.

SCORPIVS.

Scorpius terrestris crudus impositus, aut tostus in cibo proprii ictus remedium efficitur: marinus autem fel habet oculorum suffusionibus utile.

SCORIA, RECREMENTVM.

Recrementum omne ualide exiccat: ferri stercus aliis amplius, quod excoctum & in tenuissimum pollinem detritum, cum aceto auribus suppurantibus mirifice proficit, item lis qui aconitum biberunt, cum oxymelite potum remedio est. Plumbi recrementum eidem respondet, sed magis astringit.

SMILAX, AUT CACTVS

arbor, taxus.

Smilax uel cactus arbor est uirosæ uirtutis.

SMYRNA, MYRRHA.

Myrrha è secundo calefacientium siccantiumque ordine est: capitis igitur uulnera si illinatur glutinat item amarum uim obtinet, qua uentris lumbricos & foetus occidat: ad hæc abstergit, eoq; oculariis medicinis temperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita ut faucibus non asperet. Boeotica myrrha uireis habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

SMYRNION.

Smyrnion, quidam hipposelinon, quidam apium syluestre nominant, calefacit in tertio ordine eodemq; siccatur, apio duntaxat fortius, petroselino inualidius, urinæ & mensibus educendis accommodatum.

SONCHVS.

Sonchus astringit & manifeste refrigerat, tum corpori admotus, tum manducatus: exarefactus autem medicocriter calefacit.

SPARGANIVM.

Sparganium siccandi & hoc uireis refert.

SPARTOS, GENISTA.

Sparti quo uireis ligant, & semen, & flos cum mulsa

PAULI AEGINETAE

Instat quinque obolorum pota per superiora purgant
ueratri modo sine periculo, semen per inferiora quo
que purgat, uirgulæ ipsius ad coxendicum dolores
proficiunt.

SPECLARIVM, LAPIS

specularis.

Specularium, alii per ph scribunt specularium, quo non
nulli loco uitri in fenestris utuntur, eoq; diaphanes à p
spicuitate appellatur, substantia gypseum, uireis habet cō
crematis testis aut ostreis simileis.

SPONGOS, SPONGIA.

Spongia recens quæ marinum odorem adhuc reseruat
si cum aqua aut uino aut posca imponatur, uulnera glu
tinat, cremata, acris est uirtutis & discussoria cum bitu
mine autem & pice liquida usta oppositaq; ex igne, san
guinis eruptiones compescit.

SPODIUM, CINERVLA.

Spodium pompholygi uiribus æquale est.

STAPHYLINVS, PA

STINACA.

Pastinaca urinas mouet, menseis proritat, præsertim se
men ipsius & radix, folia autem abstergerendi uiribus
prædita phagedænicis affectibus congruunt, & uiridia
cum melle: syluestris autem pastinaca ad omnia ualētior
est domestica.

STACHYS.

Stachys marrubio similis frutex, tertium in calefaciendo
ordinem occupat, menseis itaq; excitat, foetus occidit, et
secundas expellit.

STEATA, ADIPES.

Adeps omnis humanum corpus & humectat & calefa
cit, sed pro diuersis animalium temperamentis uirtus eo
ius euariat. Suillus igitur omnium humidissimus est, ut
ad olei naturam accedat, unde etiam rosiones obtun
dit. Caprillus, sicciore est, & celeriter concreuit, eo que is
qui in longanone rosiones experiuntur, ab inferiori parte

LIBER SEPTIMVS.

323

iniicitur. Anserinus calidior est, maioremque tenuitatē obtinet. Inter utrumque hunc gallinarum gallorumque adeps consistit. Leoninus calore omneis & tenuitate superat, & propterea etiam ui discussoria. Bubulus inter faillum & leoninum medius temperamento existit. Vrsinus alopecidis medetur, vulpinus aurium doloribus, quemadmodum uiperinus pilos abolere, & oculorum suffusiones impedire fertur. In omni autem adipum specie calidior sicciorque est marium, atque ex his eorum qui castrati non sunt magis quam aliorum, ceterum uetustate omnis adeps redditur calidior.

STIMMI.

Stimmi præter quod siccatur, etiam astringentem habet, ob quam oculariis collyriis miscetur.

STOEBE.

Stoebeæ semen & folia in tertio ordine desiccant uiribus donata astringentis, eamque ob causam uulnera magna conglutinant: decoctum ipsorum intestinorum torminibus, sanguinis eruptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia illita oculis ex ictu suffusis conferunt.

STOECHAS.

Stoechas adaperit, extenuat, detergit, & confirmat uiscera omnia totumque corporis habitum.

STRATIOTES.

Stratiotes aquaticus frigidus est natura: terrestris etiam astringendi uim habet, qua ulcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones & ad fistulas utuntur.

STRICHNON, SOLANVM.

Solanum hortense esculentumque, astringit, et in secundo ordine refrigerat. Solanum halicaccabum hortensi simile, urinæ ciendæ idoneum fructum habet acino uuae æqualem. hypnotici, id est, somnifici solani radice cortex, cum uino denarii pondere potus, somnum conciliat, semen habet ad urinam mouendam accommodatum, ex tertio refrigerantium ordine: unde corymbi eius plures duodecim epoti, furorem accersunt. Quartum uero

SS iij

PAULI ÆGINETÆ

genus solani intus assumptum, inutile est: à foris autem illitum ulcera depascentia curat, refrigerando siccadoq; ad secundum ordinem relatum.

STYPTERIA, ALVMEN.

Alumē omne maxime astringit, substantiaq; crassum est: tenuius autem reliquis est quod uocatur scisile, mox rotundum, & astragalotes. Crassum admodum est liquidum, placites & plinthites appellatum.

STYRAX.

Styrax calefacit, emollit & concoquit: tusi, destillationi in nareis, & grauedini utilis, mensis idem & potus & appositus extrahit.

SYCA, FICVS.

Ficus aridæ in secundo fere ordine siccant: pingues autem, duros tumores magis maturant: aciores detergunt, discutuntq; decoctum ipsarum mellis speciem referens, quod iam nonnulli siræon appellant, uiribus mellis respondet, ulrides autem ficus, imbecillioris uirtutis sunt, utraq; tamen & uirides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici, acres & discussoriae sunt, quemadmodum ex domesticis grossi.

SYCE, FICVS ARBOR.

Ficus arbor calidi tenuisq; temperamenti est, adeo ut liquor & foliorum succus non rodat modo, aut abstergat uehementer, sed etiam exulceret, ora uenarum aperiat, & myrmecias exterat: iam uero & purgandi uim obtinet. At syluestris ficus, quam caprificum uocant, in omnia efficacior domestica est.

SYCOMORVS, FICVS ÆGYPTIA.

Sycomori fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius: liquor arboris uel pollet emolliendi, glutinatio uulnerum, discussoria tumorum: bibitur inungiturq; ad serpentum morsus, lienes induratos, stomachi dolores & in accessionibus febrium horrores.

SYMPHYTVM PETRÆVM.

Symphytum petræum contrariis constat uirtutibus, ha-

bet enim aliquid quod incidat, ideoque *pus in thora-
ce & pulmonibus collectum expurget: habet etiam a-
liquam contrahendi uirtutem, qua sanguinis excreatio-
nibus medeatur, conuulsis, ruptis, mulierum fluxionibus
5 rubris intestinorum ramicibus, item calida quædam
humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriæ aspe-
ritates sanat. Symphyton alterum nempe magnum
uiscosum quippiam, & quod pruritus excitet
repræsentat, scyllæ simile. Utuntur eo, ad quæ
10 superiori.

SPONDYLION.

Spondylii fructus & radix uirtute acris & incisoria, suspi-
riosus, comitialibus & arquatis succurrunt, radix autem
circumrassa, fistulisq; imposita illarum callos tollit, suc-
15 cus è flore ipsius expressus, ueterrimis *aurium ulceri-
bus instillatur.

SCHINOS, LENTISCVS.

Lentiscus in omnibus sui partibus siccatur secundo ordi-
ne absoluto, calefaciendo autem & refrigerando medi-
20 us est, adeo astringens, ut ad hypocistidis succum astric-
tione accedat.

SCHINVS ANTHOS LEN-

tisci flos.

Lentisci flos modice calefacit, minus astringit, tenuis
25 em naturam sortitus, qua urinam mouet & men-
seis trahit, obstructa referat in fomentis, potu & cata-
plasmatis adhibitus: radix adhuc magis flore astringit,
sed ille calidior.

SCHENOS ELIA, IVN-

cus palustris.

Palustris iuncus duplex est, sed eius qui uocatur oxy-
30 schenocenos, semen est (omnificum: holochœni autem di-
cti, minus, idem & capiti dolorem facit, utriusque semē
frixum si cum uino bibatur, alui fluores desiccatur, & mu-
35 lierum fluxiones cohibet.

SORI.

SS iiii

*Impres-
sum hēr,
pus in tho-
race colle-
ctū & re-
nes expur-
get. Gale-
nus &
Dioscori-
dis inter-
pres Pau-
lū citās,
nřæ uer-
sioni asti-
pulantur.
Galenus
habet
mordax.
*Male in-
græ est,
ἔσ τ' κοιλῆ
ας pro ἔσ
τὰ αἵτα.

PAULI AEGINETÆ

Sori uireis misy æqualeis obtinet, longe illo natura
crassius.

QVÆ A T INCIPIVNT.

TARICHON, SALSA

mentum thynni.

Salsi thynni caro acris est & desiccatoria: morsis igitur
à uipera, quam præsterem dicunt, quàm plurimum eius
esui datur, uinum q; superbibitur liberalius, et uomitus
excitatur: eadem ad uomitiones quæ ciborum acres
mento quærentur, accommodata est: item rabidorum
canum aliorumque serpentium morsibus utiliter ille
linitur.

TAVROCOLLA, GLVTI

num bubulum.

Taurocolla aliis xylocolla dicitur, ex boum coriis con
fecta, uim habet insigniter absterforiam, eoq; aceto suba
cta, impetigines et summæ cutis lepras exterit: ambustis
si aqua calida soluatur, inflammationem oboriri non si
nit: eadem oxymelite soluta, uulneribus accommo
datur.

TELLINÆ.

Tellinæ salse crematæ q; adurentem cinerem reddunt,
qui cedrino liquori mistus, euulsos radicitus palpebra
rum pilos, si instilletur, nasci iterum prohibet.

TERMINTHOS, TERE

BINTHVS.

Terebinthus calefacit in ordine secundo, siccatur autem
si uiridis est in primo, si aridus secundo, fructus ubi ina
ruerit, ad tertium siccantium ordinem refertur: hac igitur
ratione et urinam mouet, et lienes adiuuat.

TETTIGES, CICA DÆ.

Cicadæ crudæ siccatae ad colicum dolorem potui dā
tur, aut tres, aut quinque, aut septem, cum totidem nu
mero piperis granis: quidam tostas contra uesicæ dolo
res potui exhibent.

TEVTLON, BETA.

LIBER SEPTIMVS. 325

Beta nitrosam uim habet, qua abstergit, discutit, et per na-
reis purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arceno-
dæ fit idonea, et modice discutit.

TEUCRION.

5 Teucrion calfacit in secundo, siccatur in tertio ordine, ui-
ncisoria tenuiq; lienibus medetur.

TEPHRA, CINIS.

10 Cinis non omnis idem exacte habet temperamentum,
sed pro materia combustæ differentia euariatur: acerba-
rum sane arborum cinis, nempe quercus et ilicis, astrin-
gendi uim non modicam obtinet, qua sanguis eruptio-
nem compescit, quum nullius alterius datur facultas: a-
crium uero, puta fici et tithymalycinis uehementioris a-
crimonie et deterforius existit.

15 TELEPHION.

Telephion in primo abscessu calefacit, secundo autem
desiccatur: est itidem absterforium, quapropter ulceribus
putredinem expertis conuenit, et uirilignes, tum leucas,
tum alphas, cum aceto abolet.

20 TELIS, FOENUGRÆCVM.

Foenugræcum ex secundo ordine calidum est, è primo
siccum idcirco feruidas inflammationes irritat: minus
autem calidas, et induratas magis discutiendo per-
sanat.

25 TITHYMALVS, HERBA

LACTARIA.

30 Tithymali omnes è quarto calefacientium ordine sunt,
acrimonie et ualide amaritudinis participes, sed radix
quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta den-
tium erosorum dolores finit, liquores uehementiore do-
nati uirtute, dentium cauis imponuntur. reliquum cor-
pus si attingant, adurunt, quare etiam pilos modice de-
litos auferunt, item myrmecias, uerrucas et huius genes-
is alia: cutis labes abstergunt, maligna ulcera, phagedæ-
35 nica curant. Ceterum ex septenario ipsorum numero
ualidissimi sunt, appellati characias, myrsinites, et qui in

PAULI AEGINETÆ

petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui uerbasco
similis est & cyparissias, deinde paralius quasi dicas mas
ritimus postremo helioscopius.

TITANVS, CALX.

† Græce e Calx uiua uehementer adeo urit, ut crustam inducat: res
rat uultu stincta uero crustam quidem subito excitat, sed post diē
rei i. intē unum non amplius. † calefacit tamen & consumit caro
dit, Gale neis: si lauetur, idq; aqua marina, ualidas discutiendi ui
nus Ori reis acquirit.

bafius no
biscu sen
riunt.

TRAGACANTHA.

Tragacantha persimiles gummi uireis repræsentat.

TRAGIVM.

Tragium frutex est in Creta lentisco similis, uirtute calis
da in tertio abscessu, attractoria, discutiente, & tenui, acu
leos igitur educit, calculos comminuit, menseisq; citat,
instar denarii potum. Sed alterum tragium, hoc amarius
est, scolopendrio asimile, nascitur multis in locis, tanta
astringendi uirtute præditum, ut fluidis affectibus com
mode faciat.

TRAGORIGANVM.

* Græce e Tragoriganum origani uirtutes habet, & nonnullam e
rat d'pas tiam astrictionem.

na'us pro
d'p' x'us,
depraua
te nimix
quū me
minerit
draconis
& Diosco
rides no
biscu sen
tit, ex quo
ad uerbū
sumpsit
Paulus.

TRIBOLOS, TRIBVLVS.

Tribulus mediocriter refrigerat: sed terrestris siccando
depraua, ualentior est, aquaticus leniter etiam humectat: uterque
te nimix contra inflammationum generationes, omnesq; influ
quū me xus conuenit: terrestris fructus quum tenuis existat, renū
minerit calculos conterit.

TRAGOSITODES, TRAGVS

frumentaceus.

Tragus frumentaceus zæ figura respondet, sed difficil
lius in stomacho conficitur, aluum emollit.

TRIGLE, MVLIVS.

Mullus piscis continue esus, claritati oculorum nocet,
cradus dissectus & impositus, marini draconis, scorpio
nis, & *araneorum moribus succurrit.

LIBER SEPTIMVS. 320
TRIPOLIVM.

Tripolii radix calida est in tertio abscessu & acris.

TRICHES, CRINES

Pili combusti per similem lanis concrematis uim obtinent.

TRYGON, PASTINACA
MARINA.

Marinae pastinae aculeus impactus dentit infirmo, ipsum conterit excutitque.

TRYX, FÆX.

Fæx uini ignem non experta compositis uiribus constat ut quæ abunde deficcat discutiatque; astringentia autem facultas ei ex uini unde confit specie, accedit. Utendum igitur est ea tum in humidioribus, tum in fluidis affectibus
25 phygethla discutit, lac mammis eo refertis imposita, extinguit: cremata uero quam nunc etiam spheclem appellant, adurentem uim acquirit, quapropter & medicamentis quæ adurant, ipsam miscemus. ungueis igitur scabros cum resina eiicit: pilos cum oleo lentiscino per
30 nocte totam inuncta, flauos efficit. Lota oculorum medicinis absterforiis temperatur. Aceti fæx in omnibus ualentior est iam dicta, magisque astringit.

TROGLODYTES, PASSER.

Troglodytes passer est, omnium auium excepto regulo
35 minimus, in sepibus potissimum degens, qui & tostus & crudus salus manducatus renum calculos conterit: cremati ipsius cinis epotus, idem prestat.

TYROS, CASEVS

Caseus recens & mollis repellendi uim obtinet, leuiter
30 refrigerans, quare & uulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiam discussoriam modicam possidet, magisque uulnera conglutinat: uetustus isque pinguis discutiedii uirtutem præse fert, qua articulariorum quoque, tophis accommo
35 datus est, præsertim cum suillæ carnis & salis & pinguis decocto.

PAVLI ÆGINETÆ
QVÆ AB Y INCIPIVNT.
HYACINTHVS.

Hyacinthi radix bulbi speciem repræsentans, primi in
siccando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaq;
impuberes diu conseruare cum uino illita creditur: se-
men leuiter abstergit astringitq;, idcirco arquatis cum ui-
no datur, ut quod desiccet magis q̃ refrigeret.

HYALOS, VITRVM.

Vitrum læue cū uino tenui et albo potum, uesicæ cal-
culos comminuere dicitur.

HYDNON, TVBER TERRÆ.

Tuber terræ terrestri constat substantia cum modica qua-
dam uirtute tenui.

HYDRARGIROS, ARGEN-
tum uiuum.

Argentum uiuum in medicinæ usum non adeo accom-
modatur, q̃ uenenum repræsentet: nonnulli uero concre-
matū ipsum in cinerem, mixtumq; aliis speciebus, colli-
cis et iliosis potioni exhibuerunt.

HYDROPEPERI, AQVA
ticum piper.

Hydropiper, herbula est calida, sed non piperis modo,
uiride cum semine suo illitum, sugillata, et tumores indu-
ratos discutit.

HYDOR, AQVA.

Aqua præstantissima et alterius substantiæ expers, refri-
gerat, humectatq;, ex sua ipsius substantia: ubi autem as-
scititium calorem assumpserit, quandiu eum seruat, cal-
facit: frigida autem facta, refrigerat. Porro quæ nonnihil
mixta est, ut nitrosa aut bituminosa, adiunctæ substantiæ
uireis acquirit. Pluuialis autem nonnihil etiam astictio-
nis habet, ob quam oculariis miscetur medicinis. Qua-
lem uero conueniat laudatissimam esse aquam, in pri-
mo libro comprehensum est.

HYOSCIAMVS, ALTERCVM,
seu herba apolaris.

LIBER SEPTIMVS. 327

Altercum cuius semen nigrum est, item cuius flauum, uenenosum est: accommodatissimum uero curationibus, quod & semen et florem cādidum habet ex tertio refrigerantium ordine.

[Repositum ex Galeno.]

HYPERICVM.

Hypericum duplex est, alterum, quod androsæmon et ascyrrhon appellatur, expositum est: alterum uero calefacit et siccat, tenui substantia præditum, eoque urinas elicit et menstrua citat, totum ipsius semen, quod si cum foliis illinatur uiride, cicatricem uulneribus obducit, arida uero folia oblita ulceribus medentur, dantur etiam potioni aduersus coxarum dolores.

HYPECOON.

Hypecoon refrigerat in tertio ordine, papaueri uiribus proximum.

HYPOGLOSSON.

Hypoglosson frutex pusillus est, cuius radix et succus emolliendi uirtute pollent.

HYPOCISTIS.

Hypocistis eorum quæ ad radices cisti et cistari appellati subnascuntur, nempe cytinorum, succus est, medicamentum ad omneis fluidos affectus efficacissimum, ut quod particulas siccat corroboretq;.

HYPOPHÆSTON.

Hypophæston species est spinæ fulloniæ, quemadmodum et hippophaes, ex huius capitulo, foliis et radicibus, succus expressus siccatusque trium obolorum pondere, cum aqua mulsa ad pituitam et aquam uacuandam exhibetur: maxime congruit non nisi sub recta cerulæ spirantibus, comitialibus et neruorum affectibus.

HYSSOPVM.

Hyssopum in tertio ordine et calefacit et desiccat, tenuisq; substantiæ est.

PAVLI AEGINETAE

QVÆ A PH AVSPICANTVR.

PHACI, LENTES.

Lentes in secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento donatæ, sed astrictionis quoque nonnihil habent. Totum uero lentis corpus siccatur, aliumque sistit decoctum ipsius proritat, ideoque prior aqua defunditur, quum astringendi gratia lentes assumentur.

PHACOS, LENTICVLA

palustris.

Lenticula palustris humectatur, refrigeraturque in secundo abscessu.

PHALARIS.

Phalaridis succus, folia & semen pota, uesicæ doloribus auxiliantur. habet eadem herba & tenuem quandam uim, naturamque calidam.

PHALANGITES.

Phalangites quæ phalangiorum moribus medeatur, nomen hoc inuenit: est & tenuis naturæ compos, quæ torminosi auxiliari putatur.

PHELLOS, SVBER.

Suber præsertim ex uinorum cadis, cõbustum, cinerem reddit siccando uehementissimum, quæ medicinis ad tormina intestinorum inscriptis admiscetur.

PHILYRAS, TILIA.

Tiliæ arboris folia, syluestri oleæ similiter astringunt, quibus commanducatis, oris ulcera iuuantur, eorumque decocto colluuntur: quod etiam potum & urinam & menseis trahit.

PHLOMOS, VERBASCVM.

Verbasci genera plura sunt, inter quæ est & dicta tryalis cæterum folia omnium siccantem & mediocriter astringentiam uim referunt: præcipue eius quod aurei coloris est, & acerbum fluidis conferunt affectibus: nonnulli & dentes eis colluunt.

PHOENIX HERBA.

Phœnix, aliis rhu, herba est lolio consimilis, astringendi uiribus donata, in uino austero pota, omneis fluidos affectus sistit.

PHOENIX ARBOR, PALMA.

25 Palmæ fructus, qui iam ematuruit, calidus mediocriter est uisceribus roborandis & stomacho idoneus, tum in tus assumptus, tum foris applicatus: reliqua palma portio uehementer astringens est, quamobrem stomachicis & hepaticis medicinis temperatur: longe magis astringit quod fructus enascentis ueluti inuolutum est.

PHORMION.

Phormion tenuis, abstersoria & attractricis facultatis est: semen igitur cum melle albugines extenuat, & spicula e corporibus extrahit.

PHV.

Phu radicem habet nardi persimile, quæ tamen ad pleorag infirmior sit, sed urinas magis quàm ea elicit, nardi gallicæ modo.

PHYCOS, ALGA.

Phycos refrigerat siccatur; in secundo abscessu, ac mediocriter etiam astringit.

PHYLITES.

Phyllites cum acerbâ quadam prædita sit qualitate, non immerito alui profluuiis pota auxillatur.

QVÆ A CH AVSPICANTVR.

CHALBANE, GALBANVM.

Galbanum calore tertium ordinem accedit, siccitate secundum, molliendi & discussoria ui donatum.

CHALCITIS.

30 Chalcitidis uires astrictoria, acres, adurentesque sunt, & crustam inducunt, tenuitate media inter misy & sori consistit, usta tenuior redditur.

CHALCANTHON, ATRA

mentum sutorium.

35 Chalcanthon aqua est in Cypri metallis coalescens,

PAULI AEGINETAE

valentissimæ astrictionis cum calore non ignauo:
quod omnium efficacissime humiditas carnis absorbit
deficcatque. longiore temporis processu in chalcitidem
mutatur.

CHALCOS, ÆS COM-
BVSTVM.

Æs combustum acre quiddam habet, & astrictionis par-
ticeps est, quapropter ad cicatricem ulceribus obducen-
dam in siccioribus corporibus præstantissimum est:
si eluatut, teneris utilius est.

CHALCV ANTHOS, Æ-
ris flos.

Æris flos tenuioris naturæ est, quæ æs concrematum, eiusque
squama: mixtus itaque collyriis, palpebrarum et asperita-
tes & fici exierit.

CHAMEDRYS, TRIXAGO.

Trixago in tertio ordine calefacit siccaturque; lienes igitur
consumit, urinas et menstrua elicit, viscerum obstructio-
nes expurgat.

CHAMÆCISSVS, HEDERA
terrestris.

Hederæ terrestris flos quum amarus insigniter existat,
iecoris meatus adaperit, item contra coxendicum dolo-
res exhibetur.

CHAMÆLEVCE.

Chamelæuce in tertio abscessu calefacit, in primo
deficcat.

CHAMÆLEON.

Chamæleontis nigri radix calefacit siccaturque prope-
modum in tertio ordine, est et absterforiæ facultatis par-
ticeps, quæ cutis labes exierit, item duros tumores dissi-
pat emollitque, et phagedænica ulcera illitu persanat: si
autem intra corpus sumatur, ueneni loco est. Albi radix
superiori proportionem respondet, sed amarior est: quæ
si cum uino austero instar acetabuli bibatur, latos uentris
lumbrosos enecat: facit etiam ad aquam inter cutem.

Chamæmelon.

LIBER SEPTIMVS.

329

CHAMÆMELON.

Chamæmelon siue anthemis calefacit siccaturq; in primo abscessu, præterea uirtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata, constat.

CHAMÆPITYS.

Ghamæpitys secundo gradu calefacit, tertio deficcaturq; ob causam & purgare & abstergere uiscera, potissimum iecur potest, item urinas mensisq; trahit, magna uulnera conglutinat, putredinem expertis medetur, duritias discutit, decoctum ipsius, etiam coxendicum doloribus salutare est.

CHAMÆDROPS.

Chamædrops, quidam & hoc chamædrin uocant, alii etiam *teucrion, uiribus chamædrii respondet.

CHAMÆSYCE, HVMILIS FICVS.

Chamæsyce absterforia & acri facultate pollet, quapropter & surculi ipsius & liquor myrmecias, uerrucasq; abolent, crassas oculorum cicatrices cum melle abstergunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

CHAMÆLÆA, OLEAGO.

Oleago absterforia facultate, sordida ulcera & crustas cum melle purgat.

CHELIDONIUM, HERBA hirundinaria.

Chelidonium in tertio ordine calefacit, ualenterq; abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est: radix arquatos cum uino & aniso pota, obstructione liberat: manducata, dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidonium quarto calefacientium ordini ascriptum, acrisus est, ut illitum cutem exulceret: ungueis scabrosos euiscit: succus autem ipsius per nareis purgat.

CHELIDONES, HIRUNDINES.

Hirundinum crematarum cinis cum melle illitus, angionarum inflammationes perfanat, idem oculorum claritati bene facit.

PAV. AEGIN.

TT

*Græce e
rat τὸ πικρὸν
pro τῷ
πικρῷ.

PAULI ÆGINETÆ

CHOLE, FEL.

Fel omnium aliorum animantis humorum calidissimū est, colore tamen inter se differt, siquidem quod flauum pallido calidius, & flauo, uiride, præterea uariat pro animantium quæ id habent ratione, quatenus suillum omnibus aliis infirmius est, eoque citra rosionem aurium ulceribus medetur. Ouillum maioris acrimoniæ est quàm suillum, & ouillo caprillum efficacius, caprino æqualia urforum & boum existunt, taurinum uehementius hoc fel hyænæ superat, rursus hyæna uincitur à pisce callionymus dicto, & scorpione, cuius animantis fel suffusionibus oculorum, hebetudini, & albuginibus accommodatur, item marinæ testudinis, at capræ syluestris fel etiā lusciosis conferre dicitur, cæterum omnium uolucrum fel, tum acrius, tum siccando uehementius est quàm quadrupedum: inter has ipsas autem gallorum & perdicum aliis est præstantius: accipitrum & aquilarum acrimonia & rosione quodammodo superat, uiridi colore, nonnūquam etiam nigro.

CHONDRILLA.

Chondrilla intybi species subamara gustu est, propterea etiam maiorem siccandi uim quàm illa obtinet.

CHONDROS.

Chondrus tritico persimilis est, nisi quod glutinosior.

CHRYSOCOLLA.

Chrysocolle altera in metallis reperitur, altera in ærea pylla præparatur, pistillo æreo ex pueri impubis urina sub caniculæ æstu contrita: hæc igitur abstergit, discusso-
ria, siccanteque; uel prædita maiore, quàm ea quæ in metallis inuenitur, ut etiam carnem assumat citra rosionem ob quod
ulceribus maleficis accommodata est: concremata uero minus erodet.

CHRYSOCOME.

Chrysocome, quæ etiam chrysitis dicitur, radix acris simul & astringente uel existit, quare non multi in medicina usus est, quanquam peripneumonicis & iocinorosis

*Græce
erath' π' α' ρ
& v' π' i' e' t
.i. iecur
itaque ab-
stergit.

LIBER SEPTIMVS. 330

in mulso elixa exhibeatur: cæterum menseis educit.

QVÆ A PS ORDIVNTVR.

PSEVDOBVNIVM.

5 Pseudobunium bunii speciem repræsentat, calefacit, di-
scutit & abstergit: tormina igitur circa umbilicum, stillici-
dia & laterum dolores soluit: strumas etiam cum sale &
uino illitum disiccit.

PSEVDODICTAMNON.

Pseudodictamnion imbecillis dictamni uires habet.

10 PSIMMYTHION, CERVSA.

Cervsa refrigerat & illitu opplet.

PSYLLIVM, HERBA

pulicaris.

15 Herba pulicaris semen secundi refrigerantium ordinis
habetur, siccando humectandoq; medium est.

PSORICON.

20 Psoricon, chalcitide duplicata, argenti spume mixta,
efficitur, utrisque tamen aceto prius detritis, ac in re-
centem ollam coniectis, quæ diebus quadraginta sub
fimo delitescet: sic enim maiorem siccandi vim, tes-
tuiorem & minus rodentem quam chalcitis, ac-
quiret.

QVÆ AB O MAGNO

INCIPIVNT.

25 OON OVVM.

Ovi candidum & tenue, nullius plane rofionis compos
mediocriter refrigerat, utendum igitur eo in oculis, pu-
dendorum ulceribus, aliisq; omnibus malignis: misce-
tur etiam medicamentis emplasticis, quæ sanguinem
30 supprimunt: luteum uero pari facultate perditum, medicame-
tis temperatur ad inflammationem arcendam efficacibus
rostum uero magia siccatur, minus lenit. Porro totum oo-
uum aceto incoctum si assumatur, uentris fluxiones de-
siccatur: si acerbum aliquod adiunxeris, exempli gratia,
35 gallam, aut rhum, aut balauftium, ac frixeris, multo
redditur efficacius: ambustis autem crudum impositum

TT ii

PAULI AEGINETAE

protinus auxiliatur. Sorbile assumptum, pectoris uitia concoquit lenitq; & arteriae asperitates laeuigat. Praeponetur autem recens ueteri: & gallinaceum reliquorum animantium ouis.

OCIMUM.

Ocimum secundo calefacientium ordini ascribitur: habet & humiditatem quandam excrementitiam, propter quam neque utile est intus assumptum: extrinsecus autem illitum, discutit & concoquit.

OCIMOIDES.

Ocimoides, nonnulli philetarion nuncupant, inutilis quidem radix est: semen uero tenue est & sine rosione siccatur.

DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBUS.

quarum flauae bili purgandae sunt. Cap. IIII.

*Graece ē
διαφοει
pro διαφ-
ραει. i.
corrūpit.

ALoes denarius cum aqua mulsa mane datur: quae uespertini exhibent, aut secundum cibum, noxam inferunt, quippe alimentum digerit, flauam bilem minus uacuat: trium obulorum instar assumpta, abundanter de ad deiectionem aluum sollicitat. Caeterum quum omnia purgantia medicamina stomacho aduersentur, sola aloe conducit. qui uero amaritudinem eius non sustinent, in catapotia coactam assument. Sciendum uero est, medicamenta ea non simplici quodam temperamento, uerbi gratia, caliditate purgare (omnia siquidem calida, quale piper est, uacuationem molirentur) uerum totius substantiae proprietate, quomodo lapis magnae ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium medicaminum numero ea quae uentrem duntaxat emolliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autem utimur, uel ad materiam deriuandam, uel ad affectum induratum commouendum excitandumq; aut ad corpus reficiendum, mutandumq; ipsius temperamentum aut ad noxium humorem eliciendum. Iam uero sunt nonnulli mixti ex praedictis modi, inuicem connexi.

LIBER SEPTIMVS. 337

Cæterum purgationibus hos uti conuenit, qui uiribus constant, & eas non grauatiſſimè aſſumunt, primosq; ætatis limites euaserunt, nondum uero ad extremos peruenierunt, item qui ſtomacho robuſto ſunt, & copioſam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multi adeo ſanguinis compotes. Tempus autem purgationis ſi nulla urgeat neceſſitas, uernum maxime & autumnale opportunum eſt.

QVÆ BILEM VACVENT.

- 10 Quæ bilem educunt, quouis tempore præter hyemē recte uſurpantur: ætate uero florida & ei proxima: habitu ſiccò, muſculoſo, nigri coloris, uel rubri: uiris magis quàm mulieribus: item in quibus cibi continue corrumpuntur, aluus aſtricta eſt, amara bilis redundat, iracundis,
- 15 paucam urinam reddentibus cibo uſis ſiccò & calido. In affectibus, arquato, iecoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, inſania, cephalæa, lippitudine, eryſipelate, lepra, febrī, & quibus bilis ſuperat. Datur aloe capite grauatis, lippientibus, ſiticuloſis, & qui per ſomnum
- 20 imaginibus torquentur ſine febrī, ad hæc qui horrores diſcurſum in corpore ſentiunt, ſtatus acreis edunt, inteſtiniſ roduntur, quibus ſtomachus immodice æſtuat, aut ſaſtidio ex ciborum copia euertitur: poſtremo, quibus ob recrementorum abundantiam clyſter nequit iniici:
- 25 abunde ſiquidem inanit, ſic ut totum corpus non commoueat, niſi copioſa admodum fuerit exhibita: bilem autem inteſtiniſ, aluo & ſtomacho inhærentem educat.
- Veratrum conuenit & acuto & longo morbo laborantibus, qui medicamentum bili ducendæ idoneum
- 30 requirunt quales ſunt qui inſania, altera capitis parte (heterocranici dicuntur) humorum impetu in oculis decubente, et pectoris affectibus torquentur: accommodatiſſimum eſt uiſceribus, uteri et ueſicæ uilis medicinam requiſcentibus. Laudatur etiam ad longam aſperæ arteriæ affectionem, arquatum, eruptiones quæ exanthemata dicuntur, impetigines, uel herpetas, uel eryſipelata,

TT iii

PAULI AEGINETÆ

uel lepras. Veratrū nigrū bilē flauā potissimū ē toto cor
 pore citra molestiā educit, quōb causam iis q nō grauiter
 febricitāt, magisq; febrī carentibus instar denarii exhibe
 tur, radicibus in mulsā & aqua maceratis, aut cū melle ca
 tapotiorū modo: uerum ita exhibetur, ut ieiunium præ
 cesserit. Sunt qui misceant ei pulegium uel thymbram,
 uel aliquod ex iis quæ subito dilabuntur, stomacho nō
 inimica. Scammonia consimiliter ueratro purgat, ma
 gis flauam bilem: cæterum inter omnia quæ purgatio
 nem moliantur, aduersissima stomacho est. datur igitur
 iis qui febrī carent & stomacho sunt meliori, ad magni
 tudinem quatuor obolorum cum sale aut pipere aut
 zingibere, aut quodam stomacho utili, quod protinus
 corpus permeet, aut etiam cum melle: item cum gum
 mi quoque fiunt catapotia. Colocynthis, hoc est,
 cucurbitæ syluestris medulla bilem potissimum uacuat,
 & mucosa non a sanguine tantum trahit, quemadmo
 dum ueratrū & scammonia, sed etiam a costis & ner
 uosis partibus, instar denarii in aquæ mulsā cyathis duo
 bus, quibus & ruta incocta sit, epota: læuigetetur autem
 accurate, quoniam asperitates ipsius interaneis adhæren
 tes, ulcera concitant, & nervos consortii lege afficiunt.
 Exhibetur recte, capite dolentibus, nempe quum cere
 bri membrana, uel ea quæ caluariam cingit, uitiata fue
 rit, exempli gratia, uertiginosis, heterocranicis, cephalæa
 infestatis, comitialibus, attonitis, conuulsis, ut in utramli
 bet partem deprauata sit facies, qui cynicus spasmus di
 citur, diuturno in oculos fluxu uexatis, recta ceruice spi
 rantibus, suspiriosis, uetusta tussi conflantibus, præter
 rea iis quos articulares dolores & renū aut uesicæ affe
 ctus male habent. Elaterium scammoniæ modo es
 uacuat, deligendum uero uiridi colore, leue & anno nō
 uetustius: triobolari pondere cum lactis hemina læuiga
 tum exhibetur. Tithymalus bilem elicit, non aliter q
 elaterium & scammonia dantur liquoris guttæ quatuor
 aut quinque cum polenta macerata, quæ statim deglus

LIBER SEPTIMVS.

332

tientur. Nam in ore diu retentæ, linguam exulcerant, eiusque uiciniam. Lathyrides bilem purgant instar ueratri & scammonia offerentur igitur septem octove, & usque ad quindecim: robustis sanè & qui liberaliore indigent purgatione, manducari præcipe, imbecillioribus & malo præditis stomacho, integras ipsas deglutiri.

Peplii turionum siccatorum, instar octo obolorum in mulla datum biem educit, ueratri modo, & flatus dissicit. Agaricum simileis cucurbitæ syluestri uireis habet, lentum ad functionem obeundam, non autem stomacho admodum inimicum: datur laxigatum denariis duobus cum mulla, sit autem albisimum, uehementer fragile, non adeo lignosum, neque teredinibus obnoxium. Iris illyrica simili modo purgat octo obolorum instar ex mulla assumpta. Sit autem nec uetusta, nec teredines experta. Centaurium minus bili & mucis purgandis aptum, coxendicum doloribus peculiariter conuenit: ius ipsius denarii & semisis pondere in aquæ hemina decocti ad dimidias bibitur. Tragorigani flos cum semine instar duorum denarium ex mulla datur, quibus etiam ueratrum nigrum, quanquam hoc sit stomacho gravior, minus autem purget. Chamælaæ denarii quatuor in mullæ heminis duabus, ad quartas decocti, similiter ueratro purgant. Nonnulli uero chamælaæ & absinthii dupla portione catapotia fingunt exhibentque. Aristolochiæ clematidis, hoc est, sarmentariorum fructus drachma in mulla pota, colocynthidis more purgat. Polypodii radix arida, si lauis cum mulla illinatur, aut cum ea infricetur, eundem cum colocynthidis de effectum præstat.

QVÆ BILEM ATRAM VACVENT.

Medicamentis atram bilem educentibus utemur præcipue in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum consortia exosis, aut secessu gaudentibus, item in his quidum a morbo reficiuntur, purgationem desiderant,

TT illi

PAULI AEGINETÆ

autumno feruidiore, habitu sicco et parum musculoſo,

Epithymum laudatiſſimum eſt remedium inter ea quæ atræ bili uacuandæ ſunt, dantur ipſius denarii quinque que laxigati ex lactis hemina. Epithymbrum quod thymbræ ſupernafcitur epithymo ſimiliter euacuat, ſed imbecillius eſt. Pulegium atram ducit bilem inſtar acetabuli in mulſa potum. Tragorigani heracleotici idem modus, uti pulegium uacuar, cæterum ambo deſiccant. Alypi ſemen inferius atram purgare bilem pari epithymo meſura cum ſale et aceto dictum eſt, in teſtina uero ſi fidem Dioſcoridi accommodamus, leuiter exulcerat. Eſt autem meo iudicio, quæ nunc alypias uocatur: exhiberi debet in mulſa. Parthenium ſimiliter ſiccum ſi potetur, eadem ſolet extrahere. Alyſſon cum ſale epotum non aliter quàm ſuperiora expurgat.

QVÆ PITUITÆ VACVANDÆ SINT.

Eorum quæ pituitam educunt uſus eſt in habitu frigidiore & ſenio conſectis perque hyemen, in reſolutis, attonitis, inturgeſcentibus tumore laxo quod œdema dicunt inſuper in hiſ qui multum pituitæ in uentriculo, aut peſtore, aut ſtomacho collegerunt, & in muliebri deſfluxione, congruunt etiam copioſa emungentibus, craſſa excreantibus, faſtidioſis, & coxendicum cruciatu detentis, quum muci articulis incubuerint, aut elephanticiſ: maxima autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant cui nomen eſt anafarca. Styracis albi denarii pondus cum reſina terebinthina æquali deglutitum, pituita euacuat.

Oleæ radicis cortex drachmæ inſtar cum uino aut aqua. Pyrethri oboli nouem ex aqua. Lychnidis ſeminis denarii duo. Cyclamini radicis denarius cum hydromelite. Scordii denarii duo cum melle.

Chamaepitys in pollinem detrita, exhibitaque in catapotis. Squamæ Cypriæ denarii duo cum reſina pari in catapotis ualentius purgant pituitam. Lauri foliorum uiridium denarius & ſemiſſis. Cucumeris ſyl

*Impref-
ſu ſemis.

LIBER SEPTIMVS. 333

uestris radicis corticis oboli duo. Ricini grana quagdraginta, crotones dicti, putaminibus detractis eduntur, similemque effectum præstant. Apii dimidium quod ad radicem est manducatum: nonnulli id chamærapha non appellant. Bdellii drachmæ duæ ex hydromeliste. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus idoneum.

QVÆ AQVAM EDVCANT.

10 Aquam elicientibus uti conuenit in his quos aqua subter cutem, ab utre ascites dicta, male habet, in mulieribus albo fluore infestis, item in iis quos ulcera fluida torquent. Squamæ Cypriæ denarius & semissis cum mulla potus aquam educit: aceti uero momentum suoperforbere oportet, ne per uomitum reddatur.

15 Coccum gnidium cortice detracto læue cum melle cocto potum ne fauceis adurat, aquas trahit, dantur autem grana aut uiginti, aut uiginti quinque, aut triginta: ualentioribus quadraginta. Euphorbii denarius cum melle cocto potus, pituitam emolitur, magis autem aquas.

20 Lonchitidis seminis oboli octo cum mulla aquas purgant. Cneoron similiter aquas trahit cum polenta potum. Cnici seminis denarii quinque læuigati ptisanæ incoquantur cum salis momento, sorbenturque.

25 Ammoniaci suffiminis * denarius in mulla potus aquam educit. Nonnulli uero lienosis id cum posca exhibent. Sambuci corticis radicis succus instar unciarum duarum potus cum uino aquas educit.

* Manuscriptū denarii duo

30 D.E COMPOSITIS MEDICAMENTIS purgantibus. Cap. V.

CATAPOTIA EX ALOE.

C Olocynthidis medullæ, absinthii succi, aloes, singulæ partes, scammoniae partes duæ: ex aqua granula ad erui magnitudinem finguntur, dantur 35 undecim numero.

OXYMEL IULIANI.

PAULI AEGINETAE

Rutæ, origani, singulorum quadrans, thymi comæ tri-
ens, anethi fescuncia, iridis uncia, mandragoræ radicis se-
scuncia, agarici sextans, tedarum pinguium uncia duos
decim, cocci gnidii triens, lathyridum, alypiadis, singulo-
rum quadrans, polypodii sextans, phylli, costi, spice nar-
di, singulorum uncia, rheu Pontici fescuncia, scille, sambu-
buci turionum, canopi, (qui est sambuci cortex) singulo-
rum quadrans, asari uncia, pulegii quadrans, epithymi,
ueratri, acori, singulorum sextans, sii, amomi, hyperici, cu-
mini, singulæ uncia, anisi sextans, aceti sextarii decem,
mellis sextarii quinque: herbæ per triduum in aceto ma-
descunt, deinde excoctis dum amplius dimidio cōsumo-
ptum fuerit, mel adicitur: ubi unita fuerint, admiscantur
lathyrides, costus, coccum gnidium, spica nardi læuiga-
ta, & si uoles postquam perfecte cocta fuerint, oxymel
adiungis. Modus summus est uncia, aut pro uirium ra-
tione: bene facit podagricis affectibus & comitialibus,
ac in quibus uacuare simili & crassos humores educere
opus est.

PURGATIO AD EDVCEN

dum aquas quæ constat ca-
ryophyllo.

Aloes, epithymi, caryophylli, cocci gnidii, petroselini,
rheu Pontici, singulæ semuncia, euphorbii scrupuli
quatuor, mellis quod satis est. datur cochlearis
mensura.

PURGATIO EX RHODO

melite confecta, Alexandri.
Rosarum succi sextarii duo, mellis sextarius, scammo-
niæ uncia quatuor. summus modus est quinque co-
chlearia: leuior: duo: medius tria.

ALITER. Mellis libra rosarum succi, libra, piperis
drachmæ duæ, scammonia drachmæ octo, mastiches
drachmæ quatuor zingiberis drachmæ duæ.

ALIO MODO, QVO EGO VTOR.

Spicæ nardi, asari, epithymi, singulorum semuncia: ma-

LIBER SEPTIMVS. 334

rerantur in aquæ hemina per triduum: ubi mediocriter incoxeris, misceto aquæ rosarum succi sextarium semissem, mellis tantundem. Postquam ad usque spissitudinem fuerint incocta, scammonia sescuncia admiscetur.

5 PURGATIO EX MALIS COTONEIS.

Malorum cotoneorum tostorum uncia quatuor, piperis uncia sex, scammonia drachma, mellis uncia quinque: trita exhibentur cochleario instar uncia, aut pro uiribus.

10 COMPOSITIO DIA CITRIV,

quod est, ex malo medico, stomacho macho utilis.

Mali medici corticis carnisque pondo in aquæ sextario uno & semisse ad tertias decoquitur, mellis sextarius semis misis adicitur: ubi mellis spissitudinem ex coctione acceperint, inspergitur laeuigati piperis longi uncia, scammonia tostæ in fermento tantundem.

BVCELLATVS PURGANS.

20 Scammonia tostæ uncia, piperis, apii seminis, singulorum scrupulum, foeniculi, anisi, singula uncia, mellis libra: tosta mediocriter instar uncia datur in cocto.

OLIVÆ PURGANTES.

25 Scammonia uncia, piperis tantundem, epithymi cumini torrefacti, petroselini, rutæ foliorum, menthae uiridis, singulorum drachma quatuor, laserpitii drachma, palmarum uncia quinque, mellis tantundem, aceti heminae duae, oliuarum colymbadum sextarius, scissarum uidelicet: quidam & gari momentum addunt. Modus est quoque scrupula aut septem aut nouem.

30 PASTILLVS PURGANS.

Scammonia drachma quatuor, euphorbii tantundem phylli, piperis, singulorum drachmae duae, mellis libra, datur instar uncia.

35 FVSCA PURGANS ET

stomacho grata.

Cumini, foeniculi, singulorum uncia, pulegii, apii,

PAULI ÆGINETÆ

anisi, singulorum semuncia, epithymi, scammoniae, singulorum uncia, salis unciae duae. Summus modus datur scrupulis duobus in posca, nonnulli etiam euphorbii scrupula quatuor adiciunt.

VINVM PURGANS

in hydropicis.

Scillae tres unciae, apii seminis unciae sex, piperis drachma, capparis radice drachmę quatuor, cocci gnidii cortice exuti drachma, folii malabathri galbuli duo, uini herminae duodecim, mellis sextarii tres: scilla contusa uino superfunditur, reliqua laeuigata miscentur.

HALATIA, QVASI DICAS

ex sale confecta, purgatio.

Salis communis torrefacti drachmę sex, apii seminis, zingiberis, panis sicci, singulorum scrupula sex, anisi, piperis, singulorum semuncia, scammoniae, epithymi, singulorum uncia, datur circiter cochleare.

COMPOSITIO DIA HER

modactylu, ad podagram.

Hermodactyli quadrans, anisi, cumini Æthiopici, ameos thymi summitatum, piperis albi, zingiberis, singulorum scrupula tria, epithymi semuncia: exhibentur scrupulis quatuor, quidam scrupula sex dant mane cum condito, aut mulsæ, aut aqua calida.

ALITER EADEM PURGATIO.

Hermodactyli uncia, cumini Æthiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum scrupula sex, mastiche, spicę nardi, singulorum scrupula duo, musci siliqua, cneei scrupula duo, datur quatuor scrupulis cum hydromelite. Scammoniam, quę stomacho sit inutilis, damnamus. Si autem liberaliore uacuatione opus sit, scammoniae siliquas treis mensurę admiscebis: loto exhibetur.

CATAPOTIA QVÆ CON

stant lapide armenico, arthriticis potissimum exhibenda.

Aloes unciae quatuor, scammoniae unciae sex, agaric, un

LIBER SEPTIMVS. 335

cia, epithymi tantundem, lapidis armenici scrupula duo
decim: casie uncia, spice nardi uncia, scillæ tostæ sextas,
croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta duobus
scrupulis exhibentur.

COMPOSITIO DIA CORONOP

podii, ad eadem efficax, ad quæ ex hermoda-
ctylo confecta, stomacho utilis.

Zingiberis scrupula duo, piperis scrupulū, agarici scrupula
decem, cnici partis interioris scrupula quatuor, coronopodii
rudicis scrupula sex, danæ scrupula tria qui bus alius est difficilis,
siliquæ uigintitres, quæ faciunt osum hēt
mnino Lobolos septem aut ferè octo, ubi uenter inani octo. resti-
tus est, ad lauacrum duces: inde ouis & pane enutries. tutū ex A

MEDICAMENTVM EX

cyrenaico liquore ad febrem
quartanam.

alexandro
rone id
exigente.

Lactis cyrenaici, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singulæ drachmę.
datur ad nucis auellanae magnitudinem.

(Impres-
sum non
habet.

PVLVS AD PURGANDVM, TV

midis & elephantice singulariter efficax, &
in quibus humorem crassum glutinosumq; emoliri uoles.

Cucurbitis duabus syluestribus circuncisis semen exi-
metur, interiore ipsarum carne relicta, dulci oleo ipsas
replebis, et propriis operculis obtectas pernoctare fines
insequenti die uacuato oleo cucurbitas in aqua deco-
ques dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquæ
tempera nigri ueratri triobolum adiunges, scammonia
denarium: ubi iam cum his puliculam ē similia, aut pa-
nem siccum læuigatum incoxeris, inde ægroto dabis te-
nui pridie uso uictu, pilulas ad nucis auellanae magnitu-
dinem, octo, aut decem, aut plurimum quatuordecim,
et potioni aquam calidam exhibebis.

PAULI AEGINETAE
QUOMODO EOS QUI PUR

gantur, tueri conueniat, quidq; faciendum
ubi medicamentum purgans ni-
hil profecerit. Ca. VI.

Simmatim in omni purgatione efficaci, medica-
mentum homini quem certa prius uictus ratione
alueris, ieiunio & concoctione obita trades, lac a
somno quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu
mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu ab-
stinere usque ad consummatam purgationem com-
pelles.

EX COMMENTARIIS
PHILAGRII.

At si in ediam non tulerit, aut quod uentriculi os ad bi-
lem contrahendam expeditum ex longa penuria præ-
cedente habeat, aut alia eiusmodi de causa, dabitur ipsi
panis ex uino aquoso, aut ptisanæ cremor aut chondri,
idq; nondum incepta uacuatione, (sic enim cibus cor-
rumperetur) sed protinus ubi medicamentum fuerit es-
potum, sic enim nonnunquam ad celerem medicami-
nis motionem pondere suo opitulatur. Si uero quocun-
que medicamento ad aluum emolliendam assumpto
quis non purgetur, neque uacuetur, nullo accedente pe-
riculo nihil molliendum est. At si magnitudo morbi ur-
geat, aut æger uellicetur, distendatur, & lancinationem
expertus fuerit, clyster statim necessario iniicitur. Si ne sic
quidem uenter respondeat, corpore rofionem & ueluti
euerfionem sustinente, lauare liberaliter inungendo op-
portet: ubi repletum est grauaturque, sanguinis dimissio
congruet, præsertim ubi multi compos sanguinis ho-
mo fuerit, oculos rubros habeat & emissitios, non ex
natura, sed acquisito ex medicaminis potione. Vbi ho-
rum nihil inest, sed morsus & uellicatus affligit, a bal-
neo cibum protinus offeres, uinum liberalius potui da-
bis, atque interea clysterem inferes, nisi subsistat crucia-
tus, rursusque lauabis. Esto autem oleum quod in aluum

dabis rutaceum, aut ex alio quopiam flatus experte
preparatum.

SI PURGATIO MODVM

excedat. Cap. VII.

SI purgatio maior sit impendio, cutis infricari deo
bet, & lauari calida: ante balneum uinum tenue, ru
bens & flauum dari, tale siquidem celerrime in to
tum corpus distribuitur: item panis ex eo madens, &
malum punicum. Quod si euacuatio perseueret, artus
uinculis excipientur, quæ è summo deorsum distributa,
constringant, & non nihil sanguinis & spiritus excipiant:
dabimusq; potui theriaces ex carnibus uiperarum mo
mentum, deducit enim in cutem, subitoq; reuellit humo
rum in uentriculum confluxum, obtunditq; medicinæ
purgantis quod ceu uirosus est & medicatum. huius
penuria pastillos theriacos, præterea compositionem
dia spermaton, & Philonium appellatum: imo etiam cu
curbitulis supra stomachum, & cataplasmatibus ex polen
ta & mulso uti, prodest, deinde epithematis astringenti
bus: præsertim ubi ex totius corporis frictione, & medi
caminum potu, subsidium fuerit sequutum. Aer ipsis
uitandus qui frigidus nimium aut calidus existat: ille si
quidem materiam a foris intro compellit, fluoremq; au
get: hic discutit, & uires resoluit. At si ex intestinorum
quæ medicamento irritantur, erosionem, uacuatio oriatur
delinere cōmemorata oportet, & in aluū dare quæ acri
monia retundunt, adipē anserinum scilicet, uinum dul
ce, nardū & consimilia.

DE HIERIS ANTIDOTIS. Cap. VIII.

HIERA ANTIOCHI.

CHamædryos, agarici, colocynthidis medullæ,
stoechados, singulorum denarii decem, opopa
naxis, sagapeni, petroselini, aristolochiæ sarmenta
cæ, piperis albi, singulorū denarii quinque, cinnamo
mi, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, croci foliotum,
singulorum denarii quatuor, mellis quod satis est.

PAULI ÆGINETÆ

*Oribasi-
us decem

ALITER. Colocynthis carnis denarii uiginti, scilicet
le toste, agarici, ammoniaci thymiamatis, ueratri nigri
corticis, scammoniae, hyperici, singulorum denarii *tres
epithymi, polypodii aridi, bdelli, aloes, chamaedryos,
marrubii, casiae, singulorum denarii octo, myrrhae tro-
glodytidis, opopanax, sagapeni, piperis communis &
longi et albi, petroselini, cinnamomi, croci, castorii, aris-
tolochie longae, singulorum denarii quatuor, mellis
quod sufficit.

HIERA IVSTI.

Epithymi drachmæ duodecim, marrubii, stœchados,
chamaedrios, ueratri nigri, scammoniae, agarici, piperis
longi, scyllae toste, singulorum denarii sedecim, euphor-
bii, colocynthis carnis, aloes, croci, gentianae, petrosel-
ini, guttae ammoniaci, sagapeni, singulorum drachmæ
octo, opopanax, polii, cinnamomi, myrrhae, spicae nar-
di, iunci odorati floris, pulegii, singulorum denarii qua-
tuor, aristolochie longae et rotundae, utriusque denarii duo
mellis quod satis est. datur scrupulis duobus, aut tribus,
aut quatuor cum mulla et sale.

HIERA GALENI.

Chamaedryos, piperis longi, piperis albi, stœchados, ue-
ratri nigri, scammoniae, spicae nardi, scillae tosta, (nonnul-
li etiam epithymi) singulorum drachmæ sedecim, myr-
thae, croci, ammoniaci suffiminis, euphorbii, singulorum
denarii octo: excipiuntur melle.

HIERA RVFI.

Cucurbitae syluestris, quæ sicyonia uel colocynthis dici-
tur, carnis denarii octo, chamaedryos denarii decem, sa-
gapeni denarii octo, petroselini, aristolochie rotun-
dae, piperis albi, singulorum denarii quinque, cinna-
momi denarii quatuor, uel casiae octo, spicae, cro-
ci, polii, myrrhae, singulorum denarii quatuor, mellis
quod satis est.

HIERA ARCHIGENIS.

Marrubii, agarici, chamaedryos, colocynthis carnis,
stœchados,

Roechados, singulorum drachmæ decem, opopanax, sagapeni, petroselin, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polii, croci, singulorum denarii quatuor: arda tunduntur simul & incernuntur, opopanax autem, sagapenum, & myrrha contusa, mulla per noctem unam in pila macerantur, deinde læuigantur, & siccis admiscetur: melle optimo excepta reponuntur in uitreo uase aut plumbeo. hæc ratio omnium hierarum communis est.

S Summus ipsarum modus est denarii duo: assumatur & salis denarius, mellis hemina duæ, aquæ quantum satis est. Quod si uehementiores ad purgandum uoles efficere, quibus scammonia non inest, iniicietur, & his singulis obolus.

QVÆ SEDI ET VMBILICO

illita purgent.

Cap. IX.

ILLITIO SEDIS AD FLA

tus excutiendos.

R Vta cum melle in tenuissimum pollinem redigatur, ut unus succus fiat, & penitissime intra sedem delinitur. Efficacissimum uero est, si cumini momentum & nitri assumat, uel cyclamini succum: stuppa exceptum imponitur, aut glandis forma melle apposito, flatus siquidem multi erumpunt, uentrem leuantes.

PERVNCTIO SEDIS VENTREM

mouens, chezanance.

Alumen cum melle læuigatum coquitur quoad rubeascat, atque hoc sedes perungitur, facile enim copiosa citra laborem subducit.

MEDICAMENTVM QVOD VMBILICO

illinitur, epomphalium dictum, ad

aluum subducendam.

Cyclamini denarii quatuor, nitri denarii tres, ueratri nigri & albi, singulorum denarii duo, colocynthidis denarii tres, scammonia denarii duo, elaterii succi denarii

PAV. ÆFIN.

VV

PAULI AEGINETAE

quatuor, cocci gnidii totidem, caricarum pinguium uncia
ciae duae, fellis taurini uncia.

ALIUD LAUDATISSIMUM

Elaterii, lathyridis, galbani, cyclamini, ueratri nigri, singu
lorum denarii quatuor, colocynthidis carnis denarii octo
cucumeris syluatici recentis, scammoniae, cocci gnidii, ti
thymali singulorum denarii duo, terebinthinae denarii
tres: excipito hac felle taurino, & unguinis modo uti
tor. Quidam uero adiungentes faui uncias septem, &
ficyonii quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

QVAE MEDICAMENTA

uomitum citent, & quomodo hel
leborum exhibeatur. Cap. X.

Vomitum utuntur & sani, qui ciborum humorum
copia grauantur: & acuto morbo laborantes,
quum a pituita aut eiusmodi quodam infestan
tur. At medicamentis uomitum facientibus neque sani
neque acuta aegritudine occupati, uti permittentur: sed
in longis profunt affectibus & praesertim induratis, quae
ualidam commotionem desiderent, qualis est podagra
morbus comitialis a stomacho originem trahens, ele
phantia, aqua subter cutem, melancholia & per similes.
Aduersatur uomitibus sanguinem excreantibus, malo pro
ditis stomacho & iis qui suffocationibus opportuni
sunt. Promptissimum igitur ad uomitum ciendum est
Cyprinum, digitis aut pinnis in id intinctis, demissisq;
in guttur. Item nardi gallicae radicum denarii septem ex
mulla poti, sursum ualenter purgant: similiter etiam ra
dicum betonicae, quae cestron dicitur, quinque aut sex
denarii cum mulla sumpti: & daphnoidis tria folia uiris
dia in leuorem coacta comestaq;. Item elaterii obolus
in aqua assumptus, sursum pituitam & bilem expurgat:
& herbae pediculariae grana quindecim cum mulla cras
sior: ex bulbis autem qui manducari solent si crudi as
sumantur. Narcissi radix elixa, sursum per uomitum
purgat, idem facit apii radice, pars superior, aeri propia

or, uocant eam nonnulli chamæraphanon. Inferior autem pars per inferna purgat, tota uero sumpta, utrinque radiculæ prædictis minus quidem purgant, sed utilius: cæterum conuenit ipsas acreis & recenteis adhuc minimè concisas, ante duas tresue horas in oxymelite maceratas, quam fieri potest multas, assumere, ter quaterue a cœna uomitu excitato, semel autem ieiuni uoment, & sæpe oxymel absorbeant: ubi duabus horis in ambula uerint, egelidam bibentes aquam, digitis aut pinnis in os demissis uoment.

[Repositū ex Dioscoride.

QVIBVS MODIS VERA

trum exhibeatur.

- Veratrum dari debet, ubi longi ualentesque morbi sunt & spes ex aliis præfidiis adempta est, quod ægritudo omnibus ipsis fortior extiterit. Conueniet autem siue continue infestauerit morbus, ut aqua inter cutem, elephantia, malus corporis habitus, resolutio, & id genus alia: siue statis temporibus repetat, ut morbus comitialis, podagra. Porro quum plures hellebori exhibendi modi existant, simplicior quidem, & præparatio potius ad id assumendum, talis est. Raphano arundine compuncto dissectoque, ueratri albi optimi radicum præsemina inseruntur: ac ubi una nocte in eo petri manserint, proiciuntur: raphanus minutim concisus, cum oxymelite in dictum modum ægro exhibetur, nimirum uomitionibus assueto, atque his horis quot diximus interpositis, ad uomitum cogendus est. At proprius ueratri exhibendi modus hic fuerit. Veratri optimi sextans in aquæ hemina diebus quinque maceratus, ad aquæ tertias incoquitur: ubi expressum ueratrum est, aquæ miscetur tantundem mellis. excoctum usque ad spissitudinem prædicto modo, laboranti exhibetur, præterquam uomere prius assueto, etiam ieiuno, probeque defuncto concoctione, & cui alius responderit, uel sua sponte, uel clystere semel bisue iuxta uirium rationem sollicitata.

VV ii

PAULI AEGINETAE

Omnium uero efficacissimus modus talis est. Dissecis
 ueratri radicibus in sesami magnitudinem (nam in tenu-
 issimum redactę pollinem uirium efficacia strangulatio-
 nes pariunt) ueratri plurimum denarios duos, modice
 5 unum, imbecillioribus ptisanę cremori aut alicę, aut id
 genus alicuius incoctum, potui dabis: ualentioribus ex
 aqua calida aut mulsa. Incipit autem purgatio post tres
 quatuorue horas: quibus tardior est, iis melius purgan-
 tur. Quod si uomitus lente oboriatur mulsa potui data
 uomere æger cogendus est, pinnis oleo madidis in os
 10 demissis, si ne sic quidem proficiatur, in balneum dedu-
 ci debet. Vbi iam uomere inceperit, si uacuatio *modi-
 ce respondeat, nullum ægro negotium facessere oportet:
 si autem uellicatum aut conuulsionem experiatur,
 hydrelæum potui dabitur, simul & in aluum ab inferio-
 15 re parte indetur: quod alioquin in his qui helleborum
 assumunt, nonnunquam accidit unde medicamenti coa-
 ceruationem facilius ferunt. Si anima deficiat, naribus
 quę odorem mouent admotis & consimilibus uireis
 20 recolligere, aliis que ut uerisimile est superuenientibus casi-
 bus, eadem accommodare oportet. At multa facta inas-
 nitione, cibus dari somnusq; permitti debet, & alia sicut
 in his qui nimium purgantur diximus, facienda sūt.
 Si perseueret uacuatio, cucurbitulas stomacho defigere
 & artus uinculis excipere conuenit: si autem rationabi-
 25 liter facta sit, mulsę iusta portio propinabitur, qua super-
 fluitates è medicamento reliquę eluantur: mox cibus
 boni succi offeretur. Iam uero in iis qui medicamenta
 per os abominantur, omnino autem hellebore potione
 requirunt, Antyllus huiusmodi quodam usus est clyster
 30 re: hellebori albi drachmę duę in aquę sextario per
 diem & noctem unam macerantur, sequenti die ueras-
 trum in aqua ad dimidias coquitur, inde in aluum datur
 ut uomitum concitet, superius purgat paulo imbecilli-
 35 us quàm ueratri potio. Vbi abunde purgatum est, glā-
 de acri imposita, aluus irritatur, ut quod iniectum est red-

*Impres-
 sum hēt
 κατὰ λαο
 30 v. i. secū
 dum rō
 nem ma-
 nuscriptū
 aut κατ' ο
 λ' τ' ον.

datur, & æger non amplius uomat. Facta excretionē,
 multa semel bisve intestinis abluendis inicitur. ipse uero
 Antyllus tradit fieri etiam glandem ex helleboro albo
 tuso cribratoq; deinde cocto melle excepto, ac cly-
 steris modo ex helleboro preparati, superiorem uentri-
 culum purgare. Verum hic est modus probatior, in quo
 uidelicet purgationem dispensare nobis licet: pondus
 igitur sit ueratri drachmę duę, cæterum glans circumas-
 ptetur aut uinciatur stuppa solidiore, cuius initium exo-
 10 trinsecus per sedem recipiatur, quò glandem ubi satis
 purgando profecerit, auferre possumus. hic modus pur-
 gat quidem absolutissime, non autem suffocationē aut
 aliud quoddam periculum inducit.

DE DIFFERENTIA

antidotorum. Cap. XI.

15 **P** Ræfatio Galeni de antidotis in hunc modum
 habet. Medicinas quę non extrinsecus impositæ,
 sed intra corpus assumptæ affectibus medentur,
 antidota ueteres nuncupant: cæterum triplex ipsorum
 20 est differentia, quædam enim lethalium medicamento-
 rum gratia offeruntur, quædam ob bestias uirus iaculen-
 teis, quas Græci *ἰαβόλας* appellant, quædam uero
 morbis ex prauo uictu contractis auxiliantur: nonnulla
 25 treis hos usus promittunt, quemadmodum etiam quæ
 theriaca dicitur.

HEDYCHORI QVOD THERIACA

cen ingreditur, confectio.

Aspalathi radicis, calami aromatici, costi, asari,
 xylobalami, phu, amaraci, mastiches, singulorum dena-
 30 rii sex, carpobalsami denarii duo, mari denarii sedecim,
 iunci odorati floris denarii duo, cinnamomi denarii uiginti-
 quatuor, amomi, casfig, rhu, singulorum denarii octo,
 nardi indicæ, phylli, singulorum denarii duodecim,
 myrrhæ denarii uiginti quatuor, croci denarii duode-
 35 cim: uino primi meriti excepta, in pastillos coguntur,
 manu in opobalsamum intincta.

PAVLI AEGINETAE

QVOMODO PASTILLI SCILLA

lini prae parentur.

*Graece
erat $\sigma\sigma\alpha\pi$
i. adipe.
male ni
miz pro
 $\sigma\sigma\alpha\pi$, Ga
lenus no
biscum
sentit.

Scilla luto aut *crusta ex panificio & opere pistorio ob
lita, modice torretur, inde carnis ipsius partes duae, cum
erui farinae una capiuntur, simulq; laeuigantur & fingun
tur pastilli.

QVOMODO PASTILLI

theriaci fiant.

Sumuntur uiperæ quatuor aut quinæ, fului coloris & re
cens captae, & quaternis digitis a capite & cauda ampu
tatis, totaq; cute detracta & interaneis exemptis, reli
quum corpus in fictili nouo cum anetho & sale modis
co discoquitur, dum spinæ a carnibus segregentur: de
inde his exceptis ablatisq; accurate a spinis carnibus, &
panis puri æquali modo addito, laeuigantur omnia pari
ter, formanturq; orbiculi, manu in opobalsamum intin
cta: in umbra refrigerantur.

QVOMODO PARETVR

theriace antidotum.

Pastillorum scillinorum denarii quadraginta octo pas
stillorum theriacorum hedychroimagmatis, cinnamo
mi, piperis communis, lachrymæ papaueris, costi, singu
lorum denarii uiginti quatuor, rosarum siccarum dena
rii quindecim, palustris trixaginis, napi buniados semi
nis, iridis illyricæ, agarici, dulcis radiculae, opobalsami,
singulorum denarii duodecim, myrrhae, croci, zingibe
ris, rheupontici, quinquefolii radicis, nepitæ, iunci odo
rati floris, marrubii, petroselini, stœchados costi, piperis
albi & longi, dictamni floris, thuris masculi, terebinthi
nae, mastiches, casia nigrae, spicae nardi, spolii floris styra
cis, apii seminis, seselis thlaspis, ameos, chamaedryos,
chamaepityos, hypocistidis succi, malabathri, nardi galli
cæ, nardi, meu, gentianæ, anisi, foeniculi seminis, lemnia
terrae, chalcitidis tostæ, amomi, acori, balsami, phu, opil,
hyperici, acaciæ, gunimi, cardamomi, singulorum dena
rii quatuor, dauci seminis, galbani, sagapeni, bituminis,

- opopanax, castorii, centaurii Ltenuis, aristolochiae sar
 mentaciae, singulorum denarii duo, mellis attici pondo
 decem uini falerni sextarii duo: coniectis in pilam opio
 hypocistide, myrrha, sagapeno, Ldulci radícula J styrace
 5 acacia, & opopanace, mellis momentum instillatur, con
 tusaque dissoluuntur, deinde uino superfuso ut illa supe
 ret per triduum madescunt: inde reliqua contusa in uni
 tatem coguntur: mel despumari debet: ceterum in argē
 teo aut uitreo uase non adeo pleno medicamentum re
 10 ponitur, frequenter operculum auferitur. Vsus eius est
 quum urget necessitas in iis qui a feris commorsi sunt,
 & uenena assumpserunt, post annum ætatis septimum, sic
 ut instar nucis auellanae, cum tribus uini cyathis, quoti
 die bis bibatur. Similiter facit ad eos qui ex quadam la
 15 tente causa periclitati sunt, corruptela quæ corpus con
 ficit, lethalis medicamenti qualitatem imitata, quemad
 modum in pestilentia correptis potissimum fit, semel
 quotidie, in aliis uero affectibus a decem annis usque
 ad uiginti usus eius celebratur, in tussi, thoracis dolori
 20 bus aut laterum: si febris abest, cum mulso: si illa urat,
 cum hydromelite, sub noctem ad fabæ Ægyptiæ ma
 gnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus
 oibus, si morbus recēs est, ex posca: si uetustior, ex sym
 phyti decocto, q̄tum faba Ægyptia explet, idq; mane &
 25 uel peri. At quos inflationes & tormina iuxta umbilicū,
 aut morbus coeliacus male habet, ex aqua calida ad fa
 bæ Ægyptiæ magnitudinem mane assument. cæterum
 appetentiam uehementem excitat, rigores, perfrictionē
 & bilis uomitum, præsumptum ante accessiones discu
 30 tit, menstrua ducit, & foetus mortuos eiicit, fabæ Ægyp
 tiæ instar potum ex mulsa, aut passo in quo ruta aut dis
 etamnum decoctū sit. Item ad uocem abscissam ualet
 & per se & cū duplicato tragacantho ex mulso aut pas
 so potū, atq; sub lingua retentū eliquatumq; lienosis, io
 35 cinorosisq; ex posca, si scirrus adest, ex oxymelite, aut
 aceti scillini sesquicyatho: in nephriticis, cum oxymelite

[Additū
ex Gale.][Reposi
tū ex Gal.]

PAULI AEGINETÆ

circa fabæ Ægyptiæ magnitudinem: dysentericis tantū
dem cum decocto rhu, mane & uespert. Ad lippitudi-
nes autem summe etiam in hunc modum temperatum
facit: antidoti & opobalsimi uncia duæ, mellis cyathus:
mixta paulatim unguntur. Idem denteis abstergit, pleri-
que uero ut sanitatem ab iniuriis uindicerent, noua luna
ad græcanicæ fabæ magnitudinem ex eo sumunt, con-
coctione bene obita, cum uino mellis cochleari, & duo-
bus aque cyathis. Similiter etiam in peregrinationibus
eo utuntur, quum prauis cuiusdam aeris aut aquarum in-
itinere suspicionem habent.

SALES THERIACI.

Hæc ui-
dentur a
scriba quo-
dā addita
q salium
theriaco-
rū descri-
ptionē in
curia omi-
sit, eoq; in
calcē li-
bri reiece-
rit.
* Galenus
libra una.

Salis theriaci ante Mithridatium antidotum huc trans-
ferendi sunt, habes autem eorum descriptionem ad cal-
cē libri septimi post caput de mensuris & ponderibus. I
Sumuntur uiperæ recens capte numero quatuor, mox
salis ammoniaci aut communis modius Italicus, dein
de cum ipso in pilam coniecto tunditur minutatim
gentianæ sesquilibra, aristolochiæ rotundæ sesquilibra,
centaurii tenuis comæ libræ duæ, cardamomi, mar-
rubii, singulorum uncia sex, trixaginis palustris, apii, cha-
mæ dryos cretica, singulorum libra, rutæ satiuæ semis
nis * sextarii duo: melle attico in unitatem coguntur, &
dimidia ipsorum pars in nouum fictile conicitur, dein
de quatuor uiperæ uiuæ, quibus adduntur etiam scillæ
teneræ recentes quinque minutim concisæ, hinc reliqua
misturæ portio dimidia superinicitur: ac ubi olla coo-
perta diligenter fuerit, tribus quatuorve foraminibus
corpus ipsius pertundes, ut per ea uapor coctionis mo-
dum significet. Primum enim uidebitur fumus exire co-
piosus obscurus admodumq; turbidus, qui ignem be-
stias iam inuasisse nuntiet, quando te animum diligenter
aduertere conuenit, ne tandem fumi huius aerem è ui-
perarum exhalatu uitiatum inpires. Postea, ubi uapor
cessauerit, & tenuem quandam flammam perforamina
eiaculatam conspexeris, tunc ipsa tosta esse quamoptis

me censeto, atque ita fictili ab igne sublato, tota die non
 etuq; refrigerantur. Deinde apertos exemptosque caro
 bones diligenter tundito, & cum hisce misturis cribra
 ro: Rutæ syluestris seminis, hyssopi cretici, singulorum
 15 unciis nouem, fœniculi seminis nardi gallicæ, stachyos
 Scythici, singulorum unciis *sex, petroselini macedoni
 ci, malabathri foliorum, singulorum tuncia, amom, iu
 uæ, ormini seminis torrefacti, singulorum unciis tribus,
 origani summitatum, thymi summitatum, singulorum
 20 unciis *duabus, baccarum iuniperi, piperis albi, fœnicu
 li, singulorum libris t octo, laserpitii radices unciis decē
 coriandri seminis, zingiberis non perforati, Lsatyrii se
 minis uel radices, pulegii, seselis massaliotici, menthæ, sin
 gulorum unciis sex, cassiæ fistulæ unciis duabus, cinna
 25 momi uncia. Porro ego sales ipsos præparaui, non cō
 bustis bestiis, sed ipsarum pastillis, quemadmodum in
 theriaca, sic ut hos iis quæ cum bestiis cremantur admis
 scerem, quo si quam in se amarulentiam haberent, eam
 per adustionem deponerent: tantumq; pastillorum mo
 dum inieci, quantum uiperarum quaternionem habere
 coniciebam, atque hac ratione longe præstantissimi
 euaserunt.

ANTIDOTVM MITHRIDA

tis, dia scincu.

- 25 Myrrhæ troglodyticæ, zingiberis, cinnamomi, singulo
 rum denarii decem, spicæ nardi, thuris, thalaspis, opo
 balsami, iunci odorati floris, costi, stœchados, seselis, gal
 bani, resinæ terebinthinæ, piperis longi, castorii, hypoci
 stidis succi, styracis, malabathri foliorum, singulorum de
 30 narii quatuor, cassiæ nigræ, polii, piperis albi, trixaginis
 palustris, dauci seminis, carpobalsami, cyphios, bdellii,
 nardi gallicæ, gummi petroselini, opii, cardamomi, fœ
 niculi seminis, gentianæ, foliorum rosæ, singulorum de
 narii octo, dictamni, anisi, acori, phu, singulorum denarii
 35 tres, meu athamantici, acaciæ, alui scynci, hyperici semis
 nis, singulorum drachma & semisis, uini & mellis q̄

*Græce
 redundat
 y ante s.
 †Galenus
 uncia quæ
 tuor.
 *Galenus
 nouem.
 †Galenus
 duabus.
 [Reposi
 tum ex
 Galeno.

PAULI AEGINETÆ

latis est. Præparatur theriacæ modo. Galenus tradit ad eadem hoc ualere, ad quæ illa, præterquam ad uiperæ morsus, in eos enim theriace efficacior est.

ANTIDOTVM DIA HÆMA

ton, hoc est ex sanguinibus, ad o

mnia uenenata, & lethalia

medicamenta.

Piperis albi & longi, costi, acori, phu, anisi: dictamni cretici, singulorum denarii duo, amomi, opobalsami, rutæ syluestris seminis, foeniculi seminis, cumini æthiopici, anethi, anatis masculi sanguinis sicci, hœdi sanguinis, anserini sanguinis, anatis foeminæ sanguinis, napi syluestris seminis, singulorum denarii tres, gentianæ radice, trifolii, iunci odorati floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum, singulorum denarii quatuor, cinnamomi denarii duo, trixaginis palustris denarii octo, petroselini, polii, myrrhæ, nardi, singulorum denarii sex, cassie denarii tres: lactis cyrenaici totidem, stœchados denarii quinque: asari denarii duo, guttæ ammoniaci denarii tres, meu, athamantini denarii duo: agarici tantundem: carpobalsami grana uiginti, mellis cocti quod satis est.

*Galenus
sex.

OXYMEL SIMPLEX.

Aceti gacerimi albi sextarius, aquæ sextarii duo, mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem incoquantur, sic ut mel interea despumetur.

ACETVM SCILLITES.

Scille albi coloris in taleolas concise libre sex quadraginta diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgate fuerint, in aceti generosi sextarii duodecim, diebus sexaginta in sole madescere sinuntur, uase bene operculato. post eum numerum dierum scilla ex aceto expressa proicitur, ipsum uero acetum defæcatum transfunditur. Nonnulli uero scillæ libram in aceti sextarios sex coniiciunt, alii uiridem scillam in acetum parius triusque modo demittunt, sinuntque usque ad menseis.

*Dioscorides
sepe, uicinæ
sunt literæ
æ & ð.
†Dioscorides
agnosce.

LIBER SEPTIMVS. 342

scilicet, atque hoc modo maiorem incidendi ulm acquiri.

Valeat autem acetum scillatum collutum ad fluida oris vitia & plerisque interaneorum affectibus potum medetur, quibus exulceratio coniuncta non est. Item aliis compluribus efficax est.

OXYMEL SCILLINVM.

Scille partis internæ tenerioris pondo dua, aceti acris albi sextarii quindecim, piperis, petroselini macedonici, singulorum uncia due, dauci cretici, ameos, anisi, nardi gallice, ligustici, asari, cardamomi: spice nardi: amomi, rheu ponuci: singulorum uncia semisis, fœniculi seminis, cumini, laseris: zingiberis: pyrethri: hyssopi cretici: costi pulegii, singulorum uncia, menthe uiridis fasciculus, rutæ uiridis turiones quinque: mellis attici sextarius, sapa sextarii duo: apii uiridis fasciculus: interior scille pars alba contusa in acetum mittitur, siniturq; diebus septem sub canicule æstu madescere, deinde scilla sublata, arida quidem iam contusa: uiridia, non contusa in acetum cōiiciuntur. Rursus post dies septem omnibus exemptis, mel & sapa aceto adiciuntur: excocta q; usque ad spissitudinem in uitreum uas defunduntur. Cæterum præsidio hoc & leiuus instar potionis utere, & post cibum liquaminis modo, est enim longe utilissimum.

MEDICAMENTVM GALEO

ni è scilla: comitialibus potissimum efficax.

Scilla minutim manibus contusa in uas melleum demittitur, eoque diligenter operculato in loco ad meridiem spectante sub æstu canicule reponitur, quoadraginta diebus post canicule fidus in superficie uas se soluto scille corpus effluxisse deprehendes, excoptus igitur ipsius succus, melle optimo edulcoratur, daturque comitialibus quotidie cochleare, pueris exiguum, prouectis magnum. Ipsumque scillæ corpus tritum cum melle datur cochleari, atque hoc uirtute secundum est.

PAULI AEGINETAE

PHILONIS ANTIDOTVM.

† Oribasius
us uiginti
quinque,
† Oribasius
us uiginti

Piperis albi drachmæ & uiginti, alterci denarii & octo, lachrymæ papaueris denarii decem, croci denarii quinque, pirethri, euphorbii, spicæ nardi, singuli denarii, mellis Atici uel alterius generosi non cocti quantum sufficit, datur prouectioribus ad nucis auellanae magnitudinem: minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum est quod dolorem sopit & somnum accersit.

ATHANASIA DOLOREM

leniens, pleuriticis accommodata, auctore Oribasio.

Cassiae drachmæ octo, spicæ nardi, amomi, croci, opii, styracis, myrrhae, costi, singulorum drachmæ quatuor, mellis despumati quod satis est, datur quemadmodum Philonium.

MEDICAMENTVM EX DV

plici pipere eiusdem effectus.

Cardamomi, castorii, opii, singulorum denarii tres, myrrhae, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorum denarii tres, croci totidem: excipiuntur discocto, & ad fabæ magnitudinem exhibentur.

MEDICAMENTVM DIA

codion, id est ex papaueris capitibus & sapa.

Capita papaueris uiridia minime aquosa octo, decem uel, die postquam decerpta sunt, incoquantur cum dulcis radiculae uncia, madefacta in sapa sextario rursus incoquantur dum tabescant, ubi mediocris spissitudo facta est, ab igne sublata defenduntur: usus medicinalis est in febribus ubi sopire opus est, & quum tenuis defluxio à capite in thoracem deferatur.

MEDICAMENTVM EX CA

pitibus papaueris & melle.

Capita papauerum, ut dictum est, & dulcis radiculae uncia, in aqua pluuialis aut puteanae sextario donec intabescant excoquantur, ubi expressa fuerint, semisextarius

LIBER SEPTIMVS. 343

mellis decocto iniicitur: excocta usque ad spissitudinē dantur: in quibus præter quod dolorem lenire & somnum conciliare oportet, etiam purgatione opus est, & abstersione eorum quæ in pectore aut pulmonibus rebusq; inhærescunt.

DIA CODION, COMPOSITVM.

Aquæ, in qua papauerum capita decocta sunt ad prædictam commodatorem, sextarius, uini dulcis heminae duæ, mellis pondo, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmæ quatuor: concoquuntur usque ad spissitudinem, uerum stomacho utilius est medicamentum ex melle, capitum papaueris decocto, & malis cotoneis præparatum: efficacius si præter capitata, fertula campana & dulcis radícula aque incocta fuerint.

ECLEGMA EX MARRV

BIO, simplex, tabidis maxime accommodatum.

Marrubii comæ pondo in aque hemiuis sex decoquitur ad tertias, inde herba prolicitur, adicitur autem aqua mel, incoquunturq; usque ad mellis spissitudinē. instar cochlearis exhibetur.

EX MARRVBIO, COMPOSITVM.

Marrubii come, iridis illyrice, hyssopi, pulegii, dulcis radicule, apii, singulorum sextans, caricarum pinguium quadrans, nuclei pini resinati tantundem: minutim confusa arida cum caricis in aque sextarios tres demerguntur, coquunturque usque ad tertias illis exemptis, aquæ mellis libre due induntur, & ad crassitudinem melleam incoquuntur.

MEDICAMENTVM EX ERVIS.

Amygdalarum amararum sextans, farine erui triens, hyssopi tantundem, iridis semuncia nucleorum pini torrefactorum uncie due, mellis sextarius, uel quod satis est.

PAULI ÆGINE TÆ

MEDICAMENTVM

dodecatheon.

Iridis illyrice triens, erui triēs, hyssopi, urticae seminis, dulcis radicle, scoenugraci, singulorum sextans, bulborum seminis lini torrefacti, singulorum triens, melanthii scrupula octodecim, pulegii scrupula sex, nucleorum pini torridorum sextans, piperis scrupula sex, mellis quantum sufficit.

ANTIDOTVM SOTERA.

Spicae nardi scrupula triginta nouem, myrrhae scrupula uiginti septem, croci scrupula triginta septem, castorii scrupula triginta nouem, opii scrupula triginta sex, petroselinii scrupula quadraginta quinque, anisi scrupula nouem, apii scrupula septem, iunci odorati floris scrupula triginta sex, casiae scrupula duodecim, piperis longi totidem, sinonis seminis scrupula sex, styracis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, seselis totidem, hedychoi, costi, asari, singulorum scrupula octodecim, mellis quod satis est.

EX STYRACE BECHICON

hoc est, tusi efficax.

Amomi, casiae, singulorum sextans, styracis, spicae nardi, singulorum sescuncia, croci, piperis albi, singulorum uncia, mellis sextarius: exhibetur cochlearium.

MEDICAMENTVM PHILOXE

ni, purulentis & longa defluxione

infestatis idoneum.

Resinae terebinthinae denarii uiginti octo, nardi denarii sedecim, myrrhae stillatitiae denarii sex, cardamomi, bulborum, tantundem, croci denarii duodecim, galbani, denarii sedecim, amygdala amara octoginta mellis hemina: ex aqua potatur, quantum faba Aegypti explet.

ESDRA, MULTIPPLICIS VSVS

uehementer enim desiccatur.

Amomi scrupula sex, croci scrupula octodecim, dauci
 seminis scrupulum unum & dimidium, foeniculi seminis
 scrupula tria, casiae sesquiscrupulum, iunci odorati
 floris scrupula quatuor & dimidium, cinnamomi scrupula
 tria, hypocystidis succi scrupula quatuor & dimidium,
 sulfuris unciae quinque, papaueris seminis scrupula
 quinque, pyrethri scrupula tria, petroselini sesquiscrupu-
 lum, iridis illyrice scrupula septem & dimidium, alter-
 ci seminis scrupula tredecim & dimidium, spicae nardi
 scrupula septem & dimidium, ruta seminis sesquiscrupu-
 lum, anethi scrupula tria, cardamomi uncie tres, rosa-
 rum siccarum scrupula quatuor & dimidium, nerii flo-
 ris sesquiscrupulum, est autem ueluti fibra ex qua oritur
 rosa, rhododaphnes & rosae ipsius singulorum scrupu-
 la tria, rheu scrupula sex, gentianae scrupula sex, hedy-
 chroi sesquiscrupulum, tragacanthae scrupula quindecim,
 licii scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex,
 ocimi seminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi
 myrrhae singulorum scrupula sex, bdellii scrupula sex-
 decim, artemisiae succi scrupula tredecim: rhus
 riacei scrupula uiginti quinque & dimidium: asari, uo-
 teri mergi, lapidis iaspidis: singulorum scrupula tria
 piperis scrupula quindecim, castorii sesquiscrupulum:
 cimoliae scrupula sex, fisonis scrupula nouem: styracis
 totidem, opobalsami scrupula duodecim: seselis her-
 ba: sesquiscrupulum: mellis unciae uigintiocto, uini quatuor
 tum satis est.

MEDICAMENTVM EX

malorum cotoneorum

carnibus.

Malorum cotoneorum purorum librae tres: coquuntur
 in uini peruetusti sextariis tribus: deinde conteruntur:
 quibus piperis: anisi ligustici singulorum contritorum
 uncia admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis semunciam
 indunt, quidam in uicem uini: acetum sunt.

PAVLI ÆGINETÆ
MEDICAMENTVM EX SVCA

cis malorum, ad appetentiam abolis-
tam & ægram concoctio-
nem probatum.

Malorum cotoneorum maturorum succi sextarii duo:
mellis laudati tantundem, aceti sextarius, zingiberis un-
ciæ tres, piperis albi uncie due: incoquantur ad spissitu-
dinem. hoc Galenus ad eos qui perfrixerunt præparat:
in quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibe-
re conficitur.

QVOMODO PARETVR
melaplacontium.

Malorum cotoneorum purorum libre sex in uinc co-
quantur quousque intabescant, inde exemptæ conterun-
tur, nonnulli mellis libras octo adiiciunt, coquantque
igne lento, ferula agitantes. ubi tam spissum totum eua-
serit: ut manus non inquiner, etiã tunc addunt contusi pi-
peris uncias tres, anisi tantundẽ, petroselini uncia. Sunt
qui zingiberis uncia & mastiches tantundẽ misceant: *
deinde mixta instar semuncie formant, & cù lauri fo-
liis componunt.

* Exempla
ria uiden-
tur hic de
prauata.

CYDONATVM CONTVSVM
fragmentis saluis.

Malorum cotoneorum purorum frustulati cõcisorũ
pondo octo, in uini sextariis totidem incoquantur tem-
perate: ut non dissoluantur deinde mellis despumati
pondo octo, piperis uncia octo, petroselini, anisi, singu-
li quadrantes, zingiberis quincunx, spicæ nardi sescun-
cia, caryophylli uncia, ipsis admiscetur: omnia contusa
ac modice incocta usque ad iusculi spissitudinem au-
feruntur, quibus refrigeratis fragmenta simul cum iure
componuntur.

MEDIGAMENTVM DIA TRI-
on pipereon, ex triplici pipere.

Piperis communis, albi, & longi, singulorum denarii se-
ptem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorum
denarii

LIBER SEPTIMVS.

345

denarii duo, mellis quod satis est.

ALIVD ORIBASII.

Piperis albi uncia duæ, piperis nigri, & longi, spicæ nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, seselis, dauci, petroselini, singulæ uncia, zingiberis denarii quatuor, mellis libræ tres.

ALIVD.

Piperis communis quadrans, albi uncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi aut cassiæ duplicata, zingiberis, singulorum uncia, mellis uncia una & uiginti, uel quod satis est. ego etiam thymi comæ unciam miscui.

DIOSPOLITES.

Cumini aceto madefacti torrefactique uncia, piperis, zingiberis, singulorum uncia duæ, rutæ uiridis sesuncia, natri drachmæ duæ & semis: melle excipitur.

MEDICAMENTVM DIACI

triu, hoc est ex malo medico, tarde concoquentibus efficax.

Aceti hemina tres, mali medici carnis pondo libra, hyssopi, rutæ, singulorum fasciculus: per noctem in aceto madefacta ad tertias decoquuntur, expressaque proiciuntur: aceto miscetur mellis sextarius, rursusque decoquuntur ad mellis spissitudinem: ubi incrassata fuerint, insperguntur asari, meu, piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, & dormituro.

PICRA, HOC EST AMA

ra, compositio Galeni.

Aloes drachmæ centum, xylobalsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinnamomi, singulorum drachmæ sex. Quidam addunt etiam lunci quadrati flosris & cassiæ, utriusque denarios sex. exhibetur drachma ex oxymelite.

PICRA EX OXYMELITE,

ad stomachicos, uterum & aquam inter curem.

PAV. ÆGIN.

XX

PAULI ÆGINETÆ

Aloes uncia quatuor, phylli uncia duæ, costi castiæ, amomi, iridis, singulorum denarius, fœniculi radice corticis libra, mastiches, nardi gallice, zingiberis, singulorum denarius, piperis denarius, meu denarius, aceti, mellis, utriusque sesquiseptarius: fœniculum in aceto prius excoctum proiicitur, deinde mel additur. Vbi usque ad melleam spissitudinem incoxeris, reliqua detrita insperges.

MEDICAMENTVM EX LVO

pino iecore præstantissimum.

Gentianæ, chamepityos, petroselini, marrubii, succi, arci, sinapis, scolopendrii, panacis radice: rubricæ erythro dane: brasice seminis: aristolochiæ longe: piperis albi: spice nardi, costi, erucæ seminis: eringii radice, polii, echii eupatorii, baccarum iuniperi, lupini iecoris, helenii, pares modi: melle non cocto excipiuntur, mulsoque coctionem non experto, ad nucis auellanae magnitudinem dantur.

*Græce
est χ' α' ρ'
xix. i. suc-
ci, arci
forte lege
dū χ' α' ρ'
α' ρ' x' i' g. i.
fellis urfi
ni. sic. n.

THEODORETVS DIA

ANACARDION.

Anacardiorum fescuncia: croci, castiæ, phylli, spice nardi, caryophylli, meu, agarici: iunci quadrati floris, rheu, epithymi, singulorum denarii quatuor, acori, piperis, singulorum fescuncia, aloes unciæ tres, saxifrage, mastiches iridis illyrice, singulorum fescuncia, myrobalanorum uncia, mellis libre sex, uel quantum sufficit.

Galenus
hēt in si-
mili com-
positione

THEODORETVS ALTERA

dia anacardion.

Aloes drachmæ sexaginta: agarici drachmæ uiginti quatuor, croci, castiæ, rheu pontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorum drachmæ decem, costi, rutæ seminis, piperis albi singulorum drachmæ octo spice nardi drachmæ tres, xylobalsami, asari, chamædryos, meu, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est. Nonnulli hic quoque addunt anacardia duo, datur drachmis binis cum mulsa.

XX

MICHAEL VAS

LIBER SEPTIMVS.

346

MEDICAMENTVM CYPHOI

des: ad iecorosos, & pectoris uitia.

Vuæ passæ carnis drachmæ uiginti quinque, croci drachma, calami odorati drachmæ * duæ: bdellii drachmæ duæ & semis, casia sesquidrachma, cinnamomi tres oboli: nardi totidem, iunci quadrati drachmæ * due myrrhæ, resine terebinthine, singulorum denarii quatuor, aspalathi ramenti oboli duodecim, mellis drachmæ sedecim, uini quantum sufficit.

* Gal. due & semis. ↓ Reposi- tū ex Gal. * Gal. due & semis.

ALIUD CYPHOIDES,

Alexandri.

Croci, cinnamomi, bdellii, singulorum denarii quatuor, myrrhæ, calami aromatici, singulorum drachmæ due, aspalathi, iunci odorati floris, singulorum drachmæ tres, casia, nardi, singule drachmæ, terebinthine resine drachmæ sedecim, uue passæ carnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihemina, uini Chii quod sufficit.

DIA BACANVM MEDICA-

mentum, hepati accommodatum.

Bacani uncia, costi tantundem, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula sex, spice nardi totidem mellis quod satis est: datur cochlearium cum temperatūra conditi.

MEDICAMENTVM ZOPYROS.

Myrrhæ drachmæ quinque: croci, casia, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ tres, spice nardi drachmæ due, iunci odorati floris tantundem, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma: costi drachma: mellis quod satis est.

COMPOSITIO PÆONIA.

Styracis calamitis drachmæ sex: thuris amomi croci, singulorum fescuncia, spice nardi drachme sex, phylli drachmæ due, piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ uncia: costi tantundem, mellis quod

satis est.

XX

ii

PAULI AEGINETAE
CATAPOTIA DOSITHEI

ad iecur inscripta.

Aloes uncia, spicae nardi, phylli, costi, singulorum scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epithymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

OXYMEL SPLENICVM, HOC

est, lieni dicatum.

Capparis radicum corticis, scolopendrii, spicae nardi, asari, iridis, iunci quadrati floris, iunci rotundi floris, anisi, cumini, foeniculi, acori, ericae fructus, singulorum uncia, myrica foliorum, salicis foliorum, apii radice, thuris arboris, scillae, singulorum unciarum duarum, aceti sextarii tres, mellis tantundem, guttae ammoniaci * praeparatum modo scillini, duobus cochleariis exhibetur.

* Pondus desiderat

OXYMEL, CALCULOSIS

EFFICAX.

Saxifraga, betonica, graminis, adianti, spicae nardi, carpesii, asari, eryngii, singulorum uncia, petroselini Macedonici, rutae singulorum semuncia, foeniculi uiridis, iridis, scillae tostae, chamaedaphnes, singulorum unciarum duarum, capparis radicum corticis unciarum tres, sii unciarum duarum, aquae, aceti, mellis singulorum sextarii duo.

PHVSICA AD CONTERENDUM

calculos.

Pulegii, mastiches, apii seminis, menthae siccae, singulorum uncia, salis communis torrefacti pondo, coriandri seminis, spicae nardi, anisi, ameos. singulorum scrupula sex, phylli scrupula quatuor, piperis albi semuncia, uel communis uncia, lithospermi unciarum sex, betonicae totidem: aceti generosi sextarii quinque: omnia confusa, cribrata & in tenuissimum pollinem detrita, per triduum aceto madescunt, deinde diebus quadraginta insolantur: ubi usus inciderit, nigrum cicer, asparagi radicem, aspidium & adiantum decoquis, in huius decocti misturam heminas duas aceti superinfundis, & agro in calido balnei solio propinas. Nonnulli uero medicamenti ex pra-

LIBER SEPTIMVS. 347

dictis speciebus sicci, scrupula duodecim cum posca di-
ctarum herbarum iuri temperata exhibent, & nihilomi-
nus medicamentum proficit.

CONDITVM CALCULOS

5 confringens.

Piperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betoni-
cæ, singulorum uncia, petroselini, phylli, singulorum ses-
cuncia, rutæ sylvestris seminis semuncia, mellis sextarius
uini ascalonitis sextarii sedecim.

10 MEDICAMENTVM EX SAN-
guine hircino.

Quum uua inceperit maturescere, hirci ætate florentis
sanguinis in sole siccati cochlearia duo calculosis exhi-
beto cum passo cretico. Quidam uero amomi & phyl-
li, utriusque treis uncias miscent. Alii etiam myrrhæ qua-
tuor scrupula.

EX CICADIS MEDICAMEN-
tum nephriticum.

Lithospermi, raphidis piscis combusti, seselis, singulo-
rum uncia ameos, cucumeris satui seminis, saxifragæ,
20 uuæ passæ acinis exemptis, althææ seminis, phaseoli al-
bi, lyncurii, singulorum semuncia, spicæ nardi, phu, meu-
lapidum ex spongiis, singuli denarii, adianthi, paliuri se-
minis interioris, sili sicci, rubi radice, graminis, polypodii
25 singulorum denarii tres, hircini sanguinis desiccati ut di-
ctum est, scrupula sex, cicadarum siccarum sine capite,
pennis & pedibus, triens, piperis albi denarii sex, mellis
discocti quod satis est. datur instar nucis auellanæ in cō-
dito tribus obolis, aut decocto saxifragæ, aut sili, aut radi-
30 cis asparagi, aut rosmarini, aut quinquefolii, aut lanariæ
herbæ radice.

MEDICAMENTVM.

ex lithospermo.

Lithospermi, betonicæ, saxifragæ, petroselini, piperis al-
35 bi pares portiones cum melle excipiuntur.

XX iii

PAULI ÆGINETÆ

MEDICAMENTVM EX

marrubii semine.

Piperis albi & nigri, dauci cretici, cucumeris sativi seminis, foeniculi seminis, marrubii seminis, perroselini macedonici, pyrethri zingiberis phylli, singule unciae, mellis quod satis est.

MEDICAMENTVM EX LA

pide iudaico, qui tecolithos dicitur.

Spicae nardi, hyssopi, lapidis iudaici, singulorum scrupula octo, piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselinii costi saxifrage: singulorum scrupula sex, cassiae apii seminis: singulorum scrupula tria, cyperi scrupula sex, ramenti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligii scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

MEDICAMENTVM EX

sylvestris malue semine.

Cucumeris domestici seminis denarii duodecim, alteri seminis denarii sex, cicute seminis denarii tres (alii sex) opii foeniculi, malue sylvestris seminis, croci, singulorum denarii tres, apii seminis denarii sex, cassiae denarii quatuor, amygdala basilica decem, nuces auellane totidem asari denarii quatuor: passo cretico excepta dantur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

MEDICAMENTVM EX BELLA

riis nephriticum, uesicae & renum exulcerationi idoneum.

Vuae passae albe, cui acini sint exempti, nucleorum pini recentium, singulorum unciae due, cucumeris seminis cortice exuti: baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararum, palmularum pinguium, apii seminis, papaueris seminis, croci singulorum denarius, myrrhae unciae due: instar denarii ex passo ieiuno propinatur.

SATIURIACVM ANTIDOTVM.

LIBER SEPTIMVS. 348

Zingiberis, satyri superioris, singulorum drachmę octo
scinci caude, meu asari petroselini cardamomi seselis,
singulorum drachmę quatuor, eruce seminis, cinnamo
mi, singulorum drachmę tres, ormini piperis albi, chio
ci seminis, singulorum drachmę due, iunci odorati flo
ris, spice nardi, singule drachmę, sanguinis hircini myo
strum. datur denarius imbecillioribus cum lacte.

CATAPOTIA EX XYLO

macere, dysentericis utilia.

- 10 Xylomaceris, opii rheu, singulorum scrupula sex: galle
myrrhę, singule uncia. excipiuntur uino spathite.

MEDICAMENTVM EX CO

rallio, quod diacoralliu uocatur,
podagricis idoneum.

- 15

Rheu barbarici, peonia, myrrhę troglodytidis, spice
nardi, singuli sextantes, phylli uncia, caryophylli grana
quindecim, anagallidis phoenicie coloris quam uo
cant corallion, semuncia, aristolochię longe uncia qua
tuor, & rotunde totidem. datur instar scrupuli quotis

- 20 die, concoctione probe defuncto. Incipiendum uer
ro est ab æquinoctio autumnali, quod circa uigesim
mum quartum mensis septembris diem accidit, capiens
dumque deinceps ad dies quinquaginta, deinde relin
quetur quindecim dierum interuallo, atque sic facere
oportet quousque dies quibus assumitur absoluantur
trecenti sexaginta quinque. Sub canicule ortu omnino
abstinendum est, hoc est à uigesimo quarto die Iunii us
que ad Augusti finem. Vitari debet uenus, carnes præ

- 30 ferim suillæ, salsamentum garum beta daucum mentha
& lactuca discocta, peponesque piscium capita, camma
ri, tum qui molli, tum qui testacea cute præditi sunt, le
gumina omnia, & summatim quæ crassi succi sunt, uinū
nigrum & liberalius. Balneum conuenit & quotidianū
35 exercitium, uel pedibus, uel equo, uel gestatione adhi
bitum. Qui uero habitu siccioribus sunt, etiam si plenius

XX iiii

PAULI AEGINETAE

nutriantur, non offenduntur.

AGAPETI COMPOSITIO

ad podagram.

Phylli rheu barbarici, croci, spice nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloes hepaticæ, quincunx, hyperici, peoniæ, singuli quadrantes aristolochiæ longe, phu, meu, damafonii, anagallidis, singuli trientes: utendi modus idem est qui in compositione dia coralliu.

COMPOSITIO ATACTOS

ad podagram.

Phylli, meu, damafonii, anagallidis cui flos est ceruleus erythrodani, mastiches, croci, castiæ, aloes hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singulorum uncia, caryophylli, asari [piperis] albi & nigri, singulorum semuncia, spice nardi, myrrhæ, rheu barbarici, pæonie radice, aristolochiæ longe & rotunde, singulorum uncia duæ. Similis usus est.

In gra.
deesse ui-
detur.

PROCLI COMPOSITIO,

podagræ & coxendicum doloris

bus accommodata.

Chamedryos uncia nouem, centaurii uncia octo, aristolochiæ uncia septem, gentianæ uncia sex, hyperici uncia quinque, petroselini macedonici uncia quatuor, meu uncia tres, agarici uncia duæ, phu uncia una, mellis attici hemina duæ.

MEDICAMENTVM EX RE-

bus septem constans ad eadem.

Hyperici, aristolochiæ longe, singulorum uncia, centaurii, catnepityos, agarici, singulorum tres uncia, chamedryos uncie sex, gentianæ uncie quinque. Nonnulli etiâ petroselini unciam addunt, mellis drachmas quinque. datur instar denarii.

DE PASTILLIS. Cap. XII.

Pastilli trochisci à figura nominantur. Tres sunt eorum species, alii namque sunt potabiles, alii in alo-

uum dantur, alii delinuntur. Ex his igitur qui potantur, alii comprimunt aluum, aut sanguinem aut aliam quam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo, aut desiccando eam cohibentes: quemadmodum qui constat spina ægyptia, & qui seminibus, confis miles; alii dolorem sopiunt, uel quod sensum obtusum pefaciant, uti crocodes dictus, uel quod humores diffundant, ueluti ex aromatis confecti: alii lienem, aut renes, aut iecur obstructione liberant, ut qui ex amaris amygdalis confit. Eorum uero qui in aluum induntur, nonnulli acrimoniam obtundunt, ut in torminibus intestinorum, quemadmodum ex pompholyge, amylo, terra samia, ex cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo præparati, nonnulli alui aut sanguinis profluuium astringunt, sicuti qui alumine, acacia, & omphacio constant, qualis est qui plantaginis iniecti: nonnulli adurentes, dysentericæ quàm ulcera depascentia exercent, idonei: ex sandaracha, auripigmento, calce, charta combusta, confecti. Inserentur autem cum succo lenticulæ, aut oryzæ, sic ut intestinum prius muria elotum sit, ægerque cibum & potum antea assumpserit, ne aliquid medicamenti uirtutis reliquum, ad stomachum rapiatur. Cæterum utiles sunt pastilli qui ab inferioribus partibus iniiciuntur, ad affectus potissimum qui infra umbilicum infestant. Nam superius uis ipsorum peruenire non potest. At qui delinuntur simileis illis uireis obtinent: uerum astringentes, in herpete, papulis, quæ dicuntur exanthemata, intertriginibus, sanguinis eruptionibus: & fluidis ulceribus proficiunt: cuiusmodi est Andronius & Polyide, qui uero obtundunt, carbunculis & maleficis expediunt: utpote leucus dictus, & dialotarion. urentes, sicut iam comprehensi, cuius generis habentur & Faustiani, serpentibus naturalium & sedis ulceribus, pterygiis, & carnosis narium uitis accommodantur.

PASTILLVS ASTER
DICTVS.

PAULI AEGINETAE

Croci, opii, castorii, spice nardi, casie, myrrhæ, lenie crete, mandragoræ corticis, singulorum triens, dauci apii, anisi, seselis, alterci seminis, styracis, singulorum denarii octo: uino leuigantur.

PASTILLVS TRIGONVS.

Apii seminis, alterci seminis, singulorum denarii duo, anisi denarii quatuor, opii denarii tres: aqua teruntur.

PASTILLVS A SEMINIBVS

dia spermaton dictus.

Anisi, ameos, foeniculi seminis, singulorum denarii quatuor, apii seminis, opii, alterci seminis, singulorum denarii duo: aqua leuigantur.

PASTILLVS CROCODES

hoc est croceus.

Anisi, dauci cretici seminis, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, castorii, singulorum drachmæ due, croci, opii, singulorum drachmæ tres, apii seminis, styracis, singulorum drachmæ quatuor, alterci seminis drachmæ sex: ex aqua deteruntur.

PASTILLVS DIA RHODON.

Acaciæ, gummi, rosarum floris, balauftiorum, hypocistidis succi, gallarum, singulorum drachmæ tres, rosarum uiridium succi: plantaginis seminis, singulorum drachma, lycii indicii tantundem.

PASTILLVS DIA CORALLIV.

Alterci seminis, thuris, singulorum drachmæ octo, terræ samiæ, corallii, minii Sinopici, opii singulorum drachmæ quatuor, amyli, baluftiorum, singulorum drachmæ due: succo polygoni excipiuntur.

PASTILLVS EX ELECTRO.

Herbæ pulicaris uncia quinque, mastiches uncia quatuor, electri scobis, iridis, croci singulorum uncia quatuor, opii uncia due.

PASTILLVS EX SPI

na Aegyptia.

Spine Aegyptiæ, rhu, thuris, acaciæ, aluminis scissi,

*Galenus
& Oriba.
drachme
triginta.
†Oriba.
drachmæ
qundecim.

LIBER SEPTIMVS.

350

hypocistidis succi, gallæ, lemnæ crete, corallii, symphyti, terre samia, aloes, ladanii, pares portiones: uino subiguntur.

ALIVS PASTILLVS, QVEM

5 Galenus aphrodisiasticon clidion inscribit.

Satiuæ punice floris spine, Ægyptiæ, balaustiorum, hypocy- *Gal. uñ
pocistidis succi, acaciæ, singulorum drachmæ sex, lycii, sumptū
rheu pontici, opii singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ est, acaciæ
rhæ drachmæ due: excipiuntur uino myrteo, uel rosarū succi.
baëcarum uel myrti decocto.

CLIDION ORIBASII AD

dysentericos & coeliacos.

15 Galle omphacitidis denarii octo, opii denarii quatuor:
ex aqua finguntur catapotia, dantur terna aut quaterna.

PASTILLVS EX CORNV

ceruino dysentericis & sanguinem
excreantibus salutaris.

20 Cochlearum drachmæ duodecim, cornus ceruini com-
busti, galle torrefactæ, acaciæ inarefactæ, singulorum
drachmæ quinque oboli duodecim, baccarum myrti
nigre drachmæ quindecim, opii siccati, hypocistidis suc-
ci, singulorum drachmæ quinque, labrusce floris drach-
mæ sex, mandragore radice succi, terre samie q̄ aster
25 dicitur, singulorum drachmæ duodecim, rhu obsonio-
rum drachmæ quatuordecim, malicorii torridi drach-
mæ septem, thuris drachmæ octo, piceæ corticis exare-
facti drachmæ quatuordecim, alterci seminis siccati
drachmæ decem, rhus coriarii sextarii duo, uini nigri
30 quantum rhu incoquendo ut uinum fiat crassissimum,
satis est, atque hoc percolato: reliqua excepta in pastillos
coguntur.

PASTILLVS AMAZONVM.

35 Apii seminis, anisi, singulorum drachmæ sex, absinthii
come drachmæ quatuor, myrrhæ, piperis, opii, castorii,

PAVLI AEGINETÆ

singulorum drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ sex:
aqua subiguntur.

PASTILLVS EX AMYGDALIS

lis amaris.

Anisi, apii seminis, asari: amygdalarum amararum, absin-
thii comæ, paria pondera: ex aqua finguntur pastilli, qui
drachmam pendeant. dantur febrī carentibus ex mulso
febricitantibus cum hydyomelite.

PASTILLVS EX ERICA,

lieni dicatus.

Ericæ fructus denarii quatuor, piperis albi, nardi syria-
cæ, suffiminis ammoniaci, singulorum denarii duo: amo-
niacum aceto soluitur, aridisq; admiscetur: fingun-
tur pastilli qui singuli denarium expleant, exhibentur sin-
gulatim cum oxymelitis cyatho.

PASTILLVS EX VESICA

riis, dia physalidon uocant.

Cucumeris sativi excorticati seminis uncia quatuor, al-
terci seminis, cicute: singulorum uncia duæ, foeniculi, la-
pathi seminis, croci, nucleorum pini, amygdalarum ama-
rorum, opii, singula uncia, uesicaria sextarii tres, uini
quod sufficit.

PASTILLVS PHILIPPI,

ad intestinorum tormina.

Balaustiorum, acaciæ, hypocistidis succi opii rhu thuris
myrrhæ croci gallæ aloes rheu pontici malicorii bacca-
rum myrti singulorum drachmæ quatuor: excipiun-
tur uino austero: formanturque pastilli triobolares. dan-
tur si febris abest, cum uino: febricitantibus: cum hy-
dromelite.

PASTILLVS MVSAE.

[Additur
ab Oriba.] Alumiuis aloes myrrhæ atramenti sutorii: singulorum
sestuncia: malicorii: crocomagmatis L croci, singulorū
drachmæ sex: excipiuntur uino.

QVOMODO CROCOMAG

ma paretur.

LIBER SEPTIMVS.

351

Croci uncia duæ rosarum amyli myrrhæ aloes thuris gummi singulorum uncia costi spice nardi, singulorum drachma: uino subiguntur. At in capite de oleo croci no alia quoque crocomagmatis confectura dicitur.

PASTILLVS NERÆ EX heræ commentariis.

Myrrhe aloes croci singulorum drachmæ octo, aluminis scissi, drachmæ centum: aqua excipiuntur.

POLYIDE SPHRAGIS.

Aluminis scissi denarii * quatuor: myrrhæ denarii octo: atramenti sutorii denarii duo: floris satiuæ punice denarii duodecim: fellis taurini denarii sex: aloe thuris lias denarii sedecim: aloes uncia: uino austero ex quatuor. * Galenus

PASIONIS PASTILLVS.

Squame aris denarii duodecim: gris combusti, * salis ammoniaci, aluminis rotundi, æ ruginis rasæ thuris singulorum denarii octo: uini quod sufficit. * Græce rat α' λον' pro α' λος sic. n. hēt

PASTILLVS ANDRONIVS.

Satiuæ punice floris drachme decem: galle drachme octo: myrrhæ drachme quatuor aristolochie longe exigit. Oribasius & sensus
drachme quatuor: atramenti sutorii croci aluminis scissi crocomagmatis misyos thuris singulorum drachmæ due leuigantur in uino astringenti uel aceto.

PASTILLVS FAVSTINI.

Auripigmenti drachme duodecim, sandarache drachme sex: calcis uiue drachme octo charte combuste drachma: myrti baccarum succo uel decocto excepta, in pastillos redigito: & cum myrti baccarum, lenticulæ, & rubi radicum decocto immittito. * Oribasius, drachmæ tri- ginta due qd magis cōuenit.

PASTILLVS EX CHARTA

dia chartiu appellatus.

Charte combuste * dupondo, calcis, auripigmenti, sandarache, singule unciæ: succo plantaginis excipiuntur. lappus fa- cillimus in literis græcis.

PAULI AEGINETAE

PASTILLVS CUI NOMEN

est thronus Marcellius.

Chartæ combustæ drachmæ decē, sandarachæ, auripigmenti, squame, æris, aluminis scissi, singulorum drachmæ quatuor, balauftii drachmæ tres, opii drachmæ due calcis non reitinctæ drachmæ uiginti, omphacii drachma, hypocistidis succi drachmæ tres: uino myrteo excepta coguntur in pastillos qui drachmas quatuor pendent: *coquunturque in uino malicorium, myrti bacca, & rosæ uique ad tertias: datur pastillus unus aut in totū quatuor, ex sex uini cyathis.

Exēplar
græcū uī
detur hic
esse muti
lum.

PASTILLVS A SVBERE,

dia phellon dictus,

Gallæ, chartæ, fœculæ uini, panis, singulorum concretorum denarii decem, in alio habetur etiam cornu ceruini combustum denarii quindecim, auripigmenti denarii duo, sandarachæ, calcis, utriusque denarii quindecim, acaciæ cerusæ, singulorum denarii quinque, argenti spumæ denarii tres: uino leuigantur.

BITHYNVS.

Malicorii drachmæ decem, cadmiæ uncia tres, aristolochiæ, gallæ, panacis, radicis iridis, atramenti sutorii, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamæ æris, mannæ, (nonnulli etiam costi) singulorum sescuncia: aceto subiguntur.

PASTILLVS DIA CASTOR

riu, ad ulcera, nomas & de fluxiones.

Croci, aloes, thuris, singulorum uncia, cytinorum aluminis scissi, castorii, mannæ, æruginis rasæ, singulorum uncia, minti sinopici libra: excipiuntur uino ueteri.

PASTILLVS EX CASTO

rio, colicis efficax.

Myrrhæ, castorii, singulorum scrupula sex, croci, opii, singulorum scrupula nouem, anisi, apii seminis, dauci se

LIBER SEPTIMVS. 352

minis, singulorum semuncia, alterci seminis scrupula octodecim.

PASTILLVS EX OENE

læo, sedis & naturalium uir-
riis utilis.

Cerusæ uncia decem, argenti spumæ uncia quinque, thuris, cremeti plumbi, aluminis scissi, singulorum uncia due: uino marine experte læuigantur. in usu uino rosaceo aut myrteo soluuntur.

10 PASTILLVS EX LAPID

de phrygio, naturalium uir-
accommodatus.

Lapidis phrygi combusti restinétique ter, primum butyro uel rosaceo, deinde uino postea melle un-
15 cia duæ, rosarum floris uncia quatuor, malicorii uncia.

PASTILLVS DIA LOTA

tion, quod est ex loto syluestri,
ad sedis & naturalium uir-
ad.

20 Cerusæ, amyli, glaucii, croci, aluminis, æquales portio-
nes: teruntur succo loti syluestris, aut uino.

PASTILLVS LEVCVS.

Terræ samia triens, pompholygis, cerusæ, amyli, singu-
li sextantes, opii scrupula quatuor: aqua subiguntur.

25 PASTILLVS DIA ALICACABV.

Spumæ argenti drachmæ uigintiquatuor, cerusæ drach-
mæ duodecim, aut una & uiginti, alicacabi drachmæ
octo, atramenti sutorii drachmæ quatuor, aluminis scis-
si tantundem, mini quod ad colorem satis est: aqua
30 excipiuntur.

PASTILLVS EX DVPLI

ci ueratro, idem uero ex *a/
cacia duplici.

Acaciæ nigra & rubentis, glutini fabrilis, (in alio pisci-
35 glutinis) singulorum uncia quatuor, guttæ ammoniaci,
glaucii, aloes, singulorum uncia duæ, thuris masculi

*Græce e

rat α' / ικω

κα' βων

nullo sen

su pro

α' ηακ' ιω

PAVLI AEGINETA

ueratrl nigri & albi, singulorum uncia: aceto scillino ex
cipiuntur, quum usus incidit eodem uel comuni solu
ta: ante balneum: & rursus post id inunguntur.

PASTILLVS CRIOGENES.

Myrrhæ, æris combusti, aristolochiæ rotunde, eruginis
rasæ, squamæ stomomatis, uerbenace recte, aluminis ro
tundi, singulorum uncia, aceti quantum satis est, decers
pi autem debet uerbenaca, quum sol est in ariete.

*Mēdose
erat κίρρ
.i. gilui
κίρρ.

Fit etiam emplastrum in hunc modum: pastilli, *ceræ,
colophonix, olei, par mensura, aceti quod ad laeuigan
dum pastillum sufficit.

PASTILLVS A NIGRO

uiridique colore dictus melanchlorus.

Myrrhæ, aloes, squame æris combusti, auripigmenti, alu
minis scisilis, & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos salis
fositii atramenti sutorii: ceruse nitri argenti spume pa
naxis radice cadmie malicorii galle aristolochie rotun
de squame stomomatis eruginis rase singulorum un
cia: aceti quod satis est. Fit etiam hoc modo empla
strum: pastilli uncie due colophonie cere olei sin
gulorum uncie sex: aceti quod pastillo subigendo sa
tis est.

PANTOLMIVS AD CHIA

ronia malignaque ulcera &
defluxiones.

Cassie æris cremati ceruse argenti spume, æruginis rase
aluminis scissi rotundi liquidi & lateritii quod plinthitis
dicitur, panaxis radice, aristolochie longe & rotunde
malicorii atramenti sutorii: portulace iridis astragaliti
dis chalcitidis misyos gutte ammoniaci: salis ammonia
ci: æruginis ferri squame eris aloes diphrygis thuris gal
le sarcocolle plumbi cremari foliorum oleæ, soreos myr
rhe crete sutorie liquide: balaustiorum spine Egyptiæ:
sulfuris ignem non experti: nitri rhu rubri: rhu syriaci:
chrysocolle *rhus coriarii: acacie salis spume: omphacii
auripigmenti singulorum pares modi: cū aceto diebus
triginta,

*Græce
erat συ
πίας. i. alu
mini.

LIBER SEPTIMVS.

353

triginta, sub caniculæ sidere læuigantur.

PASTILLVS NYMPHODOTI.

Aphronitri uncia, nitri Alexandrini, saponis gallici, singulæ uncia, salis cappadocii, mastiches, gallæ, singulorum denarii quatuor, foliorum rosæ, amomi, amyli, singulorum uncia, phylli denarius, aluminis scissilis, costi, singulorum denarii duo, uini myrtei quod satis est.

PASTILLVS EX THAPSIA, hemicranico dolori efficax.

Succi thapsiæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ octo, opopanacis, euphorbii, singulorum drachmæ sex, nitri, liquoris parthenici, singulorum drachmæ quatuor, piperis, sagapeni, singulorum drachmæ duæ, aceti quantum sufficit. Vbi utendum est, aceto inunctum post horas sex abluito: at si uoles remissiore uti, cerato pari exceptum illinito, noctemq; finito.

PASTILLVS QVIA ANO SVBII citur, hypotheton dictus, ad intestinorum tormina, & ani dolores.

Terræ samiæ, amyli, singulorum quadrans, croci sextas, acaciæ, tragacanthæ, singulæ uncia, castorii, thuris, lycii, singulæ semuncia, in calidioribus etiam opii semuncia adificitur: herbæ pulicaris succo excipiuntur, *singulæ turque pastilli.

DE MEDICAMENTIS QVIBVS aridis utimur, xeria dicuntur, & smegmatibus.

Cap. XIII.

ARidorum medicamentorum quæ sanè & cataplasmata ab inspergendo uocantur, alia ulceribus congruunt, alia cuti applicantur: ex iis quæ ulceribus faciunt, quædam cauis carnem inducunt, quædam excrecentia reprimunt, quædam cicatricem generant, quædam urunt exeduntq; nonnulla sanguinem coercent. Quæ igitur carni generandæ sunt, uel repurgando sordida, carnem creant, ut quæ constant ex eruo, ario

PAV. ÆGIN.

Y Y

*Exemplar
græcū uide
hic
deprauatum.

PAULI AEGINETAE

Rhodiola, iride, panace, myrrha, thure, aloë: uel humiditatem circumfluam desiccando, ueluti quæ sunt ex ære, diphryge, squama, charta combusta, piceæ, cortice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: uel acrimoniam rosionemq; obtundendo, qualia sunt ex pompholyge, amylo, cerusa, sæce combusta, speculatio: ostreis crematis terra samia, & consimilibus, & quæ compositorum ex his uireis habent. Ex reprimentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla, ualentiora sunt, quæ atramento sutorio, æruginæ, misy, chalcitide, ignem non expertis. Vrentia uero exedentiaq; sunt ex calce, auripigmento, sandaracha, & sæce uini combusta, quæ uocant spheclen, hoc est sæculam: atque hæc omnia componuntur, cæterum in tenuissimum redacta pollicem, si ulceribus inspergantur minus rodunt: si spissiora magis, idq; urendo faciendoq; crustam. Sanguinem reprimentia aut astringendo, aut refrigerando, aut siccando aut opplendo illum coercent, quorum materiam capite de pastillis sumus exequuti. At eorum quæ cuti admoventur, alia abstergunt exteruntq; ut ex cimolia, pumice lomento, fermento hordei, peponum carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutiunt, qualia sunt ex ueratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, cachry, terra lemnia, sepia testa: atque hæc, assumpta calce & auripigmento cum liquore aliquo, pilis adbolendis idonea, & smegmata fiunt. Quædam capiti admoventur, ut fluxum ex eo ruentem desiccant, cuius modi sunt ex nitro, sale, galla malicorio, & id genus aliis præparata, omnia uero smegmata cuti non inuncta: nec modari debent.

CEPHALICVM ARIDVM, capiti conueniens.

Eruiorum quincuns, iridis fescuncia, manna fescuncia, aristolochia, squama æris, singulorum fescuncia.

ALIVD.

LIBER SEPTIMVS.

314

Piceæ corticis drachmæ sex, thuris drachmæ quatuor,
pumicis, tantundem, iridis drachmæ duæ, resinæ siccae
sex, aristolochiæ drachmæ duæ.

MEDICAMENTVM EX ALOE,

dia aloes dicitur.

Aloes drachmæ sex, erui drachmæ octo, mannæ dra-
chmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, aluminis scissi dra-
chmæ duæ.

DIA SPHECLES, HOC EST

ex face uini combusta, manethonis.

Cadmia combusta & illota pondo uncia, terræ sa-
miæ pondo uncia, facis uini combustæ pondo uncia
quatuor, lapidis specularis pondo uncia quatuor, thu-
ris pondo uncia quatuor, quidam & amyli uncias qua-
tuor addunt.

MELITERA ORIBASII.

Chalcitidis, squamæ æris, gallæ, balaustiorum, ceræ,
singulorum pondo quadrans, aristolochiæ longe pon-
do uncia, malicorii, aluminis scissi, singulorum ses-
muncia.

MEDICAMENTVM EX

ostreis, dia ostreon dicitur.

Cadmia, thuris, singulæ uncia, ostreorum combusto-
rum uncia tres.

MEDICAMENTVM EX

thure, dia libanu.

Argenti spumæ, thuris, squamæ æris, mali Punici, amyli
cerusæ, pares modi.

APHRODITARIVM.

Thuris, squamæ æris, mali Punici, amyli, cerusæ, paria
pondera.

RHODIA, AD SVPPRIMENDVM

dum sanguinem, ulcera depascen-

tia & excrescentias.

Gallæ crudæ denarii sex, gallæ combustæ restinctæq;
uino aridæ denarii duodecim, squamæ æris nigri, si non

xx ii

PAULI AEGINETAE

fit, rubri denarii octo, atramenti sutorii denarii uiginti quatuor, aluminis scissi denarii uiginti septem: teruntur diebus sat multis.

MEDICAMENTVM XANTHON

thon, hoc est, flauum.

Chalcitidis combustæ drachmæ quadraginta, atramenti sutorii usti drachmæ uiginti, misyos cremati drachmæ decem, æris usti drachmæ quinque.

MEDICAMENTVM AMVRINO

rino colore psaron dictum.

Misyos quincunx, gallarum triens, chalcitidis sextans, squamæ æris tantundem, atramenti sutorii uncia, æruginis rasæ sextans.

MEDICAMENTVM HELIOMÆS

cæs, adurens.

Auripigmenti pondo, calcis uiuæ dupondo: aqua laui gantur per dies caniculæ, deinde siccatis utitor.

ANTHERON.

Cyperii denarii octo, myrrhæ denarii duodecim, sandarachæ denarii tres, rosarum floris denarii duo, croci denarius, crocomagmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ, singulorum denarii duo.

MEDICAMENTVM EX CHARTA

ta, quod græci dicunt diachartu, ad

nomas oris potissimum &

naturalium ulcera.

Æris squamæ, chartæ combustæ, singulorum denarii octo, auripigmenti, sulfuris uiui, singulorum denarii duo decim, plumbi cremati denarii sex. Ad humidiores quæ sepe donas, sicco utitor: ad ficas, rosaceo macerabis, nonnunquam & melle cum rosaceo.

MEDICAMENTVM EX MYRTO

to syluestri, dia oximirsines appellatum, ad eadem.

Rhus coriarii uncia duodecim, myrti syluestris foliorum, sandaraches, singulorum drachmæ octo, salicis foliorum

LIBER SEPTIMVS. 355

rum siccorum, malicorii, singulorum drachmæ sex, aluminis scissi, chrysocollæ, aloes, chalcitidis crudæ, squamarum, auripigmenti, salis communis, singulorum drachmæ quatuor.

5 MEDICAMENTVM MAS-
SALIOTI.

Nitri, opii, chrysocollæ, lapidis asii, sandarachæ, misyos, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, æqualia pondera: sicco utitor.

10 SMEGMA ARIDVM, QVOD
asclepios dicitur.

Baccarum lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti, salis cap-
padocici, stillæ ammoniacæ, aphronitri, pumicis, singu-
lorum libra, ueratri nigri, herbæ lanariæ, pyrethri, fæculæ
15 quæ est uini fæx combusta, herbæ pediculariæ, sinapis,
iunci angulosi, aluminis scissi, iunci odorati floris, iridis,
gallæ, singulorum uncia sex, sampsuchi libra, uiticis se-
minis, pulegii, farina fabarum & lupini, singulorum un-
cia sex, chamæleontis nigri, sulfuris, gummi, thuris pipe-
20 ris, cucumeris syluestris radicis, marrubii, cimoliæ, pæo-
niæ, sepia testæ, scœnogræci, philli, costi, cumini, euphor-
bii, spicæ nardi, singulorum uncia tres. Alexander autē
præter hæc adiicit salis ex nitri fontibus, salis Tragasæi,
singulorum libram, adarces unciam, aluminis liquidi *
25 gallici, cnici, cocci gnidii, graminis aridi, brioniæ siccæ, in græ. de
singulorum treis uncias. esse nardi

SMEGMA PEPONATVM.

Thuris, mastiches, stillæ ammoniacæ, singulæ uncia, tra-
gacanthi fescuncia, succi uivæ immaturæ dodrans, pepo-
30 nis seminis recentis quadrans similæ sextarii quinque,
ouorum unius & uiginti albumina, iridis triens. quidam
& ueratri nigri sextantem miscent.

ALITER CRITONIS.

Lomenti modius, similæ sextarii quatuor, trifolii, glandis
35 unguentariæ, iridis illyricæ, singulorum pondo quatuor
guttæ ammoniaci, costi, singulorum pondo, ouorum

PAULI AEGINETAE

tenuia aquata peponum carnis sextarii duo, uuae imma-
turae succi tantundem: macerantur, redacta q; in pastillos
siccantur deinde contusa increta q; in usum adhibentur.

ALITER. Tragacanthæ, thuris, mastichæ, guttæ amo-
moniaci, singulorum drachmæ decem, omphacii dra-
chmæ quinque, similaginis sextarii quinque, candidi o-
uorum liquoris uncia, peponum carnis uncia decem:
præparatur ut supra dictum est.

SMEGMA QVOD CAPITIS

defluxiones exliccet.

Nitri alexandrini rufi uncia quinque, salis communis
torrefacti fescuncia, salis cappadocii uncia: hæc aceto
quamacerrimo macerata in patinā fictilem coniciuntur
atque in furno uruntur, dum redigantur in carbones: in-
de refrigeratis læuigatis q; ad abstergendum utitor, ui-
num in balneo instillans.

SAPO CONSTANTINI.

Rosarum siccarum, aloes, gallæ, malicorii, malabathri,
sarcocollæ, singulorum tres uncia, balaustiorum, myr-
rhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum uncia duæ,
costi uncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupi-
norum.

XERION QVOD EST ARI

dum psilotrum ad podagram.

Mastiches, thuris masculi, herbæ pediculariæ, ueratri al-
bi, spumæ argenti, singulorum uncia tres, phylli, amyli,
ueratri nigri, lapidis asii floris, singulorum uncia, alcyonii
pumicis tosti, cimoliæ, sampsuchi, singulorum uncia
tres, spicæ nardi uncia. Nonnulli etiam aloes unciam
addunt, contusum in uase xerion reseruatur: ubi neces-
tas inciderit, oryzæ cremor & ptisanæ in ollam conici-
tur: postquam inferbuerit, xerii, saponis gallici, auripig-
menti, aluminis scissi, sandarachæ, singulorum fescuncia
additur, calcis uiuæ recentis libra. Utitor unguento mē-
se ter, nono uidelicet lunæ die, decimonono, & uigesimo
monono, idque usque ad annum: post hunc, semel mē-

Te, quum uigefimum nonum luna diem agit.

DE MEDICAMENTIS LI.

quid is quæ illinuntur, ad oris uitia un-

de stomatica dicuntur, ac gutturi

accommadatis, C. XIII.

Quanto rarior molliorq; est summa oris tunica
cute quæ corpus totum obtegit, tanto etiam
magis stomaticorum medicaminum usus euas-
riat. Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur
medicamenta quæ humoris influxum repellant, cuius
modi sunt, arida quidem, omphacium, galla omphaci-
tis, succus rhu, hipocystidis, aluminis, cortex piceæ, & thu-
ris balauftia, & generatim omnia quæ astringunt, ita ut
insuauem ingratamq; & lethalem uim non repræsen-
tent: liquida uero, succus mororum tum quæ batina,
tum quæ sycamina dicuntur, item nucum uiridium cor-
ticis, & mali Punici, præsertim acidæ, & malorum coto-
neorum, mustum, amineumq; mel autem per initia so-
lum ut medicamenta adhæreant temperatur, at quum
humor subfiterit, misceri debent quæ concoquant &
mediocriter dissipent, cuius generis est crocus myrrha,
& dulcis radicula succus, at per totum id temporis
quod inter statum & declinationem intercedit, recte mis-
cetur alterutrum aut repellens, aut discutiens: & primū
quidem superabunt repellentia, deinde digerentia: in
morbi declinatione solis uti digerentibus absque astric-
tione oportet, qualia sunt nitrum, aphronitrum, origa-
num, hyssopum, thymus, nepita, iris, belasa, cōsimiliaq;
liquor tunc sapa esto tum quæ ex mulso decocto, tum
quæ ex caricis & palmulis conficitur ipsumq; dulce mu-
stum cum melle: ubi uero ueluti reliquæ quædam in-
flammationis remanserint, etiam sulfur ignem non exp-
tum miscebimus: succum autem primum cū melle in-
coquemus, dū liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic
arida in tenuissimum pollinem pertrita inspergemus, pos-
tea modice coquemus, quoad oia exacte in unitatem

xx liii

PAULI AEGINETAE

cogantur, quo facto uitreum uas medicamentum transfundemus.

DIA MORON SIMPLEX.

Mororum succi sextarii tres, prius excoquantur dum tertia portio fuerit absorpta, adiectoq; mellis sextario, rursus incoquantur ad melleam spissitudinem.

DIA MORON COMPOSITVM.

Mororum succi heminae sex usque ad strigmenti crassitudinem coquantur, deinde admixto lauis croci denario, myrrhæ duobus, uuae immature uno, aluminis scissiternis obolis, mellis hemina, quousque spissescant incoquantur.

DE MORIS BATINIS, QUAE
rubi fructus sunt.

Item quod ex moris batinis constat, eodem modo præparatur, maiore uel astrictoria præditum.

DIA CARYON, QVOD
est ex nucibus, simplex.

Viridium nucum corticis contusi succi heminae quinque mellis hemina, coquantur ad dimidias.

DIA CARYON, COMPOSITVM.

Per initia quidem & in uigore oris inflammationum, misceri debent croci, & aluminis, singuli denarii, myrrhæ duo in declinatione uero ad digerendum nitri denarius sulfuris tantundem, cum prædicta nucum corticis succi, & mellis mensura.

MEDICAMENTVM EX
succo mali punici.

Mali Punici cui nuclei sunt adempti dulcis succi sextarii quatuor, mali punici acidi succi sextarii duo, mellis sextarius, myrrhæ mineæ drachmæ octo, crocomagmatis, gallæ, singulorum drachmæ octo, aluminis scissilis drachmæ quatuor, iridis illyricæ drachmæ octo, omphacii drachmæ octo : conficitur; quemadmodum

quod moris constat.

ALITER IDEM.

Mali Punici dulcis cum corio suo combusti succi sextarii sex mellis generosi sextarius, aluminis scissi uncia, myrrhae semuncia.

MEDICAMENTVM E MVSTO

dia gleucous dicunt.

Musti sextarii sex, gallæ, aluminis scissilis, singulorum denarii duo, croci, myrrhae, singuli denarii. Si lenire uoles, dulce esto mustum: si repellere, austerum. quod aut neutrum est, mediam inter hæc uim obtinet.

ÆGYPTIA STOMATICA.

Mellis pondo, olei bes, resinæ terebintbinæ sextans, croci denarii quatuor: in cacabo liquefiunt.

MEDICAMENTVM DIA BE

safa, ex ruta syluestri.

Anisi seminis, apii seminis, iunci odorati floris, ameos seminis, aluminis scissi, iridis illyricæ, besafa, quod nonnulli harmala uocant, (est autem ruta syluestris) cinnamomi myrrhae troglodytidos, croci, gallæ, singulorum uncia, aristolochiæ longæ, castiæ, crocomagmatis, rosarum siccarum, singulorum uncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorum uncia tres, nardi indicæ, amomi, singulorum semuncia, mellis quod satis est.

DVLCES VTILESQVE

potiones.

Cap. XV.

Dulcium simul & utilium potionum, aliæ ex uino conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, casamo aliisque compluribus, unde etiam appellationem nonnunquam sortiuntur, aliquando melle admixto, interim non: aliæ ex aqua in qua decoquantur mala, uel rosæ quædam, nempe uua immatura, mala punica, myrti bacca, eoq; mel optimum miscetur, tum quod firmum sit, tum quod dulce, interdum etiam utile: si illud excipias quod à cibra in paruis uasculis asportatur, austerum:

PAULI AEGINETAE

Item hydromel uinosum, quod etiam sine melle fieri
 nouimus, quemadmodum apomel ex melle solo & a-
 qua, citra alterius cuiusdam substantiae misturam. Imò
 etiam ex uino confectae potiones, quas & propomata
 Graeci nominant, mellis despumati sextarium unum, ad
 uini quaternos recipiunt, componunturq; citra coctio-
 nem. At quae ex aqua & liquore fiunt, siquidem coquun-
 tur, unum mellis ad treis liquoris, cuius duae fere partes
 inter coquendum sint absumptae, sextarios assument:
 sin minus, unum mellis ad binos liquoris, caeterum quae
 non coquuntur, diu satis insolare prorsus oportet, &
 praesertim omphacomeli. Ex aqua uero temperatas
 potiones coquere conuenit, quod propter imbecillitas
 tem facillime mutantur, omnes autem in fictilia uasa exi-
 gua oblita transfundendae sunt, iisq; tuto operculatis in
 apricis locis usque dum excoquantur reponendae, atte-
 nuantibus autem & probe aqua temperatis uti conue-
 nit. Omphacomel postquam musti modo inferbuerit
 crassumq; euaserit, tunc operiri uas debet. his igitur q
 uino constant, quum febris abest, potissimum uimur,
 uel solius uoluptatis gratia, praeter eas quae scammonia
 aut grano gnidio aut eiusmodi purgantibus medica-
 mentis componuntur, uel propter eiusmodi affectus in
 quibus & medicamentis in illas coniectis, per os uti li-
 cet. Ex aqua autem aut succo aliquorum confecturae fe-
 bricitantibus conueniunt, interdum ceu affectui com-
 moda, quemadmodum apomel ad saliuam educenda
 aut urinas citandas, aut aluum emolliendam, aut exte-
 nuandum humorem, hydromel autem & hydrorosa-
 rum siticulosas, aestu flagrantibus, resolutis & stomacho
 uitiosis. Omphacomel, myrtites, rhodostacton, hoc est,
 mel rosaceum, & rhœtes, coeliaco affectui, intestinoru
 torminibus, uomitionibus, aliisq; fluidis uitis, congru-
 unt. Iam uero his collutionibus subinde in stomaticis
 affectibus utimur.

LIBER SEPTIMVS.
HYDROMEL EX MALO

358

rum cotoneorum succo.

Malorum cotoneorum nucleis exemptis contusorum
succo sextarii duo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii sex,
5 incoquantur, despumando ad tertias.

ALIVD.

Malorum cotoneorum frustulatim concisorum nucleis
ablatis pondo quinque, in aquæ fontanæ sextariis decē
incoquantur, dum intabescant, ablata ab igne, refrigera
10 taq; eximuntur, expressoq; succo proiciuntur, aquæ mo
do dimidia mellis mensura temperatur, iterumq; inco
quitur despumando, quoad octaua portio absumpta
fuerit. Nonnulli uero ex dulcibus etiam malis similiter
hydromel componunt.

15 **AQVÆ ROSATÆ QVAM**
hydrorosatum dicunt,
compositio.

Rosarum unguibus exemptis libræ quatuor, aquæ sex
tarii quinque, mellis sextarii duo.

20 **MELLIS ROSACEI, QVOD**
rhodomeli uocatur confectura.

Succi malorum cotoneorum sextarius, rosarum trepō
do, mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinque. Verum
quoniam rosæ non eodem tempore cum malis inue
25 niuntur, conuenit eas cum melle quando colliguntur
componere, ac ubi mala prouenerint, totam composi
tionem moliri.

**OMPHACOMELITIS PRÆ
PARATIO.**

30 **Vux** immaturæ succi sextarii tres, mellis sextarius : mi
xta diebus quadraginta insolantur, uel discoquantur.

**QVOMODO MYRTITES
FIAT.**

Myrti baccarum succi sextarii tres, mellis sextarius, ad
35 tertias decoquantur.

PAULI AEGINETAE
APOMEL, EX COMMEN

tariis philagrii.

Fauorum melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidium: confractis fauis unitisque aqua cum melle incoquitur, dum & spuma ipsius & id quod ueluti cerosum supernatat, particulatim relinquitur, atque tunc refrigerata diligenter transfunduntur.

RHODOSTACTI COMPOSITIO.

Rosarum quibus ungues sunt exempti succi sextarios duos, mellis sextarium incoquito despumâs quoad quarta pars fuerit absumpta.

RHOETIS CONFECTIO.

Mali Punici succi sextarii tres, mellis unus, ad tertias decoquuntur.

DE COLLYRIIS ET AG
glutinamentis. Cap. XVI.

Varia ocularium medicamentorum materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, partícula stirpium, & metallica his inseruntur: ex quibus alia acrimoniam leniunt & ueluti opplent obstruuntq; utpote pompholyx, spodium amylum, plumbum, terra samia, cadmia, eaq; omnia lota, & candidus ouis liquor. Quibus ita utendum est, ut caput prius uacuationem experiatur: nam si repletum fuerit, metus est ne oculorum tunica humoribus distentæ perrumpantur. Alia contrariam his naturam obtinent, nempe acrem, recludendis uacuandisque: iis quæ diu impacta fuerunt accommodata, quemadmodum liquores Cyrenæicus, Medicus, sagapenus, euphorbium & consimilia. Nonnulla sordidis ulceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama æris, ipsumque æs, chalcitis, misy, soris, flos æris, stinmi, concremata omnia. Quædam his uicina sunt, smectica ab exterendis sordibus appellata, cuiusmodi est auripigmētum, sandaracha, & lapidis asii flos. Sunt & astringentia, atque ex his quæ mediocriter id fa

ciunt uehementer lippitudini, ulceribus, & defluxionibus conducunt, nempe rosarum folia, flores, fructus, spica nardi, phyllum, crocus, glaucium & hypocistis.

Quæ uehementiorem astringendi uim repræsentant, oculorum claritati conducentibus potissimum medicinis miscentur, cuius generis est omphacium, acacia, balauitium, satiuæ Punicæ flos, & galla. Alia concoquunt discutiuntque, ut myrrha, crocus, castorium, lachryma thuris, foenugræci succus. Porro ex compositis oculorum remediis, alia delinuntur, simplicemque appellationem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria uocantur.

Quæ igitur delinuntur omnem comprehensam materiam recipiunt, omnibusque conferunt affectibus: cæterum uere præsertim præparari debent, æstate siquidem uirtus ipsorum perspirat euanescitque, hyeme species gelu rigida temperari nequeunt. Conterere autem ea oportet liquore non copiose affuso, ne metallica subsistant, aromata supernatent, uerum modice, ut sordium modo conterantur. Aqua uero pluuialis erit, tum quod tenuis sit, tum quod modice astringat. Si quidem uino aut succo aliquo læuigentur, teranturque eadem, metallica sanè longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo læuigabuntur. demum ubi satis læuia euaserint, gumi adicietur: in formam redacta, uasis maxime æreis aut uitreis reponentur. Cæterum iis quæ è succo conficiuntur, protinus uti licet: metallica uetustate redduntur meliora. Porro inter collyria arida quædam consumunt exteruntque callos, ficos, ungueis, scabiosaq; uitia, è chalcide, ærugine & misy composita: quædam lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accommodata quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præseruent tueanturque oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio aloe, cadmia, stimmi croco: omnia in tenuissimum polulinem coacta oculis applicantur. At liquida collyria fiunt ex melle attico, opobalsamo, oleo, ob uetustatem

PAULI ÆGINETÆ

tenui, foeniculi succo diuersorum animalium felle, liquore cyrenalico, aliisq; compluribus. Conferunt hebetudini, suffusioniq; incipienti, medicamenta quæ extenuent, calefaciant, purgentq;. Vtendum his est, & omnibus acribus, ubi caput repletionem caret, sub dio, aere puro aut strino, non nimis frigido, neque item calido nimium. At agglutinamenta quæ anacolemata græce dicuntur, ex medicamentis præparantur quæ obstruunt, opplentq;, glutinant, stringunt, aut refrigerant, aut astringunt, siccantve, qualis est farinæ pollen, manna, terra samia, myrrha, cochlear, acacia, opium, cum candido oui liquore. glutinantur autem fronti in quibus humor non intra caluariam delitescit, sed extrinsecus affligit.

COLLYRIUM QVOD PROTI

nus dolorem sedet monohemeron appellatur

latum, ad incipientem uetus

stamq; lippitudinem.

Acaciæ drachmæ triginta sex, gummi drachmæ triginta due, cadmiæ drachmæ uiginti quatuor, eris cremati & eloti drachmæ octo, opii, drachma: uino austero læuigantur. Medicamentum discutit & siccatur.

CHIACVM COLLYRIUM.

Minii sinopici, gallæ omphacitidis croci, rosarum recentium unguibus exemptis, floris quem thylaca uocamus gummi singulorum unciæ tres, opii uncia: uino aminato aut falerno, aut chio austero teruntur. Sit autem uinum marinæ expers.

CYGNARIUM.

Cadmiæ usta, elotæq; unciæ sex, cerusæ lotæ unciæ quatuor, pompholygis tantundem amyli unciæ duæ, tragacanthæ, opii torrefacti, gummi, singulorum unciæ duæ, aqua pluuiali læuigantur.

RVBENS CYGNVS.

Cadmiæ cremate elote sextans, terræ samie tantundem ceruse triens, pompholygis bes, amyli sextans, opii sextans, acaciæ, tragacanthæ, singule unciæ gummi triens:

aqua coelesti subiguntur.

ALBVS CYGNVS.

Cadmia uncia quindecim, ceruse uncia septemdecim
opii drachma octo, thuris drachma septem, amyli un-
cia septem, gummi drachma tredecim : aqua coelesti
teruntur.

PELARION AD VLCERA.

Cadmię, ceruse, singulorum denarii vintiquatuor, aca-
cie, opii, singulorum denarii octodecim, gummi traga-
canthe, amyli, singulorum denarii nouem, myrrhe dena-
rii tres, eris, croci, singulorum sesquidenarius: aqua cono-
teruntur.

PHÆON AD OCVLOS

sanguine suffusos, & ma-

gnos affectus.

Cadmię tenere drachmę vintiquatuor, ceruse drach-
mę sedecim, eruginis rase drachmę duodecim, stim mi
drachmę octo, aluminis scissi drachmę tres, chalcitidis
uste drachmę tres, nardi Indice drachmę quatuor, om-
phacii drachma due, æris drachma, squame æris dra-
chma octo, circe fructus drachma tredecim, lachry-
ma papaueris drachma vintiquatuor, croci drach-
ma quatuor, castorii drachma tres, myrrhe drachma
sex, lycii Indici, acacia, gummi singulorum drachma
quatuor, rosarum recentium drachma due & semis sis:
uino falerno aut surrentino, aut amineo, aut chio auste-
ro perteruntur, inungitur per triduum aqueum ex foenu
græci succo instillatum, deinde ex ouo aut lacte, postre-
mo aqueo crassius.

COLLYRIVM EX DECO

ctis, dia zematō dicitur.

Cadmię uncia sedecim, ceruse uncia octo, amyli, opii,
tragacanthę, acacie, singulorum uncie due, gum-
mi uncie sex : leuigantur decocto rosarum siccarum,
meliloti, capitiū papaueris, dulcis radicule, pari singu-
lorum modo.

PAULI AEGINETAE
COLLYRIUM DIA HYDRIAS, repellens.

Liquoris qui in cercalibus topi modo concretus reperitur, libræ tres, cadmiæ vstæ & elotæ libra, cerusæ, pompholygis, terre samiæ, qui aster dicitur, singulorum elotæ unciæ sex, thuris uncia, myrhæ tantundem, succi lini seminis, herbæ pulicaris, ptisanæ, foenugræci, singulorum libra, tragacanthæ unciæ sex, gummi libra.

COLLYRIUM ILAMBONIS.
Cadmiæ uncia, pompholygis unciæ quatuor, cerusæ libra, tragacanthæ, gummi, opii, singulorum unciæ quatuor: aqua pluuiatili teruntur.

CINEREVM, QVOD SPODIA
diacon dicitur, ad inflammationes, defluxus, & chemosin.

Thuris, stimmi, singulorum denarii centum, cadmiæ, cerusæ, utriusque denarii uiginti quatuor, terræ samiæ, pauis lachrymæ, singulorum denarii tres, gummi denarii quindecim: læuigantur oleæ coliculi succo. fit autem is in hunc modum: teneriora oleæ folia elota contunduntur in mortario paululo aquæ superfuso, per linteolum exprimuntur.

COLLYRIUM EX OLEÆ
turionum succo tenerum, dia thalias uocatur.

Thuris drachmæ quatuor, stimmi drachmæ quindecim, cadmiæ drachmæ uiginti octo, cerusæ drachmæ quadraginta nouem, terre samiæ drachmæ octodecim, opii drachmæ sex, gummi drachma, plūbi usti elotiq; drachmæ octo: excipiuntur oleæ turionum succo.

DIA THALIAS.
Aeris cremati drachmæ duodecim, sandycis unciæ uiginti quatuor, foliorum oleæ unciæ duæ, opii tantundem, gummi unciæ decem, uino spathite uel aminæo excipiuntur.

Dia

LIBER SEPTIMVS. 36r

DIA SMYRNON CLAVDIACVM.

Glaucoi, sarcocollæ, singulorum drachmæ quadraginta octo, croci drachmæ uiginti quatuor, opii, myrrhæ lapidis hæmatitis, singulorum drachmæ sex, tragacanthæ drachmæ quadraginta octo, gummi drachmæ sedecim uino Italico subiguntur. usus est ex ouo.

ALIUD DIA SMYRNON AD RHYADAS & ægylopas.

Cadmie lotæ, lapidis hæmatitis eloti, singulorum denarii uiginti octo, myrrhæ, spodii Cyprie, singulorum denarii uiginti quatuor, opii denarii octo, croci denarii quatuor, (alii octo) piperis albi grana triginta, gummi denarii sedecim: uino Italico teruntur. ex ouo adhibetur collirium: si uitium sit recens, aquatum.

STACTICVM PROSECHII.

Cadmie, gummi, singulorum drachmæ uiginti, stimmi, atramenti sutorii, singulorum drachmæ octo, opii drachmæ quatuordecim, eruginis rasæ drachmæ decem, piperis albi drachmæ sex, croci drachmæ octo, misyos crudi tantundem, opobalsami drachmæ quatuor: aqua conteruntur.

HYGIDION AMMONII.

Cadmie, æris, singulorum drachmæ sedecim, cerusæ, castorii, aloes, croci, singulorum drachmæ quatuor, squamæ drachmæ quinque, rosarum floris, plumbi usti, singulorum drachmæ octo, lycii drachmæ tres, lapidis schisti drachmæ quatuor, opii drachmæ decem, acacie drachmæ quadraginta, gummi drachmæ quadraginta octo: aqua excipiuntur.

OLYMPOS SEV OLYMPIACVM.

Acacie, spicæ nardi, thuris, singulorum drachmæ octo, æris, cremati eloti, stimmeos usti & loti, cerusæ concreatæ lotæ, cadmie, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, opii arefacti, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ quinque, æruginis rasæ drachmæ

PAV. AEGIN.

ZZ

PAULI AEGINETA

tres, lapidis schisti, squamæ rubræ, lycii indicii, omphacii, singulorum drachma, castorii, rosarum floris, singulorum drachmæ duæ, phœnicobalanorum drachmæ quatuor, similiter ossea palmularum uistarum ligna nuzmero quinque, gummi unciæ quinque, aqua pluuiali superfunduntur, in qua commadescunt tres dies totidēq; noctes, calami odorati, alterci seminis rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, phylli drachma.

NARDINVM.

Cadmie, croci, gummi, singulorum drachmæ triginta sex, æris usti drachmæ octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ triginta, nardi syriacæ drachmæ duodecim, opii, myrrhæ, singulorum drachmæ sedecim: aqua subiguntur.

THEODOTIION MINVS.

Stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ uiginti, æris usti drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, æruginis drachmæ duæ, aloes, meconii, lycii, singulorum drachma: pluuiatili aqua laxigantur.

RHINARIVM.

Lapidis hæmatitis, lapidis schisti, singulorum drachmæ sedecim, æris combusti, cadmiæ, æruginis, singulorum drachmæ octo, opii drachmæ quinque, chalcitidis drachmæ duæ, gummi drachmæ octo: uino excipiuntur.

XYSTER.

Pumicis, misyos, ostreorum, singulorum crematorum unciæ sex, cadmig, opii, chalcitidis ustæ, croci, aloes hepaticæ, castorii, phylli, singulorum drachmæ duæ, stimmi, acaciæ, singulæ unciæ, æris combusti unciæ quatuor, myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drachmæ octo, gummi drachmæ quatuor: aqua coelesti superfunduntur. Nonnulli etiam uinum miscent.

HECATOMBE, AD CICA

trices crassas.

Cadmia uſta lota q̄; æris cremati & eloti, uniuſcuſq̄
que drachmæ octo, ſtimmiſ combuſti, acaciæ rubentis
gummi ſingulorum drachmæ quindecim, aloes, gallæ, &
ruginis uermicularis, caſtorii, lycii, ſpicæ nardi, croci, opii
myrrhæ, ceruſæ, hebeni ramenti, chalcitidis, ſingulorū
drachma, roſarum drachmę ſexaginta: aqua pluuiali
teruntur.

COLLYRIUM EX CORNU,

dia ceratos dicitur, Galeni.

Plumbi combuſti, cornuſ ceruini cremati, ſingulorum
unciæ duæ, ceruſæ, ſquamæ æris, amyli, thuris, ſepiæ te
ſtæ combuſtæ, æruginis, myrrhæ, gummi, ſingulorū un
cia: aqua pluuiali excipiuntur.

COLLYRIUM E THVRE,

dia libanu nuncupatur.

Thuris unciæ ſex, cadmiæ, pompholygis, terræ ſamiæ,
amyli, gummi, ſingulorum uncię tres, ceruſæ unciæ ſex,
ſquamæ æris unciæ quatuor, tragacanthæ unciæ tres, op
pii unciæ ſex: aqua cœleſtis adicitur.

LIBANIVM.

Cadmia elota, amyli, ſingulorum denarii duodecim,
ceruſæ tantundem, ſpodii, pompholygis, terræ ſamiæ,
plumbi uſti & loti, tragacanthæ, ſingulorum denarii oc
cto opii denarii duodecim, gummi denarii quatuor: aq
qua pluuialis additur, & ouorum uiginti albumina. Sūt
qui etiam myrrhæ denarios quatuor addant.

ASTER MAGNI.

Pompholygis, cadmiæ, ceruſæ, ſingulorum drachmæ
ſedecim, plumbi drachmę octo, amyli drachmæ octo
decim, thuris drachmæ decem, terræ ſamiæ drachmæ
duodecim, myrrhæ drachmæ duæ, tragacanthæ, gum
mi, ſingulorum drachmæ octo: aqua additur.

VRANIVM.

Terræ ſamiæ, piperis, ſingulorum unciæ tres, ſpodii elo
ti unciæ, gūmi unciæ quatuor, ſtimmiſ cremati eloti q̄;
unciæ duæ, ſquamę lotę unciæ, opii unciæ duæ, cadmię

PAULI AEGINETÆ

combustæ & elotæ drachmæ duæ: aqua pluuiatilis ad-
miscetur. Carnem inducit repellitq;.

COLLYRIVM EX SVC

co foenugræci.

Cadmia, tragacanthæ, singulorum uncia octo, cerusæ
uncia triginta, amyli tantundem, opii uncia: læuigantur
succo foenugræci.

COLLYRIVM CLEONIS.

Pompholygis, plumbi, singulorum uncia quinque, cro-
ci fescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur uno
cia, gummi uncia duæ: aqua pluuialis additur, aquatum
illinitur.

DIA RHODON, HOC EST

ex rosis, quæ septuagintaduas
uncias pendunt.

Rosarum uiridium uncia septuagintaduæ, cadmiæ u-
stæ & elotæ denarii uigintiquatuor, æruginis rasæ dena-
rii duo, spicæ nardi denarius, squamæ æris elotæ dena-
rii duo, stimmos combusti eloti, opii, myrrhæ, singu-
lorum denarii tres, croci denarii octo, amyli denarii duo
gummi denarii uigintiquatuor: aqua pluuialis ad-
miscetur.

ALBUM DIA RHODON.

Cadmia crematæ & lotæ, cerusæ elotæ, singulorum
libra, amyli, opii, tragacanthæ, singulorum uncia
tres, aloes fescuncia, gummi uncia tres, croci fesc-
cuncia, rosarum unguibus detractis uncia sex: aqua
miscetur.

COLLYRIVM EX ALOE,

dia aloes nuncupatur.

Cadmia, cerusæ, aloes, singulorum uncia decem, rosarum
uiridium uncia sex, amyli uncia tres, opii uncia, tra-
gacanthæ uncia duæ, gummi uncia tres: aqua pluuiati-
lis adiicitur.

CROCINVM DIA RHODON.

Spicæ nardi, rosarum siccarum, aloes, singulorum dra-

LIBER SEPTIMVS. 363

chmæ duæ, alterci albi sesquidrachma, croci drachmæ quatuor & semissis, glaucii uncia sex, sarcocollæ tantundē, opii drachmæ duæ, tragacathæ uncia: aqua pluuialis additur.

5 NILI DIA RHODON.

Rosarum tenerarum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, papaueris obolus, gummi drachmæ quatuor: aqua coelesti excipiuntur.

10 LYNCEVS AD CLARI- tatem oculorum.

Cadmia, æris combusti, guttæ ammoniacæ, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitis, opii Thebani, singulorum drachmæ sex, aloes hepaticæ, fellis taurini, galbani, sagapeni, singulorum drachmæ quatuor, æruginis rasæ, opopanax, salis ammoniaci, singulorum drachma, gummi drachmæ sex: aqua pluuiali teruntur.

PROTEVS AD IDEM, CI- catricesq; extenuat.

20 Cadmia, cerusæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarii quadraginta, piperis sesquidenarius, liquoris cyrenaiici drachmæ octo, croci denarii duodecim, opii Thebani denarii decem, sagapeni denarii duodecim, oliuæ Æthiopice denarii duodecim, auripigmenti, aluminis scissilis, singulorum denarii octo, myrrhæ denarii duodecim, suffiminis ammoniaci denarii uiginti, opopanax denarii sedecim, opobalsami denarii decem, gummi denarii uiginti, aqua pluuiali excipiuntur.

COLLYRIUM EX SVC- co fœniculi.

30 Cadmia pondo drachmæ septemdecim, atramenti indici pondo drachmæ sedecim, piperis longi pondo drachmæ tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenaiici pondo drachmæ octo, opobalsami pondo drachmæ sex, spicæ nardi pondo drachmæ sex, sagapeni, opopanax, singulorum pondo drachmæ quinque, opii pondo

ZZ iii

PAULI AEGINETAE

do drachmæ quatuor, euphorbi pondo drachma, gumi pondo drachma: succo foeniculi lauigantur.

COLLYRIVM EX OPOBALSAMO.

Cadmia, cerusæ, singulorum drachmæ octo, omphacii drachmæ quatuor, piperis albi uncia sedecim, opii drachmæ quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim: aqua pluuialis additur.

THALASSEROS.

Cadmia uncie octo, æruginis uncia duæ, atramenti Indici uncia octo, piperis albi uncia quatuor, liquoris medici uncia, opobalsami uncia duæ gummi uncia sex: aqua adiicitur.

HARMATION.

Guttæ ammoniaci, æris combusti, corticis thuris, singulorum drachmæ quatuor, æruginis drachma, gummi drachmæ quatuor: aqua cœlesti excipiuntur.

COLLYRIVM MALABATHRI

num, quod & Isotheon dicitur.

Cadmia denarii sedecim, æris usti & eloti denarii quatuordecim, opii, lycii Indici, malabathri, nardi Indici, croci, aloes, singulorum denarii duo, cerusæ denarii octo, castorii denarii octo, myrrhæ denarii quatuor, cacia, *stinni, singulorum denarii quadraginta: aqua teruntur usus ex ovo.

COLLYRIVM VINO EX

ceptum, dia cœnu dicitur.

Cadmia lapidis hæmatitis, & schisti, singulorum drachmæ quadraginta, æris usti drachmæ triginta, chalcitidis drachmæ trigintadua, papaueris seminis drachmæ tresdecim: papaueris semen aqua decoquitur, succus expressus aliis adiicitur, quæ lauigantur uino spathite uel aminæo.

ALIUD EX VINO.

Æris combusti, cadmia plactidis, singulorum uncia nouem, lapidis hæmatitis eloti uncia sex, croci, myrrhæ, aloes, suffiminis ammoniaci, singulorum uncia tres, ly

[Reposi-
tū ex Gal.
†Galenus
duo.
*Galenus
stinimi o-
cto, gumi
quadra-
ginta.

LIBER SEPTIMVS. 364

cii Indici, spicæ nardi, singulorum fescuncia, piperis albi grana centum quinquaginta, acaciæ rubentis uncia nouem, gummi uncia tres: uino falerno aut aminaxo teruntur.

5 COLLYRIVM EX DVOBVS

lapidibus ad aspritudinem.

Lapidis hæmatitis, schisti q̄, cassiæ, singulorum denarii octodecim, æris, cadmiæ, opii, æruginis rasæ, singulorū denarii nouem, gummi tanrundem, chalcitidis ustæ denarii sex: aqua teruntur.

10 ARIDVM COLLYRIVM

Galenī, quod oculos tuetur.

Lapidis phrygii, minutim contusi usti que in ollula quousque incandescat, & restincti butyro non ueteri, deinde iterum similiter cremati, extinctique uino falerno, ac tertium usti & extincti melle siccatio que pondo libra, gris cremati, piperis albi, phylli, singulæ uncia, stinmi fescuncia: omnibus in læuorem detritis quum medicamentum ab igne aufertur, liquoris balsami non crassi, (id enim arefcere medicamentum prohibet) sed lucidissimi unciam iniicias. Vti autem eo conuenit in palpebris duntaxat, sic ut specillo illato tunica non attingantur, sed ut solum medicamentum palpebris apertis illinatur.

25 Inungi autem debet non semel, uerum sæpius, tum ante cibum, tum secundum ipsum, magisque ubi iam lippitudo sentitur. Miraculum enim est, quàm omni alio medicamento securius ab iniuria uindict.

ARIDVM DIA CROCV.

30 Sarcocollæ drachmæ octo, croci drachmæ quatuor, glaucii tantundem: inungitur frequenter die. Nonnulli uero aloen quoque miscnt.

ALIVD ARIDVM AD SIC

35 cam lippitudinem quæ xerophthalmia dicitur, sycosin, sepedonas carnis excrementas.

ZZ liii

PAULI AEGINETAE

Cadmia denarii decem, chalcitidis denarii uiginti, piperis grana quindecim, nardi gallicae denarius: teritur cadmia & chalcitis cum uino: ubi inaruerint, reliqua adiiciuntur, cogunturq; in pollinem.

HYGRA, HOC EST, LI

quidum collyrium, ex caucalide.

Caucalidis succi, chama dryos, coronopodis, interdum & othonnae succi par mensura. Est autem othonna magnum chelidonium.

ALIVD AD SYCOSIN, QVÆ

est ueterrima palpebrarum asperitudo,

encanthidas & excrescentiam

carnis.

Misyos tosti drachmae sex, atramenti sutorii drachmae quatuor, mellis attici sextarius.

ERASISTRATI PANCHRESTOS

hygra, mirifica est in oculariis uitiis, tonsillis

pudendis & auribus suppurantibus.

Aeris denarii sex, misyos tosti, myrrhae, singulorum denarii tres, croci sesquidenarius, piperis denarius, uini chii & passi cretici, utriusque sesquihemina: omnibus in uino laeuigatis, dum inaruerint, passum superfunditur, & usque ad melleam spissitudinem incoquantur.

AGGLVTINAMENTA OCULORUM

qui defluxionibus infestantur.

Tetrae samiae, mannae, thuris, myrrhae, pares modi, oui aquato excepti, in linteumque illiti fronti imponuntur.

ALIVD

Alterci seminis drachma, opii tantundem, myrrhae drachmae duae, croci drachma, farinae pollinis drachmae quatuor, ouorum tostorum lutea duo, albumine oui excipiuntur.

DE EMPLASTRIS, ET MEDICAM

mentorum quæ in illa mittuntur coctione,

tum qui ceræ modus cum oleo esse

debeat, ex commentariis An-

tylli. Cap. XVII.

- M**edicamentorum quæ emplastri ingrediuntur, alia sunt terrestria, utpote metallica, lapidumque & terræ species, flores, cinis, & conchylia, alia sunt oleamenta, alia lachrymæ, alia liquari possunt: quædam liquores, quædam succi sunt: semina uero, herbas, & radices modicas recipiunt. Cæterum ex ipsis emplastris nonnulla sunt uulneraria, quæ enagma, quod cruentis iniiciantur: colletica, quod glutinent: & catagmatica, quod fracturis accommodentur, appellamus. Constat re autem ex siccantibus non summe, uerum secundi ordinis absoluti, & tertii incipientis, oportet, cuiusmodi sunt salix, quercus, cupressus, piceæ & tedæ cortices, myrrhuris lachryma, bitumen, aloë, aristolochia, cinis sarmæotaceus, cerusa, spuma argenti, & pleraque ex metallicis.
- Coqui debet quousque manus amplius non inquinetur. Porro quæ cicatricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus componuntur, uerum efficacioribus quam glutinatoria, quod genus est, æs combustum, squama tui eius tui ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumine, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostreacea. Digerentia uero & calefacientibus & siccantibus modice fiunt, nempe aristolochia, thapsia, oleo ueteri, & raphanino melle, opobalsamo pice, resina terebinthina, galbano, sale combusto, salis flore. Quæ emolliunt, ex argenti spuma, adipibus, medullis, oleo ueteri, propoli, ammoniaco, styrace, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel radice althææ & cucumeris syluestris, præparantur. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad extrahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro, propoli, æruginè, fermento, stercore, sulfure terebinthina. Quæ concoquunt, ex cera, ladano, uua passa, amomo

PAULI ÆGINETÆ

croco, thure, pice, mastiche Ægyptiastyrace, myrrha, galbano, butyro, hyssopo, adipe, æruginē. Pus mouētia ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chōdro, butyro, adipe suillo & uitulino, thure, pice, resina. Quæ uero leniūt, argēti spuma constant, cerusa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, cera tracta. Iam uero enæma dicta, recentibus adhuc uulneribus & fracturis iniici debent, adiutariq; summa splendorum parte spongiis postea madentibus, simul illigatis, solui tertio quoque die, & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahunt, digerunt, concoquunt, & pus præterea mouent, post cataplasmatum ceratorumq; usum adhibentur. Quæ leniunt etiam per initia statim, summis potissimum partibus applicantur. Cæterum quomodo coquantur, deinceps exequemur.

BASILICVM TETRAPHARMACVM.

Ceræ, resinæ colophonix, picis, seui taurini, pares portiones.

EMPLASTRVM EX SVCCO

lini seminis, digerens detergensq;.

Olei ueteris dupondo, ceræ uncia uiginti, resinæ colophonix, adipis suilli, singulorum pondo & dimidiū, argenti spumæ pondo, cerusæ uncia sex, succi lini seminis tantundem, farinæ pollinis uncia, thuris uncia quatuor.

EMPLASTRVM EX MEL

le, dia melitos dicitur.

Argenti spumæ, ceræ, olei, singulorum libræ quatuor, terebinthinæ resinæ libræ duæ, mellis, adipis suilli, singulorum libra.

ALIVD.

Argenteæ spumæ libræ sex, olei libræ quinque & semis, resinæ colophonix libræ septem & semis, ceræ libræ tres & semis, mellis libræ tres.

EMPLASTRVM A SVCCO

dia chylon dictum.

LIBER SEPTIMVS.

366

Argenteæ spumæ pondo *sex, olei, æstate quidem pondo septem, hyeme uero pondo nouem scœnugræci† semisextarius: lini seminis tantundem, * althææ trepondo: althæa, seminaque in uiginti aquæ sextariis discoquuntur, quousque paululum ex ea relictum fuerit, inde succi pondo quatuor, exprimuntur miscenturque oleo ac incoquuntur dum ebullire desierint, post hæc argenti spuma in tenuissimum pollinem detrita inspergitur, postremo omnia igne non acri excoquuntur usque dum digitos intinctos non inquinent.

* Oribasius duo.

† Oribasius sextarius.

* Oribasius althææ radicis.

EMPLASTRVM EX POLLINE

farinaceo, dia gyreos appellatum.

Farinacei pollinis, guttæ ammoniaci, singulæ libræ, resinæ è picea derafa, ceræ, adipis suilli, singulorum libræ duæ, succi lini seminis quod satis est.

EMPLASTRVM AB HERBIS

botanicum dictum.

Lapathi rheelæi, anchusæ chœro spelethi, hoc est, onocleæ, heptaneuri, plantaginis, singulorum uncia tres, olei libræ sex, adipis suilli tantundem: herbarum oleo excoctæ proiciuntur, reliqua cum oleo eliquantur.

EMPLASTRVM EX HASTV

la regia, dia asphodelu dicitur.

Hastulæ regię radicis succi libra, rosacei, chamæmelini, adipis anserini, singulorum uncia duæ, adipis suilli uncia tres, ceræ uncia quatuor.

EMPLASTRVM E FERMENTO

to, abscessus rumpens.

Fermenti axungia, singulorum uncia sex, salis uncia quatuor, piceæ resinæ uncia tres, ceræ uncia quatuor, aphronitri uncia, guttæ ammoniaci uncia duæ, mellis uncia sex, saponis uncia duæ.

EMPLASTRVM DOTHIENE.

Suffiminis ammoniaci pondo nitri Alexandrini uncia sex, aphronitri tantundem, adipis suilli pondo duo, ceræ

PAULI AEGINETAE

totidem, resinae terebinthinae pondo, olei ueteris uncia,
aceti quod satis est.

EMPLASTRUM EX RADICIBUS

ce lanaria, dia struthiu dicitur, struthiu

mas discutiens.

Argenti spuma, radice lanaria, aristolochia, singulorum triens, galbani, squamae aris, aloes, singulae uncia, manna sextans, stilla ammoniacae selibra, resinae picea uncia sedecim, acetum scillini sextarii quatuor, ad aridorum lauationem.

SMILION AD ABSCESSUS.

Olei ueteris sesquilibra, argenti spuma, nitri rubri, salis ammoniaci, cineris lixiui e ficu qui primus destillauerit, protostactos dicitur, resinae, singulorum libra, galbani, guttae ammoniaci, singulorum unciae tres, atramenti sutorii unciae quatuor, cerae unciae sex, aeruginis, opopanax singulorum uncia, acetum quod satis est: argenti spuma & aerugo in oleo coquantur dum manus non inquinant, deinde reliqua admiscuntur.

EMPLASTRUM DIA SCORODON

rodon, hoc est, ex alliis, ad rumpendum.

Cerae unciae sex, resinae colophonae unciae quatuor, resinae pityinae, hoc est ex picea arbore unciae tres, seu ita uirini unciae quatuor, nitri rufi sescuncia, allia pura uiginti, olei dimidium sextarii: allia in oleo excocta proliciuntur, reliqua miscuntur.

EMPLASTRUM DIA APYRANI

ranu ad discutendum.

Adipis anserini, & fassianorum, singulorum unciae tres, olei ueteris unciae uiginti sex, herbae pulicaris unciae tres, urticae seminis, radice apyrani uiridis, singulorum libra, cerae tractae unciae decem, emplastri quod dia chylon inscribitur unciae duae, resinae terebinthinae uncia. Radix apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo madescit, semenque urticae per noctem & diem: ac ubi ex

LIBER SEPTIMVS. 367

cocta fuerint, ipsa quidem proiiciuntur: quæ liquari possunt, oleo mixta soluuntur.

EMPLASTRVM PYRINE,

ad duritias & scirros.

- 5 Althææ, palmularum, aut dactylorum qui nicolai dicuntur, singulorum libræ duæ, fœnugræci, lini seminis, singulorum sextatii dimidium, chamæmeli, meliloti, palmularum corticis singulorum uncia sex, uini aminæi sextarii dimidium, spumæ argenti libra, cerusæ, resinæ colophonix, singulorum libræ due, ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum libra, olei ueteris libræ quinque, aquæ libræ duæ, panis aridi cõtusi cribratiq; libræ quinque: herbæ in uino decoctæ exprimuntur, succo panis immadescit, sequenti die læuigatur, argenti spuma, cerusaq; in aqua, deinde oleo iniecto incoquuntur, dum medicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua adduntur, sublatis ab igne panis inditur, ualideq; rudicula agitur, addiguntur etiam æruginis rasæ & salis floris, singulorum uncia sex, iridis, aristolochiæ, singulorum uncia sex, Lte rebinthinæ resinæ libra.]

Aut re-
dundat,
aut duo
sunt em-
plastra.

PELARION EX SCORIA

argenti, dia helcysmatos dicitur,
ad similia abrasis.

- 25 Cera seui taurini, singulorum uncia quinque, scorix argenti uncia sex, resinæ colophonix uncia quatuor, piscis olei, singulorum uncia duæ, scoria argenti arida læuigatur uino uel succo fœnugræci: quod si scoria desideretur, plumbagine utimur.

EMPLASTRVM EX AL-

- 30 tæ, podagricis aliisq; duritiis
accommodatum.

- Succi fœnugræci, & lini seminis, & althææ, singulorum trepondo, olei dupondo: incoctis usque dum succus absumatur, colophonix resinæ pondo, adiicitur, item terebinthinæ resinæ pondo, hederæ lachrymæ quadrās: ubi soluta fuerint, & ab igne sublata, ceræ pōdo iniicitur

PAULI AEGINETAE

galbani triens: utraque simul confusa solutaque rudiculus agitatur.

CISSINVM AD NERVORVM

uulnera, punctus, & maxime diuturna.

Squamæ rubræ uncia quatuor & semis, thuris uncia, misyos sescuncia, chalcitidis drachmæ quatuor, aceti sex: læuigantur æstiuo sole usque dum acetum fuerit consumptum, deinde solutis ceræ uncias octo, olei octodecim misceto. Si autem diuisus fuerit neruus & nudus sit, in uicem galbani, resinæ terebinthinæ uncia duæ induntur.

MELANCHLORON AD EADEM, & cruentis aptum.

Malicorii, æris combusti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, aluminis scissi & liquidi, (alii uice liquidi rotundum ponunt) iridis, misyos, atramenti sutorii, chalcitidis, æruginis rasæ, cadmiæ, aloes, myrrhæ, thuris, panacis radicis, argentis pumæ, cerusæ, pares omnium portiones, teruntur in sole æstiuo cum aceto diebus pluribus, singunturque pastilli. Emplastrum uero sit hunc in modum: medicamentum uncia duæ, ceræ uncia sex, olei uncia octo, in neruorum uulneribus ueteris, in allis communis, temperantur.

EMPLASTRVM EX SENE

tione, quod dia erigerontos dicitur.

Senelionis succi libræ duæ, olei ueteris sesquilibra, cyprini olei uncia quatuor, axungia ueteris libra, resinæ terebinthinæ uncia, galbani semuncia, resinæ pisceæ uncia sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamenti, singulorum uncia, squamæ æris scrupula octo, ceræ uncia decem, apochymatis uncia quatuordecim: oleum & succus ad sordium spissitudinem incoquitur cum adipe suillo: arida cyprino læuigantur, galbanum cum cera contunditur & cacabo demittitur, apochyma si quidem siccum fuerit, læue incretum ponderato inspergitoque: quod si in læuorem deteri nes

queat, portione olei solutum excipiat, atque tunc omnia misceantur.

EMPLASTRVM MNASÆI DISCVTIENS.

5 Cera, axungia porcina, singulorum libra, resina colophoniae uncia sex, argenti spumae librae duae: uini generosi librae quatuor adiciuntur.

ARIOBARZANION, AD eosdem affectus.

10 Argenti spumae sescuncia, cerusae libra quincunx, aquae marinae unciae uiginti quinque, olei ueteris sesquilibra, buccinorum concrematorum unciae septem & semis, cerae rufae unciae nouem, resinae terebinthinae unciae sex, thuris unciae tres scrupula tria & dimidium.

15 EMPLASTRVM EX DRACVNCVLO.
Cera, resina colophoniae, picis aridae, axungiae, resinae, singulorum librae quatuor, guttae ammoniacae librae duae, dracunculi radices librae quinque: radix arida laevis aliis solutis inspergitur.

20 PSITACIVM.

Cera, resina colophoniae, adipis suilli, alterci foliorum tenerorum, uel succi eorum, aequalis modus. In Alexandria autem cerae librae duae semis, alterci librae duae, axungiae librae duae, semis, colophoniae resinae librae decem miscentur, magisque discutit medicamentum.

MYRSINATVM.

Argenti spumae, cerusae, sandycis, plumbi combusti & eloti, singulae unciae, cerae unciae sex, olei myrtei libra, uini quod satis est.

EMPLASTRVM EX CERVO SA, VEL OVIS.

30 Cerae trassae unciae sex, rosacei sesquilibra, argenti spumae unciae duae, cerusae tantundem, amyli unciae tres, uorum quinque aquata.

PAULI AEGINETAE
EMPLASTRUM, QVOD LIQVI

dum sit parygrum uocatum, Oribasii,
Argentæ spumæ fescuncia, cerusæ tantundem, ceræ
triens, pinguis suilli septunx, resinæ colophonæ dodrās
lini seminis succi olei, singuli dextantes: mirifice facit ad
calcanei rimas, in ulceribus autem (inquit) uitant, nam
ea tetri odoris reddit.

EMPLASTRUM DIA CAD

mias, cicatricem inducens.

Calcitidis ustæ uncia duæ, cadmiæ, manne, singulorum
uncia, ceræ, resinæ colophonæ, olei myrtei, singulorum
libra, uini quod satis est.

PALMVLATVM, PHOENI

cine dicitur.

Axungia ueteris libræ duæ, olei libræ tres, argenti spu
ma tantundem, chalcitidis crudæ uncia sex: primum
chalcitis cum oleo in pila commodiore læuigatur, uel
in sole: nbi sordium spissitudo facta fuerit, etiam spuma
argenti prius detrita superiniicitur, postea adeps: post
quam probe in pollinem redacta, fuerint, leni igne inco
ques, quoad digitos non inquinent, palmarum rudicu
la agitans.

EMPLASTRUM EX AN

chusa, ambustis efficax.

Ceræ tractæ uncia nouem, rosacei uncia octodecim:
his liquatis porphyridos anchusæ radicis siccae læuis
ma uncias quatuor inspergito.

ALIVD.

Anchusæ radicis uiridis, marrubii, gummi, singulorum
uncia tres, decoctæ in olei unclis nouem proiciuntur,
oleo ceræ tractæ uncia quindecim superiniiciuntur, om
niaq; soluuntur.

EMPLASTRUM EX POM

pholyge, pompholygeron appellatū.

Pompholygis uncia duæ, argenti spumæ uncia tres læ
uigantur cū lini seminis succo, adiiciuntur ipsis liquatæ
refrigeratæq;

refrigerataq; cera uncia sex, adipis anserini uel gallina
cei uncia dua, chamæmelini uncia sex.

PHILOCOTYCHE DOLOREM

leniens, ad sedem utilis.

Thuris uncia septemdecim, myrrhæ uncia septem, opii drachmæ quatuor, aluminis scissilis drachmæ dua, butyri drachmæ quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmiæ crematæ & elotæ drachmæ quatuor, pholygis drachmæ sex, ceræ tyrrenicæ drachmæ octo, adipis anserini drachmæ sedecim, medullæ ceruinæ drachmæ undecim, plumbi cremati eloti q; drachmæ nouem, lapidis hæmatitis drachma, hyssopi liquidi drachmæ quatuor: arida læuigantur cum uino Italico: quæ liquari possunt, admiscuntur.

EMPLASTRVM AMITHAONIS

ad articulos recenti cicatrice cōtractos, conuulsosq;: est etiam ad extrahendum efficax.

Ammoniæ, ceræ, bdellii, singulorum drachmæ octo, resinæ terebinthinæ, iridis illyricæ, galbani, singulorum drachmæ uiginti.

EMPLASTRVM ARISTOPHANII

nium emolliens.

Picis libræ quatuor, apochymatis libræ dua, ceræ libra, opopanacis uncia, aceri hemina.

EMPLASTRVM EX PLUMBAGINE

ad calidos affectus.

Plumbaginis uncia quatuor, spumæ argenti uncia dua, cerusæ tantundem, ceræ uncia octo, myrtei libræ dua: uino læuigantur arida.

CORACON EX OXYMELITE, AD

naturalium uitia & nomas accommodatum.

Gallæ uncia dua, squamæ sescuncia, chalcitidis, thuris singulorum uncia: teruntur aceto diebus complusculis, deinde mellis uncia quinque miscuntur: ubi uero seorsim ceratum feceris, ex myrtei uel rosacel uncis duabus, seu taurini uncis octo, ceræ uncis quatuor, resinæ terebinthinæ

PAV. AEGIN.

AAA.

PAULI AEGINETAE

binthinae uncia, mixta simul laeuigato & utitor, quemadmodum medicamento quod charta constat, tum ex penicillo, tum ex linamento.

EMPLASTRUM EX OXELÆO.

Argenti spumæ pars una, olei, aceti, singulorum partes duæ, nonnulli treis ponunt.

EMPLASTRUM EX ACHATE,

discutiens emolliensq;

Lapidis achatis semiuisti fescuncia, ceræ uncia quinque, resinæ frictæ uncia tres, olei uncia.

ISIS CRVENTIS ACCOMMODATA,

data, ad glutinandum, carnem inducendum, & purgandum.

Squamæ æris, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, singulorum denarii octo, aluminis scissi denarii sex, salis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ, singulorum denarii octo, myrrhæ, aloes, galbani, singulorum denarii duodecim, dracunculi radices succi denarii octo, ceræ libra, resinæ colophoniciæ libræ duæ, olei ueteris uncia tres, acetum quod satis est.

ATHENA, AD VLCERA SORDIDA,

impacta, neruorum uulnera.

Malicorii, æris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ & longæ, aloes, guttæ ammoniacæ, squamæ æris, aluminis scissilis & rotundi, iridis, misyos, atramenti sutorii, chalcitidis, æruginis rasæ, cadmiæ, aloes, myrrhæ, thuris propolis, galbani, singulorum uncia, ceræ drachmæ ducentæ, picis tantundem, resinæ colophoniciæ drachmæ centum, olei uncia sex, aceti quod satis est.

EMPLASTRUM DIA DICTAMNI

glutinans, ad canum morsus, & omnigena ulcera.

Argenti spumæ pondo duo, squamæ æris fescuncia, olei ueteris sextarii duo, diphrygis uncia tres, gentianæ fescuncia aristolochiæ, aluminis scissi, singulorum uncia duæ & semis, dictamni tantundem, colophoniciæ pondo, mannae uncia tres, guttæ ammoniaci uncia sex, pro

*Aloes
bis ponit
forte hic
pro salis
ammonia
ci, ut Gal.
habet in e
iusdē no
minis cō
positione

polis uncia duæ, ceræ uncia sex & semis, primum oleum cum argenti spuma incoqui debet dum incrasset, nec digitos inquinet, deinde lebetes deposito æruginem & squamam iniicies, rursusq; incoques, dum manum non inficiant, iterumq; cacabum ab igne tollens, resinam & ammoniacum in cretum adicies, mouens donec feruere desinant, mox in ignem repones, ac ubi modice inferbuerint, æs & diphryges admiscebis, ac rursus coques usque dum firma spissitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaq; discocta ut digitos non coinquinet, propolin immittes, his abunde refrigeratis, mox aloen, mannam, dictamnium, aristolochiam, gentianam, singula læuissima insperges.

BARBARA EMPLASTRVM

quod cruentis protinus uulneribus iniicitur, & fracturarum callos firmat.

Bituminis Iudaici, picis arida, ceræ, resinæ, singulorum libra, terebinthinæ uncia duæ, argenti spumæ uncia, cerusæ fescucia manæ uncie duæ, opopanax uncia duæ, zingiberis uncie duæ, olei uncia tres, aceti q̄tū sufficit.

EMPLASTRVM EX SALICIBVS, DIA

iteon appellatur, glutinans, cruenta excreantibus, & purulentis efficax, thoraci impositum.

Misyos, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scissilis & rotundi, cretæ sutoriæ, singulorum uncia sex, ceræ libræ duæ, resinæ piceæ libræ duæ, picis tantundem, malicorii uncia sex, bituminis libræ duæ, salicis foliorū totidem, olei rosacei uncia quatuor, atramenti sutorii uncia sex, aceti quod satis est, sunt qui terebinthinæ uncias nouem addant.

EMPLASTRVM NICOLAI AD RECENTIA UULNERA, & SINUS GLUTINANDOS APTVM.

Squamæ æris uncia quatuor, æruginis rasæ fescuncia, argenti spumæ tantundem, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum uncia, aluminis scissilis & rotundi, singulorum uncia, atramenti sutorii uncia, sulfuris uiui

PAULI AEGINETAE

uncia, gallæ omphacitidis uncię quatuor, salis ammoniaci uncia, misyos uncia, origani uncia, chamæleontis uncia, cadmiæ botryitidis uncia, ueratri albi uncia, peucedani uncię tres, apii seminis uncię duę, symphyti radicis fescuncia, cerusæ fescuncia, mandragoræ succi semuncia, chalcitidis fescuncia, terræ samiæ uncia thuris masculi uncia, aloes uncia, bdellii uncię duę, opii thebani tantundem, zingiberis troglodytici semuncia, stillæ ammoniacæ uncia foenugraci uncię sex, perdicii herbæ succi uncię sex, ceræ flauæ uncię tres, resinæ colophoniæ libbra duę, resinæ pityniæ, hoc est picea libra, polentæ tantundem, mastiches uncię sex, picis nigre libbra duę, olei ueteris libra, styracis uncia, opopanacis fescuncia, acetii quod satis est.

ICESIOS AD STRUMAS, AB scellus, lienem, articulos & coxendicum dolores.

Argenti spumæ denarii centumviginti, olei ueteris sextarii duo, acetii sextarius, æruginis sesquidenarius, picæ corticis denarii octo, chamæleontis radicis, euphorbii, hypocistidis succi, propolis, zingiberis, helenii, pyrethri, singulorum denarii sedecim, ceræ libbra tres.

EMPLASTRUM NERONIS, ad ictus, omnemque particularum carnosarum dolorem.

Olei ueteris sesquilibra, argenteæ spumæ libra, ceræ, resinæ piceæ, singulorum uncię septem & semissis, guttæ ammoniaci uncię quatuor, cerusæ tantundem, galbani, manna, zingiberis, thuris, singulorum uncia.

OXERA, MULTIPPLICIS VSUS.

Picis aridæ libbra duę, ceræ libra, guttæ ammoniacæ uncia, resinæ terebinthinæ selibra, galbani uncię duę, manna uncię duę, acetii sesquiseptarius.

LIBER SEPTIMVS. 37

ACERATOS, HOC EST CERÆ

expers, emplastrum Galeni, glutinat, concoquit, ulcera ad suppurationem perducit, ex ricinino ueteri oleo, medicaminis, in lintheolos, illiti modo, solutum.

Argenti spumæ trepondo, *olei ricinini, aut ueteris pōdo† quatuor, aceti quāmacerrimi dupondo, æris squamæ nigrae, chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti

spuma cum oleo incoquitur, dum strigmenti fiat spissitudo, deinde metallica compluribus diebus ex aceto laeuigata adiiciuntur.

* Galenus
clei rici-
nini uete-
ris.

† Galenus
quatuor
semis.

EMPLASTRUM EX METALLICIS.

Chalcitidis uncia, misyos uncia duæ, squamæ æris uncia tres, thuris tantundem, colophonæ uncia duæ, galbani sescuncia, ceræ libra, olei quincunx, aceti quod satis est.

ARMENIA FRACTVRIS

accommodata.

Chalcitidis uncia quatuor, squamæ æris uncia duæ semis, æris cremati uncia thuris uncia duæ, olei libra, aceti tantundem: coquuntur metallica in oxelæo, dum maximum non inquinent, inde thus adiicitur.

MELÆNE SERAPIONIS.

Spumæ argenti libra, ceræ uncia septem, guttæ ammoniaci uncia tres & semis, galbani, æruginis, singulorum denarii nouem, resinæ colophonæ uncia septem, myrrhæ drachma, olei sesquihemina: argenti spuma cum oleo incoquitur quousque digiti intincti non inquinentur, deinde adiiciuntur reliqua.

ANICETOS, AB INSVPERABILI

liui appellatum emplastrum, glutinat, discutit, squamas separat, & ad articulos recenticatrice contractos ualeat.

Baccarum lauri, iridis aridæ, thuris, singulorum drachma sexaginta, æris combusti drachmæ uiginti, nitri, salis

AAA iii

PAULI TEGINETÆ

guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ uiginti, pyrethri, herbæ pediculariæ, cachryos, grani gnidii, sinapis, columbarum stercoreis, aristolochiæ, cumini, æruginis, iūci quadrati, erucæ seminis, singulorum drachmæ octo, aceti hemina duodecim: laugantur: sub æstu caniculæ, quousque acetum consumatur, deinde decocti caricarum crassissimi uncia nouem adduntur, quibus mixtis pastilli fiunt, siccanturq; ubi utendum est, pastillorum ipsorum uncia duæ laugata aceto miscentur, resinæ uncia tres, ceræ tyrrhenicæ uncia duæ, olei tantundem.

EMPLASTRUM EX LOLIO,

diæ æron dicitur.

Picis libræ duæ, resinæ picæ uncie nouem, ceræ tyrrhenicæ uncia quinque, olei uncia tres, bituminis incrementi uncia duæ, lolii farinæ sextarius, aceti quantum sufficit.

EMPLASTRUM EX LIQVO

re sycamino.

Argenti spumæ, picis aridæ, seu taurini, singulorum uncia octo, terebinthinæ uncia tres, ceræ uncia quinque, æruginis rasæ, opapanacis, galbani, singulorum uncia, olei ricinini, aut susini, aut admodum ueteris hemina, picis liquidæ tantundem, liquoris sycamini cuius fructus sycomora dicuntur, hemina.

EMPLASTRUM A DVPLICI

colore dichromon appellatum.

Aeris combusti, aluminis scisilis, guttæ ammoniaci, singulorum uncia, ceræ libra, resinæ colophonix libra, seu ui suilli libra, aceti quod satis est.

INDICE AD VLCERA QVÆ

serpendo depascunt, & sanguinis sputum.

Ceræ, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zaccynthi, singulorum libra, cerusæ, chalcitidis, misyos, cretæ sutoriæ, aluminis scisilis & rotundi, gallæ omphacitidis, mallicorii, singulorum uncia sex, aceti quod satis est.

EMPLASTRVM EX CINERE

aspidum, discutit strumas & podagras.

Resinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudaici, singulorum denarii trecenti sexaginta, ceræ, baccharum lauri, stillæ ammoniaci, aphronitri, seui vitulini, singulorum denarii trecenti quadraginta, lapidis, pyritidis, calcis uiuæ, singulorum denarii centum quadraginta, cineris aspidum totidem, olei ueteris heminae duæ: refrigerato medicamento cinis inspergitur. fit etiam sine cinere, quod nonnulli eum auersentur, & nihilominus etiam lapis asius efficiat.

LEÆNA, SICCAT, DIGERITQVE.

Suffiminis ammoniaci, plumbaginis, singulorum denarii centum, sinapis denarii octo, chamæleontis radicis denarii sedecim, resinæ colophonis denarii centum, squamæ æris, lanariæ, radicis, singulorum denarii quinque, euphorbii, æruginis, singulorum denarii octo, aristolochiæ denarii sedecim, pyrethri denarii octo, olei ueteris hemina, raphanini quantum sufficit.

ALITER LEÆNA, CORPVS

recolligit, humoresq; euacuat.

Atramenti sutorii uncia duæ, auripigmenti uncia, ueratri nigri, thoracum cantharidum, singulorum sesquidrachma, sandarachæ uncia tres, ceræ sesquilibra, resinæ frigida libra, olei heminae duæ.

MACEDONICVM.

Ceræ, resinæ colophonis, picis, seui taurini, lachrymæ thuris pares portiones: eliquatis, ac sublati ab igne lachryma thuris inspergitur.

SPHÆRION AD ARDORES.

Ceruse argenti spumæ, calcis uiuæ, singulorum uncia tres, ceræ sescuncia, berenicarii, rosacei, singulorum uncia: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi formantur, quum usus incidit, olei uncias sex liquato cum duabus ceræ, adiectoque medicamenti unciam & agitato:

AAA iiii

PAULI AEGINETAE

refrigeratum ex aqua unclis nouem contundito, ego etiam ternas rosacei uncias addo.

EMPLASTRUM EX OCHRA,
inflammationem arcet, tum sponte, tum in iudicio, tortis idoneum.

Ochrae atticæ libræ duæ, cretæ libra, argenti spumæ uncia octo, uino læuigatæ, ceræ, resinæ colophoniar, picis, resinæ piceæ, singulorum libra, resinæ terebinthinæ uncia octo, olei libræ duæ hunc in modum soluantur: ceræ libra, olei ueteris libræ tres, medicamenti libra, uino conteruntur.

EMPLASTRUM EX CEDRIA,
glutinat, digerit, abstergitq;.

Ceræ picis, singulorum libra, resinæ colophoniar uncia octo, cedrini liquoris uncia sex: liquata simul incoquantur, dum digitos non coinquinent.

ALIUD EMOLLIENS.
Ceræ, picis, singulorum uncia octo, resinæ colophoniar drachmæ uiginti quinque, propoleos drachmæ septem, cedrini liquoris drachmæ uiginti.

EMPLASTRUM EX PVMICE,
ad cicatricem ducendam.

Myrtei libræ duæ, ceræ libra, pumicis cremati uinoq; resincti drachmæ sex, squamæ ferri quod stomoma dicitur drachmæ sex, æris usti, cimoliæ singulorum drachmæ quinque: super linamentum spongiamq; ex aqua accommodato.

EMPLASTRUM PAULA, STRVM
mis & bubonibus efficax.

Ceræ, resinæ colophoniar, nitri, singulorum libra.

EMPLASTRUM DIA NITRVM,
ad carbunculos.

Nitri tosti uncia tres, ceræ, olei, resinæ colophoniar, singulorum sesquidrachma, liquoris cyrenaici aut medici drachmæ decem: imponitur in linteolis solutum.

LIBER SEPTIMVS. 379

EMPLASTRVM EX ANEMONE.

Anemonæ unguibus detractis uncia duæ, ceræ uncia quinque, olei uncia quatuor, resinæ uncia quinque & semis, colophonix resinæ libræ duæ & semis.

EMPLASTRVM MACHERIONIS

uiride, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, & abscessus.

Opopanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, iridis, guttæ ammoniaci, aristolochiæ, singulorum uncia, resinæ terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorum uncia septem.

VIRIDE ALIVD SIMPLEX.

Resinæ libræ tres, ceræ libra, æruginis rasæ selibra, thuris drachmæ uiginti quinque, aceti quod satis est.

ALIVD VIRIDE, AD HVMIDA

uitia & carnis excrescentias.

Resinæ colophonix uncia sex, æruginis rasæ sescuncia, ceræ uncia duæ, salis Cappadocii uncia, rosacei uncia duæ, aceti quantum sufficit.

PEGANERA AD PLEVRITICOS.

Rutæ uiridis pondo, butyri sesquipondo, resinæ terebinthinæ pondo & quadrans, hyssopi medicamenti tantumdem, opopanacis quadrans, galbani tantundem, anethi pondo.

EMPLASTRVM DIA STACTES,

hoc est ex cinere lixiui stillatio, coxendicum doloribus, articulariis, & tumoribus oedema referentibus, utile.

Ceræ, olei ueteris, cineris lixiui qui primus destillaue-
rit, singulorum libra, resinæ frictæ, nitri Alexandrini, ni-
tri albi resinæ terebinthinæ, singulorum uncia sex: utrum-
que nitrum lixiui teritur.

EMPLASTRVM E NITRO AD

abscessus, scirros, & tumores.

Olei ueteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiui, singulorum libra, resinæ, terebinthinæ uncia sex, galbani, propolis,

PAULI AEGINETAE

guttæ ammoniaci, singulorum uncia: præparatur quem
admodum superius.

EMPLASTRUM EX SALE,

dīa halon dicitur.

Ceræ pondo uncia quatuor, olei pondo libra, salis com-
munis pondo uncia quatuor, aphronitri tantundem, ce-
rusæ pondo uncia octo, aceti pondo uncia duæ, ad as-
rida conterenda. ALITER. Salis communis, nitri singu-
lorum uncia quatuor, ceræ, olei ueteris, singulorum un-
cia sex, aquæ marinæ quod satis est.

EMPLASTRUM DIA PTERNES,

ex perna, tophos soluit.

Pernæ suillæ ueteris pinguis, guttæ ammoniaci, casei ue-
teris uaccini aut caprilli, seui taurini, apochymatis quæ
est nauiis rasura, singulorum libra, medullæ ceruinæ, un-
cia octo, hyssopi cerati uncia tres, cyprini olei uncia sex
uini Aegyptii quod satis est.

EMPLASTRUM DIA CINNABA

reos, hoc est ex cinnabari ad tophos alios;

omnigenos tumores induratos,

dicitur pamplethes.

Argenti spumæ libra, olei ueteris sextarius, squamæ æ-
ris uncia, æris usti tantundem, cinnabaris scrupula octo
decim, lapidis magnetis uiui uncia, lapidis phrygii dra-
chmæ sex, lapidis pyritidis, cadmiæ, eruginis rasæ, thuris,
singulorum uncia, diphrygis uncia duæ, aloes seiscuncia
galbani tantundem, lapidis onithis scythici scrupula o-
ctodecim, lapidis hæmatitis uncia, propolis libra scru-
pula uiginti octo, ceræ uncia septemdecim, lapidis per-
dicitis uncia, (in alio perdiciati habet) betonicæ uncia
scrupula octo, gentianæ uncia, aristolochiæ longæ & ro-
tundæ drachmæ quatuor, *chamæleontis nigri uncia,
dictamnii scrupula quadraginta duo, resinæ aridæ libra,
seui struthiocameli libra: lapides cum spuma argenti te-
runtur seorsim, adiectis salis floris libris duabus, donec
totum absumatur.

*Græcū
habebat
adiectū se-
mūcia ni-
mizsuper
flue, nisi a
liquid de
sit.

EMPLASTRVM EX AVELLA

nis, dia leptocaryon dicitur, ad articulorum
trophos probatum.

Cineris lixiui qui primus destillauerit unciae sex, auellana-
narum partis interioris unciae duae, aphronitri uncia sex
olei ueteris libra, saponis gallici unciae quatuor, mellis
unciae octo, ouorum sex aquata, cerae unciae decem, resinae
terebinthinae unciae duae: laeuigantur ex lixiuo.

DIA TURPÆNES CERATVM

ad podagram, dolorem leniens mirabiliter.

Quinto Martii mensis die, olei communis sextarios
duos lebeti in domo subterranea infundito, coquitoq;
lignis è uite: ubi inferbuerit, turpenae marini piscis libra
adiicito, asphalacis animantis quod nonnulli madamu-
dam uocant, sanguinis uncias quatuor, incoquitoque
dum carnes piscis dissoluantur aut torrefiant, deinde ex
emptis illis, olei & cerae momentum adiicito in spissitu-
dinem, ut mollissimum fiat ceratum, quod linteolo illis-
tum impones.

MEDICAMENTVM EX VRIN

na muli, podagricis utile.

Vrine muli sextarii quatuor, argenti spumae librae duae,
olei ueteris, mystrum, trita diu omnia ut strigmenti
spissitudo fiat, incoquito donec digitos non inquina-
nent.

MEDICAMENTVM EX LAPIDIS

pidis asii flore, Philagrii ad scirros.

Peucedani radice, asii lapidis floris, si non adsit, salis,
guttæ ammoniacæ, lanarum succidarum crematarum,
singulorum uncia, aristolochiae rotundæ, pumicis,
canini stercoris, æruginis rasæ, squamæ æris, misyos sin-
gulorum scrupula octodecim, castorii tantundem, myr-
rhæ unciae tres, aceti quamacerrimi tantundem, cerae un-
ciæ duodecim & semis, resinae è picea, picis brutiæ, sin-
gulorum unciae octodecim, semis, scrupula sex, olei ue-
teris quod sufficit.

PAULI AEGINETAE
EX EODEM, GALENI.

Cera, resina terebinthina, singulorum libra, lapidis asii,
manna, singulorum tres unciae, cyprini unciae duae, aq li
xina quantum satis est.

MEDICAMENTVM EX SA

lis flore, articulariis in declinatione
accommodatum.

Resina terebinthina, resina fricta, resina e picea, cera,
singulorum libra, picis aridae, aluminis scissilis, salis flo
ris, singulorum selibra: coquuntur in lebet.

MEDICAMENTVM QVOD

nutriendae ulcerum carni est.

Rosacei, resina terebinthina, mellis, singulorum unciae
duae, cerusae, butyri, singulorum uncia, alii etiam thuris
unciam addunt.

MEDICAMENTVM ITALICVM

ad purgandum sordida, inducendumq; carne.

Erinai (dico autem sylvestris ficus) tenerum corticem
oleo excoctum proicito, cerae rufae quantum satis est
in oleo liquefacito, in linamenta illito utitor.

ENTATICON, QVASI DI
cas intensorium.

Satirii pudendi ceruini, scinci cauda, singulorum drach
mae duae, eruca seminis, pyrethri, cachryos, cerae, singu
lorum drachmae quatuor, resina terebinthioae drach
ma, oua passerum troglytarum tria, stelliones transmari
ni tres, olei laurini uel irini quod satis est: macerantur ui
ui in aceto stelliones ad dies triginta, uase cui insunt in fi
mo defosso.

CHRYSE, CRVENTIS VVL
neribus accommodata.

Thuris, aluminis scissilis singuli sextantes, colophoniae
resinae libra, olei quadrans, auripigmenti sextans, oxe
lai quod satis est.

CATAGMATICE QVOD EST

fracturis idoneum medicamentum, Oribasii.

Picis brutæ libra, uncia quatuor, argenti spumæ tantum
dem, thuris uncia octo, resinæ terebinthinæ uncia quin
que, seui taurini libra, uncie quatuor, galbani, opopana
cis, singulorum uncia, ceræ uncia quatuor, olei ueteris
libra, aceti uncia quinque.

CATAGMATICE AD FRACTV

ras cum uulnere citraque id factas, ex com
mentariis Heracleti.

Picis aridæ mina, argenti spumæ tantundem, mannæ
mina dimidium, seui uitulini mina, ceræ tyrrhenicæ una
cia uigintisex, opopanaeis uncia octo, æruginis rasæ,
æris cyprii, singulorum minæ quinque & decima eius
portio, resinæ terebinthinæ sesquimina & quinta por
tio, æris uncia, ricinini, aut olei ueteris hemina, aceti he
mina semis.

LIQVIDI HYSSOPI ME

dicamenti præparatio.

Sertulæ campanæ uncia quatuor, cardamomi uncia
duæ, lanarum bene sordidarum uncia sex: macerata in
uini duobus sextariis ad triduum incoquito, dum pau
lulum fuerit reliquum. his ablatis miscentur uino olei
uncia tres, coquanturque dum exiguum superfit, atque
uino etiam tunc adficiuntur resinæ colophonæ uncia
decem, terebinthinæ tantundem: nonnulli uero & ceræ
dextantem miscent hyssopi herbæ unciam, aliisq; inco
quunt: alii lanas uino eluunt: ubi defecarint, uinum cū
sordibus lanarum addunt, quas pinon etiam appellant.
quum usus incidit, treis ex eo uncias mittūt, tum reliqua
ut comprehensum est.

QVOMODO MEDICAMENTA

quæ emplastra ingrediuntur coqui debeant.

ARGENTI SPVMA.

In medicaminum coctionibus argenti spuma cum o
leo decoquetur. Conuenit autem læuigatam rursus ex
oleo conterere, ut sordium fiat spissitudo, inde leni igne
continenter excoquere, mouēdo, initio igitur intumescit

PAULI ÆGINETÆ

& in bullas attollitur: ubi uero iam fere satis incocta fuerit, colorem faci similiorem recipit. Modus coctionis est, quum à tumore subsidet, & manus non inquinat.

PLUMBAGO.

Plumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eousque dum non modo digitos, non inquinat, uerum etiam ex igneo colore in rufum & uehementer floridum elanguescat.

ÆS CREMATVM.

Æs crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit, finis coquendi est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superet, & emplastrum rufum efficiat.

SORI ET DIPHRYGES.

Sori & diphryges demittuntur & ipsa inter coquendum lebeti: diphryges autem sicut & squama, eousque coquitur dum colore reliqua uincat, sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum reddatur, digitosque non inquinat.

CHALCITIS.

Chalcitis incoquitur æris modo, coctionemque ipsius metimur inde si emplastrum fuluum magis & phoeniceum euaserit.

FLOS ÆRIS.

Æris flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui communis esse coctioni solet.

ATRAMENTVM SVTORIVM.

Atramentum sutorium in media coctione emplastro indatur, coctum uero uehementiorem eius colorem efficit, & si alia ei non resistent, nigrum.

MISY.

Misy postremo adiicitur: quod diu autem coqui debeat, proprie definitum non est.

AURIPIGMENTVM ET

sandaracha.

Auripigmentum & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.

PLVMBVM VSTVM.

Plumbum ustum in media coctione adiungitur.

CERUSA.

Cerusa in alba emplastra postremo mittitur, sic enim colorem conseruat, magisq; albescit: in nigra autem, principio: cocta enim largius, nigrescit.

ÆR VGO.

Ærugo uiridibus emplastris post coctionem iniicitur.

In quibus autem neutiquam ollæ inditur, cum aceto detrita ipsi manentiq; in pila reliqua superfunduntur.

In melinis emplastris quum semicocta est confectio immittitur: nam moderatam consequuta coctionem, melinum colorem efficit. at in his quæ diprosopa & dichroma dicuntur, per initia statim æruginem incoquimus, in quibusdam enim per coctionem primum melinum colorem inducit, qui duplicem representat, postremo rufum.

ALVMEN.

Alumen plerunque secundum coctionem additur, peculiararem uero coctionis modum nullum habet.

MINIVM, CADMIA ET POMPHOLYX.

Minium in fine admiscetur, cadmia & pompholyx per initia immittuntur.

SAL, NITRVM, SVLFVR.

Sal & nitrum in medio coctionis, sulfur, in fine adiicitur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

TERRA ET LAPIDES, pumex, conchyliæ.

Terram omnem & lapides plerunque ad coctionis finem inicimus, item pumicem & conchyliæ combusta.

PAULI AEGINETAE
OLEVM, ET RELIQUA
PINGVIA.

Oleum si quidem per initia fuerit iniectum, resinae aut pici liquidae, emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaserint incocta, recte indetur, reliqua uero pinguia insulsa, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

VNGVETA.

Vnguentum irinum coctionem quidem fert, sed cyprinum & rosaceum, minus: reliqua neutiquam, quare ad finem coctionis immittenda sunt.

CERA.

Cera priuatim sola non coquitur, ut quae aduratur, neque cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturque, uerum superiniicitur, uel oleo puro, uel oleoso cum quodam metallico incocto, aut resinae, aut pici prius incoctae, ac prius quam reliqua quae possunt intici spissescet.

RESINA.

Resina arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia alia ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum eius assumatur.

PIX.

Pix ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, liquidae, dum inspissatur: aridae, maxime dum non amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit.

APOCHYMA, PIX NAVIS

BVS DERASA.

Apochyma laeuigatum cribroque ab excrementis suis secretum, emplastro posteaquam coctum fuerit, inspergitur. Si autem molle fuerit, cum oleo soluitur, sed prima ratio coquendi exactior est, quod scilicet in secunda potius non conseruetur.

BITVMEN.

Bitumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in laeuorem deterere oportet, quoniam asperitudines fici oliuarumque

LIBER SEPTIMVS.

377

Oliuarumq; granis interioribus simileis, obtinet. Quia propter in crassiores particulas confringendum est, coquendumque in aceto, sic ut non agretur usque dum ebullire desinat. Ego uero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi.

PROPOLIS.

Propolin emollire & discoquere oportet, siquidem & coctione neutiq; diffunditur. At si & ceram emplastrum recipiat, propolin cum illa quemadmodum & galbanum, contusam iniiciemus.

AMMONIACVM.

Ammoniacum circiter mediam coctionem iniicitur: detritum uero si potest fieri & in tenuem redactum puluerem inspergere conuenit. sin minus, cum liquore quodam laeuigatum iniicere: si emplastrum cruentis uulneribus adaptabitur, cum aceto aut uino: si fistulis aut strumis, omnino cum aceto: at si molle futurum est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in forodum spissitudinem coactum aliis refrigeratis infundere ne efferuescat.

OPOPANAX.

Opopanax multo post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino acetove prius laeuigandus est.

GALBANVM.

Galbanum neutiquam coctionem tolerat, uerum emplastro ab igne sublato, quo spissescat, sic ut digitos non inquinent, emollitum inditur.

SAGAPENV M.

Sagapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro ubi ab igne sublato fuerit, emollitur.

ALOE.

Aloe secundum coctionem inspergitur.

LACHRYMA PAPAVERIS.

Lachryma papaueris pridie in aqua modica maceratur

PAV. AEGIN.

BBB

PAULI AEGINETAE

inde in pila laeuigatur, mox etiam emplastrum ei supero funditur.

THAPSIA.

Thapsia inspergitur postrema, uel liquore quodam laeuigatur.

BDELLIVM.

Bdellium in lauorem pertritum, emplastro ab igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat & laeuigari non possit, sagapeno similiter ipsum contusum, ac in emplastri figuram coactum, post coctionem simul cum emplastro molliemus.

THURIS LACHRYMA ET

MANNA.

Lachryma thuris & manna coctione iam absoluta insperguntur, in sordium spissitudinem coacta ex melle modico, aut aceto, aut aqua, aut uino, si emplastrum liquorem recipit.

MYRRHA.

Myrrha ubi iam coctio finita est, inditur.

SEMINA RADICES, ET HERBAE.

Semina, radices, & herbae nullam coctionem sustinent: laeuigatis igitur, & in pila etiamnum subsistentibus liquida superfunduntur.

QVI CERAE MODVS

cum oleo esse debeat.

Quod si unguina quae Graeci à leuanda lassitudine accipiant appellat, conficere constitueris, oleum ceræ quadruplum immittes: at si liquidum ceratum, ut in fracturis praeparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionem olei ceræ aequalem miscebimus, si aer ambiens moderatus extiterit: at si cera uetus aut squalida, aer frigidus fuerit, oleum paulo copiosius quam cera erit: quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus paulo minor olei portio erit paulum autem hoc, medii in utramlibet partem excessus duodecima erit portio, etenim undecim & tredecim olei uncias, ceræ libræ admiscebis.

INter ea quæ malagmata dicuntur, alia mediis cor-
poris partibus iniiciuntur, longa inflammatione cō-
flictantibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus; aut
perfrictionem fluxionemve expertis: alia articulis qui-
bus humores sint impacti uel nervis refrigeratis, uel et-
iam aliis particulis scirro obsessis congruunt. de his igitur
tum in capite de emplastris tractatum est, tum ubi
ad acopa uentum erit differetur. Porro inter malagma-
ta mediis corporis regionibus accommodata, (epithea-
mata proprie nuncupantur) quæ quidem stomacho, &
iocrinori admoventur, qualiacunque illa fuerint roborā-
tem ex astringentibus uim postulant. Sine his etenim ui-
tæ aliquod discrimen intulerint, cum illa nempe stomas-
chus & iecur communes aliarum partium alimenti, sint
officinæ. Quamobrem eiusmodi medicamenta ex aro-
matis potissimum conficiuntur. Stomacho igitur iniici
debent, si non concoquit, aut infirmatur, aut inflatione
laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloe, absin-
thio, sampsucho, nardo & mastiche. Iecori autem ex
myrobalano confecta, ammoniaco, pinguibus, & cha-
mæmelino. At lieni applicantur, quæ constant calce ui-
ua, auripigmento, cappari salicibus, cardamomo, ærugi-
ne, ammoniaco & aceto: iis autem qui alui fluore labor-
ant, ex cenanthe, alumine, melino & aliis astringentibus
preparata. atque hæc etiam per abusionem
communiter malagmata nominant, & si diuersam a
molliendo uim repræsentent. Si uero ardor uiscera uro-
geat, ut in febribus ardentibus, ex croco competunt ma-
lagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut
herbæ seminalis, adipe suillo, & spuma argenti: si
perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, ca-
samum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis ei-
citur, prosunt astringentia siccantiaque, ex alumine, sa-
lice, & bitumine. In tæbe quæ phthisis dicitur, conducunt

PAULI AEGINETAE

ex baccis lauri, matrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

MALAGMA EX SERTVLA CAM

pana, dia meliloton dicitur.

Croci, nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis, myrrhae, singulorum unciae duae, sertulae campanae librae stillae ammoniacae tantundem, cerae librae tres, resinae terebinthinae libra, olei cyprini librae tres, gleucini librae duae, bdellii unciae sex, nonnulli etiam cyphi uncias duas addunt, uini quod satis est.

POLYARCHION EX COMMEN

tario Galeni de compositione medicamentorum cata topos.

Instaura tu ex Gal. Cerae, resinae terebinthinae, bdellii, suffiminis ammoniaci, cardamomi, iunci quadrati, singulorum mina, Lsertulae campanae, Lamomi, nardi Indicae, croci, myrrhae, thuris, xylocinnamomi, singulorum denarii uiginti quinque, olei cyprini hemina uini Italici quod satis est: praeparato ac utitur, interim meraco, interim cerato quod cyprino fit soluto.

ALITER POLYARCHION.

Xylobalsami, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhae, iunci rotundi floris cardamomi, thuris, spicae nardi, mastiches, styracis, bdellii, amomi, phylli, croci, casiae, pyrethri, aristolochiae longa, singulorum uncia, guttae ammoniacae sescuncia, resinae frictae tres unciae, resinae terebinthinae libra, medullae ceruiniae unciae duae, cerae librae duae, opobalsami unciae sex, uini unciae octo.

PHILAGRIANVM.

Croci sescuncia, aloes, ammoniaci thymiamatis, bdellii, styracis, singulae unciae, adipis anserini sextans, hyssopi medicamenti triens, palmularum sextans, cerae libra, nardi selibra, melini unciae sex, uini quod sufficit ad sicca lae uiganda: per triduum macerantur mouenturque; rudicula ter die, deinde incoquantur oleo, secundo die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus,

LIBER SEPTIMVS. 379

uino. Nonnulli cum croco etiam alias quinque myrrhæ uncias adiciunt: illis autem exemptis, oleum purum reponunt, omni uero specierum facie in pastillos coacta siccataque id habent quod crocomagosa ma dicitur.

MENDESIVM.

Dictum est Mendesium quod in Ægypto reperiatur, ubi & Mendes, hoc est caper colitur. Recipit autem olei balanini libram, alias sextarios decem, myrrhæ, casia, fistulæ, singulorum uncias treis, resinæ terebinthinæ librâ, in alio sextarios decem, cinnamomi uncias treis: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitatur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus aliis septem mouetur, atque sic res conditur.

MARCIATVM.

Mastiches, ceræ, styracis, singulorum uncia tres, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami fescuncia, nardini, gleucini, olei omphacini singulorum uncia tres, medullæ ceruinæ fescuncia, terebinthinæ uncia.

EMBOLE PRIMA, DIA omphacos.

Aspalathi, rudiculæ palmularum, sertulæ campanæ, iris, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum uncia tres, olei omphacini libræ decem, uuæ immaturæ succi tantundem.

EMBOLE SECVNDA, EX caryophyllo.

Ammoniacy, spicæ nardi, costi, caryophylli, casia, casiamini, singulorum uncia tres, in alio etiam habetur arnabou uncia tres, uini quod sufficit.

EMBOLE TERTIA.

Thuris, guttæ ammoniaci, styracis, bdellii, myrrhæ, mastiches, singulorum uncia tres, uini quod satis est, ceræ tractæ uncia quinque, opobalsami uncia sex, nonnulli

BBB iii

PAVLI REGINETÆ

uncias octo. Primæ emboles medicamenta, pridie in
uua immaturæ succo oleoq; macerantur, secundæ seor
sim in uino aminæo aut alio ueteri ac odorato, mouen
turq; quotidie rudicula palmea: tertiæ ad triduum, post
quod in cacabo nitente primum emboles primæ medi
camenta incoquantur, quousque pauxillum acoris uua
relictum fuerit: mox secundæ emboles species cum uino
no immittuntur, rectius autem fiet si prius aliis exemptis
puro deinde oleo ipsæ adiciantur, coquanturq; donec
paululum uini supersit, ne aduratur oleum: sublata ab
igne eximito, superq; adicito rursus oleo puro tertiæ
emboles medicamenta, prius ex uino in pila soluta præ
ter styracem quemadmodum prædixi, hic enim cum aliis
inditus prompte soluitur. Coques autē carbonibus
quousque bene habere tibi uideantur: sublata ab igne re
frigerari sinito, insequentē die exceptis diligenter ex oleo
cafactisq; abunde super ignem ceram adicito, inde su
blata rudicula agitato, ubi refrixerint, opobalsamū ad
misceto, & uitreis uasis reponito.

GLEVCINVM, EMBOLE PRIMA. 20

Olei sextarii decem, musti aminæi sextarii sex, aspalathi
unciæ quatuor, palmæ fructus operimēti quod spathe
dicitur unciæ sex, iunci rotundi floris tantundem, sertu
læ campanæ unciæ quatuor, rosarum unciæ, myrrhæ un
ciæ tres, foliorum lauri unciæ duæ, arboris thuris unciæ
sex, xylobalsami totidem, inulæ campanæ unciæ sex, ari
stolochiæ longæ unciæ tres, iridis tantundem: hæc ma
cerantur in musto.

ALTERA EMBOLE.

Nardi gallicæ unciæ quatuor, calami, qui est balsami
fructus unciæ duæ, cyperi, cassiæ, spicæ, nardi, asari, amo
mi, costi, sampluchi, singulorum unciæ tres, calami aro
matici, caryophylli, folii herbæ, singulorum unciæ carda
momi unciæ quatuor, balsamum uino odorato ma
descit.

EMBOLE TERTIA. 35

LIBER SEPTIMVS. 380

Mastiches triens, myrrhæ troglodyticæ, bdellii, singuli sextantes, ladani quadrans, styracis liquidi, thuris masculii, singuli trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci sextantem addunt: præparatur quemadmodum medicamentum ex uua immatura, nisi quod ceram non recipiat, hic autem septem diebus oportet species duarum embolarum macerari.

NARDVS CIZICINE, EMBOLE prima.

10 Olei primi meriti sextarii decem, à spalathi cypiarum, in ulæ campanæ, iridis, xylobalsami, aristolochiæ, cardamomi, iunci rotundi floris singulorum uncia sex, sampsiuchi uncia quatuor, herbæ sabinæ uncie duæ, nonnulli & calami odorati uncias duas immittunt: hæc
15 in uini odorati sextariis quaternis commadesunt.

ALTE'RA EMBOLE.

Cassia, casami, arnabo, singulorum uncia duæ, spicæ nardi uncia tres, caryophylli uncia, costi, amomi, singulorum uncia, nonnulli etiam nardi gallicæ uncias duas
20 addunt, atque hæc in uino macerantur.

TERTIA EMBOLE.

Myrrhæ troglodyticæ, aloes, thuris, singulorum uncia duæ, styracis uncia tres, mastiches uncia quatuor, opobalsami uncia sex, quidam & croci uino læuigati unciam miscent. præparato & hoc sicut compressum est.

DECAMYRON.

Spicæ nardi, phylli, euphorbii, piperis, costi, adarces, singulorum uncia, mastiches sescuncia opobalsami uncia sex *nardini libra, ceræ libæ tres.

PENTAMYRON.

Styracis uncia, mastiches uncia duæ, ceræ albæ uncia tres, opopanacis uncia quatuor, nardini uncia quinque
35 Lfoliati, phylli, singulorum uncia tres, ammoniaci uncia cassiæ uncia sex, ladani.

*Græce erat *ναρδ* & *pro* *ναρδ* *sic. n. hēt* Oriba. Hæc superflua sunt ut medicamenti nomen & Oribasius indicat.

RBB iiii

PAULI ÆGINETÆ

EVODES, AGRATO ODO

RE DICTVM.

Croci, aloes, mastiches, absinthii, styracis, cœnanthæ, casami, caryophylli, singulorum uncia tres, nardi libra, ceræ tantundem, melini uncia sex, palmulæ duodecim, uini quod satis est.

BAION.

Cardamomi, casfiæ, cœnanthæ, nardi gallicæ, balaustiorum, propolis, singulorum scrupula octo, herbæ sabinæ casami, amomi, singulorum scrupula sex, iunci rotundi floris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli sesquiscrupulum, suffiminis Crinati uncia duæ, thuris, myrrhæ, singulorum uncia, ladani uncia sex: bdellii, mastiches, aloes, nardi, olei lentiscini, singulorum semuncia, resinæ acernæ quæ zygia dicitur, resinæ piceæ resinæ terebinthinæ, singulorum uncia tres, opobalsami uncia, guttæ ammoniaci scrupula sex, ceræ uncia sex: cœnanthino liquida læuigantur, aridaque contusa. in alio exemplari piperis quoque scrupula octodecim inuenio: nonnulli & moschi scrupulum unum addunt.

GALENIVM.

Croci semuncia, aloes uncia, mastiches tres uncia, absinthii seminis scrupula octo, cœnanthes tantundem palmulæ maiores tres, ceræ uncia tres, olei melini uncia sex.

ERYTHRIVM.

Styracis uncia quinque, malorum cotoneorum uncia uiginti, masuchæ uel masuaphii, croci, singulorum denarii decem, psichæ, cyphios, singulorum denarii quinque, cœnanthæ uncia duæ semis, casami, absinthii, singulorum denarii decem, caryophylli scrupula quindecim, guttæ ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & semis, nardi uncia quinque, resinæ colophonæ gleucini, melini, singulorum uncia decem, rosacei denarii decem, propolis uncia quinque, resinæ terebinthinæ

LIBER SEPTIMVS.

382

uncia decem, mellis cochlearia decem, phylli denarii decem, spicae nardi tantundem, cerae unciae septem & semis: uino falerno aut aminæo conteruntur.

MALAGMA NILI AD LIE

5 nem omnemq; duritiem.

Cerae pondo, guttae ammoniaci pondo, olei cyprini pondo, croci semuncia, secundum alios uncia, aceti quantum satis est.

CITRINVM.

10 Cerae, resinae colophonae singulorum pondo libra, sulfiminis ammoniaci, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti singulorum cyathi octo, laeuigantur arida in aceto.

MALAGMA QVOD AD

cureum authorem refertur.

15 Picis aridae libra, cerae, resinae piceae, guttae ammoniaci, nitri, baccarum lauri aridarum, seu taurini, singulorum librae duae, farinae foenugraeci sextarius, pollinis frumentacei tantundem, chamaeleontis nigri radice siccae libra.

20 MALAGMA EX STERCORE CA

prillo oribassii, ad lienofos, hydropicos & iecur induratum.

Cyprini, aut uetustissimi olei librae tres, cerae librae duae semis, simi caprarum, baccarum lauri cortice detracto,

25 iridis illyricae, singulorum sextarii decem, resinae terebinthinae libra, sinapis, nitri, cyperi, raphani seminis, capparis radice, singulorum unciae tres, cucurbitae syluestris carnis unciae duae, foenugraeci uncia: interim arida excipiuntur liquidis, interim aceto macerata: quod si aliud profuat, cucurbita iniici non debet.

30 EX FIMO CAPRILLO, SPHONGION, hydropicis efficax.

Picis brutiae librae duae semis, nitri libra una, cucurbitae syluestris carnis, pyrethri, opopanax, cocci gnidii, singu-

35 lorum unciae tres, capparis radice corticis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterii, squamæ aris, apii seminis, lathyrig

PAULI AEGINETAE

dum, singulorum uncia sex, baccharum lauri sextarii dimidium, foenugraeci farina semuncia, fellis taurini uncia duae, olei cyprini sextarii dimidium, cerae libra, resinae frictae librae tres, caprilli stercoreis montani, cachryos, cyperi, cardamomi, singulorum uncia sex.

EX BACCIS LAVRI.

Cerae, resinae, picis, baccharum lauri, seui taurini, singulorum libra, nitri, guttae ammoniacae, singulorum uncia sex, aceti quantum sufficit.

MEDICAMENTVM DIA

spermaton.

Cardamomi, cyperi, herbae sabinae, nitri, baccharum lauri casiae, sertulae campanae, foenugraeci, nardi gallicae, apii feminis, sampsuchi, anisi, panacis radice, thuris, guttae ammoniacae, terebinthinae, singulorum uncia tres, melis, cerae, nardi, singulorum libra, seui taurini, tantundem.

MALAGMA A FOEDO ODO

re dysodes dictum, ad pleuriticos.

Resinae piceae libra, cerae, rutae uiridis, cyprini, singulorum uncia sex, sulfuris uiui, opopanax, sagapeni, singulorum drachmae quatuor, nonnulli & galbani tantundem addunt.

MALAGMA DIA SAMPSECHV.

Cerae pondo, resinae terebinthinae pondo duo, sampsuchi, baccharum lauri, foenugraeci, singulorum sextarius, nardini quod satis est.

MALAGMA APOLLOPHANIS

ad iecorosos,

Cerae denarii octoginta, resinae terebinthinae, mannae, singulorum denarii quadraginta, mortario trini sedimento uncto contunduntur.

COPTON AD DVRTIEM STOMACHI & IECINORIS.

Propolis uncia sex, styracis uncia duae, mastiches uncia, resinae terebinthinae semuncia, fecis nardini quantum satis est.

MALAGMA EX OENANTHE.

Oenanthe, aloes, croci acaciæ, aluminis scissilis, rosarum siccarum, absinthii, succi, gallæ, omphacii, rhus syriaci, manna, singulorum drachma, olei myrtei, ceræ, utriusque libbre, palmulæ magnæ & duæ, uini quod sufficit.

ANTYLIVM.

Aluminis scissilis semuncia, aloes uncia, mastiches scrupulum, oenantes scrupula sex, omphacii scrupula octo, rosarum siccarum tantundem, rhus syriaci scrupula decem, spinæ Egyptiæ totidem, balaustrorum scrupula uiginti, gallarum scrupula quindecim, ceræ uncia quinque, olei melini quod sufficit.

MALAGMA EX VINACEIS,

dia gigarton dicitur.

25 Croci, sandycis, labruscæ, singulorum uncia, aluminis sicci uncia quatuor, balaustrorum, omphacii, rosarum floris, myrtorum siccorum, singulorum uncia duæ, ceræ tractæ libra, olei melini libræ duæ, malorum cotoneorum uncia quatuor, dactyli qui nicolai dicuntur decem, uini aminæi quod satis est, uinaceorum aridorum uncia octo in usu, medicamenti uncis tribus, ceræ unam misces.

ANETHINE.

Anethi uiridis uncia sex, sertulæ campanæ uncia duæ, chamæmeli tantundem, capitum papaueris uiridium decem excoctorum iuris libræ tres, & olei quod sufficit: ubi uero consumptum fuerit ius, adipis suilli recentis libræ duæ adduntur, tritisque priuatim scillæ tostæ interioris uncis duabus & medullæ ceruinæ totidem, omnia miscentur.

AMBROSIA AD FEBREIS

arcendas apta.

Argenti spumæ libra, adipis suilli recentis uncia sex, lini seminis succi tantundem, ceræ tractæ uncia nouem, rosacei libræ, mellis uncia tres, croci uncia nonnulli etiam quorum decem lutea cruda addunt,

*Depra-
uatū hic
est exem-
plar græ-
cum.

PAULI ÆGINETÆ
DE ACOPIS, IN VNCTIONIBVS,
dropacibus, & sinapismis. Cap. XIX.

A Copa inde nomen sortiuntur, quod præcipue
ad lassitudinis quæ copos græce dicitur, puta tē
suar, ulcerosæ & eius quæ ossa defatigat, sensum
conueniant, quanquam aliis quoque morbis compluri
bus sint ex usu. Alia siquidem ipsorum calefaciendi uim
habent, alia emolliendi. Quæ calefaciunt, pipere, pyre
thro, cachry, & consimilibus constant: neruorum uitiis,
perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo calore possunt
euinci accommodata. Quæ emolliunt, durities, scirros,
& infarctos articulorum sinus discutunt, quorum mate
ries capite de emplastris comprehensa est. At emollien
tibus quæ adarce, cachry, euphorbio, cocco gnidio, &
id genus aliis componuntur, in diuturnis affectibus, &
qui ægre possunt elidi, quibus etiam sinapismus cōgruit
utimur. Porro spissitudinem uniuersa acopa inter cerata
& emplastra mediam habere conuenit. Vnguina uero
acopis similia, liquidiorē propemodum substantiam
obtinēt. At dropax duplicem recipit præparationem:
hanc emplastro, illam malagmati consimilem, nonnulli
& calidum ipsum illinunt: materiam uero acopis & em
plastris confinem. Cæterum usum cataplasmatīs exhi
bet, diuturnis affectibus iisdem quibus & sinapismus, uo
tilis, ideoque ante illum assumitur, quo corpus sinapi
reddatur idoneum, à sinapismo adhibetur, ut affectus
reliquias discutiat. Sinapismus materiam quidem uariā
non habet, uerum diuturnis potissimum affectibus post
commemorata aliorum præsidiorum uim, efficacissi
mus est: utilissime autem applicatur capiti in eius dolo
re quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat
ipsius pars affligitur, Græci heterocraniam uocant in
morbo comitiali, uertiginibus, & insania: pectori autem
in suspirio, orthopnoea, hoc est quum non nisi recta cer
uice spiritus trahitur, & tussi longa. At in diuturna hu
morū ē capite in fauceis destillatione, & caput & tho

- ax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter in lo-
gis ipsorum morbis eodem obducuntur. Iam conue-
niens est præsidium sinapi coxendicum & podagricis
doloribus, omnique partiresolutæ, aut alio quodam
5 modo perfrictionem expertæ, ut difficulter exalfieri
possit. Ac tunc profecisse satis id putato, ubi dolor sub-
sequutus fuerit, ualidus, & caro liuidior altiorq; euaseo-
rit, & postquam ablotum fuerit mitius pustulæ erupe-
rint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere
10 negotio conuenit, parte quam obliueris sæpius detecta:
nam si uel immodice adurantur ita affecti non persentis-
cunt. Præterea in acutis morbis, utpote lethargo, pro-
funda in somnum delatione, (cataphora dicitur) & cato-
cho, sinapi inducitur, per initia quidem, cruribus: ubi ue-
15 ro materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori pa-
tuerunt ut uix ullo modo queant incalescere, iis crura &
inguina sinapi oblinuntur. In his autem qui continua fe-
bre laborant, ulcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum
locis excarnibus uitari debet sinapis mus: nā partes car-
20 nibus uacuae si obducantur sinapi, uruntur, interim etiā
nigrescunt.

BROMION ACOPON.

- Ceræ, resinæ colophonix, singulorum libra, adipis suilli
uncie quatuor, butyri uncie sex, althææ, fœnugræci, se-
25 minis lini, singulorum libræ duæ, olei libra, galbani uncie
duæ & semissis: excocto succo cum oleo quousque ma-
gna illius pars fuerit absumpta, reliqua cum cera & gal-
bano adiiciuntur.

ACOPON A VARIETATE

- 30 fœcilon dictum.
Succi althææ, fœnugræci, seminis lini, rutæ, cumini, sin-
gulorum libræ duæ, medullæ ceruinæ, olei ueteris, adio-
pis anserini, opobalsami: nardi, singulorum libra ceræ,
colophonix & resinæ, singulorum sesquilibra, euphor-
35 bii, resinæ terebinthinæ, opopanax, singulorum uncie
sex, castorii uncie tres, herbarum unde succus exprimitur,

PAULI AEGINETAE

singularum libra iniicietur, coques ut superius.

ACOPON AZANITAE.

Adipis suilli librae duae, seui taurini, resinae colophoniae, hyssopi medicamenti, cerae, singulorum libra, galbani unciae tres.

ACOPON BASILII.

Althaeae, chamamelis, fertulae campanae, lini seminis, fenugraeci singulorum fescuncia, amomi unciae tres: haec macerantur in uini Ascalonii aut Cilicii sextariis octo, per triduum coquanturque ad melleam spissitudinem, deinde succi librae quinque cum olei ueteris libris quatuor & semisse decoquantur, quousque modicum succi fuerit relictum, adiciuntur butyri unciae sex, resinae terebinthinae unciae quatuor, adipis anserini unciae quindecim, medullae ceruiniae cum momento olei laeuigatae unciae quinque, cerae tractae librae tres.

LYSIPONIVM.

Piperis, castorii, styracis, mastiches, aloes, inulae campanae, iridis, singulorum unciae quatuor, euphorbiae, costi, guttae ammoniaci, myrrhae, sampluchi, thuris, cyperi, casiae fistulae, cachry, singulorum unciae tres, adarciae, amomi, bdellii, xylobalsami, singulorum unciae duae, malobathri, spicae nardi, pyrethri, croci, singulorum uncia, opobalsami libra, nardini, cyprini, gleucini, singulorum librae duae, cerae libra.

ACOPON AEOEDO ODO

re dysodes appellatum, ex opere de compositione medicamentorum cata genos.

Cerae, resinae terebinthinae, singulorum denarii uiginti, quatuor, galbani, suffiminis ammoniaci, singulorum denarii sex, olei heminae duae, medullae ceruiniae denarii octo: utitor mero & diluto.

* Galenus
olei ueteris.

ALIVD DYSODES.

Resinae terebinthinae denarii sedecim, cerae denarii uigintiocto, oesypi, mellis, singulorum denarii sex, medullae

lae ceruinæ uncia sex, stillæ ammoniacæ, galbani, aphro-
nitri, baccarum lauri singulorum uncia sex, olei ueteris
sextarius, uini cyathi duo, quidam etiam castorii dena-
rios treis admiscant.

5 BARBARICVM DIA EUPHORBIV
ad coxendicum dolores, & alia pleraque.

Opopanacis uncia, ceræ tyrrenicæ libra, resinae tere-
binthinæ libræ duæ & semis, galbani uncia, stillæ am-
moniacæ uncia duæ, euphorbii, castorii, piperis albi sin-
10 gulorum uncia duæ, medullæ ceruinæ uncia quatuor,
cesypitantiundem, lemnestidis (est autem adarce) semun-
cia, olei styracini, laurini, irini, amaracini, singulorum un-
cia sex, olei ueteris libræ duæ, hedychroi, uncia sex.

ACOPON CUI NOMEN
15 est pixis,

Resinae colophonie sesquilibra, resinae terebinthinæ un-
cia octo, guttæ ammoniaci uncia tres, thuris uncia no-
uem, olei ueteris libræ duæ, succi lini seminis libra, lactis
uaccini tantundem, adipis anserini uncia sex, butyri uno-
20 cia octo, ouorum uigintiquatuor albumina, preparat-
um buxæo uase reponitur.

ACOPON EX ABIETE, GALENI.

Abietis seminis cocti modius italicus, hoc est sextarii
duodecim, olei libræ quindecim, ceræ libræ quatuor, re-
25 sinæ strobilinæ aut terebinthinæ uncia quatuor. Contu-
sum abietis semen, oleo inilcitur. Vbi quadraginta die-
bus in eo si ueris, expressum prolicito, mixtis reliquis uig-
titor, ad labores spontaneos, resolutiones, & articulorū
perfrictiones. At si necessitas urgeat coquere oportet se-
30 men abietis cum oleo mixtum, ne nimium aduratur, &
aquæ sextariis quatuor, idq; in podagricis, & articulo-
ris affectibus.

ALIUD AD IDEM.

Olei heminae uiginti quinque, id est sextarii duodecim,
35 & semis. fructus abietis modius, hoc est libra semis, re-
sinæ abiegnae libræ tres, strobilinæ uel terebinthinæ

PAULI AEGINETAE

librae tres, cerae libra.

ACOPON EX NIGRA POPV

lo, dia Aegyros dicitur, ad eadem.
Loco fructus abietis, nigrae populi fructus æqua portio
additur, & reliqua similiter illi præparantur.

VNGVENTVM ZOSIMI

ad tremulos celebratum.

Resinae piceae unciae sedecim, cerae unciae quatuor, olei
ueteris libra, opopanax unciae duae, adarcae uncia,
euphorbii tantundem: nitri unciae quatuor, aphronitri
teneri totidem: nitrum, euphorbium, adarce cum uino
læuigantur, deinde adiicitur opopanax, simulq; in læuo
rem teritur, seorsim autem quæ liquari possunt, cum
anchusa ad colorem accipiendum eliquantur, refrigera
ta excipiuntur.

DROPAX GALLVS ORIBASII.

Resinae colophoniae quæ thus redolet, piceae & lignosae
dictæ quæ sola in Italia nascitur, apochymatis, picis
aridae, cerae, singulorum librae quatuor, resinae frictæ un
ciae *quindecim, picis brutiae librae duae, nitri libra, bitu
minis, galbani, adarcae, pyrethri, singulorum unciae sex,
opopanax, euphorbii, ueratri albi, piperis, singulorum
unciae quatuor, sulfuris uiui unciae tres, castorii, am
moniaci, uue passæ syluestris staphis agria dicitur, sin
gulorum unciae duae, olei sicyonii libra, opobalsami
unciae sex. †

* Oriba. li
brae duae.

† Oriba. ad
dit, zingi
beris un
ciae duae.
* Orib. sel
quipondo.

ALITER SIMPLEX.

Cerae pondo, picis siccae *pondo, picis, brutiae pondo,
resinae piceae sesquipondo, frictæ pondo & quadrans,
loco prius nitro exterso imponitur.

QVOMODO SINAPISMVS FIAT.

Ficus siccate pridie in aqua tepida macerari debent, die
insequenti probe expressæ ualenter læuigari, deinde a
cre sinapi, cuiusmodi est syriacum ægyptiumq; priuatim
conteri, diluto illarum affuso, factaq; massa admisceri,
& si quidem uehementem sinapismum uoluerimus
inducere,

inducere. parteis duas sinapis cum una ficuum temper
 rabimus: si imbecillem, e contrario: si mediocrem, æ
 qualeis. Cæterum sinapi ante quàm deteratur, aceto cõ
 madescens, ut nonnulli faciunt, languidius euadit. At
 sinapi ablato, etiam balneũ utile est. Si dolor uehement
 ruborve accesserit, & pustulæ, linteolum succo maluæ
 aut foenugræci cum rosaceo madefactum imponem^{us},
 deinde rosaceo cerato cum cerusa utemur. Verum in
 resolutis in quibus sensus labefactatus est, cura adhibeo
 bitur ut sæpius partem retegamus, inspiciamusq^{ue}. Qu
 enim admota non percipiãt, sæpe immodice exusti sũt.
 Item caprarum finus cum aceto illitus sinapi est effica
 cior, & præsertim in coxendicum doloribus.

ACOPON EX ATRAMENTO LIBRA

rio, cutis ruborem peculiariter inducens, idq^{ue} pos
 tissimum in iis quibus altera capitis pars do
 let, ex commentariis Alexandri.

Euphorbii, atramenti librarii, singulorum drachmæ qua
 tuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis al
 bi, singulorum uncia tres, croci drachmæ duæ, aceti
 quod satis est: ad hæc probe læuiganda, utq^{ue}, spissitudo
 sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, à media super
 ciliorum parte incipiens, adusque tempora tota, præser
 tim si æger pilis careat: ubi refrigerata fuerint, rursus il
 lines: & quum præsidium bene profecerit, in balneum
 hominem deduces.

QVOMODO DIVERSA OLEI ET
 unguentorum genera conficiantur. Cap. XX.

I Nunctionum unguentorumq^{ue}, uel olei generũ quæ
 unguenta repræsentent alia sunt simplicia, una olei
 specie iniecta, alia composita ex pluribus conflata.

Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur
 uerbi causa, rosaceum, chamæmelinum, susinum. Quæ
 dam ex fructibus & seminibus conficiũtur: qdam ex sur
 culis qbusdã nempe rutæ, q etiã simul cũ oleo coquun
 tur. At cũ nullus florum coctionem accipiat, insolantur

PAV. AEGIN.

CCC

PAULI AEGINETAE

potius.uerum si ualida odoris gratiam repraesentent et
 pluribus diebus constantem, ex insolatu tenuius ipso
 oleum magisq; utile redditur, quemadmodum rosaceum
 & chamæmelinū. Qui inualidiores sunt faciliusq; dif-
 fari possunt, minus insolatum tolerant, ut quæ uirtus
 propte euanescat, utpote liliū & uiola. Ex his q̄ fructibus
 & seminibus constant nonnulla illis integris oleo iniectis
 conficiuntur, ueluti melinum, nonnulla cōtusis uel læuiga-
 tis, oleamine ipso sequestrato, uel expressis ipsis in cō-
 chulas: uel ex aqua calida, sic ut ipsa discernentur, ex
 pli causa, caryinon, sesaminū, amygdalinū, lentiscinū, lau-
 rinum, ricininū, raphaninū, atq; eius notæ alia. Porro q̄
 ex stirpibus odoratis cōponuntur, pparari potissimum
 solent, illis oleo incoctis cum uino uel musto uel aqua,
 atq; eisdem deinde exemptis. Liquoribus aut quibusdā
 oleo cōtemperatis interim & adipibus uel medullis, ex
 huiusmodi aliquo exactā olei spissitudinē sortita, simpli
 ei sermone unguēta uel inunctiones noiantur, ut gleuci-
 nū, nardinū, sicyoniū & cyprinū. Sunt q̄ acopa crassitudi-
 ne repraesentent, cerā aut resinā aut eiusmodi q̄piam re-
 cipientia, uocanturq; myracopa, ueluti decamyron, ama-
 racinum, atq; his similia. Iā uero aliqua una uice coquū-
 tur, q̄ nō diuersam recipiūt materiam, sicuti metopion,
 mastychinum, sicyoniū: aliq̄ duabus tribusue. & quatuor
 iniectionibus. Primum cōtumaciorib; incoctis, ut diaspa-
 latho, palmea rudicula, thure arbore, lauro: inde aroma-
 tis, phyllo, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo
 liquorib; adipibus & medullis. Si aut eueniat, cera quo-
 q; & resinis inditis. At balsami liquor neutiq; coquitur, sed
 post absolutā coctionē unguento mediocriter refrigera-
 to instillatur. imo ex ipsis unguentis sunt q̄ nullā coctio-
 nē recipiant, sed tm̄ misceant, quale est mendesium. Nō
 nulli uero uiride unguentum reddere cogitantes, ubi ab
 igne sustulerint, in olei sextarium intingunt, æruginis ra-
 sæ in exactum detritæ læuorem sescunciam, immiscen-
 tes, quemadmodum in cyprino & amaracino. Cæteræ

simplicia quidem unguenta specierum quae in ipsa mittuntur naturam uel eorum ex quibus confusis facta sunt, obtinet ut oleum ueluti materiae rationem obtineat. At quae uaria magis compositionem sortita sunt, tota eorum natura ad calidum inclinata est, sed quaedam ualide calefaciunt emolliuntque, ut etiam articulis recenti cicatrice obductis & sinibus eorum infarctis conueniant, ueluti metopium, mendesium, marciatum: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodum decamyron ualentius ut etiam summa rodat: mediocriter autem calida tenuiaque dico. At uero modice calida extenuant, leniunt & concoquunt, quale est susinum, amaracinum, irinum, crocinum, foliatum. Alia praeterquam quod calefaciunt, abunde siccant inciduntque, ueluti cyprinum & lycionium. Alia calefaciunt quidem insigniter, sed uires magis confirmant, unde stomacho potissimum & uisceribus resolutis conpetunt, qualia habentur mastichinum, nardinum & glectinum. Valentius adhuc corroborat, quod ex acore conficitur. Iam nonnullis unguentis ob gratum duntaxat odorem utuntur, ut foliato, spicato, commageno & quae moschelæa, quasi dicas, ex musco & oleo confecta nuncupantur.

ROSACEI CONFECTIO.

Rosarum rubrarum detractis unguibus refrigeratarum die nocteque una, unciae tres, olei omphacini sextarius, ut na diligenter constricta ne perspirent, insolabis sub diebus quadraginta, atque sic repones non in pauimento, sed assere. Aliqui uero, uice insolatus in puteum utrumque nam diebus quadraginta mittunt, ut ex frigiditate odoris gratia conseruet. Alii uero ipsam sub terra defodiunt.

CHAMÆMELINON.

Chamæmeli floris citra alba folia refrigerati, per diem noctemque unam olei sextarius Italicus, uase linteo simpliciter contexto ut perspiret, insolatur, idque diebus quadraginta, inde secure hoc percolatum repones.

ANETHINVM.

PAULI ÆGINETÆ

Anethi uiridis comæ refrigeratæ uncia olei dulcis sextarius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autem & pro temporis ratione anethinum cum insolatus desideratur sicci enim anethi comam decoquentes cū oleo in caca

bo utuntur, & chamæmelino similiter: uerū hæc imbecilliora sunt iis quæ ex uiridibus fiūt & p̄sertim insolatis

LILIACEVM, ALII SVSINVM

dicunt, quod in suis forsan reperiatur. Foliorū alborū liliorum similiter refrigeratorum uncia duæ in olei sextarium Italicum coniectæ exacte circumstringuntur, ne euaporent, & p̄ triduum insolantur, inde primis exemptis proiectisq; aliæ duæ uncia iniiiciuntur p̄ triduum subsequens, atq; sic reponuntur.

SVSINVM COMPOSITVM.

Olei sextarii tres, calami odorati libræ quinque, myrrhæ uncia quinque, cardamomi libræ tres, lilli foliorū unguibus ablatis refrigeratoꝝ libra, cinnamomi uncia tres, croci cilicii uncia quinque: tota cōfectio tribus iniectionibus distinguenda est. Primum myrrha & calamus odoratus, uino ad dies quinque macerata ter die mouentur, inde oleo modice incoquantur, deinde cardamomū aq̄ maceratum triduo mouetur, similiterq; rursus cum oleo ad horā unam incoquitur, inde exemptis tertiam liliorum partem oleo puro inferemus, tribus diebus post his quoq; exemptis reliqua liliorum tertia portio immitte

tur, iterumq; post triduum exemptis proiectisq; primis, postremo tertia pars cum croco laeuigata iniicietur. Secundum alios tres dies ablato oleo cinnamomū contusum indetur. Huius in uicē, Arnabo, aut carpesiū, aut cassiæ duplicatum, atque reponetur.

VIOLACEVM.

Violaceum præparant, modo purpurearū, modo crocearum, modo candidarū uiolarū foliis ungue desecto, tris uncias pondere coniectis in olei omphacini sextarios quinque Italicos: circumstricta exacte, ne p̄spirent ad dies decem insolantur, tertioq; eadem mutantur ad tris

dulci, quemadmodum lilia: ad repositionem autē pauca iniiciunt exacte arida.

MELINVM.

Hoc efficitur ex malis cotoneis extrinsecus panniculo inuolutis, & in frusta cum suis corticibus dissectis, deinde de unciis ternis illorum, in decem olei omphacini sextarios Italicos coniectis, atque quadraginta dies insolatis.

SESAMINVM.

Sesaminum oleum fit, contusis uel laeuigatis sesamis, expressisq; per fiscellas in cochleis, oleo ipso ceu in aqua calida segregato, uasisq; uitreis reposito.

RAPHANINVM.

Eodem modo fit raphaninum in Aegypto, ex semine raphani qui tenuem radicem habeat contuso segregatoq;.

RICININVM, SIVE CICINVM.

Hoc quoque similiter Aegypto fit, ex semine ricini qui croton dicitur, pari modo contuso aut laeuigato.

ÆGIRINVM.

Verno tempore oleum fit ægirinum, hoc est ex nigra populo, quum resina circa semine copiosa existit: etenim grana populi contusa unciis quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusq; quadraginta insolant, uel horis tribus in lebetes decoquunt, atque sic exempta reponunt.

AMYGDALINVM.

Conficitur hoc quoque sicut prædictum, amygdalis amaris iisque puris, contusis, aqua modica irroratis, separatisq; ut comprehensum est: Nonnulli tusa amygdala unciis duabus, dulcis olei sextario Italico immissa, in cacabo decoquunt.

AMYGDALINVM, QVOD ET metopion dicitur.

Aegyptiis huius olei inuentores metopion ipsum nuncupant, quod galbanum recipiat: germen autem unde galbanum nascitur, metopion appellatur. Hæc recipit olei omphacini sextarios uiginti, amygdalarum amara

PAULI AEGINETAE

rum libras duas, cardamomi libram, iunci rotundi floris, calami odorati, carpobalsami, singulorum libram, myrrhæ, galbani, singulorum uncias sex, resinæ terebinthinæ, libras duas, uini odorati ad arida imbuenda sextarios quatuor, mellis attici libras treis: resinam & galbanum in læuorem redacta ex olei parte soluta, reliquis in coctis adiiciemus, necnon ipsum mel: Mixta uero accurate omnia ab igne tollentes, quum tepidum est medicamentum eximimus, nam refrigeratum concreescit.

BALANINON.

Balaninum oleum perinde ut simplex amygdalinum præparatur, ex querneis glandibus.

CARYINVM.

Hoc quoque ut supra dictum ex uetustis nucibus conficitur.

LAVRINVM.

Purum quidem laurinū simili ratione & lauri fructu conficitur, mixtum uero hæc recipiet: maturarum oliuarum sextarium, cum duobus baccarum lauri miscemus: teruntur omnia exprimunturque. Nonnulli æqualem amborum portionem miscunt.

LENTISCINVM.

Lentiscinum oleum laurini modo ex lentisci semine conficitur, idque bifariam & per se, & cum oliuis immaturis

MASTICHINVM.

Mastichinum simplicissimū quidem fit, chiæ mastiches uncia, omphacini olei sextario Italico immissa, excottaque in cacabo. Nonnulli uero absinthii & styracis, singulorum unciam adiungunt.

MASTICHINVM MAGIS VARIVM.

Olei sextarii quinquaginta, inulæ campanæ libræ quinque, xylobalsami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinque, cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinque, xylomastiches libræ octo, resinæ terebinthinæ libræ tres, absinthii comæ libra, uini odorati sextarii quinque, aquæ sextarii decem, arida uino ante tertium diem macerata oleo miscentur, & aqua horis sex coquantur, ac mastiche &

terebinthina iniicitur: accurate mixta excipiantur: refrigerata transfunduntur.

SICYONIVM SIMPLEX.

Radix cucumeris syluestris refrigerata duarum uncias pondere in olei sextarium Italicum mittitur, atque in lebeti coquitur, fitq; sicyonium.

SICYONIVM COMPOSITVM.

Olei sextarii decem, cucumis syluestris radices deraſæ pondo, ſerpilli, ſertulæ campanæ ſingulorum uncia ſextedarum piceæ pinguium, althææ, ſingulorum uncia quinque ſcolopendriæ uncia ſex, fœnugræci ſextarii duo. Fœnugræcum aqua primum die uno prius commat deſcet, deinde exemptum inditur commemoratis unâ cum oleo, & uini ſextariis duobus, omnibuſq; incoctis adſciuntur medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ uncia quatuor, adipis gallinarum totidem, ruruſ exceptum oleum in aliud uas transfunditur. Nonnulli ipſum poſt coctionem diebus quadraginta inſolant.

ALIVD SICYONIVM EFFICACIVS.

Elaterii ſucci ſextarii tres, ariſtolochia rotundæ & longæ, ſtyracis, inulæ campanæ, hyſſopi, iridis, cucurbitæ ſylueſtris, pulegii, origani, cyperi, thuriſ arboriſ, centaury, ſoliorum lauri, ſingulorū uncia duæ, olei ſextarii quinque. Miſta incoquito dum parum ſucci relictum fuerit.

CYPRI NV M EX COMMEN

tariis poſidonii.

Olei ſextarius, iunci quadrati, inulæ campanæ, iridis, ſingulorum libra, ſampſuchi, hyſſopi, uiticis ſeminis, eleliſphaci, ſingulorum uncia tres, iunci quadrati ſloris libra. Reliqua omnia pridie in uino macerata coquantur cū oleo horis ſex. Excepto oleo puro, iuncus quadratus iniicitur, Si quidem adſit, uiridis cum teneris uirgultis non cōciſis: ſin minus, certe aridus cōtuſus cū aquæ momento coquetur ſeſquihora. At ſi uoleſ ipſum tingere poſtq; ab igne fuerit ablatum, indito æruginis puræ ſeſquilibra. Poſidonius aut acrimoniâ æruginis uitans, à coctione

PAULI TÆGINETÆ

(inquit) triduum dimittes oleum in cacabo bene humi
do: & ungetur, ita ut uirtus ipsius non offendatur.

ALIA SCRIPTURA CYPRINI.

Cyperī foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, elelispha
ci, singulorum quadrans, thuris arboris, aristolochiæ lō
gæ, uicis seminis, singulorum triens, inulæ campanæ,
aspalathi, singulorum uncia sex, rutæ uncia dug, cupres
si uncia duæ, olei sextarii decem. Hæc prius uino made
facta, incoques oleo, ubi exemeris iniice rursus xylobal
fami, xylocassiae singulorum uncias quatuor, samplu
chi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singulorum uncias
tres, opopanax uncias duas, iunci quadrati floris uncia
as sex, æruginis unciam.

AMARACINVM.

Inulæ campanæ pondo, xylobalsami libræ uiginti, cy
peri libræ octo, iunci rotundi floris, aspalathi, herbæ sa
binæ, singulorum libræ octo, opopanax, amaracifemi
nis, singulorum libræ duæ, olei primi meriti sextarii duo,
uini odorati sextarii quinque. Alia omnia superius dicta
primam iniectionem habent uino prius macerata, secū
dam herba sabina, atq; illa quidem horis sex incoquun
tur. hoc autem tribus nonnulli etiam hoc tingentes, æ
ruginis uncias tres iniiciunt.

IRINVM.

Iridis, aspalathi, cyperi, singulorum libræ quinque, opo
panaxis uncia tres, anchusæ uncia duæ, olei sextarii tri
ginta, aquæ sextarii quindecim. Sunt qui adificiantur iun
ci rotundi floris uncias sex, cassiæ uncias tres, xylobalsa
mi uncias sex, nardi gallicæ, tantundem, omnia contusa
aqua pridie macerantur, inde oleo diebus quinque in
coquuntur in lebetē ad sex horas: reponiturq; unguētū.

CROCINVM, IN QVO ET AL
terius crocomagmatis confectura explicatur.

Olei omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ
troglodyticæ singulorum uncia quinque, cardamomi
uncia septem, croci cilicii uncia sex, primum iniiciatur.

calamus & myrrha uino læuigata, & ante uncia modo
repositæ, piperis albi grana quadraginta, myrrhæ tro-
glodyticæ drachma, tunsa, cribrataq; teruntur rursus in
mortario adiecta olei nardini libra. ut autem medica-
mentum reddatur nigrius, nucum cortices combustos
detritosq; in mortario adiecito: inde opobalsami co-
chlearia tria, ceræ sesquilibram admisceto.

DE OENANTHARIIS. Cap. XXI.

Non quod œnanthen, hoc est labruscæ florem
habeant hæc (nonnulla. n. ne œnanthen quidem
recipiunt) sed ex uino & flore illiorum nomen
hoc sortita sunt, usus œnanthariorum apud quosdam
odoris gratia duntaxat & deliciarum adhibetur, sic ut q
eis utuntur, à lauacro perfundantur: & mensæ ipsis per
spongiam oblinantur. At apud eos qui recte utuntur, et
tiam sunt præsidia tum in resolutis, tum in iis quos syn-
cope premit, si roboratibus stomachi cataplasmatibus ad-
misceantur. Item in iis, qui se à morbo præsertim febre
li recolligunt, ubi lauacro egrediatur per totum corpus
diffundentur: naribusq; admouebuntur, adhuc spirantis
bus. Trahuntur enim in altum, & spiritum animale ui-
talemq; confirmant. Ad hæc utilia sunt ad morbum pes-
tiferum uitandum, cum eiusmodi mutationem aer sus-
tinet. Refertur autem huiusmodi unguentum ad Posi-
donium authorem, à quo uocatur mesopotamenon.

OENANTHINI CONFECTIO.

Cassia, myrrhæ, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi,
carpobalsami, opobalsami, singulorum uncia tres, styra-
cis pinguis uncia quatuor, uini odorati aminæ, Italici
sextarii decem, contusa omnia cribrataq; styracem uero
minutim concisum composito in urnam oris ampli, cū
foliis foliorū pridie refrigeratorum, è domo una in ale-
teram & unguibus detractis: sint autem lilia numero *.
deinde uinū adicitur, & opobalsamū: misti, cōmotaq;
ante iniectionem, & constructo urnæ ostio quadraginta
diebus insolantur. Balnei usus est in uiriū ex morbo res

PAULI ÆGINETÆ

creatione. Domus irrorabitur unguento, uasaq; & spon-
gia intinctæ faciei admoventur.

ALIA CONFECTIO, NOSTRA.

Costi uncia tres, spicæ nardi, amabo, caryophylli, singu-
lorum uncia, amomi uncia tres, cassiæ, cœnanthes, cala-
mi, singulorum uncia nouem, styracis, opobalsami, sin-
gulorum uncie quatuor, lilia trecenta, uini falerni sextarii
decem. Simili modo præparatur.

DE SVFFIMENTIS ET CYPHI. C. XXII.

CYphis materia inter medicamenta quæ potui da-
tur & antidota existit, usus est eius incēsi ad odo-
rem gratum conciliandum, quemadmodum &
suffiminum. Interim naribus admoventur, ut destillatiōes
ex capite in subiectas partes concoquat, grauedinesq;
& obstructione liberet, purgetq; cerebri uentriculos, itē
pestilentialibus morbis euitandis. Iam per os quoq; as-
sumitur, tum ad hæc, tum ad ea quæ pectori inhærescūt
concoquenda: necnon ad frigidiōres iecoris affectus,
unde & Cyphoide appellata antidota ueteres inueni-
runt. Miscetur autem compositis medicinis, præcipue
epithematis & antidotis.

ROSATVM SVFFIMEN.

Costi, amomi, myrrhæ, cassiæ, singulorū uncia, styracis,
chiæ, bdellii, conchulæ Indicæ, musci, ladani, singulorū
drachmæ duæ, rosarum purarum uncie uigintinouem,
opobalsami * uini quod sufficit.

SVFFIMEN LILINVM: QVOD

crinaton dicunt.

Liliorum ungue defecto libra, styracis primæ notæ, un-
cia uouem, spicæ nardi, uncia tres, costi, caryophylli, a-
momi, mastiches, conchulæ indicæ combustæ, mellis,
singulorum sescuncia, opobalsami uncia quinque, uini
quantum satis est. læuigata coguntur in pastillos.

CYPHI MAGNVM QVOD VOCANT

solare, ex rebus triginta sex confectum.

Styracis, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ campanæ, singu-

10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 620
 630
 640
 650
 660
 670
 680
 690
 700
 710
 720
 730
 740
 750
 760
 770
 780
 790
 800
 810
 820
 830
 840
 850
 860
 870
 880
 890
 900
 910
 920
 930
 940
 950
 960
 970
 980
 990
 1000
 1010
 1020
 1030
 1040
 1050
 1060
 1070
 1080
 1090
 1100
 1110
 1120
 1130
 1140
 1150
 1160
 1170
 1180
 1190
 1200
 1210
 1220
 1230
 1240
 1250
 1260
 1270
 1280
 1290
 1300
 1310
 1320
 1330
 1340
 1350
 1360
 1370
 1380
 1390
 1400
 1410
 1420
 1430
 1440
 1450
 1460
 1470
 1480
 1490
 1500
 1510
 1520
 1530
 1540
 1550
 1560
 1570
 1580
 1590
 1600
 1610
 1620
 1630
 1640
 1650
 1660
 1670
 1680
 1690
 1700
 1710
 1720
 1730
 1740
 1750
 1760
 1770
 1780
 1790
 1800
 1810
 1820
 1830
 1840
 1850
 1860
 1870
 1880
 1890
 1900
 1910
 1920
 1930
 1940
 1950
 1960
 1970
 1980
 1990
 2000
 2010
 2020
 2030
 2040
 2050
 2060
 2070
 2080
 2090
 2100
 2110
 2120
 2130
 2140
 2150
 2160
 2170
 2180
 2190
 2200
 2210
 2220
 2230
 2240
 2250
 2260
 2270
 2280
 2290
 2300
 2310
 2320
 2330
 2340
 2350
 2360
 2370
 2380
 2390
 2400
 2410
 2420
 2430
 2440
 2450
 2460
 2470
 2480
 2490
 2500
 2510
 2520
 2530
 2540
 2550
 2560
 2570
 2580
 2590
 2600
 2610
 2620
 2630
 2640
 2650
 2660
 2670
 2680
 2690
 2700
 2710
 2720
 2730
 2740
 2750
 2760
 2770
 2780
 2790
 2800
 2810
 2820
 2830
 2840
 2850
 2860
 2870
 2880
 2890
 2900
 2910
 2920
 2930
 2940
 2950
 2960
 2970
 2980
 2990
 3000
 3010
 3020
 3030
 3040
 3050
 3060
 3070
 3080
 3090
 3100
 3110
 3120
 3130
 3140
 3150
 3160
 3170
 3180
 3190
 3200
 3210
 3220
 3230
 3240
 3250
 3260
 3270
 3280
 3290
 3300
 3310
 3320
 3330
 3340
 3350
 3360
 3370
 3380
 3390
 3400
 3410
 3420
 3430
 3440
 3450
 3460
 3470
 3480
 3490
 3500
 3510
 3520
 3530
 3540
 3550
 3560
 3570
 3580
 3590
 3600
 3610
 3620
 3630
 3640
 3650
 3660
 3670
 3680
 3690
 3700
 3710
 3720
 3730
 3740
 3750
 3760
 3770
 3780
 3790
 3800
 3810
 3820
 3830
 3840
 3850
 3860
 3870
 3880
 3890
 3900
 3910
 3920
 3930
 3940
 3950
 3960
 3970
 3980
 3990
 4000
 4010
 4020
 4030
 4040
 4050
 4060
 4070
 4080
 4090
 4100
 4110
 4120
 4130
 4140
 4150
 4160
 4170
 4180
 4190
 4200
 4210
 4220
 4230
 4240
 4250
 4260
 4270
 4280
 4290
 4300
 4310
 4320
 4330
 4340
 4350
 4360
 4370
 4380
 4390
 4400
 4410
 4420
 4430
 4440
 4450
 4460
 4470
 4480
 4490
 4500
 4510
 4520
 4530
 4540
 4550
 4560
 4570
 4580
 4590
 4600
 4610
 4620
 4630
 4640
 4650
 4660
 4670
 4680
 4690
 4700
 4710
 4720
 4730
 4740
 4750
 4760
 4770
 4780
 4790
 4800
 4810
 4820
 4830
 4840
 4850
 4860
 4870
 4880
 4890
 4900
 4910
 4920
 4930
 4940
 4950
 4960
 4970
 4980
 4990
 5000
 5010
 5020
 5030
 5040
 5050
 5060
 5070
 5080
 5090
 5100
 5110
 5120
 5130
 5140
 5150
 5160
 5170
 5180
 5190
 5200
 5210
 5220
 5230
 5240
 5250
 5260
 5270
 5280
 5290
 5300
 5310
 5320
 5330
 5340
 5350
 5360
 5370
 5380
 5390
 5400
 5410
 5420
 5430
 5440
 5450
 5460
 5470
 5480
 5490
 5500
 5510
 5520
 5530
 5540
 5550
 5560
 5570
 5580
 5590
 5600
 5610
 5620
 5630
 5640
 5650
 5660
 5670
 5680
 5690
 5700
 5710
 5720
 5730
 5740
 5750
 5760
 5770
 5780
 5790
 5800
 5810
 5820
 5830
 5840
 5850
 5860
 5870
 5880
 5890
 5900
 5910
 5920
 5930
 5940
 5950
 5960
 5970
 5980
 5990
 6000
 6010
 6020
 6030
 6040
 6050
 6060
 6070
 6080
 6090
 6100
 6110
 6120
 6130
 6140
 6150
 6160
 6170
 6180
 6190
 6200
 6210
 6220
 6230
 6240
 6250
 6260
 6270
 6280
 6290
 6300
 6310
 6320
 6330
 6340
 6350
 6360
 6370
 6380
 6390
 6400
 6410
 6420
 6430
 6440
 6450
 6460
 6470
 6480
 6490
 6500
 6510
 6520
 6530
 6540
 6550
 6560
 6570
 6580
 6590
 6600
 6610
 6620
 6630
 6640
 6650
 6660
 6670
 6680
 6690
 6700
 6710
 6720
 6730
 6740
 6750
 6760
 6770
 6780
 6790
 6800
 6810
 6820
 6830
 6840
 6850
 6860
 6870
 6880
 6890
 6900
 6910
 6920
 6930
 6940
 6950
 6960
 6970
 6980
 6990
 7000
 7010
 7020
 7030
 7040
 7050
 7060
 7070
 7080
 7090
 7100
 7110
 7120
 7130
 7140
 7150
 7160
 7170
 7180
 7190
 7200
 7210
 7220
 7230
 7240
 7250
 7260
 7270
 7280
 7290
 7300
 7310
 7320
 7330
 7340
 7350
 7360
 7370
 7380
 7390
 7400
 7410
 7420
 7430
 7440
 7450
 7460
 7470
 7480
 7490
 7500
 7510
 7520
 7530
 7540
 7550
 7560
 7570
 7580
 7590
 7600
 7610
 7620
 7630
 7640
 7650
 7660
 7670
 7680
 7690
 7700
 7710
 7720
 7730
 7740
 7750
 7760
 7770
 7780
 7790
 7800
 7810
 7820
 7830
 7840
 7850
 7860
 7870
 7880
 7890
 7900
 7910
 7920
 7930
 7940
 7950
 7960
 7970
 7980
 7990
 8000
 8010
 8020
 8030
 8040
 8050
 8060
 8070
 8080
 8090
 8100
 8110
 8120
 8130
 8140
 8150
 8160
 8170
 8180
 8190
 8200
 8210
 8220
 8230
 8240
 8250
 8260
 8270
 8280
 8290
 8300
 8310
 8320
 8330
 8340
 8350
 8360
 8370
 8380
 8390
 8400
 8410
 8420
 8430
 8440
 8450
 8460
 8470
 8480
 8490
 8500
 8510
 8520
 8530
 8540
 8550
 8560
 8570
 8580
 8590
 8600
 8610
 8620
 8630
 8640
 8650
 8660
 8670
 8680
 8690
 8700
 8710
 8720
 8730
 8740
 8750
 8760
 8770
 8780
 8790
 8800
 8810
 8820
 8830
 8840
 8850
 8860
 8870
 8880
 8890
 8900
 8910
 8920
 8930
 8940
 8950
 8960
 8970
 8980
 8990
 9000
 9010
 9020
 9030
 9040
 9050
 9060
 9070
 9080
 9090
 9100
 9110
 9120
 9130
 9140
 9150
 9160
 9170
 9180
 9190
 9200
 9210
 9220
 9230
 9240
 9250
 9260
 9270
 9280
 9290
 9300
 9310
 9320
 9330
 9340
 9350
 9360
 9370
 9380
 9390
 9400
 9410
 9420
 9430
 9440
 9450
 9460
 9470
 9480
 9490
 9500
 9510
 9520
 9530
 9540
 9550
 9560
 9570
 9580
 9590
 9600
 9610
 9620
 9630
 9640
 9650
 9660
 9670
 9680
 9690
 9700
 9710
 9720
 9730
 9740
 9750
 9760
 9770
 9780
 9790
 9800
 9810
 9820
 9830
 9840
 9850
 9860
 9870
 9880
 9890
 9900
 9910
 9920
 9930
 9940
 9950
 9960
 9970
 9980
 9990
 10000

15
 25
 35
 45
 55
 65
 75
 85
 95
 105
 115
 125
 135
 145
 155
 165
 175
 185
 195
 205
 215
 225
 235
 245
 255
 265
 275
 285
 295
 305
 315
 325
 335
 345
 355
 365
 375
 385
 395
 405
 415
 425
 435
 445
 455
 465
 475
 485
 495
 505
 515
 525
 535
 545
 555
 565
 575
 585
 595
 605
 615
 625
 635
 645
 655
 665
 675
 685
 695
 705
 715
 725
 735
 745
 755
 765
 775
 785
 795
 805
 815
 825
 835
 845
 855
 865
 875
 885
 895
 905
 915
 925
 935
 945
 955
 965
 975
 985
 995
 1005
 1015
 1025
 1035
 1045
 1055
 1065
 1075
 1085
 1095
 1105
 1115
 1125
 1135
 1145
 1155
 1165
 1175
 1185
 1195
 1205
 1215
 1225
 1235
 1245
 1255
 1265
 1275
 1285
 1295
 1305
 1315
 1325
 1335
 1345
 1355
 1365
 1375
 1385
 1395
 1405
 1415
 1425
 1435
 1445
 1455
 1465
 1475
 1485
 1495
 1505
 1515
 1525
 1535
 1545
 1555
 1565
 1575
 1585
 1595
 1605
 1615
 1625
 1635
 1645
 1655
 1665
 1675
 1685
 1695
 1705
 1715
 1725
 1735
 1745
 1755
 1765
 1775
 1785
 1795
 1805
 1815
 1825
 1835
 1845
 1855
 1865
 1875
 1885
 1895
 1905
 1915
 1925
 1935
 1945
 1955
 1965
 1975
 1985
 1995
 2005
 2015
 2025
 2035
 2045
 2055
 2065
 2075
 2085
 2095
 2105
 2115
 2125
 2135
 2145
 2155
 2165
 2175
 2185
 2195
 2205
 2215
 2225
 2235
 2245
 2255
 2265
 2275
 2285
 2295
 2305
 2315
 2325
 2335
 2345
 2355
 2365
 2375
 2385
 2395
 2405
 2415
 2425
 2435
 2445
 2455
 2465
 2475
 2485
 2495
 2505
 2515
 2525
 2535
 2545
 2555
 2565
 2575
 2585
 2595
 2605
 2615
 2625
 2635
 2645
 2655
 2665
 2675
 2685
 2695
 2705
 2715
 2725
 2735
 2745
 2755
 2765
 2775
 2785
 2795
 2805
 2815
 2825
 2835
 2845
 2855
 2865
 2875
 2885
 2895
 2905
 2915
 2925
 2935
 2945
 2955
 2965
 2975
 2985
 2995
 3005
 3015
 3025
 3035
 3045
 3055
 3065
 3075
 3085
 3095
 3105
 3115
 3125
 3135
 3145
 3155
 3165
 3175
 3185
 3195
 3205
 3215
 3225
 3235
 3245
 3255
 3265
 3275
 3285
 3295
 3305
 3315
 3325
 3335
 3345
 3355
 3365
 3375
 3385
 3395
 3405
 3415
 3425
 3435
 3445
 3455
 3465
 3475
 3485
 3495
 3505
 3515
 3525
 3535
 3545
 3555
 3565
 3575
 3585
 3595
 3605
 3615
 3625
 3635
 3645
 3655
 3665
 3675
 3685
 3695
 3705
 3715
 3725
 3735
 3745
 3755
 3765
 3775
 3785
 3795
 3805
 3815
 3825
 3835
 3845
 385

PAULI AEGINETAE

quinque, phylli, croci, singulorum uncia, opobalsami semuncia, gummi libra, rosarum siccarum unciae sex, uini quantum sufficit.

EX COMMENTARIIS ANTYLLI, de pessis. Cap. XXIII.

Pessi mulierum locis admoventur, ceterum generales ipsorum differentiae tres existunt, alii quidem emolliunt, alii astringunt, alii aperiunt. Emollientes inflammationibus uteri, exulcerationi, perfrictioni, strangulatu, auersioni & inflationibus accommodantur. Fiunt autem ex cera tyrrhenica, cyprino, susino, pinguedine anseris aut gallinae, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, foenugraeo, & quae sunt eius generis. Aperientibus utimur, quum purgationem suppressam irritare statuimus, aut uulua conuiuentem compressamve emendare. Preparantur hi ex melle, artemisia, dictamnino, brassica, succo dulcis radiculae, porro, succo rutae, scamonia, & similibus. Astringentes in contrarium aperientibus usum exhibentur, nam fluxum muliebrem cohibent, & suspensum contrahunt uterum, prolapsumque reprimunt. Materia uero astringentium prius in capite de collyriorum etiam modo comprehensa est. Ceterum conuenit pessi crassitudinem instar strigmenti & paulo spissiore facere, deinde lanam linamento tortili similem, duplicatam in medicamentum tinctam ori uuluae condere, sic ut stuppam plögam habeat alligatam quo pessus facile possit extrahi quando uisum fuerit.

PESSVS CROCODES, AD INFLAMMATIONES, auersiones, duritias, & inflationes.

Cerae tractae, medullae uitulinae, singulorum denarii sexdecim, medullae ceruinae drachmae undecim, adipis anserini drachmae octo, adipis gallinae drachmae octo, mastiches drachmae quatuor, hyssopi medicamenti drachmae tres, mellis drachmae duae, croci, drachmae octo, rosacei quod satis est: crocus lacte muliebri laeuigatur.

PESSVS AB AVREO COLORE DICTUS chrysos emolliens, laudatissimus.

Croci denarius, cœsypī tantundem, medullæ ceruinæ denarii duo, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, singulorum denarii tres, ouorum tostorum lutea sedecim irinæ & rosacei quod satis est ex æquo.

5 PESSVS LIBANIVS, MENSEIS EVO-
cans & uulvæ uitis singulariter accommodus.

Nardini unguenti uncia sex, ceræ tyrrhenicæ uncia quæque, susini unguenti uncia quatuor, adipis suilli recentis uncia tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amaracini unguenti, singulorum uncia duæ, seui taurini, resinæ terebinthinæ, cœsypī, singulorum uncia: lebetes elioquantur, omnesq; reliqui pessi.

ENNEAPHARMACVS.

15 Rosacei unguenti, ricinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri pares portiones.

TITIANVS EMOLLIENS.

20 Ceræ uncia sex, resinæ colophonæ uncia quatuor & semis, seui taurini uncia quatuor, guttæ ammoniaci tantundem: ammoniacum aqua soluitur.

PESSVS ÆGYPTIA.

Mellis, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei uel sosini, croci, singulæ partes: in quibus aut inflammatio abest, & fordidis, æruginis dimidiam addunt.

25 GONE AD CONCIPIENDVM.

Butyri uncia sex, hyssopi medicamenti, medullæ ceruinæ, adipis anseris & gallinæ, resinæ terebinthinæ, aloes singulorū uncia tres, ceræ tyrrhenicæ uncia sex, rosacei libræ duæ, myrrhæ, cassiæ, singulorū uncia duæ, spicæ nardi uncia, mellis quod satis est.

DE MEDICAMENTIS INVI-

cem alternantibus ex commentariis Ga-

leni.

Cap. XXV.

35 **I**N Alexandria (inquit) muliere quadam morbo periclitante, cum quæfisssem lychnidem, nec eius fuisset data copia, nisi p̄tinus uice lychnidis usus fuisssem

PAULI AEGINETAE

acanthii semine, periisset mulier. Vnde rogatus ab amicis ad hanc alternantium inuicem medicaminum expositionem ueni, iuxta literarum seriem exoritur.

Vice acanthii seminis, lychnis.

*Aromatum calamus odoratus.

Aloes indicæ, aloes uiridis folia uel glauciæ, uel finus ciconiæ, aut ly cion, aut centaurium.

Halicacabi, solani semen.

Bituminis, pix liquida brutia.

Aconiti, iridis syluestris radix.

Absinthii, abrotanum.

Opobalsami, liquor myrti.

Abrotani, origanum.

Calcis uiuæ, adarce.

Anchusæ, hyacinthos.

Salis ammoniaci, sal cappadocicus.

Auripigmenti, sandaracha.

Acanthæ, cerasiorum acantha.

Amyli, siccus pollen.

Guttæ ammoniacæ, propolis.

Aspalathi, ericæ fructus.

Aracis, sesamum.

Amygdalorum amarorum, absinthium.

Armenii, atramentum indicum.

Actes, acantha.

Agarici, euphorbium.

Argemones, seriphon.

Hastulæ regiæ radices, betæ succus.

Semperuiui succi, lactucæ succus aut folia.

Amianti, aphroselinon.

Aspalathi, uiticis semen.

Æthiopicae oleæ, lachrymæ acaciæ partes duæ.

Asii lapidis, galadites lapis, uel sal ammoniacus combustus.

Salis ammoniaci, cappadocicus.

Adipis uulpinæ, adeps ursinus.

*Aliud uice huius ponendū uidetur.

- Populi nigrae surculorem, sampsyclus.
Buprestis, blattę pendentes.
Butyri, lactis bouilli concretum.
Balsami liquoris, stillatitia myrrha.
5 Bdellii, sphagnus odoratus.
Gentianę radicis apium odoratum.
Terrę samia, leucographis ægyptia.
Terrę erethriados, calx thebaica.
Gongylidos, heliotropium.
10 Dulcis radiculae succi, succus sycamini.
Gruis fimi, columbæ finus.
Terrę tenerę, plumbago.
Dorycnii, alterci semen.
Dictamni, elelisphacus.
15 Baccarum lauri, serpyllis sicca.
Dauci, semen sui.
Diphrygis, lapis phrygius.
Dracunculi, androsmon.
Elelisphaci, nepita.
20 Olea lachrymę, hipocistidis succus.
Serpylli potamogiton.
Eruca seminis, erysini semen.
Elaterii succi, eiusdem herbę succus.
Erysini seminis, radix lanarię.
25 Ericę fructus, galla omphacitis.
Ebeni, lotinon aridum.
Erini foliorum, finus ciconię.
Ebisce radicis, folia mori.
Veratri nigri, radix papyri.
30 Enneaphylli, potamogiton.
Olei ueteris, duplicatum oleum coquitur cum adipe
suillo ueteri.
Zingiberis, pyrethrum.
Thapsiæ succi, chamæleontis nigri succus.
35 Thapsiæ, elydrión.
Thermuntiadis, lycopsolos.

PAULI AEGINETAE

Sulfuris uiui, sandaracha,
 Aeruginis ferri, scoria ferri.
 Visci quernei, chamaeleon niger.
 Iridis illyricae, elenium odoratum.
 Cinnamomi, cassiae duplicatum.
 Cassiae, brathae aut mannae, cinnamomum.
 Cyperi, iuniperus maior.
 Cardamomi, cyperis ammoniac.
 Costi, cedri baccae.
 Baccarum cedri, ladanum.
 Calami odorati, sphagnos.
 Croci, crocomagma.
 Crocomagmatis, aloe indica.
 Castorei, blattarum foetentium intestina.
 Cadmia, leucographis aegyptia.
 Crocodili adipis, canis marini adeps.
 Cicutae seminis, coriandrum.
 Cantharidum, phalangia.
 Cnidii seminis, uiticis semen.
 Hederae, liquor persicus.
 Gallae, sordes gymnastiorum.
 Capparis radices, ericae fructus uel myrica.
 Fimi palumbi, simus columbae.
 Ceraunini, leucographis.
 Coralli, moly.
 Fimi aluri, simus ichneumonis.
 Cinnaberis, rhodoides.
 Cumini, brassicae semen.
 Clinopodii, heliotropium.
 Nepitae, sylvestris menta.
 Cucurbitae sylvestris, semen ricini quod est
 crotonis.
 Cotyledonis, anacardium.
 Colophoniae, apochyma.
 Rubi canini, halicacabi semen.
 Crinanthemi, aphrodisium.

Comari,

- Comari, gutta ammoniaci.
 Pumicis, terra Cretica.
 Cypheos, carica uita.
 Buccinorum ostrea.
 Cardamomi, cyperus uel myrtus.
 Cere, lomentum, cum propoli coquitur teriturq;.
 Thuris, terra ampelitis.
 Lathyridum, coccum gnidium.
 Lepidii, erythrodanum.
 Lapidis asii, lapis gagates.
 Lapidis magnetis, lapis phrygius.
 Lapidis phrygii, lapis argentyritis.
 Libystici, semen staphilini.
 Lapidis pyritis, lapis pyrobolus.
 Leucini floris, radix lanaria.
 Loti seminis, semen betæ.
 Lepidii radice, folia capparis.
 Leporis marini, cancer fluuiatilis.
 Lini seminis, fabæ succus.
 Lappathi radice, radix pyrethri.
 Malabathri casia, uel nardus indica.
 Mandragoræ succi, dorycnion.
 Myrsinati, liquor mori.
 Mandragoræ, olea lachryma.
 Mastiches iunci rotundi cor.
 Myrobalani, peucion.
 Maluæ foenugracum.
 Mellis, sapa.
 Mannæ thuris cortex.
 Muscerdæ, mustelæ æquale pondus.
 Magnesinæ uitreæ, ptyelum Italicum, uel stimum parathicum.
 Medullæ ceruinæ, adeps ceruina uel medulla uitulina.
 Malorum cotoneorum, sertula campana.
 Misyos cyprii, ochra cypria.
 Mei, myrobalanus.

PAV. ÆGIN.

DDD

PAULI AEGINETA

Mororum succi, ruborum folia.
 Misyos tosti, diphryges.
 Malabathri, tractylus.
 Nardi syriaci, iuncus odoratus.
 Napi, gongilidis semen.
 Xylobalsami, radix uiolæ candidæ.
 Lachrymæ papaueris, succus mandragoræ.
 Opopanacis, lac sycamini.
 Liquoris cyrenaici, liquor syriacus.
 Opocarpasi, liquor myrti.
 Liquoris fici, liquor mori.
 Liquoris itææ, liquor hederæ nigræ.
 Liquoris rhododaphnæ, uiscus querneus.
 Oenanthæ succi, ampelini arboris succus.
 Hormini, lini semen.
 Orizæ, hordeacea farina.
 Vini rosati, uinum austerum.
 Orinthogallorum, anthalli.
 Acoris, gallæ omphacitis.
 Anacardii, psyche herba.
 Liquoris peucedani, dulcis radiculae succus.
 Propolis, ladanum.
 Pityocampes, uespæ in cedria.
 Piperis, zingiber.
 Pterei, cneori semen.
 Polypodii, radix chamæleæ, aut chamæleontis.
 Verbasci, chamæleuca.
 Polytrichi, absinthium.
 Resinæ piceæ, resina terebinthina.
 Rosarum siccarum, persi folia arida.
 Raphanini olei, recininum.
 Rhodoeidis, sinopis.
 Resinæ colophoniz, apochyma.
 Radicis lapathi, cynara.
 Iunci odorati, cardamomum.
 Cineris cyprii, cinis foliorum oleæ.

- Myrrha troglodytica, calamus odoratus.
 Seui ceruini, adeps anserinus.
 Adipis suilli, adeps uulpinus.
 Adipis uulpini, adeps urfinus.
 5 Lanariae radices, ueratri nigri radix.
 Satyrii, semen erucæ.
 Salamandra, lacerta uiridis.
 Sphagni aromatis, iunci rotundi elaborati.
 Syrici, argentispuma.
 10 Recrementi plumbi, recrementum argenti.
 Sampsuchi, thus magericum aridum.
 Sinapis, cardamomum.
 Sagapeni, piceæ resina arida.
 Scammonia, crotones ricini.
 15 Strobilorum, cucumeris semen.
 Aluminis, sal foslitius.
 Scyni, satyrion.
 Stymmeos contusi, squama æris.
 Iunci rotundi, polygoni radix.
 20 Recrementi cyprii, melantheria Ægyptia.
 Silymbrii, ocimum.
 Vuæ passæ satiuæ, palmulæ syriacæ caro.
 Sandonici, abrotanum.
 Sepiæ testæ, pumex.
 25 Serapiadis, pæoniae radix.
 Scyllæ, bulbus.
 Sesamoidis, expressum amaricinum.
 Zisami, semen lini.
 Alterci seminis, rubi canini semen.
 30 Hypocistidis succi, acaciæ acanthidis succus.
 Liquidæ picis, opopanax.
 Oesypi, medulla uitulina.
 Hyacinthi, flos isatidis.
 Hyperici, anethi semen.
 35 Flocium uini, sandaracha,
 Fuci, anchusa.

PAULI AEGINETAE

Phu, sphagnos.

Fellis suilli, fel perdicis.

Fellis uiperæ, fel ichneumonis.

Fellis mustelæ, fel cameli.

Fellis cameli, fel alabetæ.

Galbani, sagapenum.

Chamædryos, lapathi sylvestris radix.

Chamæmeli, anthemis.

Cerusæ, recrementum plumbi.

Psyllii, lenticula palustris.

Ocymi, sisymbrium.

Ocimoidis, menta sylvestris.

DE PONDERIBVS ET MEN- suris. Cap. XXVI.

Pondus grauitate mensor diiudicat, mensuram au-
tem uasculi concauitate, uasculum uero sicca quo-
titatis mensura est, aut humidæ, ut tres quantitates
quæ mensuratur, sint differentia, una quædem ponderis, al-
tera uero aridæ substantiæ qualis ea quæ in cumulum
cogi potest, porro tertia humidæ est substantiæ. Cum
autem multa propeque infinita sint pondera & mensuræ,
pro regionum diuersitate, & utentium consuetudine, de
iis quæ omnibus in usu communi sunt, nobis sermo er-
it præcipuus.

DE NOTIS PONDERVM & mensurarum.

Quoniam uero nonnulli literis non integris sed notis
signisque eas demonstrant, satius fuerit, ueteres in hac re
imitari, & primum characteras ipsos exponere. Primum
igitur χ litera, cum subscriptum habet alpha, chalcum,
hoc est æreolum signat, exempli gratia, χ^α. Si ο habeat,
choa, quod est congiū, χ^ο. Si υ, choenicem, χ^υ. Si η, che-
man, χ^η. At κ si ε habet suprapositum, & lineam rectam,
quæ per obliquum inferius cornu ipsius secet, ceratium
hoc est siliquam notat, ut κ^ε. Si υ superiectum est, cyathū
κ^υ. Si ο, cotylam, hoc est heminam. Si uero linea utrinque

circuli figuram repræsentet, obolum notat ω . Si duæ huiusmodi notæ sint, duos signant obolos $\omega\omega$. Qui grammæ hoc est scripulum faciunt, prima eius elementa scribunt addita linea, $\gamma\rho$. Duæ autem coniunctæ atq; altera parte in angulum coactæ duobus κ literæ cornibus si millem ad rectam lineam spectantibus, notant drachmā quæ alio nomine uocatur olca ω . proprie uero olca $\rho\lambda$ scribitur, cui in medio litera σ sit addita, $\rho\sigma$. Verum si λ adiectum, habet, libram signat, λ . Nonnulli uero eadem litera acato secunda accentu, idem ostendunt, $\lambda\acute{\sigma}$. At cum Γ litera, in ipso sui angulo σ habeat, unciam denotat, $\Gamma\sigma$. Quod si μ in summo uertice habeat oppositū, minam refert, μ . Si ν , notat mystrium. $\mu\nu$. Si ϵ , medimnū id est modium, $\mu\epsilon$. Si σ , modium, $\mu\sigma$. Porro τ post se habens ρ , & ν , signat tryglion, $\tau\rho\nu$. At ξ cui iuxta sit positum ϵ , xesten, qui est sextarius, ostendit, $\xi\epsilon$. Si σ apponatur, oxybaphum id est acetabulum $\xi\sigma$. Aliqui uero sextarium littera recta ξ secan es conficiunt, ξ . Sed η adiectum literæ μ , heminam $\eta\mu$. κ addita ρ , ceramium ualet, $\kappa\rho$.

DE POND E R I E V S.

Mina attica, & Ægyptia habet uncias sedecim. Romana uiginti. Libra uncias duodecim. Vncia drachmas octo. Drachma, habet scrupula tria. Scrupulum, obolos duos. Obolus, siliquas duas. Siliqua, æreolos duos, & duas tertii partes.

DE M E N S U R I S L I Q U I D I S.

Italicum ceraminum habet congios octo, Congius sextarios sex, Sextarius cochlearia duo, quæ nonnulli triblia nuncupant. Hemina idem triblium continet, mystra magna tria, acetabula quatuor. Nam magnum mystrium habet acetabulum. Acetabulum sesquicyathum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra parua duo. At si uoles & ponderum liquidorum mensuram scire, per multæ liquidarum rerum in examine suo differentia habentur, ut in olei, uini, & mellis exemplo dicemus. Mel igitur uino ponderosius quarta parte, itemq; decima est: quo fit ut

Alias tria.

PAULI AEGINETAE

fere tertia ponderis pars melli accedat: capit enim integram huius mensuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius est: continet. n. totum olei modum, & ultra semissem. Vinum, oleo nona parte supereminet, totum. n. ipsius pondus continet & nonam eius partem. Quod autem res fiat dilucidior, ceu exemplo, particularium mensurarum pondus subiungemus. Ex quo per ordinem quid communiter hæc differant, constituetur, his liquoribus publico consensu perspicuis in usum prolatis, oleo, uino, melle.

	Olei.	Vini.	Mellis.
Italica amphora	lib. 72	lib. 80	lib. 108
Congius	lib. 9	lib. 10	lib. 13 & semis.
Sextarius	lib. 1. uncias. 6	lib. 1. uncias. 8	uncias. 13 & semis.
Hemina	uncias. 9	uncias. 10	uncias. 13 & semis.
Mystrū magnū	uncias. 3	uncias. 3. scrup. 8	uncias. 4 & semis.
Acetabulum	drach. 18	uncias. 2. scrup. 12	drach. 27
Cyathus	drach. 12	drach. 12. scrup. 4	uncias. 2 drach. 2
Mystrū paruum	drach. 16	scrup. 20	drach. 9

Oribasius secundum Adamantium author est, sextariū quidem Italicum uini mensura unciarū uigintiquatuor esse, pondere uero unciarum uiginti. cum sextarius mensuræ mellis duas libras, semissem, pendeat.

DE ARIDIS.

Ægyptia artaba habet modios quinque. Modius ægyptius & Italicus chœnices octo. Chœnix sextarios duos Sextarius, semifextarios duos quos heminas uocant. Hemina habet cyathos octo. Atticus medimnus habet semifextaria, quæ hemiecta uocant, duodecim. Hemiectum chœnices quatuor. Ita semimedimnus habebit minas quadraginta nouem, sextarios nonaginta sex. Huiusmodi autem mensurarum pondus exponere haud facile, quod aridarum rerum infinitæ iuxta momenti longis rationem differentię existant.

FINIS.

REGISTRVM.

AB C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X
Y Z A A B B C C D D E E F F G G H H I I K K L L
M M N N O O P P Q Q R R S S T T V V X X Y Y
Z Z A A A B B B C C C D D D.

Omnes sunt quaterni præter D D D qui est duernus.

Venetis apud Ioannem Farreum & fratres de
Riuoltella. Anno à partu Virginis,
M D X X X I.

2 y
3. III. 25
Hely

REGISTRVM
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X
Y Z A A B B C C D D E E F F G G H H I I K K L L
M M N N O O P P Q Q R R S S T T V V X X Y Y
Z Z A A A B B B C C C D D D

Quoniam hunc mundum p[er]tinet D D d d e e f f g g h h i i k k l l
m m n n o o p p q q r r s s t t v v x x y y z z
Venerabilis pater noster pater noster pater noster
Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen
M D X X X X

